

新聞稿附表

表 1. 影響未滿 12 歲兒童發生氣喘之因素

問項	佔率(%)
塵蟎	46.3%
氣溫急劇變化	37.7%
病毒感染	36.8%
冰冷的食物	28.8%
空氣污染	24.2%
劇烈運動	16.1%
其他	11.2%

資料來源：2013 年國民健康訪問調查(NHIS)

問卷題目：請問影響他發生氣喘的因素有哪些？(可複選)

- | | |
|-------------|------------------|
| a 空氣污染 | h 劇烈運動 |
| b 貓狗等寵物的毛髮 | i 藥物(如阿斯匹靈) |
| c 冰冷食物 | j 激烈情緒反應(如大笑、大哭) |
| d 塵蟎 | k 蚊香、燒香 |
| e 花粉、乾草 | l 菸品燃燒的煙霧 |
| f 氣溫急遽變化 | m 其他影響因素 |
| g 病毒感染(如感冒) | n 不知道是什麼因素 |

註：完訪樣本數採本題實際完訪樣本數之最大可利用值，其餘各分項之人數及百分比(%)為經加權處理之樣本數及百分比(%)。

表 2. 未滿 12 歲兒童氣喘盛行率

	盛行率(%)
總計	6.7%
性別	
男	7.8%
女	5.4%
年齡	
0-5 歲	4.6%
6-11 歲	8.4%

資料來源：2013 年國民健康訪問調查(NHIS)

問卷題目：他過去是否曾經被醫師診斷有氣喘？

註：完訪樣本數採本題實際完訪樣本數之最大可利用值，其餘各分項之人數及百分比(%)為經加權處理之樣本數及百分比(%)。