

中華民國 108 年

癌症登記報告

CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT, 2019

TAIWAN



守護健康

衛生福利部

國民健康署

衛生福利部國民健康署
編印

中華民國 110 年 12 月出版

HEALTH PROMOTION ADMINISTRATION
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE
TAIWAN
DECEMBER 2021

經費由國民健康署菸品健康福利捐支應

目 錄

民國 108 年長短表癌症登記工作	xi
前 言	xiii
癌症登記資料處理流程圖	xvi
癌症登記資料偵測流程圖	xvii
參與癌症登記醫院名單	xxiii
癌症登記小組諮詢委員名單	xxv
 壹、民國 108 年癌症別發生率統計	
一、民國 108 年侵襲癌發生率及死亡率	1
全癌症	2
台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序	3
口腔、口咽及下咽 (ICD-O-3 C00 - C14 (主唾液腺 C07 - C08，鼻咽 C11 除外))	6
口腔 (ICD-O-3 C00 - C06)	8
唇 (ICD-O-3 C00 (唇的皮膚 C44.0 除外))	10
舌 (ICD-O-3 C01 - C02)	11
齒齦 (ICD-O-3 C03)	12
口底 (ICD-O-3 C04)	13
口腔之其他及未詳細說明部位 (ICD-O-3 C05 - C06)	14
口咽 (ICD-O-3 C09 - C10)	15
下咽 (ICD-O-3 C12 - C13)	16
咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 (ICD-O-3 C14)	17
口腔 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	18
口咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	20
下咽 (ICD-O-3 分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.)	22
主唾液腺 (ICD-O-3 C07 - C08)	24
鼻咽 (ICD-O-3 C11)	26
消化器官及腹膜 (ICD-O-3 C15 - C26，C48)	
食道 (ICD-O-3 C15)	28
胃 (ICD-O-3 C16)	30
小腸 (ICD-O-3 C17)	32

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 (ICD-O-3 C18 - C21)	34
結腸 (ICD-O-3 C18)	36
直腸、乙狀結腸連結部及肛門 (ICD-O-3 C19 - C21)	38
肝及肝內膽管 (ICD-O-3 C22)	40
膽囊及肝外膽管 (ICD-O-3 C23 - C24)	42
胰 (ICD-O-3 C25)	44
後腹膜腔及腹膜 (ICD-O-3 C48)	46
消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 (ICD-O-3 C26)	48
呼吸系統及胸腔內器官 (ICD-O-3 C30 - C39)	
鼻腔、副竇、中耳及內耳 (ICD-O-3 C30 - C31)	50
喉 (ICD-O-3 C32)	52
肺、支氣管及氣管 (ICD-O-3 C33 - C34)	54
胸膜 (ICD-O-3 C38.4)	56
胸腺、心臟及縱膈 (ICD-O-3 C37 - C38.3 , C38.8)	58
骨、關節及關節軟骨 (ICD-O-3 C40 - C41)	60
結締組織、軟組織及其他皮下組織 (ICD-O-3 C47 , C49)	62
皮膚 (ICD-O-3 C44)	64
皮膚，惡性黑色素瘤 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903)	66
皮膚，非惡性黑色素瘤 (ICD-O-3 C44 M-87203 - M-87903 除外)	68
乳房 (ICD-O-3 C50)	70
女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C58)	
子宮頸 (ICD-O-3 C53)	72
子宮體 (ICD-O-3 C54)	74
卵巢、輸卵管及寬韌帶 (ICD-O-3 C56 , C57.0 - C57.4)	76
陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 (ICD-O-3 C51 - C52 , C57.7 - C57.9)	78
男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 - C63)	
攝護腺 (ICD-O-3 C61)	80
睪丸 (ICD-O-3 C62)	82
陰莖及其他男性生殖器官 (ICD-O-3 C60 , C63)	84
泌尿器官 (ICD-O-3 C64 - C68)	

膀胱 (ICD-O-3 C67)	86
腎 (ICD-O-3 C64)	88
腎盂及其他泌尿系統 (ICD-O-3 C65 - C66 , C68)	90
眼及淚腺 (ICD-O-3 C69)	92
中樞神經系統 (ICD-O-3 C70 - C72)	
腦 (ICD-O-3 C71)	94
腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 (ICD-O-3 C70 , C72)	96
甲狀腺 (ICD-O-3 C73)	98
其他內分泌腺 (ICD-O-3 C74 - C75)	100
不明原發部位 (ICD-O-3 C80)	102
白血病 (ICD-O-3 M-980 - M-999 , 詳細範圍請見附錄五)	104
急性淋巴性白血病	106
慢性淋巴性白血病	108
急性骨髓性白血病	110
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	112
惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 M-959 - M-976 , 詳細範圍請見附錄五)	
淋巴結惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C77 M-95903 - M-97643)	114
淋巴結外惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 C00 -C80 (C77 除外) M-95903 - M-97643) ..	116
惡性淋巴瘤申報發生人數按原發部位及細胞形態分類表	118
何杰金氏淋巴瘤	120
非何杰金氏淋巴瘤	122
漿細胞瘤	124
 二、民國 108 年原位癌發生率	127
台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年	128
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌 (ICD-O-3 C18 - C21)	132
肺、支氣管及氣管，原位癌 (ICD-O-3 C33 - C34)	134
乳房，原位癌 (ICD-O-3 C50)	136
子宮頸，原位癌 (ICD-O-3 C53)	138
膀胱，原位癌 (ICD-O-3 C67)	140

三、民國 108 年癌症申報發生人數分類統計表.....	143
表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類.....	144
表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類 【依據 WHO 2017 年的分類】	158
表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部 位、性別分類（每 10 萬人口）	168
表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 108 年【依據 WHO 2017 年的分類】	178
表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類.....	188
表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類	252
表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類	260
表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類	264
表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類	272
表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類	276
表七 台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類.....	280
表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及分化程度分類	404
表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類	412
表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類， 民國 81 至 108 年	476
附錄一 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準	488
附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)	492
附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 108 年	494
附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口	495
附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表.....	496
附錄六 108 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布	497
附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版分類標準	498

民國 108 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 108 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	501
□ 口腔癌.....	502
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	502
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	505
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	505
□ 咽癌.....	508
表二之一 □ 咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	508
表二之二 □ 咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	510
表二之三 □ 咽癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之四 □ 咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	513
表二之五 □ 咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	514
表二之六 □ 咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	515
表二之七 □ 咽癌(P16-)發生人數按整併期別及治療方式分類	516
表二之八 □ 咽癌(P16-) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	517
表二之九 □ 咽癌(P16-) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	518
表二之十 □ 咽癌(P16-) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	519
下咽癌.....	522
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	522
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	525
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	525
喉癌	528
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	528
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	530

表四之三 喉癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	530
表四之四 喉癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	531
表四之五 喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	531
主唾液腺癌.....	534
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	534
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	536
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	536
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	537
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	537
鼻咽癌.....	540
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	540
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	542
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	542
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	543
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	543
食道癌.....	546
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	546
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	548
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	549
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	551
胃癌	554
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	554
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類	556
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	557
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	558
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	559
結腸癌.....	562
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	562
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	564
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	565

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	566
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	567
直腸癌.....	570
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	570
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	572
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	573
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	574
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	575
肝癌	578
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	578
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	580
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	586
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	588
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	588
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類....	589
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	589
肺癌	592
表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	592
表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	594
表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	598
表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	598

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按肺小細胞癌的分期系統及治療方式分類.....	600
表十二之八 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	600
乳癌	602
表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	602
表十三之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	610
子宮頸癌	616
表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	616
表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	619
表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	621
表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	622
表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	623
表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	623
表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	625
子宮體癌	628
表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	628
表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類	630
表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	630
表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	632
卵巢癌	636
表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	636
表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	638

表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	638
表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	640
攝護腺癌	644
表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	644
表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	650
膀胱癌	654
表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	654
表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別之治療方式分類	658
表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	658
表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	660
表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	660
惡性淋巴瘤	664
表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	664
表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	666
表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	667
表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	668
表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ..	669

民國 108 年

長短表癌症登記工作

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首，每年奪走 4 萬多人的生命，不但影響病患和家人之生活品質，也造成龐大的工作人年損失和醫療費用支出。如何有效防治癌症，是台灣當前重要的醫療照護與公共衛生課題之一。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。民國 92 年 5 月公布之癌症防治法規定，癌症防治醫療機構應提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。

為了使我國的癌症監測工作更有系統，衛生福利部自民國 68 年起建立以 50 床以上的醫院為申報單位之新發癌症登記申報系統，並設立癌症登記委員會訂定新發癌症個案登記作業標準；台灣癌症登記系統之資料蒐集與處理作業可分 2 個階段：第 1 階段由申報醫院對其院內診斷或治療之新發癌症個案，進行個案確定與資料蒐集，申報醫院依據癌症登記委員會設計之標準化格式與代碼進行資料登錄或轉錄，以書面、媒體或線上登錄方式申報至癌症登記中心；第 2 階段由癌症登記中心進行新發癌症資料之整理、分析、檔案製作與年報之編撰。本年報資料係以截至民國 110 年 5 月 11 日止，198 家 50 床以上申報醫院所申報之民國 108 年間新發診斷為**侵襲癌**與**原位癌**的個案進行分析。茲說明申報個案條件、新發個案資料蒐集與處理、發生率計算、申報資料品質指標，及癌症登記年報圖表之製作與編排於后：

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年至民國 90 年之新發癌症診斷個案之腫瘤學分類，係採 ICD-O, Field Trial Edition（ICD-O-FT），自民國 91 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，申報分類標準採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3），該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼，因此本報告中除列出所有個案組織形態個案數分布外，也增列經顯微鏡檢證實之組織形態個案數分布。多重原發性腫瘤部分，癌症申報自民國 96 年後新診斷個案均採用 SEER "Multiple Primary and Histology Coding Rule" 規則進行多發癌症判斷與申報。本報告資料處理與分析係參照國際癌症研究總署（International Agency

for Research on Cancer, IARC) 之多重原發性腫瘤分類標準(附錄一)，進行歸類與計算，此與 IARC 發表之五大洲癌症發生率採用相同標準，以便於國際比較使用。

二、新發個案資料蒐集與處理

(一) 申報時程與方式

為縮短癌症登記申報作業時程與邏輯偵測回覆即時性，國民健康署與癌症登記中心建置「線上邏輯偵測與申報作業」且於民國 99 年 8 月正式上線。故所有癌症醫院需將申報資料依標準化格式以線上申報方式或轉錄儲存於電子媒體中，按季申報(每年 3、6、9、12 月)給癌症登記中心進行資料彙整與處理。所有資料申報最遲須於新發個案確定診斷後 12 個月內進行。

於民國 91 年以前，癌症登記資料庫僅收錄**短表 20 欄位**之癌症診療相關資料。自民國 91 年起，開始著手**長表 65 欄位**癌症資料收集工作，且僅**口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌**等 6 種癌症納入長表申報作業。後續於民國 95 年依照診療資料詳細程度區分之**長表及短表**資料庫申報內容進行改版，則各癌症醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案應全部改採「**96 年版**」癌症登記項目申報；此階段長表申報項目為**95 欄位**，短表申報項目則為**33 欄位**；其中僅申報短表醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫，原自民國 91 年起陸續參與長表申報醫院，則依 95 欄位長表內容申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫。另自民國 97 年新增**食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌**；再於民國 98 年起，新增**主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤**等至長表申報範圍；民國 102 年再加入**喉癌**共 16 種癌症收錄長表資料。因參與長表申報醫院之 16 種主要癌症，僅需申報長表格式，無需再將同一個案申報至短表資料庫。

於民國 99 年，為因應癌症診療實務與品質提升需要，且考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表資料庫內，故規劃及研擬符合我國收錄前述 15 種癌症部位特定因子(Site-Specific Factors, 簡稱 SSF)之摘錄內容，其收錄分類包括：**(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記**(例如：結直腸癌之 CEA)、**(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標**(例如：乳癌之 HER2)、**(3)治療效果評估**、**(4)決定存活之極重要的治療副作用**(例如：血癌之 GVHD)、**(5)影響預後的手術病理特徵**(例如：結直腸癌之 Perineural invasion)等。此外，同時基於公共衛生的考量，亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數(BMI)等危險因

子收錄於「**100 年版**」癌症登記摘錄手冊；故自民國 100 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 100 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 114 欄位，短表申報項目新增為 42 欄位。

為因應 AJCC 第八版癌症分期手冊應用於民國 107 年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100 年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107 年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國 107 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 107 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 115 欄位，短表新增為 45 欄位。

(二) 申報資料內容


衛生福利部訂定之結構式新發癌症個案摘錄表（附錄二）內容包含：

- 1 申報機構：包括醫療機構名稱、代碼。
- 2 患者資料：包括病歷號碼、姓名、身分證字號、性別、出生年月日、戶籍地代碼。
- 3 癌症確認：包括診斷年齡、癌症發生順序號碼、個案分類、首次就診日期、最初診斷日期、原發部位、側性、組織形態、性態碼、分級/分化、癌症診斷方式和首次顯微鏡檢證實日期。
- 4 最初診斷期別：包括臨床/病理 TNM stage。（僅長表收錄）
- 5 首次療程：包括申報醫院首次療程中各項治療及治療開始日期。
（民國 99 年以前「標靶藥物」皆歸類在「化學治療」項目下進行申報與年報分析。自民國 100 年起，因新增標靶藥物治療項目，故「標靶治療」將獨立分析與呈現。民國 107 年起，新增「其他治療」項目與臨床試驗化學治療、臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療、臨床試驗免疫治療、臨床試驗標靶治療選項）
- 6 結果：包括首次復發型式與復發日期、生存狀態、死亡日期。（僅長表收錄）
- 7 危險因子：包括身高、體重、吸菸行為、嚼檳榔行為及喝酒行為。
（民國 100 年起新增收錄項目，民國 107 年起長表新增「首次治療前生活功能狀態評估」項目）
- 8 部位特定因子（SSF）：依各癌別不同，包括結直腸癌之 CEA 與 Perineural invasion、乳癌之 HER2、血癌之 GVHD 等。（民國 100 年起長表新增收錄項目）


(三) 資料處理流程及偵測標準

癌症登記中心於收到資料後之處理及偵測流程如下圖：

癌症登記資料處理流程圖



癌症登記資料偵測流程圖



(四) 年報資料處理

癌症登記中心須將長表資料先截取短表資訊後（不包括癌症部位特定因子內容），再進行全國癌症登記年報之資料處理與分析。故本年報第一部分之「民國 108 年癌症發生率統計」（第 1-498 頁）包含長短表資料共同分析；而第二部分之「民國 108 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計」（第 499-665 頁）僅分析長表資料內容。

截至民國 110 年 5 月 11 日止，癌症登記中心共收到民國 108 年新發診斷之侵襲癌 157,200 例，原位癌 17,416 例，經身分證字號、姓名、罹癌部位、與組織形態比對，剔除重複申報病例及不符申報定義的個案後，共有 121,254 例侵襲癌個案，其中男性 64,109 例、女性 57,145 例。

依 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準（附錄一）進行分析之民國 108 年年報，合併歸類後減少 38,552 筆，其癌症個案數差異整理如下：

癌症發生醫院申報個案合併歸類前後分布

項目	侵襲癌與原位癌		侵襲癌	
108 年癌症發生醫院申報數	174,616		157,200	
重複個案合併方式	重複個案數	合併後個案數	重複個案數	合併後個案數
同一個案癌症部位相同且組織形態同組者	21,898	152,718	21,113	136,087
同一個案組織形態有 Lymphoma 或 Leukemia 或 Kaposi Sarcoma 經檢查為重複者	890	151,828	890	135,197
同一個案癌症部位代碼前三碼相同且資料為三筆以上者	13,995	137,833	12,377	122,820
多重部位原發個案合併歸類者	1,484	136,349	1,282	121,538
同一個案之癌症部位其一為「不明原發部位」	285	136,064	284	121,254
108 年癌症發生個案數	136,064		121,254	
重複個案處理前後差異數（%）	38,552 (22.08%)		35,946 (22.87%)	

三、發生率計算與個案數變化

本報告發生率係以台灣之人口為分母，新發報告個案為分子計算。人口數係依據內政部所提供之民國 108 年性別、年齡別人口數之電子檔計算所得。全癌

症之侵襲癌粗發生率為每 10 萬人口 513.72，其中男性為 547.70，女性為 480.29。為便於與不同人口結構族群比較，本年報分別以 1976 年及 2000 年世界標準人口計算年齡標準化發生率，以 2000 年世界人口計算之全癌症之侵襲癌年齡標準化發生率是每 10 萬人口 315.86，其中男性為 345.37、女性為 292.66。各癌症之性別、年齡別發生數與發生率，及年齡標準化發生率均列於報告內。

民國 108 年全癌症個案數為 121,254 人，較 107 年的 116,131 人增加 5,123 人，增加率為 4.41%。增加數如下表：

108 年癌症個案數增加最多前 5 名

癌症部位	發生數		增加數	增加百分比*
	107 年	108 年		
1.肺、支氣管及氣管	15,345	16,233	888	5.79%
2.結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,525	17,302	777	4.70%
3.女性乳房	14,217	14,856	639	4.49%
4.攝護腺(前列腺)	6,644	7,115	471	7.09%
5.皮膚	4,049	4,442	393	9.71%

*增加百分比= (當年發生數 - 前一年發生數) ÷ 前一年發生數 × 100%

四、申報資料品質指標

自癌症個案診斷年民國 88 年起，癌症登記中心於每年將各醫院申報個案資料，與全國死亡檔的資料比對，扣除已申報個案後，將未申報個案名單提供申報醫院進行個案申報條件之確認，以促進該院申報個案之完整，並縮短申報時程；之後診斷年民國 91 年的個案開始，比對的資料檔加入全民健康保險重大傷病檔中診斷為癌症的個案，以及台灣子宮頸癌篩檢報告檔中的子宮頸細胞抹片檔確診為高度病變以上個案；診斷年民國 93 年開始加入子宮頸切片檔確診為高度病變以上個案；民國 94 年起則加入衛生福利部大腸癌、乳癌、口腔癌篩檢計畫診斷為癌症的個案；上述重大傷病檔、死亡檔、大腸癌、乳癌、口腔癌與子宮頸癌篩檢檔作為追蹤的可能癌症個案資料來源。

此外，資料品質的指標主要是用以評估登記系統的完整性及效度，IARC 係以僅有死亡診斷的個案百分比 (Percentage of Death Certificate Only Cases, DCO%) 作為完整性的指標、以及經形態學證實的個案百分比 (Percentage of Morphologically Verified Cases, MV%) 作為效度的指標。為使指標具可比較性，本年報也依據 IARC 慣例以 DCO% 及 MV% 作為申報資料品質指標。

(一) 申報之完整性與縮短年報誤差

藉由每年例行的癌症個案申報提醒、催收程序，合併各可能癌症個案資料來源、與癌症登記申報資料庫，計算各年癌症登記申報完整性從 90 年的 91.28%，提升至 108 年約 98.35%，顯示依據各癌症資料來源進行醫院催收作業，對癌症登記申報的完整性實有相當助益。另資料申報時程由民國 93 年之前的 23 個月，近年來已縮短為 14 個月。

(二) 僅有死亡診斷的個案百分比（DCO%）

僅有死亡登記的個案是指死亡登記中記載在當年死於癌症，但從未經由任何途徑申報到登記系統的個案，這些個案的資料及診斷僅依據死亡證明書上的紀錄，資料較不周延，亦無經過進一步的鑑定，若此等個案的比例太高，即表示登記系統覆蓋面不夠完整，而且系統中的資料品質較參差不齊。經由資料檔案比對催收的結果，DCO%由診斷年民國 87 年的 8.84%降至民國 108 年的 0.71%。另民國 106-108 年之重要癌症 DCO%如下表所示：

民國 106-108 年重要癌症僅有死亡診斷的個案百分比分布

癌症部位	民國 106 年*			民國 107 年*			民國 108 年		
	癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO		癌症 個案數	DCO	
		個案數	百分比**		個案數	百分比**		個案數	百分比**
女性乳房	17,060	41	0.24%	17,336	33	0.19%	17,790	39	0.22%
結腸及直腸	21,443	91	0.42%	21,701	86	0.39%	22,514	81	0.36%
肝及肝內膽管	11,697	195	1.64%	11,662	191	1.61%	11,294	166	1.45%
肺、支氣管及氣管	15,400	202	1.29%	16,589	209	1.24%	17,042	237	1.37%
攝護腺	6,137	26	0.42%	6,845	38	0.55%	7,139	29	0.40%
口腔，口咽及下咽	8,211	15	0.18%	8,558	21	0.24%	8,503	22	0.26%
胃	4,093	48	1.16%	4,183	26	0.62%	4,257	35	0.82%
子宮頸	4,361	5	0.11%	4,377	5	0.11%	4,508	6	0.13%
皮膚	4,462	5	0.11%	4,732	3	0.06%	5,074	5	0.10%
子宮體	2,872	3	0.10%	2,987	1	0.03%	3,328	4	0.12%
全癌症	128,370	975	0.75%	132,958	959	0.72%	136,064	977	0.71%

* 民國 106、107 年的數據為 110 年 7 月增修資料後之結果

** $DCO\% = \frac{DCO \text{ 個案數}}{(DCO \text{ 個案數} + \text{癌症個案數})} \times 100\%$

(三) 經形態學證實的個案百分比（MV%）

經形態學證實的個案意指經由組織學、細胞學、血液學等顯微鏡檢證實為癌

症的個案。一般而言，MV%高表示癌症個案診斷的正確性較高。MV%高低依不同腫瘤差異甚大，除少數腫瘤（如：肝、腦幹...等）外，MV%應以高值較佳。民國 108 年全癌症個案之 MV%為 93.47%，男性為 92.31%，女性為 94.77%。

五、癌症登記年報圖表之製作與編排

本報告各部位分類原則係參照 IARC 發表之五大洲癌症發生率標準。民國 91 年之前的癌症登記報告，除子宮頸癌依侵襲癌、原位癌分列外，其餘癌症係將原位癌與侵襲癌個案資料合併分析，製作圖表。自民國 92 年起，癌症登記報告則將所有癌症個案依「侵襲癌」、「原位癌」分別進行處理與分析，報告內容僅以「侵襲癌」資料進行圖表製作，原位癌部分則列出子宮頸、乳房、結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門、膀胱和肺的資料供參考。

民國 96 年癌症登記報告開始，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。民國 97 年起，癌症登記報告新增修三個部份：第一部份為新增口腔癌參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版所修訂的口腔、口咽、下咽分類，以符合臨床醫師判斷的參考價值；第二部份為新增血液腫瘤依據 WHO 2008 年分類編修，將血液腫瘤採新、舊分類併呈；第三部份是將『長短表癌症發生率統計』與『長表申報十六種癌症期別與治療方式分析』合訂為一冊，內容除癌症發生率統計外，還增加主要癌症期別與治療分佈之統計分析資料。

民國 99 年至 105 年癌症登記報告，血液腫瘤僅採「WHO 2008 年分類標準暨 2010 年台灣編修版」呈現，民國 106 年癌症登記報告起，血液腫瘤採「WHO 2017 年分類標準暨 2018 年台灣編修版」新分類呈現，請見附錄五。民國 100 年起，因應五都改制，本年報表三「台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類」由原 25 縣市改為 22 縣市呈現。

自民國 101 年癌症登記報告開始，表七組織形態係依據 WHO (World Health Organization Classification of Tumours) 各癌別分類原則進行分組，個案數較少的組織形態將依以下原則合併：對上皮癌為主的癌症部位，「其他特定上皮癌」為特定的 carcinoma，未能歸在表格內已列出之 carcinoma 主要分組中，將合併在此分類；「非特定上皮癌」為 carcinoma, NOS，無法歸類至 carcinoma 任一組；「其他惡性腫瘤」包含 Neoplasm, malignant，以及少數不可歸於任一分組者。對惡性肉瘤為主的癌症部位，「其他惡性肉瘤」包含其他特定惡性肉瘤（Other specified sarcoma）及非特定惡性肉瘤（Sarcoma, NOS）；「其他惡性腫瘤」包含 Neoplasm, malignant 及少數非惡性肉瘤。

有關年報治療方式之呈現，在第壹章發生率統計部分(長短表數據)，每名個案所接受之治療方式均分別計數；在第貳章癌症期別分類統計表部分(長表數據)，呈現每名個案所接受之治療組合方式。若個案同時接受正規治療與緩和照護(包含緩和性的手術/放療/化療或安寧療護等)，在第壹章正規治療與緩和照護皆會分別計數，在第貳章會歸至正規治療組合項目，而第貳章所呈現的緩和照護，為僅接受緩和照護者。「未有首次治療申報記錄」表示個案在癌症登記收錄治療欄位中(包含手術/放療/化療/賀爾蒙/類固醇/免疫/內分泌/標靶/其他/緩和照護)，皆未有申報記錄者。

因為癌症登記資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或歷年延遲申報的個案，每年製作年報時將重新統計，請見本年報表十，其中民國 92 年至 93 年新發個案報告數年度變化率增加幅度較大，可能係因 92 年 SARS 流行影響個案就醫所致。

六、存活率分析

存活率資料可參考癌症登記中心網站：

<http://tcr.cph.ntu.edu.tw/main.php?Page=A5B3>

七、長表申報 16 種癌症特定因子(SSF)分佈統計表

長表申報 16 種癌症特定因子(SSF)分佈統計資料可參考癌症登記中心網站：

<http://tcr.cph.ntu.edu.tw/main.php?Page=A5#t02>

參與癌症登記醫院名單

1. 國立臺灣大學醫學院附設醫院
2. 臺北榮民總醫院
3. 三軍總醫院附設民眾診療服務處
4. 臺北市立聯合醫院中興院區
5. 臺北市立聯合醫院仁愛院區
6. 臺北市立聯合醫院和平院區
7. 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院
8. 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院
9. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
10. 臺北醫學大學附設醫院
11. 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
12. 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
13. 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院
14. 中山醫療社團法人中山醫院
15. 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處
16. 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院
17. 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院
18. 博仁綜合醫院
19. 臺北市立聯合醫院婦幼院區
20. 臺北市立聯合醫院陽明院區
21. 西園醫療社團法人西園醫院
22. 臺北市立聯合醫院忠孝院區
23. 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
24. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
25. 振興醫療財團法人振興醫院
26. 臺北市立萬芳醫院
27. 衛生福利部胸腔病院
28. 康寧醫療財團法人康寧醫院
29. 臺北市立關渡醫院
30. 中國醫藥大學附設醫院臺北分院
31. 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院
32. 衛生福利部基隆醫院
33. 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會台灣礦工醫院
34. 三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處
35. 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
36. 衛生福利部臺北醫院
37. 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院
38. 板橋中興醫院
39. 新北市立聯合醫院
40. 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
41. 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院
42. 祐民醫院
43. 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
44. 新泰綜合醫院
45. 仁愛醫院
46. 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
47. 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院
48. 衛生福利部雙和醫院
49. 天主教輔仁大學附設醫院
50. 國立陽明交通大學附設醫院
51. 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院
52. 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院
53. 臺北榮民總醫院蘇澳分院
54. 財團法人蘭陽仁愛醫院
55. 臺北榮民總醫院員山分院
56. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
57. 臺北榮民總醫院新竹分院
58. 南門綜合醫院
59. 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處
60. 東元醫療社團法人東元綜合醫院
61. 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院
62. 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院
63. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院
64. 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院
65. 中國醫藥大學新竹附設醫院
66. 新國民醫療社團法人新國民醫院
67. 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院
68. 衛生福利部桃園醫院
69. 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處
70. 敏盛綜合醫院
71. 龍潭敏盛醫院
72. 天成醫院
73. 臺北榮民總醫院桃園分院
74. 聯新國際醫院
75. 怡仁綜合醫院
76. 天成醫療社團法人天晟醫院
77. 衛生福利部桃園醫院新屋分院
78. 重光醫院
79. 衛生福利部苗栗醫院
80. 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院
81. 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院
82. 大千綜合醫院
83. 協和醫院
84. 梓榮醫療社團法人弘大醫院
85. 衛生福利部臺中醫院
86. 中山醫學大學附設醫院
87. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處
88. 澄清綜合醫院
89. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院
90. 臺中榮民總醫院
91. 中國醫藥大學附設醫院
92. 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院
93. 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院
94. 澄清綜合醫院中港分院
95. 林新醫療社團法人林新醫院
96. 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院
97. 光田醫療社團法人光田綜合醫院
98. 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
99. 衛生福利部豐原醫院
100. 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

參與癌症登記醫院名單

101. 清泉醫院
102. 賢德醫院
103. 中國醫藥大學附設醫院豐原分院
104. 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
105. 亞洲大學附屬醫院
106. 衛生福利部彰化醫院
107. 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
108. 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
109. 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院
110. 員榮醫療社團法人員榮醫院
111. 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院
112. 員林何醫院
113. 員生醫院
114. 惠來醫療社團法人宏仁醫院
115. 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
116. 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院
117. 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院
118. 衛生福利部南投醫院
119. 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院
120. 臺中榮民總醫院埔里分院
121. 佑民醫療社團法人佑民醫院
122. 竹山秀傳醫院
123. 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院
124. 衛生福利部嘉義醫院
125. 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
126. 臺中榮民總醫院嘉義分院
127. 衛生福利部朴子醫院
128. 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
129. 臺中榮民總醫院灣橋分院
130. 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
131. 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
132. 陽明醫院
133. 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
134. 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
135. 中國醫藥大學北港附設醫院
136. 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院
137. 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院
138. 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院
139. 衛生福利部臺南醫院
140. 奇美醫療財團法人奇美醫院
141. 郭綜合醫院
142. 國立成功大學醫學院附設醫院
143. 台南市立醫院
144. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院
145. 臺南市立安南醫院
146. 衛生福利部新營醫院
147. 高雄榮民總醫院臺南分院
148. 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
149. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院
150. 衛生福利部臺南醫院新化分院
151. 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
152. 高雄市立民生醫院
153. 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
154. 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處
155. 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院
156. 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院
157. 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處
158. 高雄市立聯合醫院
159. 高雄榮民總醫院
160. 祐生醫院
161. 健仁醫院
162. 健新醫院
163. 高雄市立小港醫院
164. 高雄市立大同醫院
165. 義大醫療財團法人義大大昌醫院
166. 謝外科醫院
167. 衛生福利部旗山醫院
168. 高雄市立鳳山醫院
169. 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處
170. 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
171. 高雄市立岡山醫院
172. 建佑醫院
173. 劉光雄醫院
174. 義大醫療財團法人義大醫院
175. 義大醫療財團法人義大癌治療醫院
176. 衛生福利部澎湖醫院
177. 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處
178. 衛生福利部屏東醫院
179. 輔英科技大學附設醫院
180. 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
181. 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處
182. 民眾醫院
183. 南門醫療社團法人南門醫院
184. 高雄榮民總醫院屏東分院
185. 安泰醫療社團法人安泰醫院
186. 寶建醫療社團法人寶建醫院
187. 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院
188. 枋寮醫療社團法人枋寮醫院
189. 衛生福利部臺東醫院
190. 東基醫療財團法人台東基督教醫院
191. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院
192. 臺北榮民總醫院臺東分院
193. 衛生福利部花蓮醫院
194. 臺北榮民總醫院玉里分院
195. 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
196. 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處
197. 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
198. 衛生福利部金門醫院

癌症登記小組諮詢委員名單

朱旆億

秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院病理科主任

李文宗

臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授

李偉華

衛生福利部雙和醫院病理科教授兼專任主任級主治醫師

李興中

新竹國泰綜合醫院院長

林成俊

長庚紀念醫院林口總院胃腸肝膽科系副教授

林秀玲

臺灣大學醫學院附設醫院癌症防治中心專員

邱昭華

台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任

侯明鋒

高雄醫學大學附設中和紀念醫院教授

柯政郁

臺灣大學醫學院附設醫院耳鼻喉科暨耳鼻喉部主任

洪志宏

長庚紀念醫院林口總院副院長

張廷彰

長庚紀念醫院林口總院婦產部教授

張獻崑

長庚紀念醫院林口總院腫瘤科主治醫師

陳健弘

臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院副院長

癌症登記小組諮詢委員名單

游山林

輔仁大學醫學院醫學系助理教授

黃經民

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院放射腫瘤科主任

蒲永孝

臺灣大學醫學院泌尿科教授

鄭永銘

臺灣大學醫學院附設醫院病理部主任

鄭安理

臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院腫瘤內科部教授

鄭鴻鈞

和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任

賴美淑

臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所名譽教授

（依姓名筆劃順序排序）

壹、民國 108 年
癌症別發生率統計

一、民國 108 年
侵襲癌發生率及死亡率

全癌症



自民國 71 年起，癌症即成為台灣 10 大死因之首。民國 108 年台灣共有 50,232 人死於惡性腫瘤，佔所有死亡人數的 28.63%，每 10 萬人口粗死亡率為 212.82，每 10 萬人口年齡標準化死亡率³為 119.69。同年，初次診斷為癌症的人數共有 121,254 人，每 10 萬人口粗發生率為 513.72，每 10 萬人口年齡標準化發生率³為 315.86。有關年齡別、性別之癌症發生率及死亡率見下圖，男、女性 10 大癌症之發生率及死亡率見下表：

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	64,109	57,145
年齡中位數	65	62
粗率(每 10 萬人口)	547.70	480.29
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	308.57	264.80
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	345.37	292.66
性別比(年齡標準化率 ³)	1.18	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	30,543	19,689
年齡中位數	68	71
粗率(每 10 萬人口)	260.94	165.48
年齡標準化率 ² (每 10 萬人口)	135.99	75.14
年齡標準化率 ³ (每 10 萬人口)	156.86	87.18
性別比(年齡標準化率 ³)	1.80	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 (以年齡標準化率^{2b}排序)

10 大癌症 (不含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 108 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	14,856	124.86 ^{5a}	74.84 ^{5a}	80.99 ^{5a}
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	17,302	73.30	38.09	42.94
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	16,233	68.77	35.37	39.77
4	C61	攝護腺 (前列腺)	7,115	60.79 ^{5b}	30.22 ^{5b}	35.83 ^{5b}
5	C22	肝及肝內膽管	11,272	47.76	24.62	27.66
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,204	34.76	20.61	22.14
		口腔	5,340	22.62	13.50	14.53
		口咽	1,649	6.99	4.13	4.41
		下咽	1,215	5.15	2.97	3.20
7	C54	子宮體	3,124	26.26 ^{5a}	15.81 ^{5a}	17.00 ^{5a}
8	C73	甲狀腺	4,850	20.55	14.25	15.46
9	C44	皮膚	4,442	18.82	8.47	10.14
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,677	14.09 ^{5a}	9.16 ^{5a}	9.86 ^{5a}
	C00-C80	全癌症	121,254	513.72	284.28	315.86

10 大癌症 (含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 108 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	17,710	148.85 ^{5a}	89.91 ^{5a}	96.95 ^{5a}
	C50	女性乳房原位癌	2,854	23.99 ^{5a}	15.07 ^{5a}	15.96 ^{5a}
	C50	女性乳房侵襲癌	14,856	124.86 ^{5a}	74.84 ^{5a}	80.99 ^{5a}
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	22,457	95.14	50.15	56.05
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	5,155	21.84	12.06	13.11
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	17,302	73.30	38.09	42.94
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	16,985	71.96	37.36	41.90
		肺、支氣管及氣管原位癌	752	3.19	2.00	2.13
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	16,233	68.77	35.37	39.77
4	C61	攝護腺 (前列腺)	7,137	60.97 ^{5b}	30.31 ^{5b}	35.94 ^{5b}
5	C53	子宮頸	4,507	37.88 ^{5a}	26.01 ^{5a}	29.07 ^{5a}
	C53	子宮頸原位癌	3,114	26.17 ^{5a}	19.13 ^{5a}	21.41 ^{5a}
	C53	子宮頸侵襲癌	1,433	12.07 ^{5a}	7.06 ^{5a}	7.85 ^{5a}
6	C22	肝及肝內膽管	11,276	47.77	24.63	27.67
7	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,364	35.44	21.01	22.57
		口腔	5,454	23.11	13.79	14.84
		口咽	1,671	7.08	4.18	4.46
		下咽	1,239	5.25	3.03	3.26
8	C54	子宮體	3,325	27.95 ^{5a}	17.07 ^{5a}	18.41 ^{5a}
9	C73	甲狀腺	4,850	20.55	14.25	15.46
10	C44	皮膚	4,966	21.04	9.46	11.32
	C00-C80	全癌症	136,064	576.47	322.17	357.42

10 大癌症死亡率 (每 10 萬人口)，民國 108 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,701	41.10	19.19	22.47
2	C22	肝及肝內膽管	7,881	33.39	16.01	18.55
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,436	27.27	12.44	14.72
4	C50	女性乳房	2,633	22.13 ^{5a}	11.77 ^{5a}	12.98 ^{5a}
5	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,425	14.51	8.12	8.86
6	C61	攝護腺 (前列腺)	1,538	13.14 ^{5b}	5.42 ^{5b}	7.01 ^{5b}
7	C25	胰	2,497	10.58	5.04	5.84
8	C16	胃	2,379	10.08	4.57	5.40
9	C15	食道	1,983	8.40	4.62	5.02
10	C56,C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	683	5.74 ^{5a}	3.11 ^{5a}	3.42 ^{5a}
	C00-C97	全癌症	50,232	212.82	103.75	119.69

- 註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. (a)每 10 萬女性人口發生率及死亡率；(b)每 10 萬男性人口發生率及死亡率。

台灣男性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 (以年齡標準化率^{2b}排序)

男性 10 大癌症 (不含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 108 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,893	84.52	46.40	52.26
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,847	75.58	40.09	45.61
3	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,468	63.80	38.95	41.82
		口腔	4,776	40.80	25.14	27.01
		口咽	1,516	12.95	7.85	8.40
		下咽	1,167	10.05	5.95	6.41
4	C22	肝及肝內膽管	7,757	66.27	36.89	40.95
5	C61	攝護腺 (前列腺)	7,115	60.79	30.22	35.83
6	C15	食道	2,639	22.55	13.18	14.18
7	C16	胃	2,389	20.41	10.56	12.14
8	C44	皮膚	2,356	20.13	9.85	11.81
9	C91-C95	白血病	1,529	13.06	9.13	9.70
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,602	13.69	8.09	9.05
	C00-C80	全癌症	64,109	547.70	308.57	345.37

男性 10 大癌症 (含原位癌⁴) 發生率 (每 10 萬人口)，民國 108 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	13,124	112.12	62.34	69.52
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	3,231	27.60	15.94	17.26
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	9,893	84.52	46.40	52.26
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,062	77.42	41.26	46.88
		肺、支氣管及氣管原位癌	215	1.84	1.18	1.27
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	8,847	75.58	40.09	45.61
3	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,606	64.98	39.67	42.59
		口腔	4,870	41.61	25.64	27.53
		口咽	1,537	13.13	7.96	8.51
		下咽	1,199	10.24	6.08	6.54
4	C22	肝及肝內膽管	7,760	66.30	36.90	40.96
5	C61	攝護腺 (前列腺)	7,137	60.97	30.31	35.94
6	C15	食道	2,821	24.10	14.11	15.16
7	C44	皮膚	2,612	22.31	10.93	13.10
8	C67	膀胱	2,513	21.47	11.04	12.78
9	C16	胃	2,452	20.95	10.84	12.46
10	C91-C95 ⁵	白血病	1,529	13.06	9.13	9.70
	C00-C80	全癌症	69,299	592.04	333.71	372.98

男性 10 大癌症死亡率 (每 10 萬人口)，民國 108 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,190	52.88	26.51	31.14
2	C22	肝及肝內膽管	5,363	45.82	24.24	27.68
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	3,661	31.28	15.51	18.40
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,154	26.95	15.73	17.15
5	C15	食道	1,841	15.73	9.03	9.81
6	C16	胃	1,436	12.27	5.97	7.08
7	C61	攝護腺 (前列腺)	1,538	13.14	5.42	7.01
8	C25	胰	1,360	11.62	6.02	6.92
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	735	6.28	3.20	3.77
10	C91-C95	白血病	653	5.58	3.27	3.69
	C00-C97	全癌症	30,543	260.94	135.99	156.86

- 註： 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
 2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
 3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
 4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼 (性態譯碼) 為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
 5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

台灣女性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序（以年齡標準化率^{2b}排序）

女性 10 大癌症（不含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 108 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	14,856	124.86	74.84	80.99
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,386	62.08	31.46	35.01
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	7,409	62.27	30.58	34.61
4	C73	甲狀腺	3,582	30.11	20.94	22.70
5	C54	子宮體	3,124	26.26	15.81	17.00
6	C22	肝及肝內膽管	3,515	29.54	13.28	15.44
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,677	14.09	9.16	9.86
8	C44	皮膚	2,086	17.53	7.27	8.72
9	C53	子宮頸	1,393	11.71	6.88	7.67
10	C16	胃	1,549	13.02	6.11	7.04
	C00-C80	全癌症	57,145	480.29	264.80	292.66

女性 10 大癌症（含原位癌³）發生率（每 10 萬人口），民國 108 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	17,710	148.85	89.91	96.95
	C50	女性乳房原位癌	2,854	23.99	15.07	15.96
	C50	女性乳房侵襲癌	14,856	124.86	74.84	80.99
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,333	78.44	39.05	43.91
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	1,924	16.17	8.47	9.29
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	7,409	62.27	30.58	34.61
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,923	66.59	34.23	37.96
		肺、支氣管及氣管原位癌	537	4.51	2.78	2.95
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	7,386	62.08	31.46	35.01
4	C53	子宮頸	4,507	37.88	26.01	29.07
	C53	子宮頸原位癌	3,114	26.17	19.13	21.41
	C53	子宮頸侵襲癌	1,393	11.71	6.88	7.67
5	C73	甲狀腺	3,582	30.11	20.94	22.70
6	C54	子宮體	3,325	27.95	17.07	18.41
7	C22	肝及肝內膽管	3,516	29.55	13.28	15.44
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,707	14.35	9.34	10.06
9	C44	皮膚	2,354	19.78	8.17	9.81
10	C16	胃	1,587	13.34	6.25	7.20
	C00-C80	全癌症	66,765	561.15	315.41	348.18

女性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 108 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數 (人)	粗死亡率	年齡標準化 死亡率 ^{2a}	年齡標準化 死亡率 ^{2b}
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,511	29.51	12.81	15.04
2	C50	女性乳房	2,633	22.13	11.77	12.98
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	2,775	23.32	9.76	11.56
4	C22	肝及肝內膽管	2,518	21.16	8.50	10.29
5	C25	胰	1,137	9.56	4.14	4.87
6	C16	胃	943	7.93	3.36	3.98
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	683	5.74	3.11	3.42
8	C53	子宮頸	674	5.66	2.83	3.20
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	540	4.54	1.93	2.29
10	C91-C95	白血病	470	3.95	2.00	2.27
	C00-C97	全癌症	19,689	165.48	75.14	87.18

註： 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
 2. 年齡標準化率^{2a}係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
 3. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。

口腔、口咽及下咽 (主唾液腺、鼻咽除外)

ICD-O-FT T-140 - T-149 (T-142, T-147除外)

ICD-O-3 C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)

ICD-9 140-149 (142, 147除外)

ICD-10 C00 - C14 (C07 - C08, C11除外)



民國 108 年，口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 6.77%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 6.82%。發生率的排名於男性為第 3 位、女性為第 15 位；死亡率的排名於男性為第 4 位、女性為第 15 位。民國 108 年初次診斷為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 8,204 人；當年死因為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 3,425 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,468	736
年齡中位數	57	64
粗率(每10萬人口)	63.80	6.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	38.95	3.33
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	41.82	3.66
性別比(年齡標準化率 ³)	11.43	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,154	271
年齡中位數	60	69
粗率(每10萬人口)	26.95	2.28
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.73	1.06
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	17.15	1.20
性別比(年齡標準化率 ³)	14.29	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

8,204位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為8,148位，證實率為99.32%，男性證實率為99.38%，女性為98.64%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.13%，女性個案之90.22%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	7,328	98.13	7,321	99.90	664	90.22	663	99.85
唾液腺癌	39	0.52	39	100.00	51	6.93	51	100.00
神經內分泌癌	1	0.01	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他特定上皮癌	12	0.16	12	100.00	2	0.27	2	100.00
非特定上皮癌	25	0.33	20	80.00	2	0.27	2	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	5	0.07	5	100.00	4	0.54	4	100.00
軟組織肉瘤	18	0.24	18	100.00	2	0.27	2	100.00
其他惡性腫瘤	40	0.54	6	15.00	11	1.49	2	18.18
惡性淋巴瘤 ¹	72		72	100.00	67		67	100.00
總計 ²	7,468	100.00	7,422	99.38	736	100.00	726	98.64

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

8,204位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占65.60%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,858	65.05	524	71.20	5,382	65.60
放射線治療	3,620	48.47	280	38.04	3,900	47.54
化學治療	3,549	47.52	262	35.60	3,811	46.45
免疫治療	48	0.64	8	1.09	56	0.68
標靶治療	327	4.38	18	2.45	345	4.21
緩和照護	454	6.08	50	6.79	504	6.14
其他治療	0	0.00	1	0.14	1	0.01
未有首次治療申報紀錄	587	7.86	58	7.88	645	7.86

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

口腔 (主唾液腺除外)

ICD-O-FT

T-140 - T-145 (T-142除外)

ICD-O-3

C00 - C06

ICD-9

140-145 (142除外)

ICD-10

C00 - C06


民國 108 年，口腔惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.98%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 4.62%。民國 108 年初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 6,042 人；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,321 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,424	618
年齡中位數	57	65
粗率(每10萬人口)	46.34	5.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	28.49	2.78
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	30.60	3.06
性別比(年齡標準化率)	10.00	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,107	214
年齡中位數	60	70
粗率(每10萬人口)	18.00	1.80
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.53	0.84
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.48	0.95
性別比(年齡標準化率)	12.08	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

6,042位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,015位，證實率為99.55%，男性證實率為99.56%，女性為99.51%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.14%，女性個案之90.13%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	5,323	98.14	5,320	99.94	557	90.13	557	100.00
唾液腺癌	35	0.65	35	100.00	49	7.93	49	100.00
其他特定上皮癌	8	0.15	8	100.00	2	0.32	2	100.00
非特定上皮癌	14	0.26	12	85.71	1	0.16	1	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	5	0.09	5	100.00	3	0.49	3	100.00
軟組織肉瘤	16	0.29	16	100.00	2	0.32	2	100.00
其他惡性腫瘤	23	0.42	4	17.39	4	0.65	1	25.00
惡性淋巴瘤 ¹	20		20	100.00	14		14	100.00
總計 ²	5,424	100.00	5,400	99.56	618	100.00	615	99.51

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,042位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.08%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,291	79.11	487	78.80	4,778	79.08
放射線治療	2,214	40.82	197	31.88	2,411	39.90
化學治療	2,072	38.20	185	29.94	2,257	37.36
免疫治療	32	0.59	7	1.13	39	0.65
標靶治療	152	2.80	11	1.78	163	2.70
緩和照護	229	4.22	39	6.31	268	4.44
未有首次治療申報紀錄	397	7.32	46	7.44	443	7.33

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)

ICD-O-FT

T-140

ICD-O-3

C00


民國 108 年，初次診斷為唇惡性腫瘤者共計 295 人，占口腔、咽喉及下咽惡性腫瘤發生個案數的 3.60%；當年死因為唇惡性腫瘤者共計 45 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	266	29
年齡中位數	57	71
粗率(每10萬人口)	2.27	0.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.40	0.11
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.49	0.12
性別比(年齡標準化率 ³)	12.42	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	39	6
年齡中位數	62	74
粗率(每10萬人口)	0.33	0.05
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.19	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.22	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	11.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

舌

ICD-O-FT

T-141

ICD-O-3

C01 - C02


民國 108 年，初次診斷為舌惡性腫瘤者共計 2,314 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 28.21%；當年死因為舌惡性腫瘤者共計 720 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,987	327
年齡中位數	57	64
粗率(每10萬人口)	16.98	2.75
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.48	1.51
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.28	1.67
性別比(年齡標準化率 ³)	6.75	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	632	88
年齡中位數	58	68
粗率(每10萬人口)	5.40	0.74
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.24	0.38
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.51	0.42
性別比(年齡標準化率 ³)	8.36	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

齒齦


ICD-O-FT T-143
ICD-O-3 C03

民國 108 年，初次診斷為齒齦惡性腫瘤者共計 798 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 9.73%；當年死因為齒齦惡性腫瘤者共計 232 人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	714	84	個案數(人)	210	22
年齡中位數	59	69	年齡中位數	61	74
粗率(每10萬人口)	6.10	0.71	粗率(每10萬人口)	1.79	0.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.67	0.35	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.01	0.08
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.94	0.39	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.12	0.09
性別比(年齡標準化率 ³)	10.10	1	性別比(年齡標準化率 ³)	12.44	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

口底


ICD-O-FT T-144
ICD-O-3 C04

民國 108 年，初次診斷為口底惡性腫瘤者共計 221 人，占口腔、咽喉及下咽惡性腫瘤發生個案數的 2.69 %；當年死因為口底惡性腫瘤者共計 18 人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	196	25	個案數(人)	14	4
年齡中位數	58	57	年齡中位數	60	55
粗率(每10萬人口)	1.67	0.21	粗率(每10萬人口)	0.12	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.02	0.12	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.07	0.02
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.08	0.13	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.08	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	8.31	1	性別比(年齡標準化率 ³)	4.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

口腔之其他及未詳細說明部位

ICD-O-FT

T-145

ICD-O-3

C05 - C06


民國 108 年，初次診斷為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 2,414 人(未詳細說明部位有 44 人，詳細分布請見 p.497 附錄六)，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 29.42%；當年死因為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 1,306 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,261	153
年齡中位數	57	63
粗率(每10萬人口)	19.32	1.29
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	11.92	0.70
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.81	0.75
性別比(年齡標準化率 ³)	17.08	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,212	94
年齡中位數	61	74
粗率(每10萬人口)	10.35	0.79
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.02	0.34
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.55	0.39
性別比(年齡標準化率 ³)	16.79	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

口咽

ICD-O-FT T-146
ICD-O-3 C09 - C10


民國 108 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 941 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 11.47%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 400 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	862	79
年齡中位數	58	61
粗率(每10萬人口)	7.36	0.66
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.47	0.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.77	0.39
性別比(年齡標準化率 ³)	12.23	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	367	33
年齡中位數	59	67
粗率(每10萬人口)	3.14	0.28
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.87	0.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.02	0.14
性別比(年齡標準化率 ³)	14.43	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

下咽

ICD-O-FT T-148
ICD-O-3 C12 - C13


民國 108 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,206 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 14.70%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 650 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,168	38
年齡中位數	58	60
粗率(每10萬人口)	9.98	0.32
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.91	0.18
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.36	0.20
性別比(年齡標準化率 ³)	31.80	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	630	20
年齡中位數	59	62
粗率(每10萬人口)	5.38	0.17
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.11	0.08
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.39	0.09
性別比(年齡標準化率 ³)	37.67	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

ICD-O-FT

T-149

ICD-O-3

C14


民國 108 年，初次診斷為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 15 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 0.18%；當年死因為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 54 人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	14	1
年齡中位數	54	65
粗率(每10萬人口)	0.12	0.01
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.08	0.00
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.08	0.00
性別比(年齡標準化率 ³)	19.63	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	50	4
年齡中位數	62	85
粗率(每10萬人口)	0.43	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.22	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.26	0.02
性別比(年齡標準化率 ³)	13.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

口腔 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-140、T-141(T-1410、T-1416除外)、T-143、
T-144、T-145(T-1453、T-1454除外)

ICD-O-3 C00、C02(C024除外)、C03、C04、C050、
C058、C059、C06


民國 108 年，初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 5,340 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.40%；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,207 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 4.39%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	4,776	564
年齡中位數	57	65
粗率(每10萬人口)	40.80	4.74
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	25.14	2.52
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	27.01	2.79
性別比(年齡標準化率 ³)	9.68	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,997	210
年齡中位數	60	70
粗率(每10萬人口)	17.06	1.77
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.99	0.82
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.89	0.93
性別比(年齡標準化率 ³)	11.71	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

5,340位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,317位，證實率為99.57%，男性證實率為99.56%，女性為99.65%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.35%，女性個案之92.73%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	4,697	98.35	4,695	99.96	523	92.73	523	100.00
唾液腺癌	26	0.54	26	100.00	31	5.50	31	100.00
其他特定上皮癌	6	0.13	6	100.00	2	0.35	2	100.00
非特定上皮癌	6	0.13	5	83.33	1	0.18	1	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	5	0.10	5	100.00	2	0.35	2	100.00
軟組織肉瘤	14	0.29	14	100.00	2	0.35	2	100.00
其他惡性腫瘤	22	0.46	4	18.18	3	0.53	1	33.33
惡性淋巴瘤 ¹	8		8	100.00	9		9	100.00
總計 ²	4,776	100.00	4,755	99.56	564	100.00	562	99.65

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,340位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占83.60%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,003	83.81	461	81.74	4,464	83.60
放射線治療	1,837	38.46	165	29.26	2,002	37.49
化學治療	1,690	35.39	159	28.19	1,849	34.63
免疫治療	25	0.52	6	1.06	31	0.58
標靶治療	108	2.26	9	1.60	117	2.19
緩和照護	176	3.69	32	5.67	208	3.90
未有首次治療申報紀錄	335	7.01	43	7.62	378	7.08

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

口咽 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-1410、T-1416、T-1453、T-1454、T-146、T-1491、T-1498

ICD-O-3 C01、C024、C051、C052、C09、C10、C142、C148


民國 108 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 1,649 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 1.36%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 519 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.03%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,516	133
年齡中位數	58	61
粗率(每10萬人口)	12.95	1.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.85	0.63
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.40	0.67
性別比(年齡標準化率 ³)	12.54	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	481	38
年齡中位數	59	67
粗率(每10萬人口)	4.11	0.32
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.43	0.15
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.63	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	15.47	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,649位口咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,632位，證實率為98.97%，男性證實率為99.21%，女性為96.24%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.23%，女性個案之80.45%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,474	97.23	1,472	99.86	107	80.45	107	100.00
p16+	287	18.93	287	100.00	46	34.59	46	100.00
p16-	1,130	74.54	1,129	99.91	59	44.36	59	100.00
未申報 p16 狀態	57	3.76	56	98.25	2	1.50	2	100.00
唾液腺癌	11	0.73	11	100.00	19	14.29	19	100.00
其他特定上皮癌	4	0.26	4	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	13	0.86	11	84.62	1	0.75	1	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	0	0.00	0	0.00	1	0.75	1	100.00
軟組織肉瘤	4	0.26	4	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	10	0.66	2	20.00	5	3.76	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	60		60	100.00	58		58	100.00
總計 ²	1,516	100.00	1,504	99.21	133	100.00	128	96.24

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,649位口咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占64.77%，放射線治療者次之，占63.19%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	558	36.81	58	43.61	616	37.36
放射線治療	952	62.80	90	67.67	1,042	63.19
化學治療	988	65.17	80	60.15	1,068	64.77
免疫治療	15	0.99	1	0.75	16	0.97
標靶治療	111	7.32	5	3.76	116	7.03
緩和照護	132	8.71	12	9.02	144	8.73
其他治療	0	0.00	1	0.75	1	0.06
未有首次治療申報紀錄	157	10.36	10	7.52	167	10.13

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

下咽(Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT T-148、T-1490

ICD-O-3 C12、C13、C140


民國 108 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,215 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 1.00%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 699 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.39%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,176	39
年齡中位數	58	60
粗率(每10萬人口)	10.05	0.33
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.95	0.18
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.41	0.20
性別比(年齡標準化率 ³)	32.05	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	676	23
年齡中位數	60	69
粗率(每10萬人口)	5.78	0.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.31	0.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.62	0.10
性別比(年齡標準化率 ³)	36.20	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,215位下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,199位，證實率為98.68%，男性證實率為98.89%，女性為92.31%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.38%，女性個案之87.18%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,157	98.38	1,154	99.74	34	87.18	33	97.06
唾液腺癌	2	0.17	2	100.00	1	2.56	1	100.00
神經內分泌癌	1	0.09	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他特定上皮癌	2	0.17	2	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	6	0.51	4	66.67	0	0.00	0	0.00
黏膜惡性黑色素瘤	0	0.00	0	0.00	1	2.56	1	100.00
其他惡性腫瘤	8	0.68	0	0.00	3	7.69	1	33.33
惡性淋巴瘤 ¹	4		4	100.00	0		-	-
總計 ²	1,176	100.00	1,163	98.89	39	100.00	36	92.31

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,215位下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占73.58%，放射線治療者次之，占70.45%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	297	25.26	5	12.82	302	24.86
放射線治療	831	70.66	25	64.10	856	70.45
化學治療	871	74.06	23	58.97	894	73.58
免疫治療	8	0.68	1	2.56	9	0.74
標靶治療	108	9.18	4	10.26	112	9.22
緩和照護	146	12.41	6	15.38	152	12.51
未有首次治療申報紀錄	95	8.08	5	12.82	100	8.23

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

主唾液腺

ICD-O-FT T-142
ICD-O-3 C07 - C08
ICD-9 142
ICD-10 C07 - C08



民國108年，主唾液腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.27%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.16%。發生率的排名於男性為第25位、女性為第28位；死亡率的排名於男性為第28位、女性為第33位。民國108年初次診斷為主唾液腺惡性腫瘤者共計330人；當年死因為主唾液腺惡性腫瘤者共計79人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	190	140
年齡中位數	60	57
粗率(每10萬人口)	1.62	1.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.01	0.77
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.10	0.83
性別比(年齡標準化率 ³)	1.33	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	53	26
年齡中位數	68	63
粗率(每10萬人口)	0.45	0.22
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.25	0.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.27	0.14
性別比(年齡標準化率 ³)	1.93	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

330位主唾液腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為328位，證實率為99.39%，男性證實率為99.47%，女性為99.29%。

男性患者的組織形態分布，以其他特定上皮癌最多，占男性個案之21.05%，女性患者的組織形態分布，以黏液表皮樣癌最多，占女性個案之22.86%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
黏液表皮樣癌	35	18.42	35	100.00	32	22.86	32	100.00
鱗狀細胞癌	21	11.05	21	100.00	9	6.43	9	100.00
腺癌，非特定	5	2.63	5	100.00	1	0.71	1	100.00
腺樣囊狀癌	28	14.74	28	100.00	30	21.43	30	100.00
腺泡細胞癌	14	7.37	14	100.00	14	10.00	14	100.00
惡性混合性腫瘤	27	14.21	27	100.00	17	12.14	17	100.00
淋巴上皮癌	7	3.68	7	100.00	10	7.14	10	100.00
其他特定上皮癌	40	21.05	40	100.00	19	13.57	19	100.00
非特定上皮癌	11	5.79	11	100.00	6	4.29	6	100.00
軟組織肉瘤	1	0.53	1	100.00	1	0.71	1	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.53	.	.	1	0.71	.	.
惡性淋巴瘤 ¹	17		17	100.00	23		23	100.00
總計 ²	190	100.00	189	99.47	140	100.00	139	99.29

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

330位主唾液腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占82.42%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	151	79.47	121	86.43	272	82.42
放射線治療	113	59.47	86	61.43	199	60.30
化學治療	57	30.00	33	23.57	90	27.27
免疫治療	2	1.05	1	0.71	3	0.91
標靶治療	6	3.16	2	1.43	8	2.42
緩和照護	12	6.32	7	5.00	19	5.76
未有首次治療申報紀錄	15	7.89	8	5.71	23	6.97

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

鼻咽

ICD-O-FT T-147

ICD-O-3 C11

ICD-9 147

ICD-10 C11



民國108年，鼻咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.29%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.37%。發生率的排名於男性為第14位、女性為第20位；死亡率的排名於男性為第12位、女性為第19位。民國108年初次診斷為鼻咽惡性腫瘤者共計1,560人；當年死因為鼻咽惡性腫瘤者共計689人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,216	344
年齡中位數	52	52
粗率(每10萬人口)	10.39	2.89
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.83	1.83
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.48	2.02
性別比(年齡標準化率 ³)	3.70	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	536	153
年齡中位數	60	64
粗率(每10萬人口)	4.58	1.29
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.71	0.67
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.99	0.75
性別比(年齡標準化率 ³)	3.99	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,560位鼻咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,552位，證實率為99.49%，男性證實率為99.42%，女性為99.71%。

男、女性患者的組織形態分布，均以非角化鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之95.56%，女性個案之96.22%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
非角化鱗狀細胞癌	1,162	95.56	1,162	100.00	331	96.22	331	100.00
角化鱗狀細胞癌	24	1.97	24	100.00	3	0.87	3	100.00
唾液腺癌	3	0.25	3	100.00	1	0.29	1	100.00
其他特定上皮癌	3	0.25	3	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	18	1.48	16	88.89	8	2.33	7	87.50
其他惡性腫瘤	6	0.49	1	16.67	1	0.29	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	17		17	100.00	11		11	100.00
總計 ²	1,216	100.00	1,209	99.42	344	100.00	343	99.71

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,560位鼻咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占89.23%，其次為化學治療，占85.90%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4	0.33	1	0.29	5	0.32
放射線治療	1,087	89.39	305	88.66	1,392	89.23
化學治療	1,045	85.94	295	85.76	1,340	85.90
免疫治療	19	1.56	4	1.16	23	1.47
標靶治療	18	1.48	6	1.74	24	1.54
緩和照護	77	6.33	18	5.23	95	6.09
其他治療	1	0.08	0	0.00	1	0.06
未有首次治療申報紀錄	64	5.26	22	6.40	86	5.51

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

食道

ICD-O-FT T-150

ICD-O-3 C15

ICD-9 150

ICD-10 C15


民國108年，食道惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.34%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.95%。發生率的排名於男性為第6位、女性為第26位；死亡率的排名於男性為第5位、女性為第21位。民國108年初次診斷為食道惡性腫瘤者共計2,833人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的7.06%；當年死因為食道惡性腫瘤者共計1,983人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,639	194
年齡中位數	59	65
粗率(每10萬人口)	22.55	1.63
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	13.18	0.80
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	14.18	0.90
性別比(年齡標準化率 ³)	15.76	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,841	142
年齡中位數	60	68
粗率(每10萬人口)	15.73	1.19
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.03	0.53
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.81	0.61
性別比(年齡標準化率 ³)	16.08	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

2,833位食道惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,816位，證實率為99.40%，男性證實率為99.47%，女性為98.45%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之92.16%，女性個案之82.47%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	2,432	92.16	2,430	99.92	160	82.47	160	100.00
腺癌	93	3.52	93	100.00	15	7.73	15	100.00
腺性鱗狀癌	12	0.45	12	100.00	1	0.52	1	100.00
神經內分泌癌	34	1.29	34	100.00	5	2.58	5	100.00
其他特定上皮癌	14	0.53	14	100.00	2	1.03	2	100.00
非特定上皮癌	25	0.95	24	96.00	3	1.55	3	100.00
胃腸基質瘤	6	0.23	6	100.00	1	0.52	1	100.00
其他惡性肉瘤	7	0.27	7	100.00	2	1.03	2	100.00
其他惡性腫瘤	16	0.61	5	31.25	5	2.58	2	40.00
惡性淋巴瘤 ¹	1		1	100.00	.		.	.
總計 ²	2,639	100.00	2,625	99.47	194	100.00	191	98.45

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,833位食道惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占67.14%，放射線治療者次之，占62.30%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	806	30.54	49	25.26	855	30.18
放射線治療	1,660	62.90	105	54.12	1,765	62.30
化學治療	1,793	67.94	109	56.19	1,902	67.14
免疫治療	61	2.31	4	2.06	65	2.29
標靶治療	25	0.95	1	0.52	26	0.92
緩和照護	605	22.93	36	18.56	641	22.63
未有首次治療申報紀錄	301	11.41	43	22.16	344	12.14

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

胃

ICD-O-FT T-151
ICD-O-3 C16
ICD-9 151
ICD-10 C16


民國108年，胃惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.25%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.74%。發生率的排名於男性為第7位、女性為第10位；死亡率的排名於男性為第6位、女性為第6位。民國108年初次診斷為胃惡性腫瘤者共計3,938人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的9.82%；當年死因為胃惡性腫瘤者共計2,379人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,389	1,549
年齡中位數	69	69
粗率(每10萬人口)	20.41	13.02
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.56	6.11
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.14	7.04
性別比(年齡標準化率 ³)	1.72	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,436	943
年齡中位數	73	75
粗率(每10萬人口)	12.27	7.93
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.97	3.36
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.08	3.98
性別比(年齡標準化率 ³)	1.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

3,938位胃惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,879位，證實率為98.50%，男性證實率為98.66%，女性為98.26%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之86.81%，女性個案之85.15%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	2,074	86.81	2,069	99.76	1,319	85.15	1,319	100.00
腺性鱗狀癌	10	0.42	10	100.00	3	0.19	3	100.00
鱗狀細胞癌	26	1.09	26	100.00	4	0.26	4	100.00
神經內分泌癌	74	3.10	74	100.00	53	3.42	53	100.00
其他特定上皮癌	13	0.54	13	100.00	5	0.32	5	100.00
非特定上皮癌	44	1.84	38	86.36	28	1.81	24	85.71
胃腸基質瘤	124	5.19	120	96.77	109	7.04	108	99.08
其他惡性肉瘤	3	0.13	3	100.00	4	0.26	4	100.00
其他惡性腫瘤	21	0.88	4	19.05	24	1.55	2	8.33
惡性淋巴瘤 ¹	103		103	100.00	115		115	100.00
瀰漫性大B細胞惡性淋巴瘤	60	2.51	60	100.00	69	4.45	69	100.00
與粘膜有關的淋巴樣組織淋巴瘤	39	1.63	39	100.00	43	2.78	43	100.00
總計 ²	2,389	100.00	2,357	98.66	1,549	100.00	1,522	98.26

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,938位胃惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占59.22%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,420	59.44	912	58.88	2,332	59.22
放射線治療	190	7.95	90	5.81	280	7.11
化學治療	1,132	47.38	721	46.55	1,853	47.05
免疫治療	33	1.38	22	1.42	55	1.40
標靶治療	126	5.27	87	5.62	213	5.41
緩和照護	577	24.15	380	24.53	957	24.30
其他治療	7	0.29	3	0.19	10	0.25
未有首次治療申報紀錄	336	14.06	240	15.49	576	14.63

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

小腸

ICD-O-FT T-152

ICD-O-3 C17

ICD-9 152


ICD-10 C17

民國108年，小腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.39%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.30%。發生率的排名於男性為第24位、女性為第25位；死亡率的排名於男性為第22位、女性為第28位。民國108年初次診斷為小腸惡性腫瘤者共計478人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的1.19%；當年死因為小腸惡性腫瘤者共計150人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	256	222	個案數(人)	92	58
年齡中位數	63	67	年齡中位數	73	76
粗率(每10萬人口)	2.19	1.87	粗率(每10萬人口)	0.79	0.49
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.25	0.94	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.38	0.20
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.38	1.05	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.45	0.24
性別比(年齡標準化率 ³)	1.31	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.88	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

478位小腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理實者為472位，證實率為98.74%，男性證實率為99.22%，女性為98.20%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胃腸基質肉瘤最多，分別占男性個案之48.05%，女性個案之57.66%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	87	33.98	87	100.00	64	28.83	63	98.44
神經內分泌癌	26	10.16	26	100.00	21	9.46	21	100.00
其他特定上皮癌	1	0.39	1	100.00	3	1.35	3	100.00
非特定上皮癌	8	3.13	7	87.50	2	0.90	1	50.00
胃腸基質瘤	123	48.05	123	100.00	128	57.66	127	99.22
其他惡性肉瘤	9	3.52	9	100.00	2	0.90	2	100.00
其他惡性腫瘤	2	0.78	1	50.00	2	0.90	1	50.00
惡性淋巴瘤 ¹	50		49	98.00	28		28	100.00
總計 ²	256	100.00	254	99.22	222	100.00	218	98.20

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

478位小腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占72.38%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	183	71.48	163	73.42	346	72.38
放射線治療	8	3.13	3	1.35	11	2.30
化學治療	52	20.31	38	17.12	90	18.83
標靶治療	62	24.22	50	22.52	112	23.43
緩和照護	40	15.63	24	10.81	64	13.39
未有首次治療申報紀錄	39	15.23	33	14.86	72	15.06

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門



ICD-O-FT T-153, T-154
ICD-O-3 C18 - C21
ICD-9 153, 154
ICD-10 C18 - C21

民國108年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的14.27%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的12.81%。發生率的排名於男性為第1位、女性為第3位；死亡率的排名於男性為第3位、女性為第3位。民國108年初次診斷為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計17,302人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26, C48)個案數的43.13%；當年死因為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計6,436人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	9,893	7,409	個案數(人)	3,661	2,775
年齡中位數	65	67	年齡中位數	72	76
粗率(每10萬人口)	84.52	62.27	粗率(每10萬人口)	31.28	23.32
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	46.40	30.58	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.51	9.76
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	52.26	34.61	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	18.40	11.56
性別比(年齡標準化率 ³)	1.51	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.59	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

17,302位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為17,005位，證實率為98.28%，男性證實率為98.70%，女性為97.73%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之93.22%，女性個案之91.16%。

民國108年男、女性結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案分別為3,231位和1,924位，詳見本年報第132、133頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	9,222	93.22	9,212	99.89	6,754	91.16	6,746	99.88
神經內分泌癌	422	4.27	420	99.53	308	4.16	308	100.00
其他特定上皮癌	52	0.53	52	100.00	109	1.47	109	100.00
非特定上皮癌	61	0.62	47	77.05	79	1.07	49	62.03
胃腸基質瘤	18	0.18	18	100.00	17	0.23	17	100.00
其他惡性肉瘤	4	0.04	4	100.00	3	0.04	3	100.00
其他惡性腫瘤	114	1.15	11	9.65	139	1.88	9	6.47
惡性淋巴瘤 ¹	30		30	100.00	27		27	100.00
總計 ²	9,893	100.00	9,764	98.70	7,409	100.00	7,241	97.73

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

17,302位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.05%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	7,670	77.53	5,661	76.41	13,331	77.05
放射線治療	1,336	13.50	731	9.87	2,067	11.95
化學治療	5,156	52.12	3,690	49.80	8,846	51.13
免疫治療	8	0.08	10	0.13	18	0.10
標靶治療	1,217	12.30	916	12.36	2,133	12.33
緩和照護	1,212	12.25	1,049	14.16	2,261	13.07
其他治療	1	0.01	0	0.00	1	0.01
未有首次治療申報紀錄	1,007	10.18	781	10.54	1,788	10.33

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

結腸

ICD-O-FT T-153

ICD-O-3 C18

ICD-9 153

ICD-10 C18


民國108年，結腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的9.10%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的9.36%。民國108年初次診斷為結腸惡性腫瘤者共計11,031人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的27.50%；當年死因為結腸惡性腫瘤者共計4,700人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	6,038	4,993
年齡中位數	66	68
粗率(每10萬人口)	51.58	41.97
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	27.83	20.19
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	31.56	22.98
性別比(年齡標準化率 ³)	1.37	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,571	2,129
年齡中位數	74	77
粗率(每10萬人口)	21.96	17.89
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	10.72	7.39
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	12.83	8.78
性別比(年齡標準化率 ³)	1.46	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

11,031位結腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為10,792位，證實率為97.83%，男性證實率為98.41%，女性為97.14%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之96.60，女性個案之94.59%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	5,833	96.60	5,826	99.88	4,723	94.59	4,715	99.83
神經內分泌癌	66	1.09	64	96.97	69	1.38	69	100.00
其他特定上皮癌	9	0.15	9	100.00	19	0.38	19	100.00
非特定上皮癌	37	0.61	30	81.08	63	1.26	35	55.56
胃腸基質瘤	3	0.05	3	100.00	5	0.10	5	100.00
其他惡性肉瘤	1	0.02	1	100.00	1	0.02	1	100.00
其他惡性腫瘤	89	1.47	9	10.11	113	2.26	6	5.31
惡性淋巴瘤 ¹	28		28	100.00	22		22	100.00
總計 ²	6,038	100.00	5,942	98.41	4,993	100.00	4,850	97.14

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

11,031位結腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占78.38%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,763	78.88	3,883	77.77	8,646	78.38
放射線治療	155	2.57	112	2.24	267	2.42
化學治療	3,008	49.82	2,444	48.95	5,452	49.42
免疫治療	6	0.10	6	0.12	12	0.11
標靶治療	757	12.54	654	13.10	1,411	12.79
緩和照護	764	12.65	734	14.70	1,498	13.58
其他治療	1	0.02	0	0.00	1	0.01
未有首次治療申報紀錄	665	11.01	565	11.32	1,230	11.15

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

直腸、乙狀結腸連結部及肛門

ICD-O-FT T-154
ICD-O-3 C19 - C21
ICD-9 154
ICD-10 C19 - C21



民國108年，直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的5.17%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.46%。民國108年初次診斷為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計6,271人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的15.63%；當年死因為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計1,736人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,855	2,416
年齡中位數	64	65
粗率(每10萬人口)	32.93	20.31
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	18.57	10.39
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	20.70	11.63
性別比(年齡標準化率 ³)	1.78	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,090	646
年齡中位數	69	72
粗率(每10萬人口)	9.31	5.43
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	4.79	2.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	5.57	2.79
性別比(年齡標準化率 ³)	2.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

6,271位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,213位，證實率為99.08%，男性證實率為99.14%，女性為98.97%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之87.91%、女性個案之84.06%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	3,389	87.91	3,386	99.91	2,031	84.06	2,031	100.00
神經內分泌癌	356	9.23	356	100.00	239	9.89	239	100.00
其他特定上皮癌	43	1.12	43	100.00	90	3.73	90	100.00
鱗狀細胞癌	29	0.75	29	100.00	69	2.86	69	100.00
非特定上皮癌	24	0.62	17	70.83	16	0.66	14	87.50
胃腸基質瘤	15	0.39	15	100.00	12	0.50	12	100.00
其他惡性肉瘤	3	0.08	3	100.00	2	0.08	2	100.00
其他惡性腫瘤	25	0.65	2	8.00	26	1.08	3	11.54
惡性淋巴瘤 ¹	2		2	100.00	5		5	100.00
總計 ²	3,855	100.00	3,822	99.14	2,416	100.00	2,391	98.97

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,271位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占74.71%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,907	75.41	1,778	73.59	4,685	74.71
放射線治療	1,181	30.64	619	25.62	1,800	28.70
化學治療	2,148	55.72	1,246	51.57	3,394	54.12
免疫治療	2	0.05	4	0.17	6	0.10
標靶治療	460	11.93	262	10.84	722	11.51
緩和照護	448	11.62	315	13.04	763	12.17
未有首次治療申報紀錄	342	8.87	216	8.94	558	8.90

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16屆期別與治療統計。

肝及肝內膽管

ICD-O-FT T-155

ICD-O-3 C22

ICD-9 155

ICD-10 C22


民國108年，肝及肝內膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的9.30%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的15.69%。發生率的排名於男性為第4位、女性為第6位；死亡率的排名於男性為第2位、女性為第4位。民國108年初次診斷為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計11,272人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的28.10%；當年死因為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計7,881人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,757	3,515
年齡中位數	65	72
粗率(每10萬人口)	66.27	29.54
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	36.89	13.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	40.95	15.44
性別比(年齡標準化率 ³)	2.65	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,363	2,518
年齡中位數	67	76
粗率(每10萬人口)	45.82	21.16
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	24.24	8.50
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	27.68	10.29
性別比(年齡標準化率 ³)	2.69	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

11,272位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,903位，證實率為52.37%，男性證實率為53.96%，女性為48.85%。

男、女性患者的組織形態分布，均以肝細胞癌最多，分別占男性個案之88.32%，女性個案之82.65%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
肝細胞癌	6,851	88.32	3,414	49.83	2,905	82.65	1,237	42.58
膽管癌	673	8.68	567	84.25	497	14.14	383	77.06
合併肝細胞癌和膽管癌	131	1.69	127	96.95	48	1.37	46	95.83
肝母細胞瘤	14	0.18	12	85.71	5	0.14	5	100.00
其他特定上皮癌	16	0.21	16	100.00	20	0.57	20	100.00
非特定上皮癌	21	0.27	15	71.43	9	0.26	7	77.78
血管肉瘤	29	0.37	28	96.55	17	0.48	15	88.24
其他惡性肉瘤	6	0.08	6	100.00	5	0.14	4	80.00
其他惡性腫瘤	16	0.21	1	6.25	9	0.26	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	8		8	100.00	8		8	100.00
總計 ²	7,757	100.00	4,186	53.96	3,515	100.00	1,717	48.85

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

11,272位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占27.42%，其次為TAE/TACE，占21.16%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,267	29.23	824	23.44	3,091	27.42
局部治療(如 PEIT/PAIT, RFA 等)	1,154	14.88	707	20.11	1,861	16.51
PEIT/PAIT	33	0.43	24	0.68	57	0.51
RFA	1,112	14.34	678	19.29	1,790	15.88
TAE/TACE	1,712	22.07	673	19.15	2,385	21.16
TAE	346	4.46	131	3.73	477	4.23
TACE	1,449	18.68	562	15.99	2,011	17.84
TAE, PEIT/PAIT, RFA 任二種以上	156	2.01	99	2.82	255	2.26
放射線治療	663	8.55	193	5.49	856	7.59
化學治療	548	7.06	247	7.03	795	7.05
免疫治療**	241	3.11	65	1.85	306	2.71
標靶治療	1,073	13.83	288	8.19	1,361	12.07
緩和照護	1,496	19.29	662	18.83	2,158	19.14
其他治療	2	0.03	0	0.00	2	0.02
未有首次治療申報紀錄	1,207	15.56	657	18.69	1,864	16.54

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

免疫治療**：包含Thalidomide與其他Anti-cancer drugs。

膽囊及肝外膽管

ICD-O-FT T-156
ICD-O-3 C23 - C24
ICD-9 156
ICD-10 C23 - C24



民國108年，膽囊及肝外膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.97%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.23%。發生率的排名於男性為第18位、女性為第18位；死亡率的排名於男性為第15位、女性為第16位。民國108年初次診斷為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計1,173人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的2.92%；當年死因為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計617人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	622	551
年齡中位數	69	72
粗率(每10萬人口)	5.31	4.63
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.77	2.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.21	2.35
性別比(年齡標準化率 ³)	1.37	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	339	278
年齡中位數	72	72
粗率(每10萬人口)	2.90	2.34
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.43	1.00
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.68	1.18
性別比(年齡標準化率 ³)	1.42	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

1,173位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為999位，證實率為85.17%，男性證實率為86.01%，女性為84.21%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之81.35%，女性個案之80.04%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	506	81.35	465	91.90	441	80.04	402	91.16
腺性鱗狀癌	12	1.93	12	100.00	13	2.36	13	100.00
神經內分泌癌	15	2.41	15	100.00	12	2.18	12	100.00
其他特定上皮癌	22	3.54	22	100.00	21	3.81	21	100.00
非特定上皮癌	28	4.50	17	60.71	24	4.36	14	58.33
其他惡性肉瘤	1	0.16	1	100.00	1	0.18	1	100.00
其他惡性腫瘤	38	6.11	3	7.89	39	7.08	1	2.56
惡性淋巴瘤 ¹	1		1	100.00	2		2	100.00
總計 ²	622	100.00	535	86.01	551	100.00	464	84.21

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,173位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占49.96%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	317	50.96	269	48.82	586	49.96
放射線治療	75	12.06	59	10.71	134	11.42
化學治療	215	34.57	190	34.48	405	34.53
免疫治療	2	0.32	5	0.91	7	0.60
標靶治療	3	0.48	2	0.36	5	0.43
緩和照護	161	25.88	157	28.49	318	27.11
其他治療	1	0.16	0	0.00	1	0.09
未有首次治療申報紀錄	117	18.81	115	20.87	232	19.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胰

ICD-O-FT T-157
ICD-O-3 C25
ICD-9 157
ICD-10 C25


民國108年，胰惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.31%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.79%。發生率的排名於男性為第13位、女性為第13位；死亡率的排名於男性為第8位、女性為第5位。民國108年初次診斷為胰惡性腫瘤者共計2,803人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的6.99%；當年死因為胰惡性腫瘤者共計2,497人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,510	1,293
年齡中位數	67	69
粗率(每10萬人口)	12.90	10.87
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.99	5.19
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.91	5.90
性別比(年齡標準化率 ³)	1.34	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,360	1,137
年齡中位數	68	72
粗率(每10萬人口)	11.62	9.56
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.02	4.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.92	4.87
性別比(年齡標準化率 ³)	1.42	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

2,803位胰惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,243位，證實率為80.02%，男性證實率為81.13%，女性為78.73%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之68.68%，女性個案之65.97%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,037	68.68	1,018	98.17	853	65.97	835	97.89
腺泡細胞癌	7	0.46	7	100.00	5	0.39	5	100.00
神經內分泌癌	119	7.88	118	99.16	101	7.81	101	100.00
實性偽乳突瘤	8	0.53	8	100.00	29	2.24	29	100.00
其他特定上皮癌	6	0.40	6	100.00	6	0.46	6	100.00
非特定上皮癌	100	6.62	58	58.00	81	6.26	33	40.74
惡性肉瘤	2	0.13	2	100.00	2	0.15	2	100.00
其他惡性腫瘤	231	15.30	8	3.46	216	16.71	7	3.24
惡性淋巴瘤 ¹	4		4	100.00	2		2	100.00
總計 ²	1,510	100.00	1,225	81.13	1,293	100.00	1,018	78.73

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,803位胰惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占50.84%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	399	26.42	386	29.85	785	28.01
放射線治療	126	8.34	102	7.89	228	8.13
化學治療	820	54.30	605	46.79	1,425	50.84
免疫治療	13	0.86	3	0.23	16	0.57
標靶治療	26	1.72	19	1.47	45	1.61
緩和照護	648	42.91	508	39.29	1,156	41.24
其他治療	0	0.00	3	0.23	3	0.11
未有首次治療申報紀錄	253	16.75	232	17.94	485	17.30

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

後腹膜腔及腹膜

ICD-O-FT T-158

ICD-O-3 C48

ICD-9 158


ICD-10 C48

民國108年，後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.25%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.27%。發生率的排名於男性為第30位、女性為第25位；死亡率的排名於男性為第31位、女性為第24位。民國108年初次診斷為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計300人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的0.75%；當年死因為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計134人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	97	203	個案數(人)	41	93
年齡中位數	62	63	年齡中位數	68	72
粗率(每10萬人口)	0.83	1.71	粗率(每10萬人口)	0.35	0.78
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.63	0.97	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.19	0.36
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.64	1.05	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.22	0.41
性別比(年齡標準化率 ³)	0.61	1	性別比(年齡標準化率 ³)	0.54	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

300位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為288位，證實率為96.00%，男性證實率為98.97%，女性為94.58%。

男性患者的組織形態分布，以脂肪肉瘤最多，占男性個案之49.48%，女性患者的組織形態分布，以漿液性腺癌最多，占女性個案之27.59%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
脂肪肉瘤	48	49.48	48	100.00	31	15.27	29	93.55
平滑肌肉瘤	1	1.03	1	100.00	25	12.32	24	96.00
Ewing 氏肉瘤*	1	1.03	1	100.00	0	0.00	-	-
生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	2	2.06	2	100.00	1	0.49	1	100.00
惡性間皮瘤	7	7.22	7	100.00	10	4.93	10	100.00
其他惡性肉瘤*	21	21.65	21	100.00	22	10.84	22	100.00
漿液性腺癌	0	0.00	0	0.00	56	27.59	56	100.00
其他上皮癌	6	6.19	6	100.00	43	21.18	41	95.35
其他惡性腫瘤*	11	11.34	10	90.91	15	7.39	9	60.00
惡性淋巴瘤 ¹	4		4	100.00	5		5	100.00
總計 ²	97	100.00	96	98.97	203	100.00	192	94.58

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[周邊原始性神經外胚層腫瘤]不再呈現，重新分組為[Ewing氏肉瘤](m-code 9364/3、9473/3)，[其他惡性肉瘤](加入m-code 9500/3、9540/3、9560/3、9580/3)，與[其他惡性腫瘤](加入m-code 8680/3、9490/3)。

首次療程

300位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占68.67%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	66	68.04	140	68.97	206	68.67
放射線治療	21	21.65	27	13.30	48	16.00
化學治療	30	30.93	97	47.78	127	42.33
內分泌藥物治療	1	1.01	3	1.48	4	1.33
免疫治療	0	0.00	2	0.99	2	0.67
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	1	1.03	1	0.49	2	0.67
標靶治療	8	8.25	39	19.21	47	15.67
緩和照護	18	18.56	29	14.29	47	15.67
未有首次治療申報紀錄	14	14.43	19	9.36	33	11.00

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位


ICD-O-FT	T-159
ICD-O-3	C26
ICD-9	159
ICD-10	C26

民國108年，消化器官不明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.02%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.20%。發生率的排名於男性為第36位、女性為第38位；死亡率的排名於男性為第26位、女性為第31位。民國108年初次診斷為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計21人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的0.05%；當年死因為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計99人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	16	5	個案數(人)	62	37
年齡中位數	77	72	年齡中位數	69	78
粗率(每10萬人口)	0.14	0.04	粗率(每10萬人口)	0.53	0.31
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.07	0.02	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.28	0.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.08	0.02	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.32	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	4.00	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.88	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

21位消化器官不明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為20位，證實率為95.24%，男性證實率為93.75%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之62.50%，女性個案之40.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	10	62.50	10	100.00	2	40.00	2	100.00
神經內分泌癌	1	6.25	1	100.00	1	20.00	1	100.00
其他特定上皮癌	1	6.25	1	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	2	12.50	2	100.00	1	20.00	1	100.00
惡性肉瘤	1	6.25	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	1	6.25	0	0.00	1	20.00	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	3		3	100.00	.		.	.
總計 ²	16	100.00	15	93.75	5	100.00	5	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

21位消化器官不明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占33.33%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2	12.50	0	0.00	2	9.52
放射線治療	1	6.25	1	20.00	2	9.52
化學治療	6	37.50	1	20.00	7	33.33
免疫治療	1	6.25	0	0.00	1	4.76
標靶治療	1	6.25	0	0.00	1	4.76
緩和照護	4	25.00	2	40.00	6	28.57
未有首次治療申報紀錄	8	50.00	2	40.00	10	47.62

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

鼻腔、副竇、中耳及內耳

ICD-O-FT T-160

ICD-O-3 C30 - C31

ICD-9 160



ICD-10 C30 - C31

民國108年，鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.22%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.11%。發生率的排名於男性為第26位、女性為第32位；死亡率的排名於男性為第30位、女性為第34位。民國108年初次診斷為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計262人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的1.45%；當年死因為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計57人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	181	81	個案數(人)	45	12
年齡中位數	59	58	年齡中位數	63	58
粗率(每10萬人口)	1.55	0.68	粗率(每10萬人口)	0.38	0.10
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.94	0.40	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.21	0.06
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.04	0.45	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.23	0.07
性別比(年齡標準化率 ³)	2.31	1	性別比(年齡標準化率 ³)	3.29	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

262位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為262位，證實率為100.00%，男性證實率為100.00%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之46.41%，女性個案之45.68%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	84	46.41	84	100.00	37	45.68	37	100.00
腺癌	7	3.87	7	100.00	4	4.94	4	100.00
唾液腺癌	15	8.29	15	100.00	11	13.58	11	100.00
神經內分泌癌	9	4.97	9	100.00	3	3.70	3	100.00
鼻與鼻竇未分化上皮癌	10	5.52	10	100.00	3	3.70	3	100.00
其他特定上皮癌	7	3.87	7	100.00	2	2.47	2	100.00
非特定上皮癌	24	13.26	24	100.00	8	9.88	8	100.00
軟組織肉瘤	5	2.76	5	100.00	1	1.23	1	100.00
惡性黑色素瘤	10	5.52	10	100.00	5	6.17	5	100.00
其他惡性腫瘤	10	5.52	10	100.00	7	8.64	7	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	37		37	100.00	26		26	100.00
總計 ²	181	100.00	181	100.00	81	100.00	81	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

262位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占57.25%，其次為手術治療，占50.38%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	88	48.62	44	54.32	132	50.38
放射線治療	99	54.70	51	62.96	150	57.25
化學治療	81	44.75	34	41.98	115	43.89
免疫治療	4	2.21	1	1.23	5	1.91
標靶治療	1	0.55	2	2.47	3	1.15
緩和照護	13	7.18	6	7.41	19	7.25
未有首次治療申報紀錄	38	20.99	11	13.58	49	18.70

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

喉

ICD-O-FT T-161
ICD-O-3 C32
ICD-9 161
ICD-10 C32


民國108年，喉惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.70%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.50%。發生率的排名於男性為第16位、女性為第35位；死亡率的排名於男性為第18位、女性為第35位。民國108年初次診斷為喉惡性腫瘤者共計846人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的4.70%；當年死因為喉惡性腫瘤者共計252人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	798	48
年齡中位數	63	65
粗率(每10萬人口)	6.82	0.40
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.81	0.21
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.20	0.22
性別比(年齡標準化率 ³)	19.09	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	238	14
年齡中位數	67	67
粗率(每10萬人口)	2.03	0.12
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.06	0.05
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.20	0.06
性別比(年齡標準化率 ³)	20.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

846位喉惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為837位，證實率為98.94%，男性證實率為98.87%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.37%，女性個案之91.67%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	777	97.37	775	99.74	44	91.67	44	100.00
神經內分泌癌	3	0.38	3	100.00	1	2.08	1	100.00
其他特定上皮癌	3	0.38	3	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	4	0.50	4	100.00	2	4.17	2	100.00
軟組織肉瘤	1	0.13	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	10	1.25	3	30.00	1	2.08	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	1		1	100.00	.		.	.
總計 ²	798	100.00	789	98.87	48	100.00	48	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

846位喉惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占59.22%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	310	38.85	19	39.58	329	38.89
放射線治療	476	59.65	25	52.08	501	59.22
化學治療	261	32.71	13	27.08	274	32.39
免疫治療	1	0.13	0	0.00	1	0.12
標靶治療	37	4.64	2	4.17	39	4.61
緩和照護	29	3.63	0	0.00	29	3.43
未有首次治療申報紀錄	69	8.65	6	12.50	75	8.87

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管


ICD-O-FT T-162
ICD-O-3 C33 - C34
ICD-9 162
ICD-10 C33 - C34

民國108年，肺、支氣管及氣管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.39%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的19.31%。發生率的排名於男性為第2位、女性為第2位；死亡率的排名於男性為第1位、女性為第1位。民國108年初次診斷為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計16,233人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的90.12%；當年死因為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計9,701人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	8,847	7,386	個案數(人)	6,190	3,511
年齡中位數	67	65	年齡中位數	71	73
粗率(每10萬人口)	75.58	62.08	粗率(每10萬人口)	52.88	29.51
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	40.09	31.46	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	26.51	12.81
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	45.61	35.01	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	31.14	15.04
性別比(年齡標準化率 ³)	1.30	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.07	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

16,233位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為15,727位，證實率為96.88%，男性證實率為96.47%，女性為97.37%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之58.17%，女性個案之87.30%。

民國108年男、女性肺、支氣管及氣管原位癌個案分別為215位和537位，詳見本年報第134、135頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,671	18.89	1,666	99.70	262	3.55	261	99.62
腺癌	5,146	58.17	5,123	99.55	6,448	87.30	6,435	99.80
腺性鱗狀癌	120	1.36	120	100.00	81	1.10	81	100.00
大細胞癌	118	1.33	118	100.00	56	0.76	55	98.21
小細胞癌	962	10.87	960	99.79	122	1.65	121	99.18
肉瘤樣癌	81	0.92	80	98.77	32	0.43	32	100.00
類癌腫瘤	37	0.42	37	100.00	52	0.70	52	100.00
唾液腺樣癌	16	0.18	16	100.00	11	0.15	10	90.91
其他特定上皮癌	9	0.10	9	100.00	6	0.08	6	100.00
非特定上皮癌	407	4.60	372	91.40	134	1.81	113	84.33
非小細胞癌, NOS	181	2.05	179	98.90	41	0.56	41	100.00
其他	226	2.55	193	85.40	93	1.26	72	77.42
惡性肉瘤	17	0.19	17	100.00	4	0.05	4	100.00
其他惡性腫瘤	263	2.97	17	6.46	178	2.41	22	12.36
惡性淋巴瘤 ¹	28		28	100.00	29		29	100.00
總計 ²	8,847	100.00	8,535	96.47	7,386	100.00	7,192	97.37

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

16,233位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占38.98%，其次為化學治療，占33.02%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,682	30.32	3,645	49.35	6,327	38.98
放射線治療	2,270	25.66	1,052	14.24	3,322	20.46
化學治療	3,696	41.78	1,664	22.53	5,360	33.02
免疫治療	465	5.26	175	2.37	640	3.94
標靶治療	1,720	19.44	2,375	32.16	4,095	25.23
緩和照護	3,051	34.49	1,766	23.91	4,817	29.67
其他治療	13	0.15	16	0.22	29	0.18
未有首次治療申報紀錄	1,164	13.16	560	7.58	1,724	10.62

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

胸膜

ICD-O-FT	T-163
ICD-O-3	C38.4
ICD-9	163
ICD-10	C38.4



民國108年，胸膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.07%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第32位、女性為第36位；死亡率的排名於男性為第38位、女性為第38位。民國108年初次診斷為胸膜惡性腫瘤者共計82人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的0.46%；當年死因為胸膜惡性腫瘤者共計8人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	61	21
年齡中位數	69	68
粗率(每10萬人口)	0.52	0.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.26	0.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.30	0.10
性別比(年齡標準化率 ³)	3.00	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	5	3
年齡中位數	74	68
粗率(每10萬人口)	0.04	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.02	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.03	0.01
性別比(年齡標準化率 ³)	3.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

82位胸膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為82位，證實率為100.00%，男性證實率為100.00%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性間皮瘤最多，分別占男性個案之93.44%，女性個案之71.43%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
惡性間皮瘤	57	93.44	57	100.00	15	71.43	15	100.00
惡性肉瘤	3	4.92	3	100.00	4	19.05	4	100.00
其他惡性腫瘤	1	1.64	1	100.00	2	9.52	2	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	9		8	88.89	4		4	100.00
總計 ²	61	100.00	61	100.00	21	100.00	21	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

82位胸膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，化學治療者最多，占63.41%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	19	31.15	5	23.81	24	29.27
放射線治療	5	8.20	3	14.29	8	9.76
化學治療	38	62.30	14	66.67	52	63.41
免疫治療	2	3.28	2	9.52	4	4.88
標靶治療	6	9.84	3	14.29	9	10.98
緩和照護	17	27.87	11	52.38	28	34.15
其他治療	1	1.64	0	0.00	1	1.22
未有首次治療申報紀錄	13	21.31	5	23.81	18	21.95

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胸腺、心臟及縱膈

ICD-O-FT T-164

ICD-O-3 C37 - C38(C38.4除外)

ICD-9 164

ICD-10 C37 - C38(C38.4除外)


民國108年，胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.49%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.30%。發生率的排名於男性為第23位、女性為第23位；死亡率的排名於男性為第21位、女性為第26位。民國108年初次診斷為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計589人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的3.27%；當年死因為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計152人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	330	259
年齡中位數	56	59
粗率(每10萬人口)	2.82	2.18
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.89	1.33
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.02	1.41
性別比(年齡標準化率 ³)	1.43	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	93	59
年齡中位數	62	65
粗率(每10萬人口)	0.79	0.50
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.47	0.25
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.52	0.29
性別比(年齡標準化率 ³)	1.79	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

589位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為585位，證實率為99.32%，男性證實率為99.39%，女性為99.23%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胸腺瘤最多，分別占男性個案之59.70%，女性個案之69.11%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
胸腺瘤	197	59.70	197	100.00	179	69.11	179	100.00
胸腺癌	95	28.79	95	100.00	61	23.55	61	100.00
生殖細胞瘤	18	5.45	17	94.44	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	6	1.82	6	100.00	4	1.54	4	100.00
惡性肉瘤	11	3.33	11	100.00	11	4.25	10	90.91
其他惡性腫瘤	3	0.91	2	66.67	4	1.54	3	75.00
惡性淋巴瘤 ¹	36		36	100.00	44		44	100.00
總計 ²	330	100.00	328	99.39	259	100.00	257	99.23

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

589位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占73.17%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	236	71.52	195	75.29	431	73.17
放射線治療	123	37.27	86	33.20	209	35.48
化學治療	97	29.39	63	24.32	160	27.16
免疫治療	4	1.21	2	0.77	6	1.02
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術						
治療	0	0.00	1	0.39	1	0.17
標靶治療	3	0.91	3	1.16	6	1.02
緩和照護	30	9.09	27	10.42	57	9.68
未有首次治療申報紀錄	28	8.48	17	6.56	45	7.64

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

骨、關節及關節軟骨

ICD-O-FT T-170
ICD-O-3 C40 - C41
ICD-9 170
ICD-10 C40 - C41


民國108年，骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.15%。發生率的排名於男性為第27位、女性為第30位；死亡率的排名於男性為第27位、女性為第27位。民國108年初次診斷為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計176人；當年死因為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計77人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	99	77
年齡中位數	40	47
粗率(每10萬人口)	0.85	0.65
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.85	0.64
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.86	0.65
性別比(年齡標準化率 ³)	1.32	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	42	35
年齡中位數	61	64
粗率(每10萬人口)	0.36	0.29
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.30	0.23
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.30	0.25
性別比(年齡標準化率 ³)	1.20	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

176位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為170位，證實率為96.59%，男性證實率為95.96%，女性為97.40%。

男、女性患者的組織形態分布，均以骨肉瘤最多，分別占男性個案之40.40%，女性個案之42.86%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
骨肉瘤	40	40.40	39	97.50	33	42.86	33	100.00
軟骨肉瘤	21	21.21	21	100.00	17	22.08	17	100.00
惡性骨巨大細胞瘤	4	4.04	4	100.00	3	3.90	3	100.00
Ewing 氏肉瘤	5	5.05	5	100.00	6	7.79	6	100.00
脊索瘤	11	11.11	11	100.00	4	5.19	4	100.00
惡性成釉細胞瘤	4	4.04	4	100.00	0	0.00	0	0.00
血管肉瘤	1	1.01	1	100.00	2	2.60	2	100.00
纖維肉瘤	1	1.01	1	100.00	1	1.30	1	100.00
平滑肌肉瘤	1	1.01	1	100.00	1	1.30	1	100.00
其他惡性肉瘤	5	5.05	5	100.00	7	9.09	6	85.71
其他惡性腫瘤	6	6.06	3	50.00	3	3.90	2	66.67
惡性淋巴瘤 ¹	19		18	94.74	13		13	100.00
總計 ²	99	100.00	95	95.96	77	100.00	75	97.40

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

176位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占73.30%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	73	73.74	56	72.73	129	73.30
放射線治療	23	23.23	21	27.27	44	25.00
化學治療	45	45.45	39	50.65	84	47.73
免疫治療	2	2.02	0	0.00	2	1.14
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	1	1.01	0	0.00	1	0.57
標靶治療	3	3.03	3	3.90	6	3.41
緩和照護	11	11.11	4	5.19	15	8.52
未有首次治療申報紀錄	12	12.12	8	10.39	20	11.36

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結締組織、軟組織及其他皮下組織



ICD-O-FT T-171
ICD-O-3 C47, C49
ICD-9 171
ICD-10 C47, C49

民國108年，結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.50%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.55%。發生率的排名於男性為第21位、女性為第21位；死亡率的排名於男性為第19位、女性為第20位。民國108年初次診斷為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計609人；當年死因為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計277人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	333	276	個案數(人)	153	124
年齡中位數	60	60	年齡中位數	64	63
粗率(每10萬人口)	2.84	2.32	粗率(每10萬人口)	1.31	1.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.97	1.54	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.80	0.62
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.13	1.65	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.90	0.68
性別比(年齡標準化率 ³)	1.29	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.32	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

609位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為601位，證實率為98.69%，男性證實率為99.10%，女性為98.19%。

男、女性患者的組織形態分布，均以脂肪肉瘤最多，分別占男性個案之20.42%，占女性個案之17.75%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤	59	17.72	59	100.00	42	15.22	42	100.00
脂肪肉瘤	68	20.42	67	98.53	49	17.75	49	100.00
平滑肌肉瘤	18	5.41	18	100.00	25	9.06	25	100.00
橫紋肌肉瘤	10	3.00	10	100.00	6	2.17	6	100.00
血管肉瘤	39	11.71	39	100.00	15	5.43	14	93.33
滑膜肉瘤	16	4.80	16	100.00	14	5.07	14	100.00
惡性周邊神經鞘瘤	15	4.50	15	100.00	24	8.70	24	100.00
周邊原始神經外胚層腫瘤	5	1.50	5	100.00	1	0.36	1	100.00
胃腸基質瘤	5	1.50	5	100.00	5	1.81	5	100.00
未分化肉瘤	47	14.11	47	100.00	51	18.48	51	100.00
其他惡性肉瘤	38	11.41	37	97.37	35	12.68	32	91.43
其他惡性腫瘤	13	3.90	12	92.31	9	3.26	8	88.89
惡性淋巴瘤 ¹	12		12	100.00	9		9	100.00
總計 ²	333	100.00	330	99.10	276	100.00	271	98.19

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

609位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占76.85%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	252	75.68	216	78.26	468	76.85
放射線治療	131	39.34	106	38.41	237	38.92
化學治療	72	21.62	57	20.65	129	21.18
標靶治療	11	3.30	11	3.99	22	3.61
緩和照護	22	6.61	22	7.97	44	7.22
未有首次治療申報紀錄	31	9.31	26	9.42	57	9.36

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚

ICD-O-FT T-173
ICD-O-3 C44
ICD-9 172 , 173
ICD-10 C43 - C44



民國108年，皮膚惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.66%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.58%。發生率的排名於男性為第8位、女性為第8位；死亡率的排名於男性為第20位、女性為第22位。民國108年初次診斷為皮膚惡性腫瘤者共計4,442人；當年死因為皮膚惡性腫瘤者共計293人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,356	2,086
年齡中位數	74	76
粗率(每10萬人口)	20.13	17.53
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.85	7.27
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	11.81	8.72
性別比(年齡標準化率 ³)	1.35	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	169	124
年齡中位數	75	80
粗率(每10萬人口)	1.44	1.04
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.72	0.40
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.86	0.49
性別比(年齡標準化率 ³)	1.76	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

4,442位皮膚惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,437位，證實率為99.89%，其中男性證實率為99.92%，女性證實率為99.86%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最為常見，分別占男性個案之45.93%，女性個案之56.57%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	1,082	45.93	1,082	100.00	1,180	56.57	1,180	100.00
鱗狀細胞癌	917	38.92	916	99.89	657	31.50	656	99.85
皮膚附件癌	77	3.27	77	100.00	52	2.49	52	100.00
惡性黑色素瘤	154	6.54	153	99.35	134	6.42	133	99.25
其他特定上皮癌	14	0.59	14	100.00	14	0.67	14	100.00
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	15	0.64	15	100.00	11	0.53	10	90.91
血管肉瘤	84	3.57	84	100.00	26	1.25	26	100.00
惡性神經瘤	8	0.34	8	100.00	9	0.43	9	100.00
其他惡性肉瘤	4	0.17	4	100.00	2	0.10	2	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.04	1	100.00	1	0.05	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	69		69	100.00	38		38	100.00
總計 ²	2,356	100.00	2,354	99.92	2,086	100.00	2,083	99.86

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,442位皮膚惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.51%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,088	88.62	1,888	90.51	3,976	89.51
放射線治療	150	6.37	91	4.36	241	5.43
化學治療	56	2.38	24	1.15	80	1.80
免疫治療	14	0.59	13	0.62	27	0.61
標靶治療	7	0.30	11	0.53	18	0.41
緩和照護	48	2.04	32	1.53	80	1.80
其他治療	0	0.00	1	0.05	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	181	7.68	134	6.42	315	7.09

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，惡性黑色素瘤

ICD-O-FT T-173 (M-87203 - M-87903)

ICD-O-3 C44 (M-87203 - M-87903)

ICD-9 172


ICD-10 C43

民國108年，皮膚惡性黑色素瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.24%，當年因皮膚惡性黑色素瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.30%。民國108年初次診斷為皮膚惡性黑色素瘤者共計288人；當年死因為皮膚惡性黑色素瘤者共計151人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	154	134	個案數(人)	77	74
年齡中位數	68	65	年齡中位數	72	75
粗率(每10萬人口)	1.32	1.13	粗率(每10萬人口)	0.66	0.62
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.71	0.60	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.35	0.27
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.82	0.68	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.41	0.32
性別比(年齡標準化率 ³)	1.21	1	性別比(年齡標準化率 ³)	1.28	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

首次療程

288位皮膚惡性黑色素瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占78.47%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	116	75.32	110	82.09	226	78.47
放射線治療	18	11.69	18	13.43	36	12.50
化學治療	14	9.09	11	8.21	25	8.68
免疫治療	11	7.14	11	8.21	22	7.64
標靶治療	4	2.60	9	6.72	13	4.51
緩和照護	13	8.44	12	8.96	25	8.68
未有首次治療申報紀錄	24	15.58	12	8.96	36	12.50

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，非惡性黑色素瘤


ICD-O-FT T-173 (M-87203 - M-87903 除外)
 ICD-O-3 C44 (M-87203 - M-87903 除外)
 ICD-9 173
 ICD-10 C44

民國108年，皮膚非惡性黑色素瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.43%，當年因皮膚非惡性黑色素瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.28%。民國108年初次診斷為皮膚非惡性黑色素瘤共計有4,154人；當年死因為皮膚非惡性黑色素瘤者共142人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	2,202	1,952	個案數(人)	92	50
年齡中位數	74	77	年齡中位數	78	88
粗率(每10萬人口)	18.81	16.41	粗率(每10萬人口)	0.79	0.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.14	6.67	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.37	0.14
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	10.98	8.04	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.45	0.17
性別比(年齡標準化率 ³)	1.37	1	性別比(年齡標準化率 ³)	2.65	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

4,154位皮膚非惡性黑色素瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,151位，證實率為99.93%，男性證實率為99.95%，女性為99.90%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最多，分別占男性個案之49.14%，女性個案之60.45%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	1,082	49.14	1,082	100.00	1,180	60.45	1,180	100.00
鱗狀細胞癌	917	41.64	916	99.89	657	33.66	656	99.85
皮膚附件癌	77	3.50	77	100.00	52	2.66	52	100.00
其他特定上皮癌	14	0.64	14	100.00	14	0.72	14	100.00
纖維肉瘤樣隆突性皮膚								
纖維肉瘤	15	0.68	15	100.00	11	0.56	10	90.91
血管肉瘤	84	3.81	84	100.00	26	1.33	26	100.00
惡性神經瘤	8	0.36	8	100.00	9	0.46	9	100.00
其他惡性肉瘤	4	0.18	4	100.00	2	0.10	2	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.05	1	100.00	1	0.05	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	69		69	100.00	38		38	100.00
總計 ²	2,202	100.00	2,201	99.95	1,952	100.00	1,950	99.90

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,154位皮膚非惡性黑色素瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占90.27%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,972	89.55	1,778	91.09	3,750	90.27
放射線治療	132	5.99	73	3.74	205	4.94
化學治療	42	1.91	13	0.67	55	1.32
免疫治療	3	0.14	2	0.10	5	0.12
標靶治療	3	0.14	2	0.10	5	0.12
緩和照護	35	1.59	20	1.02	55	1.32
其他治療	0	0.00	1	0.05	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	157	7.13	122	6.25	279	6.72

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房

ICD-O-FT T-174，T-175

ICD-O-3 C50

ICD-9 174，175

ICD-10 C50


民國108年，女性及男性乳房惡性腫瘤發生個案數分別占全部惡性腫瘤發生個案數的12.25%及0.04%，女性及男性乳房惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的5.24%及0.02%。發生率的排名於女性為第1位、男性為第33位；死亡率的排名於女性為第2位、男性為第35位。民國108年初次診斷為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為14,856人及53人；當年死因為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為2,633人及12人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	53	14,856
年齡中位數	66	56
粗率(每10萬人口)	0.45	124.86
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.26	74.84
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.29	80.99
性別比(年齡標準化率 ³)	1	279.28


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	12	2,633
年齡中位數	87	62
粗率(每10萬人口)	0.10	22.13
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.04	11.77
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.05	12.98
性別比(年齡標準化率 ³)	1	259.60

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



男性乳房年齡別發生率與死亡率，
民國108年



女性乳房年齡別發生率與死亡率，
民國108年

診斷依據與組織形態

14,856位女性乳房惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為14,814位，證實率為99.72%；53位男性乳房惡性腫瘤中，經細胞學或組織病理證實者為53位，證實率為100.00%。

女、男性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以「侵襲性癌，非特定型」最多，分別占女性個案之86.32%，男性個案之83.02%。

民國108年女性乳房原位癌個案2,854位，詳見本年報第136、137頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
侵襲性癌，非特定型	44	83.02	44	100.00	12,823	86.32	12,819	99.97
黏液性癌	0	0.00	.	.	464	3.12	464	100.00
侵襲性小葉癌	0	0.00	.	.	672	4.52	672	100.00
惡性葉狀腫瘤	0	0.00	.	.	76	0.51	76	100.00
乳房 Paget 氏病	0	0.00	.	.	38	0.26	38	100.00
侵襲性乳頭狀癌	6	11.32	6	100.00	251	1.69	251	100.00
化生性癌	0	0.00	.	.	91	0.61	91	100.00
其他特定上皮癌	2	3.77	2	100.00	102	0.69	102	100.00
非特定上皮癌	1	1.89	1	100.00	283	1.90	278	98.23
惡性肉瘤	0	0.00	.	.	13	0.09	13	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	.	.	43	0.29	10	23.26
惡性淋巴瘤 ¹	0		.	.	22		22	100.00
總計 ²	53	100.00	53	100.00	14,856	100.00	14,814	99.72

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

14,909位女性及男性乳房惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占88.08%

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	46	86.79	13,086	88.09	13,132	88.08
放射線治療	14	26.42	8,292	55.82	8,306	55.71
化學治療	23	43.40	8,096	54.50	8,119	54.46
內分泌治療	41	77.36	10,531	70.89	10,572	70.91
藥物	41	77.36	10,514	70.77	10,555	70.80
手術	0	0.00	17	0.11	17	0.11
標靶治療	5	9.43	2,883	19.41	2,888	19.37
緩和照護	5	9.43	663	4.46	668	4.48
其他治療	0	0.00	7	0.05	7	0.05
未有首次治療申報紀錄	2	3.77	468	3.15	470	3.15

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

子宮頸


ICD-O-FT	T-180
ICD-O-3	C53
ICD-9	179，180
ICD-10	C53，C55

民國108年，子宮頸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.34%。發生率的排名於女性為第9位；死亡率的排名於女性為第8位。民國108年初次診斷為子宮頸惡性腫瘤者共計1,393人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58) 個案數的21.78%；當年死因為子宮頸惡性腫瘤者共計674人。


項 目	發生個案	項 目	死亡個案
	女性		女性
個案數(人)	1,393	個案數(人)	674
年齡中位數	57	年齡中位數	64
粗率(每10萬人口)	11.71	粗率(每10萬人口)	5.66
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	6.88	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.83
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.67	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,393位子宮頸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,382位，證實率為99.21%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占1,393位個案之69.06%。
民國108年子宮頸原位癌個案3,114位，詳見本年報第138、139頁。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	962	69.06	961	99.90
腺癌	318	22.83	317	99.69
腺性鱗狀癌	33	2.37	33	100.00
神經內分泌癌	30	2.15	30	100.00
其他特定上皮癌	5	0.36	5	100.00
非特定上皮癌	23	1.65	20	86.96
惡性黑色素瘤	2	0.14	2	100.00
混合性上皮與間質腫瘤	6	0.43	6	100.00
惡性肉瘤	4	0.29	4	100.00
其他惡性腫瘤	10	0.72	4	40.00
惡性淋巴瘤 ¹	1		1	100.00
總計 ²	1,393	100.00	1,382	99.21

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,393位子宮頸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占59.87%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	617	44.29
放射線治療	834	59.87
化學治療	726	52.12
標靶治療	27	1.94
緩和照護	121	8.69
其他治療	2	0.14
未有首次治療申報紀錄	141	10.12

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

子宮體

ICD-O-FT	T-182
ICD-O-3	C54
ICD-9	182
ICD-10	C54


民國108年，子宮體惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.58%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.78%。發生率的排名於女性為第5位；死亡率的排名於女性為第11位。民國108年初次診斷為子宮體惡性腫瘤者共計3,124人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的48.84%；當年死因為子宮體惡性腫瘤者共計392人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	3,124
年齡中位數	56
粗率(每10萬人口)	26.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.81
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	17.00


項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	392
年齡中位數	62
粗率(每10萬人口)	3.29
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.75
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.91

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

3,124位子宮體惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,114位，證實率為99.68%。

組織形態分布，以子宮內膜癌最為常見，占3,124位個案之92.32%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
子宮內膜癌	2,884	92.32	2,882	99.93
子宮內膜樣癌	2,303	73.72	2,301	99.91
漿液性腺癌	149	4.77	149	100.00
明亮細胞癌	57	1.82	57	100.00
癌肉瘤*	166	5.31	166	100.00
其他	209	6.69	209	100.00
絨毛膜癌	1	0.03	1	100.00
其他特定上皮癌	3	0.10	3	100.00
非特定上皮癌	19	0.61	18	94.74
平滑肌肉瘤	102	3.27	102	100.00
子宮內膜基質肉瘤	72	2.30	72	100.00
其他惡性肉瘤	30	0.96	30	100.00
其他惡性腫瘤	13	0.42	6	46.15
惡性淋巴瘤 ¹	2		2	100.00
總計 ²	3,124	100.00	3,114	99.68

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[惡性Muller氏混合腫瘤]更名。

首次療程

3,124位子宮體惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.05%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,782	89.05
放射線治療	881	28.20
化學治療	754	24.14
內分泌藥物治療	261	8.35
標靶治療	39	1.25
緩和照護	90	2.88
其他治療	6	0.19
未有首次治療申報紀錄	152	4.87

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

卵巢、輸卵管及寬韌帶

ICD-O-FT	T-183
ICD-O-3	C56，C57.0 - C57.4
ICD-9	183
ICD-10	C56，C57.0 - C57.4


民國108年，卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.38%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.36%。發生率的排名於女性為第7位；死亡率的排名於女性為第7位。民國108年初次診斷為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計1,677人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的26.22%；當年死因為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計683人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	1,677
年齡中位數	54
粗率(每10萬人口)	14.09
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.86


項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	683
年齡中位數	61
粗率(每10萬人口)	5.74
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.11
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.42

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,677位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,644位，證實率為98.03%。

組織形態分布，以漿液性腺癌最為常見，占1,677位個案之34.70%。

組 織 形 態	個案數	各形態百分比	女性	
			細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿液性腺癌	582	34.70	581	99.83
高級別漿液性腺癌	453	27.01	453	100.00
低級別漿液性腺癌	42	2.50	42	100.00
未分類	87	5.19	86	98.85
黏液性腺癌	151	9.00	151	100.00
子宮內膜樣癌	237	14.13	237	100.00
明亮細胞癌	333	19.86	333	100.00
混合細胞腺癌	59	3.52	59	100.00
非特定腺癌	63	3.76	62	98.41
生殖細胞瘤	59	3.52	58	98.31
性索間質腫瘤	77	4.59	75	97.40
其他特定上皮癌	39	2.33	37	94.87
非特定上皮癌	36	2.15	33	91.67
惡性肉瘤	12	0.72	12	100.00
其他惡性腫瘤	29	1.73	6	20.69
惡性淋巴瘤 ¹	3		3	100.00
總計 ²	1,677	100.00	1,644	98.03

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,677位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.15%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	1,495	89.15
放射線治療	14	0.83
化學治療	1,289	76.86
內分泌藥物治療	17	1.01
標靶治療	283	16.88
緩和照護	94	5.61
其他治療	1	0.06
未有首次治療申報紀錄	61	3.64

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

ICD-O-FT	T-184
ICD-O-3	C51 - C52，C57.7 - C57.9
ICD-9	184
ICD-10	C51 - C52，C57.7 - C57.9


民國108年，陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.16%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.10%。發生率的排名於女性為第27位；死亡率的排名於女性為第29位。民國108年初次診斷為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計188人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的2.94%；當年死因為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計52人。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	188
年齡中位數	67
粗率(每10萬人口)	1.58
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.76
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.87


項 目	死亡個案
	女性
個案數(人)	52
年齡中位數	74
粗率(每10萬人口)	0.44
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.19
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.22

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

188位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為186位，證實率為98.94%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占188位個案之57.98%。

組 織 形 態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	109	57.98	109	100.00
腺癌	36	19.15	36	100.00
神經內分泌癌	4	2.13	4	100.00
混合性上皮與間質腫瘤	4	2.13	4	100.00
絨毛膜癌	9	4.79	8	88.89
其他特定上皮癌	3	1.60	3	100.00
非特定上皮癌	6	3.19	5	83.33
惡性黑色素瘤	14	7.45	14	100.00
惡性肉瘤	2	1.06	2	100.00
其他惡性腫瘤	1	0.53	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	0	-	-	-
總計 ²	188	100.00	186	98.94

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

188位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占53.19%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	100	53.19
放射線治療	73	38.83
化學治療	59	31.38
緩和照護	13	6.91
未有首次治療申報紀錄	24	12.77

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

攝護腺(前列腺)

ICD-O-FT T-185

ICD-O-3 C61

ICD-9 185

ICD-10 C61


民國108年，攝護腺(前列腺)惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的5.87%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.06%。發生率的排名於男性為第5位；死亡率的排名於男性為第7位。民國108年初次診斷為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計7,115人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的94.87%；當年死因為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計1,538人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	7,115
年齡中位數	72
粗率(每10萬人口)	60.79
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	30.22
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	35.83


項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	1,538
年齡中位數	82
粗率(每10萬人口)	13.14
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.42
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	7.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織型態

7,115位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為7,013位，證實率為98.57%。

組織形態分布，以腺癌最多，占7,115位個案之98.12%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	6,981	98.12	6,963	99.74
鱗狀細胞癌	1	0.01	1	100.00
神經內分泌癌	22	0.31	22	100.00
其他特定上皮癌	2	0.03	2	100.00
非特定上皮癌	29	0.41	20	68.97
惡性肉瘤	2	0.03	2	100.00
其他惡性腫瘤	78	1.10	3	3.85
惡性淋巴瘤 ¹	2		2	100.00
總計 ²	7,115	100.00	7,013	98.57

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

7,115位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案接受治療之情形，以內分泌治療者最多，占56.70%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療**	3,223	45.30
放射線治療	1,843	25.90
化學治療	195	2.74
內分泌治療	4,034	56.70
藥物	3,987	56.04
手術(睪丸切除術)	47	0.66
免疫治療	5	0.07
標靶治療	1	0.01
緩和照護	668	9.39
其他治療	3	0.04
未有首次治療申報紀錄	1,241	17.44
僅接受 TURP 或經尿道前列腺雷射手術治療	589	8.28
首次療程為不予治療或積極監視或觀察等待等	254	3.57
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	225	3.16
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	129	1.81
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	44	0.62

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

手術治療**：包含prostatectomy, cryoprostectomy, hyperthermia。

睪丸	ICD-O-FT	T-186
	ICD-O-3	C62
	ICD-9	186
	ICD-10	C62


民國108年，睪丸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.23%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第20位；死亡率的排名於男性為第33位。民國108年初次診斷為睪丸惡性腫瘤者共計283人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的3.77%；當年死因為睪丸惡性腫瘤者共計16人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	283
年齡中位數	31
粗率(每10萬人口)	2.42
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.54


項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	16
年齡中位數	33
粗率(每10萬人口)	0.14
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

283位睪丸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為283位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以精細胞瘤最多，占283位個案之51.24%。

組 織 形 態	男 性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
精細胞瘤	145	51.24	145	100.00
卵黃囊瘤	7	2.47	7	100.00
胚胎性癌	13	4.59	13	100.00
混合性生殖細胞瘤	93	32.86	93	100.00
惡性畸胎瘤	11	3.89	11	100.00
絨毛膜癌	2	0.71	2	100.00
非特定生殖細胞瘤	4	1.41	4	100.00
性索基質腫瘤	2	0.71	2	100.00
其他惡性腫瘤	6	2.12	6	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	18		18	100.00
總計 ²	283	100.00	283	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

283位睪丸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占96.11%。

申 報 治 療 方 式*	男 性	
	治療人數	百分比
手術治療	272	96.11
放射線治療	11	3.89
化學治療	95	33.57
內分泌藥物治療	1	0.35
免疫治療	1	0.35
骨髓/幹細胞移植	1	0.35
緩和照護	7	2.47
未有首次治療申報紀錄	3	1.06

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

陰莖及其他男性生殖器官

ICD-O-FT	T-187
ICD-O-3	C60，C63
ICD-9	187
ICD-10	C60，C63


民國108年，陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.06%。發生率的排名於男性為第31位；死亡率的排名於男性為第32位。民國108年初次診斷為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計102人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的1.36%；當年死因為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計30人。

項 目	發生個案
	男性
個案數(人)	102
年齡中位數	65
粗率(每10萬人口)	0.87
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.47
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.53


項 目	死亡個案
	男性
個案數(人)	30
年齡中位數	65
粗率(每10萬人口)	0.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.17
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

102位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者，合計有102位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占102位個案之51.96%。

組 織 形 態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	53	51.96	53	100.00
基底細胞癌	9	8.82	9	100.00
Paget 氏病	28	27.45	28	100.00
其他上皮癌	4	3.92	4	100.00
惡性肉瘤	5	4.90	5	100.00
其他惡性腫瘤	3	2.94	3	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	2		2	100.00
總計 ²	102	100.00	102	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

102位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占87.25%。

申 報 治 療 方 式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	89	87.25
放射線治療	8	7.84
化學治療	15	14.71
免疫治療	1	0.98
緩和照護	5	4.90
未有首次治療申報紀錄	9	8.82

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67

ICD-9 188

ICD-10 C67


民國108年，膀胱惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.99%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.16%。發生率的排名於男性為第11位、女性為第16位；死亡率的排行於男性為第11位、女性為第13位。民國108年初次診斷為膀胱惡性腫瘤者共計2,410人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64–C68)個案數的41.72%；當年死因為膀胱惡性腫瘤者共計1,086人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,690	720
年齡中位數	70	74
粗率(每10萬人口)	14.44	6.05
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.34	2.57
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.55	3.04
性別比(年齡標準化率 ³)	2.81	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	711	375
年齡中位數	80	80
粗率(每10萬人口)	6.07	3.15
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.68	1.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.35	1.44
性別比(年齡標準化率 ³)	2.33	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

2,410位膀胱惡性腫瘤個案之診斷依據，經細胞學或組織病理證實者為2,381位，證實率為98.80%，男性證實率為99.17%，女性為97.92%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之94.73%，女性個案之92.91%。

民國108男、女性膀胱原位癌個案分別為823位和312位，詳見本年報第140、141頁。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	1,601	94.73	1,597	99.75	668	92.91	662	99.10
腺癌	37	2.19	34	91.89	14	1.95	13	92.86
鱗狀細胞癌	11	0.65	11	100.00	10	1.39	10	100.00
神經內分泌癌	25	1.48	25	100.00	8	1.11	8	100.00
非特定上皮癌	9	0.53	8	88.89	6	0.83	5	83.33
惡性黑色素瘤	0	0.00	0	0.00	2	0.28	2	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	0	0.00	2	0.28	2	100.00
其他惡性腫瘤	7	0.41	1	14.29	10	1.39	3	30.00
惡性淋巴瘤 ¹	1		1	100.00	4		4	100.00
總計 ²	1,690	100.00	1,676	99.17	720	100.00	705	97.92

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,410位膀胱惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.38%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	1,522	90.06	632	87.78	2,154	89.38
TURBT	1,184	70.06	490	68.15	1,674	69.46
放射線治療	143	8.46	82	11.39	225	9.34
全身性化學治療	356	21.07	131	18.19	487	20.21
局部性化學治療***	874	51.72	339	47.08	1,213	50.33
全身性免疫治療	72	4.26	30	4.17	102	4.23
局部性免疫治療****	89	5.27	38	5.28	127	5.27
緩和照護	112	6.63	74	10.28	186	7.72
未有首次治療申報紀錄	96	5.68	49	6.81	145	6.02

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16癌期別與治療統計。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注化療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

腎

ICD-O-FT T-189.0

ICD-O-3 C64

ICD-9 189.0

ICD-10 C64


民國108年，腎惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.33%，當年因此死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.19%。發生率的排名於男性為第15位、女性為第17位；死亡率的排行於男性為第14位、女性為第17位。民國108年初次診斷為腎惡性腫瘤者共計1,615人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64 - C68)個案數的27.96%；當年死因為腎惡性腫瘤者共計599人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,111	504
年齡中位數	60	64
粗率(每10萬人口)	9.49	4.24
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.80	2.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.31	2.60
性別比(年齡標準化率 ³)	2.43	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	379	220
年齡中位數	69	77
粗率(每10萬人口)	3.24	1.85
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.64	0.77
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.89	0.92
性別比(年齡標準化率 ³)	2.05	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,615位腎惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,517位，證實率為93.93%，其中男性證實率為94.69%，女性證實率為92.26%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腎細胞癌最多，分別占男性個案之95.68%，女性個案之92.66%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腎細胞癌	1,063	95.68	1,019	95.86	467	92.66	441	94.43
亮細胞腺癌	682	61.39	679	99.56	280	55.56	278	99.29
乳突狀腎細胞癌	114	10.26	114	100.00	24	4.76	24	100.00
嫌色性腎細胞癌	57	5.13	57	100.00	59	11.71	59	100.00
其他與非特定腎細胞癌	210	18.90	169	80.48	104	20.63	80	76.92
腎母細胞瘤	5	0.45	5	100.00	3	0.60	3	100.00
其他特定上皮癌	7	0.63	7	100.00	9	1.79	9	100.00
非特定上皮癌	10	0.90	8	80.00	9	1.79	8	88.89
惡性肉瘤	9	0.81	9	100.00	4	0.79	4	100.00
其他惡性腫瘤	17	1.53	4	23.53	12	2.38	0	0.00
惡性淋巴瘤 ¹	3		3	100.00	6		6	100.00
總計 ²	1,111	100.00	1,052	94.69	504	100.00	465	92.26

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,615位腎惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占80.74%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	912	82.09	392	77.78	1,304	80.74
放射線治療	41	3.69	14	2.78	55	3.41
化學治療	30	2.70	10	1.98	40	2.48
內分泌藥物治療	1	0.09	0	0.00	1	0.06
免疫治療	34	3.06	6	1.19	40	2.48
標靶治療	150	13.50	53	10.52	203	12.57
緩和照護	78	7.02	37	7.34	115	7.12
未有首次治療申報紀錄	80	7.20	51	10.12	131	8.11

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腎盂及其他泌尿器官

ICD-O-FT

ICD-O-3

ICD-9

ICD-10

T-189.1 - T-189.9

C65 - C66 , C68

189.1-189.9

C65 - C66 , C68


民國108年，腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.44%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.33%。發生率的排名於男性為第17位、女性為第14位；死亡率的排行於男性為第16位、女性為第14位。民國108年初次診斷為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計1,752人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64 - C68)個案數的30.33%；當年死因為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計667人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	754	998
年齡中位數	68	72
粗率(每10萬人口)	6.44	8.39
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.32	3.62
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.82	4.26
性別比(年齡標準化率 ³)	0.90	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	306	361
年齡中位數	73	79
粗率(每10萬人口)	2.61	3.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.29	1.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.53	1.42
性別比(年齡標準化率 ³)	1.08	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,752位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,698位，證實率為96.92%，男性證實率為97.08%，女性為96.79%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之93.90%，女性個案之94.99%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	708	93.90	691	97.60	948	94.99	926	97.68
鱗狀細胞癌	7	0.93	7	100.00	6	0.60	6	100.00
腺癌	9	1.19	9	100.00	11	1.10	10	90.91
其他特定上皮癌	3	0.40	3	100.00	10	1.00	10	100.00
非特定上皮癌	17	2.25	16	94.12	11	1.10	10	90.91
惡性肉瘤	1	0.13	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	9	1.19	5	55.56	12	1.20	4	33.33
惡性淋巴瘤 ¹	1		1	100.00	2		2	100.00
總計 ²	754	100.00	732	97.08	998	100.00	966	96.79

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,752位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占70.49%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	532	70.56	703	70.44	1,235	70.49
放射線治療	68	9.02	84	8.42	152	8.68
化學治療	277	36.74	293	29.36	570	32.53
免疫治療	46	6.10	48	4.81	94	5.37
標靶治療	3	0.40	5	0.50	8	0.46
緩和照護	79	10.48	124	12.42	203	11.59
其他治療	0	0.00	1	0.10	1	0.06
未有首次治療申報紀錄	111	14.72	120	12.02	231	13.18

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

眼及淚腺

ICD-O-FT	T-190
ICD-O-3	C69
ICD-9	190
ICD-10	C69



民國108年，眼及淚腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.05%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第34位、女性為第34位；死亡率的排名於男性為第35位、女性為第37位。民國108年初次診斷為眼及淚腺惡性腫瘤者共計61人；當年死因為眼及淚腺惡性腫瘤者共計13人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	31	30
年齡中位數	54	59
粗率(每10萬人口)	0.26	0.25
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.27	0.28
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.25	0.25
性別比(年齡標準化率)	1	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	9	4
年齡中位數	71	62
粗率(每10萬人口)	0.08	0.03
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.06	0.04
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.05	0.03
性別比(年齡標準化率)	1.67	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

61位眼及淚腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為45位，證實率為73.77%，男性證實率為74.19%，女性為73.33%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性黑色素瘤最多，分別占男性個案之45.16%，女性個案之33.33%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
視網膜母細胞瘤	5	16.13	4	80.00	7	23.33	5	71.43
惡性黑色素瘤	14	45.16	8	57.14	10	33.33	4	40.00
鱗狀細胞癌	6	19.35	5	83.33	6	20.00	6	100.00
淚腺癌	2	6.45	2	100.00	3	10.00	3	100.00
其他特定上皮癌	2	6.45	2	100.00	2	6.67	2	100.00
非特定上皮癌	1	3.23	1	100.00	1	3.33	1	100.00
惡性肉瘤	1	3.23	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	0	0.00	1	3.33	1	100.00
惡性淋巴瘤 ¹	18		18	100.00	19		18	94.74
總計 ²	31	100.00	23	74.19	30	100.00	22	73.33

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

61位眼及淚腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占67.21%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	19	61.29	22	73.33	41	67.21
放射線治療	11	35.48	10	33.33	21	34.43
化學治療	8	25.81	7	23.33	15	24.59
標靶治療	0	0.00	1	3.33	1	1.64
未有首次治療申報紀錄	4	12.90	2	6.67	6	9.84

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦

ICD-O-FT	T-191
ICD-O-3	C71
ICD-9	191
ICD-10	C71



民國108年，腦部惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.59%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.28%。發生率的排名於男性為第19位、女性為第19位；死亡率的排名於男性為第13位、女性為第12位。民國108年初次診斷為腦部惡性腫瘤者共計718人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71 – C72)個案數的90.20%；當年死因為腦部惡性腫瘤者共計641人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	410	308
年齡中位數	56	56
粗率(每10萬人口)	3.50	2.59
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.81	2.09
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.90	2.15
性別比(年齡標準化率)	1.35	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	363	278
年齡中位數	60	59
粗率(每10萬人口)	3.10	2.34
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.08	1.53
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.23	1.65
性別比(年齡標準化率)	1.35	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

718位腦部惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為634位，證實率為88.30%，男性證實率為88.78%，女性為87.66%。

男、女性患者的組織形態分布，均以神經膠母細胞瘤最多，分別占男性個案之50.98%，女性個案之45.45%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
瀰漫性星形細胞瘤	40	9.76	40	100.00	27	8.77	26	96.30
退行性星形細胞瘤	40	9.76	40	100.00	49	15.91	49	100.00
神經膠母細胞瘤	209	50.98	195	93.30	140	45.45	130	92.86
其他特定之星形細胞瘤	10	2.44	9	90.00	9	2.92	7	77.78
寡樹突膠質細胞瘤	35	8.54	33	94.29	21	6.82	20	95.24
室管膜瘤	9	2.20	8	88.89	9	2.92	9	100.00
非特定之神經膠質瘤	17	4.15	9	52.94	19	6.17	8	42.11
胚胎性瘤	10	2.44	10	100.00	10	3.25	10	100.00
神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤	2	0.49	2	100.00	0	0.00	0	0.00
生殖細胞瘤	13	3.17	10	76.92	8	2.60	5	62.50
脈絡叢癌	1	0.24	1	100.00	1	0.32	1	100.00
惡性肉瘤	3	0.73	3	100.00	3	0.97	3	100.00
其他特定之惡性瘤	2	0.49	2	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	19	4.63	2	10.53	12	3.90	2	16.67
惡性淋巴瘤 ¹	44		44	100.00	40		40	100.00
總計 ²	410	100.00	364	88.78	308	100.00	270	87.66

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

718位腦部惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.16%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	318	77.56	236	76.62	554	77.16
放射線治療	252	61.46	199	64.61	451	62.81
化學治療	222	54.15	163	52.92	385	53.62
內分泌藥物治療	0	0.00	1	0.32	1	0.14
免疫治療	1	0.24	0	0.00	1	0.14
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	1	0.24	1	0.32	2	0.28
標靶治療	6	1.46	10	3.25	16	2.23
緩和照護	29	7.07	31	10.06	60	8.36
未有首次治療申報紀錄	32	7.80	27	8.77	59	8.22

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位


ICD-O-FT	T-192
ICD-O-3	C70，C72
ICD-9	192
ICD-10	C70，C72

民國108年，腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.06%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.06%。發生率的排名於男性為第35位、女性為第33位；死亡率的排名於男性為第34位、女性為第35位。民國108年初次診斷為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計78人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71 – C72)個案數的9.80%；當年死因為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計29人。


項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	36	42	個案數(人)	16	13
年齡中位數	56	52	年齡中位數	63	69
粗率(每10萬人口)	0.31	0.35	粗率(每10萬人口)	0.14	0.11
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.21	0.32	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.09	0.05
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.23	0.32	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.10	0.06
性別比(年齡標準化率)	0.72	1	性別比(年齡標準化率)	1.67	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

78位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為70位，證實率為89.74%，男性證實率為91.67%，女性為88.10%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性腦膜瘤最多，分別占男性個案之41.67%，女性個案之47.62%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
星形細胞瘤	5	13.89	5	100.00	3	7.14	3	100.00
室管膜瘤	8	22.22	8	100.00	10	23.81	9	90.00
惡性腦膜瘤	15	41.67	14	93.33	20	47.62	17	85.00
惡性神經鞘瘤	1	2.78	0	0.00	0	0.00	-	-
生殖細胞瘤	1	2.78	1	100.00	0	0.00	-	-
惡性肉瘤	1	2.78	1	100.00	3	7.14	3	100.00
神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤*	0	0.00	-	-	2	4.76	2	100.00
其他惡性腫瘤	5	13.89	4	80.00	4	9.52	3	75.00
惡性淋巴瘤 ¹	2		2	100.00	4		4	100.00
總計 ²	36	100.00	33	91.67	42	100.00	37	88.10

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

*原[原始性神經外胚層腫瘤]不再呈現，歸入[神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤](加入m-code 9473/3、9490/3、9500/3、9522/3)與[其他惡性腫瘤](加入m-code 9508/3)。

首次療程

78位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占85.90%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	31	86.11	36	85.71	67	85.90
放射線治療	16	44.44	17	40.48	33	42.31
化學治療	3	8.33	5	11.90	8	10.26
標靶治療	2	5.56	0	0.00	2	2.56
緩和照護	3	8.33	1	2.38	4	5.13
未有首次治療申報紀錄	3	8.33	3	7.14	6	7.69

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

甲狀腺

ICD-O-FT T-193

ICD-O-3 C73

ICD-9 193

ICD-10 C73


民國108年，甲狀腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的4.00%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.35%。發生率的排名於男性為第12位、女性為第4位；死亡率的排名於男性為第25位、女性為第23位。民國108年初次診斷為甲狀腺惡性腫瘤者共計4,850人；當年死因為甲狀腺惡性腫瘤者共計176人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,268	3,582
年齡中位數	51	50
粗率(每10萬人口)	10.83	30.11
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	7.43	20.94
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	8.07	22.70
性別比(年齡標準化率)	0.36	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	70	106
年齡中位數	69	77
粗率(每10萬人口)	0.60	0.89
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.31	0.37
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.36	0.46
性別比(年齡標準化率)	0.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

4,850位甲狀腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,841位，證實率為99.81%，男性證實率為99.61%，女性為99.89%。

男、女性患者的組織形態分布，均以乳頭狀癌最多，分別占男性個案之91.01%、女性個案之92.60%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
乳頭狀癌	1,154	91.01	1,152	99.83	3,317	92.60	3,316	99.97
濾泡性癌	69	5.44	68	98.55	160	4.47	160	100.00
髓質癌	12	0.95	12	100.00	34	0.95	34	100.00
未分化癌	15	1.18	15	100.00	20	0.56	20	100.00
其他特定上皮癌	10	0.79	10	100.00	27	0.75	27	100.00
非特定上皮癌	6	0.47	6	100.00	15	0.42	15	100.00
其他惡性腫瘤	2	0.16	0	0.00	9	0.25	6	66.67
惡性淋巴瘤 ¹	8		8	100.00	11		11	100.00
總計 ²	1,268	100.00	1,263	99.61	3,582	100.00	3,578	99.89

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,850位甲狀腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占95.44%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,188	93.69	3,441	96.06	4,629	95.44
放射線治療	642	50.63	1,670	46.62	2,312	47.67
化學治療	7	0.55	11	0.31	18	0.37
內分泌藥物治療	899	70.90	2,649	73.95	3,548	73.15
免疫治療	0	0.00	1	0.03	1	0.02
標靶治療	8	0.63	10	0.28	18	0.37
緩和照護	15	1.18	20	0.56	35	0.72
其他治療	0	0.00	1	0.03	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	52	4.10	89	2.48	141	2.91

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

其他內分泌腺

ICD-O-FT

T-194

ICD-O-3

C74 - C75

ICD-9

194

ICD-10

C74 - C75


民國108年，其他內分泌腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.14%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.13%。發生率的排名於男性為第29位、女性為第31位；死亡率的排名於男性為第29位、女性為第30位。民國108年初次診斷為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計173人；當年死因為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計64人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	86	87
年齡中位數	42	50
粗率(每10萬人口)	0.73	0.73
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.82	0.61
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.77	0.62
性別比(年齡標準化率)	1.24	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	33	31
年齡中位數	58	59
粗率(每10萬人口)	0.28	0.26
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.25	0.21
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.25	0.21
性別比(年齡標準化率)	1.19	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

173位其他內分泌腺惡性腫瘤個案中(包含：腎上腺120例、副甲狀腺8例、腦下垂體5例、松果體20例、副神經節18例、及其他2例)，經細胞學或組織病理證實者為160位，證實率為92.49%，男性證實率為93.02%，女性為91.95%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性嗜鉻細胞瘤最多，分別占男性個案之46.51%，女性個案之58.62%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
神經母細胞瘤	11	12.79	11	100.00	4	4.60	4	100.00
腎上腺皮質癌	12	13.95	11	91.67	12	13.79	11	91.67
惡性嗜鉻細胞瘤	40	46.51	39	97.50	51	58.62	51	100.00
其他特定上皮癌	3	3.49	3	100.00	6	6.90	6	100.00
非特定上皮癌	1	1.16	1	100.00	2	2.30	1	50.00
惡性肉瘤	1	1.16	1	100.00	2	2.30	2	100.00
生殖細胞瘤	13	15.12	10	76.92	4	4.60	2	50.00
其他惡性腫瘤	5	5.81	4	80.00	6	6.90	3	50.00
惡性淋巴瘤 ¹	1		1	100.00	0		-	-
總計 ²	86	100.00	80	93.02	87	100.00	80	91.95

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

173位其他內分泌腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.50%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	65	75.58	76	87.36	141	81.50
放射線治療	22	25.58	13	14.94	35	20.23
化學治療	29	33.72	15	17.24	44	25.43
免疫治療	1	1.16	1	1.15	2	1.16
標靶治療	0	0.00	2	2.30	2	1.16
緩和照護	9	10.47	4	4.60	13	7.51
未有首次治療申報紀錄	4	4.65	3	3.45	7	4.05

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

不明原發部位

ICD-O-FT T-199

ICD-O-3 C80

ICD-9 199



ICD-10 C80

民國108年，不明原發部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.55%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.34%。民國108年初次診斷為不明原發部位惡性腫瘤者共計666人；當年死因為不明原發部位惡性腫瘤者共計674人。

項 目	發生個案		項 目	死亡個案	
	男性	女性		男性	女性
個案數(人)	368	298	個案數(人)	388	286
年齡中位數	68	75	年齡中位數	69	71
粗率(每10萬人口)	3.14	2.50	粗率(每10萬人口)	3.31	2.40
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.64	1.08	年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.73	1.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.88	1.29	年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.00	1.29
性別比(年齡標準化率)	1.46	1	性別比(年齡標準化率)	1.55	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

666位不明原發部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為519位，證實率為77.93%，男性證實率為81.52%，女性為73.49%。

男、女性患者的組織形態分布，男性以非特定上皮癌最多，占男性個案之28.26%，女性以腺癌最多，占女性個案之29.87%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	74	20.11	72	97.30	89	29.87	87	97.75
鱗狀細胞癌	60	16.30	60	100.00	27	9.06	26	96.30
未分化癌	3	0.82	3	100.00	1	0.34	1	100.00
小細胞癌	11	2.99	11	100.00	2	0.67	2	100.00
其他特定上皮癌	45	12.23	44	97.78	17	5.70	17	100.00
非特定上皮癌	104	28.26	96	92.31	80	26.85	69	86.25
惡性肉瘤	6	1.63	6	100.00	9	3.02	7	77.78
惡性黑色素瘤	0	0.00	0	0.00	2	0.67	2	100.00
其他惡性腫瘤	65	17.66	8	12.31	71	23.83	8	11.27
惡性淋巴瘤 ¹	20		20	100.00	12		11	91.67
總計 ²	368	100.00	300	81.52	298	100.00	219	73.49

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

666位不明原發部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，在去除緩和照護及未有首次治療申報紀錄下，以化學治療者最多，占24.92%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	10	2.72	8	2.68	18	2.70
放射線治療	75	20.38	43	14.43	118	17.72
化學治療	104	28.26	62	20.81	166	24.92
內分泌藥物治療	4	1.09	1	0.34	5	0.75
免疫治療	10	2.72	3	1.01	13	1.95
骨髓/幹細胞移植或內分泌手術治療	1	0.27	0	0.00	1	0.15
標靶治療	10	2.72	11	3.69	21	3.15
緩和照護	128	34.78	104	34.90	232	34.83
未有首次治療申報紀錄	163	44.29	145	48.66	308	46.25

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

白血病

ICD-O-FT 見p.496附錄五

ICD-O-3 見p.496附錄五

ICD-9 204-208

ICD-10 C91 - C95


民國108年，白血病發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.15%，當年因白血病死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.24%。發生率的排名於男性為第9位、女性為第12位；死亡率的排名於男性為第10位、女性為第10位。民國108年初次診斷為白血病者共計2,612人；當年死因為白血病者共計1,123人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,529	1,083
年齡中位數	63	62
粗率(每10萬人口)	13.06	9.10
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	9.13	6.12
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.70	6.46
性別比(年齡標準化率)	1.50	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	653	470
年齡中位數	69	70
粗率(每10萬人口)	5.58	3.95
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.27	2.00
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.69	2.27
性別比(年齡標準化率)	1.63	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

2,612位白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,500位，證實率為95.71%，男性證實率為95.81%，女性為95.57%。

男、女性患者的組織形態分布，均以急性骨髓性白血病最多，分別占男性個案之31.00%，女性個案之33.89%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	474	31.00	473	99.79	367	33.89	364	99.18
急性淋巴性白血病	174	11.38	174	100.00	128	11.82	128	100.00
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	164	10.73	161	98.17	110	10.16	108	98.18
慢性淋巴性白血病	150	9.81	142	94.67	87	8.03	84	96.55
分化不明之急性白血病	9	0.59	8	88.89	12	1.11	12	100.00
骨髓增生性腫瘤	324	21.19	286	88.27	235	21.70	205	87.23
骨髓分化不良症候群	230	15.04	220	95.65	141	13.02	132	93.62
其他白血病	1	0.07	0	0				
白血病，無法歸類	3	0.20	1	33.33	3	0.28	2	66.67
總計	1529	100	1465	95.81	1083	100	1035	95.57

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,612位白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占65.08%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.07	1	0.09	2	0.08
放射線治療	42	2.75	23	2.12	65	2.49
化學治療	990	64.75	710	65.56	1,700	65.08
類固醇治療	176	11.51	135	12.47	311	11.91
免疫治療	1	0.07	4	0.37	5	0.19
骨髓/幹細胞移植	114	7.46	83	7.66	197	7.54
標靶治療	313	20.47	220	20.31	533	20.41
緩和照護	190	12.43	144	13.30	334	12.79
其他治療	156	10.20	120	11.08	276	10.57
未有首次治療申報紀錄	270	17.66	174	16.07	444	17.00

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性淋巴性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 108 年，初次診斷為急性淋巴性白血病者共計 302 人，占白血病發生個案數的 11.56%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	174	128
年齡中位數	21	39
粗率(每10萬人口)	1.49	1.08
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.27	1.47
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.00	1.33
性別比(年齡標準化率)	1.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

302位急性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為302位，證實率為100.00%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性淋巴性白血病	174	100.00	174	100.00	128	100.00	128	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

302 位急性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占93.38%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	20	11.49	12	9.38	32	10.60
化學治療	162	93.10	120	93.75	282	93.38
類固醇治療	129	74.14	110	85.94	239	79.14
骨髓/幹細胞移植	31	17.82	22	17.19	53	17.55
標靶治療	34	19.54	33	25.78	67	22.19
緩和照護	14	8.05	10	7.81	24	7.95
未有首次治療申報紀錄	8	4.60	5	3.91	13	4.30

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性淋巴性白血病

ICD-O-FT

見 p.496 附錄五

ICD-O-3


見 p.496 附錄五

民國 108 年，初次診斷為慢性淋巴性白血病者共計 237 人，占白血病發生個案數的 9.07%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	150	87
年齡中位數	66	67
粗率(每10萬人口)	1.28	0.73
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.68	0.36
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.77	0.41
性別比(年齡標準化率)	1.88	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

237 位慢性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 226 位，證實率為 95.36%，男性證實率為 94.67%，女性為 96.55%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性淋巴性白血病	150	100.00	142	94.67	87	100.00	84	96.55

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

237 位慢性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 43.46%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	0	0.00	1	1.15	1	0.42
放射線治療	4	2.67	1	1.15	5	2.11
化學治療	68	45.33	35	40.23	103	43.46
類固醇治療	34	22.67	13	14.94	47	19.83
標靶治療	22	14.67	11	12.64	33	13.92
緩和照護	10	6.67	8	9.20	18	7.59
未有首次治療申報紀錄	75	50.00	46	52.87	121	51.05

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 108 年，初次診斷為急性骨髓性白血病者共計 841 人，占白血病發生個案數的 32.20%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	474	367
年齡中位數	64	62
粗率(每10萬人口)	4.05	3.08
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	2.53	1.98
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.79	2.12
性別比(年齡標準化率)	1.32	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

841 位急性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 837 位，證實率為 99.52%，男性證實率為 99.79%，女性為 99.18%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	474	100.00	473	99.79	367	100.00	364	99.18

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

841 位急性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 82.16%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.21	0	0.00	1	0.12
放射線治療	14	2.95	8	2.18	22	2.62
化學治療	390	82.28	301	82.02	691	82.16
類固醇治療	5	1.05	6	1.63	11	1.31
免疫治療	1	0.21	0	0.00	1	0.12
骨髓/幹細胞移植	67	14.14	54	14.71	121	14.39
標靶治療	60	12.66	48	13.08	108	12.84
緩和照護	68	14.35	56	15.26	124	14.74
其他治療	28	5.91	25	6.81	53	6.30
未有首次治療申報紀錄	53	11.18	37	10.08	90	10.70

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性骨髓性白血病

ICD-O-FT 見 p.496 附錄五


ICD-O-3 見 p.496 附錄五

民國 108 年，初次診斷為慢性骨髓性白血病(僅包含 BCR-ABL1 陽性)者共計 274 人，占白血病發生個案數的 10.49%。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	164	110
年齡中位數	53	56
粗率(每10萬人口)	1.40	0.92
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.00	0.60
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.09	0.66
性別比(年齡標準化率)	1.65	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

274 位慢性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 269 位，證實率為 98.18%，男性證實率為 98.17%，女性為 98.18%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性骨髓性白血病	164	100.00	161	98.17	110	100.00	108	98.18

註：1. 慢性骨髓性白血病僅包含BCR-ABL1陽性。

2. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

274 位慢性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占 98.54%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
化學治療	82	50.00	42	38.18	124	45.26
類固醇治療	1	0.61	1	0.91	2	0.73
免疫治療	0	0.00	2	1.82	2	0.73
骨髓/幹細胞移植	2	1.22	0	0.00	2	0.73
標靶治療	162	98.78	108	98.18	270	98.54
緩和照護	0	0.00	9	8.18	9	3.28
未有首次治療申報紀錄	2	1.22	1	0.91	3	1.09

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

淋巴結惡性淋巴瘤

ICD-O-FT T-196 M-CODE見p.496附錄五


ICD-O-3 C77 M-CODE見p.496附錄五

民國108年，初次診斷為淋巴結惡性淋巴瘤者共計1,922人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,041	881
年齡中位數	64	64
粗率(每10萬人口)	8.88	7.40
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	5.44	4.16
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	6.06	4.59
性別比(年齡標準化率)	1.32	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,922位淋巴結惡性淋巴瘤個案之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,910位，證實率為99.38%，男性證實率為99.42%，女性為99.32%。其中185位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為185位，證實率為100.00%；1,681位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,679位，證實率為99.88%。

1,922位淋巴結惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之88.09%，女性個案之86.72%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	92	8.84	92	100.00	93	10.56	93	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	917	88.09	915	99.78	764	86.72	764	100.00
漿細胞瘤	1	0.10	1	100.00	0	0.00	-	-
組織細胞與樹突狀細胞瘤	3	0.29	3	100.00	2	0.23	1	50.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	28	2.69	24	85.71	22	2.50	17	77.27
總計	1,041	100.00	1,035	99.42	881	100.00	875	99.32

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

1,922 位淋巴結惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占77.26%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	29	2.79	23	2.61	52	2.71
放射線治療	107	10.28	103	11.69	210	10.93
化學治療	813	78.10	672	76.28	1,485	77.26
類固醇治療	704	67.63	570	64.70	1,274	66.29
免疫治療	11	1.06	6	0.68	17	0.88
骨髓/幹細胞移植	23	2.21	15	1.70	38	1.98
標靶治療	610	58.60	530	60.16	1,140	59.31
緩和照護	96	9.22	83	9.42	179	9.31
其他治療	1	0.10	2	0.23	3	0.16
未有首次治療申報紀錄	146	14.02	134	15.21	280	14.57

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16 癌期別與治療統計。

淋巴結外惡性淋巴瘤

ICD-O-FT T-140 - T-199 (T-196除外) M-CODE見p.496附錄五


ICD-O-3 C00 - C80 (C77除外) M-CODE見p.496附錄五

民國107年，初次診斷為淋巴結外惡性淋巴瘤者共計1,349人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	718	631
年齡中位數	64	64
粗率(每10萬人口)	6.13	5.30
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.77	3.03
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.16	3.34
性別比(年齡標準化率)	1.25	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,349位淋巴結外惡性淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,338位，證實率為99.18%，男性證實率為99.03%，女性為99.37%。其中9位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為8位，證實率為88.89%；1,286位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,278位，證實率為99.38%，男性證實率為99.12%，女性為99.67%。

1,349位淋巴結外惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，男、女性患者均以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之95.40%，女性個案之95.25 %。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	5	0.70	4	80.00	4	0.63	4	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	685	95.40	679	99.12	601	95.25	599	99.67
組織細胞與樹突狀細胞瘤	14	1.95	14	100.00	16	2.54	16	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	14	1.95	14	100.00	10	1.58	8	80.00
總計	718	100.00	711	99.03	631	100.00	627	99.37

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

1,349 位淋巴結外惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以類固醇治療者最多，占 59.94%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	111	9.91	92	9.71	203	9.82
放射線治療	191	17.05	160	16.90	351	16.98
化學治療	629	56.16	522	55.12	1,151	55.68
類固醇治療	667	59.55	572	60.40	1,239	59.94
免疫治療	263	23.48	229	24.18	492	23.80
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	80	7.14	62	6.55	142	6.87
標靶治療	605	54.02	556	58.71	1,161	56.17
緩和照護	134	11.96	93	9.82	227	10.98
其他治療	53	4.73	40	4.22	93	4.50
未有首次治療申報紀錄	147	13.13	128	13.52	275	13.30

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數，有關其他各種合併治療，請參考第二部分長表16 癌期別與治療統計。

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)
 申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國108年

ICD-O-3	原 發 部 位 別	何 杰 金 氏 淋 巴 瘤	非 何 杰 金 氏 淋 巴 瘤	漿 細 胞 瘤	其 他 生 性 無 法 歸 類 之 疾 病 與 淋 巴 增	惡 性 淋 巴 瘤 總 計
C77	淋巴結	185	1,681	1	55	1,922
C01-C02	舌	0	18	1	0	19
C07-C08	主唾液腺	0	39	0	1	40
C05-C06	齒齦	0	5	0	0	5
C03	□底	0	1	0	0	1
C05-C06	□腔之其他及未詳細說明部位	0	8	0	1	9
C09-C10	□咽	1	94	0	1	96
C14	鼻咽	0	27	0	1	28
C12 - C13	下咽	0	1	0	0	1
C11	咽和唇、□腔及咽之分界不明部位	0	8	0	0	8
C15	食道	0	1	0	0	1
C16	胃	0	218	0	0	218
C17	小腸	0	78	0	0	78
C18	結腸	0	48	0	2	50
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	0	7	0	0	7
C22	肝及肝內膽管	0	12	0	4	16
C23-C24	膽囊及肝外膽管	0	3	0	0	3
C25	胰	0	6	0	0	6
C48	後腹膜腔及腹膜	0	9	0	0	9
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分 界不明部位	0	3	0	0	3
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳	0	58	3	2	63
C32	喉	0	1	0	0	1
C33-C34	肺、支氣管及氣管	3	53	0	1	57

惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)

申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國108年（續完）

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴 生性疾病與 無法歸類之 惡性淋巴瘤	總計
C38.4	胸膜	0	12	0	1	13
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈	4	75	0	1	80
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）	0	133	693	21	847
C40-C41	骨、關節與關節軟骨	1	15	11	5	32
C47, C49	結締組織皮下組織	0	16	1	4	21
C44	皮膚	0	101	5	1	107
C50	女性乳房	0	22	0	0	22
C50	男性乳房	0	0	1	0	1
C53	子宮頸	0	1	0	0	1
C54	子宮體	0	2	0	0	2
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	0	3	0	0	3
C61	攝護腺	0	2	0	0	2
C62	睪丸	0	18	0	0	18
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官	0	1	1	0	2
C67	膀胱	0	4	0	1	5
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	0	11	1	0	12
C69	眼及淚腺	0	35	0	2	37
C71	腦	0	83	0	1	84
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位	0	6	0	0	6
C73	甲狀腺	0	19	0	0	19
C74-C75	其他內分泌腺	0	1	0	0	1
C76	其他分界不明的部位	0	1	0	0	1
C80	不明原發部位	0	27	1	4	32
C00-C80	總計	194	2,967	719	109	3,989

何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT

見p.496附錄五

ICD-O-3

見p.496附錄五

ICD-9

201

ICD-10

C81



民國108年，何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.16%，當年因何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第28位、女性為第29位；死亡率的排名於男性為第35位、女性為第38位。民國108年初次診斷為何杰金氏淋巴瘤者共計194人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的4.86%；當年死因為何杰金氏淋巴瘤者共計11人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	97	97
年齡中位數	37	31
粗率(每10萬人口)	0.83	0.82
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.74	0.77
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.79	0.81
性別比(年齡標準化率)	0.98	1

項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	9	2
年齡中位數	72	65
粗率(每10萬人口)	0.08	0.02
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.04	0.01
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.05	0.01
性別比(年齡標準化率)	5.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



診斷依據與組織形態

194位何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為194位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以小節硬化性何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之42.27%，女性個案之52.58%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
富淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	10	10.31	10	100.00	5	5.15	5	100.00
乏淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	2	2.06	1	50.00	0	0.00	-	-
混合細胞性何杰金氏淋巴瘤	16	16.49	16	100.00	13	13.40	13	100.00
結節硬化性何杰金氏淋巴瘤	41	42.27	41	100.00	51	52.58	51	100.00
非特定何杰金氏淋巴瘤	28	28.87	28	100.00	28	28.87	28	100.00
總計	97	100.00	96	98.97	97	100.00	97	100.00

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

194位何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占91.75%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3	3.09	3	3.09	6	3.09
放射線治療	27	27.84	28	28.87	55	28.35
化學治療	88	90.72	90	92.78	178	91.75
類固醇治療	31	31.96	33	34.02	64	32.99
免疫治療	1	1.03	0	0.00	1	0.52
骨髓/幹細胞移植	3	3.09	0	0.00	3	1.55
標靶治療	4	4.12	5	5.15	9	4.64
緩和照護	5	5.15	2	2.06	7	3.61
未有首次治療申報紀錄	6	6.19	4	4.12	10	5.15

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

非何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT 見p.496附錄五

ICD-O-3 見p.496附錄五

ICD-9 200，202-203

ICD-10 C82 - C85


民國108年，非何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.45%，當年因非何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.54%。發生率的排名於男性為第10位、女性為第11位；死亡率的排名於男性為第9位、女性為第9位。民國108年初次診斷為非何杰金氏淋巴瘤者共計2,967人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的74.38%；當年死因為非何杰金氏淋巴瘤者共計1,275人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,602	1,365
年齡中位數	64	65
粗率(每10萬人口)	13.69	11.47
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	8.09	6.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	9.05	6.84
性別比(年齡標準化率)	1.32	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	735	540
年齡中位數	71	75
粗率(每10萬人口)	6.28	4.54
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.20	1.93
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	3.77	2.29
性別比(年齡標準化率)	1.65	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

2,967位非何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,957位，證實率為99.66%，男性證實率為99.50%，女性為99.85%。

男、女性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以B細胞淋巴瘤樣瘤最多，分別占男性個案之84.64%，女性個案之90.84%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
B 細胞淋巴瘤	1,356	84.64	1,351	99.63	1,240	90.84	1,238	99.84
T/NK 細胞淋巴瘤	246	15.36	243	98.78	125	9.16	125	100.00
總計	1,602	100.00	1,594	99.50	1,365	100.00	1,363	99.85

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,967位非何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占70.81%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	123	7.68	100	7.33	223	7.52
放射線治療	213	13.30	203	14.87	416	14.02
化學治療	1,156	72.16	945	69.23	2,101	70.81
類固醇治療	1,037	64.73	860	63.00	1,897	63.94
免疫治療	15	0.94	13	0.95	28	0.94
骨髓/幹細胞移植	31	1.94	22	1.61	53	1.79
標靶治療	915	57.12	833	61.03	1,748	58.91
緩和照護	146	9.11	119	8.72	265	8.93
其他治療	54	3.37	42	3.08	96	3.24
未有首次治療申報紀錄	220	13.73	210	15.38	430	14.49

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

漿細胞瘤

ICD-O-FT M-973

ICD-O-3 M-97313 – M-97343

ICD-10 C90


民國108年，漿細胞瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.59%，當年因漿細胞瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.85%。發生率的排名於男性為第22位、女性為第23位；死亡率的排名於男性為第17位、女性為第18位。民國108年初次經顯微鏡檢診斷為漿細胞瘤者共計719人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的18.02%；當年死因為漿細胞瘤者共計428人。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	403	316
年齡中位數	68	68
粗率(每10萬人口)	3.44	2.66
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.83	1.25
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	2.09	1.41
性別比(年齡標準化率)	1.48	1


項 目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	243	185
年齡中位數	72	72
粗率(每10萬人口)	2.08	1.55
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.03	0.67
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.22	0.80
性別比(年齡標準化率)	1.53	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年



年齡別死亡率，民國108年

診斷依據與組織形態

719位漿細胞瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為698位，證實率為97.08%，男性證實率為96.77%，女性為97.47%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿細胞瘤	403	100.00	390	96.77	316	100.00	308	97.47

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

719位漿細胞瘤個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占73.16%，以類固醇治療次之，占72.32%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	6	1.49	1	0.32	7	0.97
放射線治療	55	13.65	30	9.49	85	11.82
化學治療	171	42.43	141	44.62	312	43.39
類固醇治療	283	70.22	237	75.00	520	72.32
免疫治療	257	63.77	221	69.94	478	66.48
骨髓/幹細胞移植	68	16.87	55	17.41	123	17.11
標靶治療	285	70.72	241	76.27	526	73.16
緩和照護	76	18.86	52	16.46	128	17.80
未有首次治療申報紀錄	46	11.41	30	9.49	76	10.57

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

民國 108 年
原位癌發生率

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 GENDER	總 計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C00-C14 ¹	口腔、口咽及下咽	男 Male	138	0	0	0	0	0
		女 Female	22	0	0	0	0	0
		計 Total	160	0	0	0	0	0
C11	鼻咽	男 Male	1	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0	0
		計 Total	1	0	0	0	0	0
C15	食道	男 Male	182	0	0	0	0	0
		女 Female	15	0	0	0	0	0
		計 Total	197	0	0	0	0	0
C16	胃	男 Male	63	0	0	0	0	0
		女 Female	38	0	0	0	0	0
		計 Total	101	0	0	0	0	0
C17	小腸	男 Male	7	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0	0
		計 Total	11	0	0	0	0	0
C18-C21 ²	結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門	男 Male	3,231	0	0	0	0	0
		女 Female	1,924	0	0	0	0	0
		計 Total	5,155	0	0	0	0	0
C22	肝及肝內膽管	男 Male	3	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0	0
		計 Total	4	0	0	0	0	0
C23-C24	膽囊及肝外膽管	男 Male	13	0	0	0	0	0
		女 Female	26	0	0	0	0	0
		計 Total	39	0	0	0	0	0
C25	胰	男 Male	10	0	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0	0
		計 Total	17	0	0	0	0	0
C30	鼻腔、副竇、中耳與內耳	男 Male	3	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	5	0	0	0	0	0
C32	喉	男 Male	47	0	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0	0
		計 Total	55	0	0	0	0	0
C33-C34	肺、支氣管及氣管	男 Male	215	0	0	0	0	2
		女 Female	537	0	0	0	0	0
		計 Total	752	0	0	0	0	2

註：1. C00-C14：口腔、口咽及下咽原發部位代碼包含C00-C06、C09-C10、C12-C14，個案數包含High grade dysplasia

2. C18-C21：結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門個案數包含High grade dysplasia

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	1	3	11	18	16	34	20	18	13	1	1	2	C00-C14 ¹
0	0	1	0	1	1	3	6	1	7	0	1	0	1	
0	0	2	3	12	19	19	40	21	25	13	2	1	3	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2	6	16	33	33	37	27	15	6	3	4	C15
0	0	0	0	1	1	0	2	3	4	1	1	2	0	
0	0	0	2	7	17	33	35	40	31	16	7	5	4	
0	0	0	0	0	2	1	5	10	13	12	10	4	6	C16
0	0	0	0	1	0	0	1	6	9	4	6	5	6	
0	0	0	0	1	2	1	6	16	22	16	16	9	12	
0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	C17
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	0	1	0	1	
1	12	18	55	113	194	396	476	596	606	347	187	127	103	C18-C21 ²
3	8	12	28	76	83	217	252	315	362	204	160	132	72	
4	20	30	83	189	277	613	728	911	968	551	347	259	175	
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	C22
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	0	1	1	1	4	1	0	2	1	C23-C24
0	0	1	0	3	1	3	0	3	3	4	2	0	6	
0	0	1	1	4	1	4	1	4	7	5	2	2	7	
0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	2	0	1	0	C25
0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	3	4	2	1	2	2	0	2	0	
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	C30
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	
0	0	0	0	2	3	2	11	11	5	8	4	1	0	C32
0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	3	0	0	
0	0	0	0	2	4	2	11	13	6	9	7	1	0	
1	1	5	12	17	27	35	40	23	28	14	6	3	1	C33-C34
1	7	8	33	49	65	83	93	92	76	17	11	1	1	
2	8	13	45	66	92	118	133	115	104	31	17	4	2	

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

ICD-O-3	原 發 部 位 別	性 別		總 計	0	1	5	10	15
	PRIMARY ANATOMIC SITES	GENDER	TOTAL		4	9	14	19	
C44	皮膚	男	Male	256	0	0	0	0	0
		女	Female	268	0	0	0	0	0
		計	Total	524	0	0	0	0	0
C50	女性乳房	女	Female	2,854	0	0	0	1	3
C50	男性乳房	男	Male	3	0	0	0	0	0
C53	子宮頸	女	Female	3,114	0	0	0	0	0
C54	子宮體	女	Female	201	0	0	0	0	2
C56	卵巢、輸卵管及寬韌帶	女	Female	30	0	0	0	0	1
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官	女	Female	77	0	0	0	0	0
C61	攝護腺	男	Male	22	0	0	0	0	0
C62	睪丸	男	Male	0	0	0	0	0	0
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官	男	Male	23	0	0	0	0	0
C67 ³	膀胱	男	Male	823	0	0	0	0	0
		女	Female	312	0	0	0	0	0
		計	Total	1,135	0	0	0	0	0
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	男	Male	147	0	0	0	0	0
		女	Female	178	0	0	0	0	0
		計	Total	325	0	0	0	0	0
C69	眼及淚腺	男	Male	3	0	0	0	0	0
		女	Female	2	0	0	0	0	0
		計	Total	5	0	0	0	0	0
	總計	男	Male	5,190	0	0	0	0	2
		女	Female	9,620	0	0	0	1	6
		計	Total	14,810	0	0	0	1	8

註：3. C67：膀胱癌個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	2	2	6	8	6	17	24	32	40	39	33	47	C44
0	1	1	4	5	3	7	15	19	28	28	37	48	72	
0	1	3	6	11	11	13	32	43	60	68	76	81	119	
8	16	41	98	240	600	499	406	403	321	99	63	43	13	C50
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	C50
36	183	464	604	473	354	220	236	212	185	55	45	33	14	C53
2	5	27	38	39	36	25	13	5	4	2	1	0	2	C54
1	1	2	4	7	3	3	4	1	0	1	2	0	0	C56
2	3	2	2	8	3	10	13	12	11	5	3	2	1	C51-C52, C57.7-C57.9
0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	6	3	4	1	C61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C62
2	3	0	2	4	0	1	0	3	3	1	1	1	2	C60,C63
1	2	2	14	18	27	49	80	128	132	95	109	75	91	C67 ³
0	1	1	4	1	6	14	26	36	54	60	50	33	26	
1	3	3	18	19	33	63	106	164	186	155	159	108	117	
0	0	0	3	2	1	7	12	14	31	25	21	13	18	C64-C66, C68
0	0	0	2	1	3	3	18	17	37	32	29	18	18	
0	0	0	5	3	4	10	30	31	68	57	50	31	36	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	C69
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	
5	18	28	95	182	299	552	713	873	909	580	389	268	277	總計
53	226	560	817	906	1,162	1,089	1,088	1,129	1,104	513	415	318	233	
58	244	588	912	1,088	1,461	1,641	1,801	2,002	2,013	1,093	804	586	510	

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌

ICD-O-FT T-153，T-154

ICD-O-3 C18 - C21

民國108年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌發生個案數共計5,155人，每10萬人口粗發生率為21.84，每10萬人口年齡標準化發生率³為13.11。其中男性發生個案數為3,231人，每10萬人口粗率為27.60，每10萬人口年齡標準化發生率³為17.26；女性發生個案數為1,924人，每10萬人口粗率為16.17，每10萬人口年齡標準化發生率³為9.29。


項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,231	1,924
年齡中位數	63	64
粗率(每10萬人口)	27.60	16.17
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	15.94	8.47
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	17.26	9.29
性別比(年齡標準化率 ³)	1.86	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。

5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

5,155位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,155位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之98.79%，女性個案之99.22%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原位腺癌	3,192	98.79	3,192	100.00	1,909	99.22	1,909	100.00
其他特定原位上皮癌	14	0.43	14	100.00	5	0.26	5	100.00
非特定原位上皮癌	25	0.77	25	100.00	10	0.52	10	100.00
總計	3,231	100.00	3,231	100.00	1,924	100.00	1,924	100.00

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia

首次療程

5,155位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.72%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,914	90.19	1,711	88.93	4,625	89.72
放射線治療	0	0.00	2	0.10	2	0.04
化學治療	2	0.06	0	0.00	2	0.04
緩和照護	2	0.06	2	0.10	4	0.08
未有首次治療申報紀錄	315	9.75	212	11.02	527	10.22

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管，原位癌

ICD-O-FT T-162


ICD-O-3 C33 – C34

民國108年，肺、支氣管及氣管原位癌發生個案數共計752人，每10萬人口粗發生率為3.19，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.13。其中男性發生個案數為215人，每10萬人口粗率為1.84，每10萬人口年齡標準化發生率³為1.27；女性發生個案數為537人，每10萬人口粗率為4.51，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.95。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	215	537
年齡中位數	56	56
粗率(每10萬人口)	1.84	4.51
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	1.18	2.78
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	1.27	2.95
性別比(年齡標準化率 ³)	1	2.32

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

752位肺、支氣管及氣管原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為752位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之100.00，女性個案之99.81%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原位腺癌	215	100.00	215	100.00	536	99.81	536	100.00
其他特定原位上皮癌	0	0.00	0	0.00	1	0.19	1	100.00
總計	215	100.00	215	100.00	537	100.00	537	100.00

首次療程

752位肺、支氣管及氣管原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占99.73%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	213	99.07	537	100.00	750	99.73
放射線治療	0	0.00	1	0.19	1	0.13
標靶治療	1	0.47	0	0.00	1	0.13
未有首次治療申報紀錄	2	0.93	0	0.00	2	0.27

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房，原位癌

ICD-O-FT

T-174，T-175

ICD-O-3

C50


民國108年，女性及男性乳房原位癌發生個案數分別為2,854人及3人，其中女性乳房原位癌每10萬人口粗率為23.99，每10萬人口年齡標準化率³為15.96。男性乳房原位癌每10萬人口粗率為0.03，每10萬人口年齡標準化率³為0.02。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	3	2,854
年齡中位數	55	54
粗率(每10萬人口)	0.03	23.99
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	0.02	15.07
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	0.02	15.96
性別比(年齡標準化率 ³)	1	798

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 乳房原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

2,854位女性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,854位，證實率為100.00%；3位男性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為3位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以管道內癌最多，分別占男性個案之66.67%，女性個案之91.14%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
管道內癌	2	66.67	2	100.00	2,601	91.14	2,601	100.00
小葉原位癌	0	0.00	-	-	77	2.70	77	100.00
乳頭狀原位癌	1	33.33	1	100.00	163	5.71	163	100.00
其他特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	9	0.32	9	100.00
非特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	4	0.14	4	100.00
總計	3	100.00	3	100.00	2,854	100.00	2,854	100.00

首次療程

2,854位乳房原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.87%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3	100.00	2,679	93.87	2,682	93.87
放射線治療	1	33.33	1,438	50.39	1,439	50.37
化學治療**	0	0.00	6	0.21	6	0.21
內分泌治療	3	100.00	1,876	65.73	1,879	65.77
藥物	3	100.00	1,876	65.73	1,879	65.77
手術	0	0.00	0	0.00	0	0.00
標靶治療	0	0.00	1	0.04	1	0.04
緩和照護	0	0.00	9	0.32	9	0.32
未有首次治療申報紀錄	0	0.00	101	3.54	101	3.54

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

化學治療**：6例女性乳房原位癌個案中，4例進行輔助性化療(Adjuvant therapy)及2例進行前導性化療(Neoadjuvant therapy)。

子宮頸，原位癌

ICD-O-FT

T-180

ICD-O-3

C53


民國108年，子宮頸原位癌發生個案數共計3,114人，每10萬人口粗發生率為26.17，每10萬人口年齡標準化發生率³為21.41。

項 目	發生個案
	女性
個案數(人)	3,114
年齡中位數	42
粗率(每10萬人口)	26.17
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	19.13
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	21.41

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 子宮頸原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

3,114位子宮頸原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,114位，證實率為100.00%。

原位癌患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，以鱗狀細胞原位癌最多，占子宮頸惡性腫瘤原位癌個案之93.99%。

組 織 形 態	個案數	各形態百分比	女性	
			細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2,927	93.99	2,927	100.00
原位腺癌	97	3.11	97	100.00
其他原位上皮癌	90	2.89	90	100.00
總計	3,114	100.00	3,114	100.00

首次療程

3,114位子宮頸原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.87%。

申 報 治 療 方 式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,923	93.87
放射線治療	5	0.16
緩和照護	1	0.03
未有首次治療申報紀錄	183	5.88
本院診斷後轉至非癌登醫院接受後續治療	91	2.92
本院診斷後個案拒絕治療或失聯或其他因素等	62	1.99
外院診斷後至本院接受後續治療或追蹤	30	0.96

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱，原位癌

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67


民國108年，膀胱原位癌發生個案數共計1,135人，每10萬人口粗發生率為4.81，每10萬人口年齡標準化發生率³為2.73。其中男性發生個案數為823人，每10萬人口粗率為7.03，每10萬人口年齡標準化發生率³為4.23；女性發生個案數為312人，每10萬人口粗率為2.62，每10萬人口年齡標準化發生率³為1.41。

項 目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	823	312
年齡中位數	68	70
粗率(每10萬人口)	7.03	2.62
年齡標準化率 ² (每10萬人口)	3.69	1.22
年齡標準化率 ³ (每10萬人口)	4.23	1.41
性別比(年齡標準化率 ³)	3	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 膀胱原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2，個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。



年齡別發生率，民國108年

診斷依據與組織形態

1,135位膀胱原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,135位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以非侵襲性乳突狀癌最多，分別占男性個案之92.95%，女性個案之88.46%。

組 織 形 態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮原位癌	57	6.93	57	100.00	35	11.22	35	100.00
非侵襲性乳突狀癌	765	92.95	765	100.00	276	88.46	276	100.00
非特定原位上皮癌	1	0.12	1	100.00	1	0.32	1	100.00
總計	823	100.00	823	100.00	312	100.00	312	100.00

首次療程

1,135位膀胱原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多占96.74%。

申 報 治 療 方 式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	794	96.48	304	97.44	1,098	96.74
TURBT	747	90.77	290	92.95	1,037	91.37
放射線治療	4	0.49	3	0.96	7	0.62
全身性化學治療	1	0.12	0	0.00	1	0.09
局部性化學治療***	570	69.26	221	70.83	791	69.69
全身性免疫治療	2	0.24	0	0.00	2	0.18
局部性免疫治療	53	6.44	20	6.41	73	6.43
緩和照護	1	0.12	0	0.00	1	0.09
未有首次治療申報紀錄	19	2.31	5	1.60	24	2.11

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與 TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注。

民國 108 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	64,109	27	82	56	69	119
		女 Female	57,145	15	54	36	53	111
		計 Total	121,254	42	136	92	122	230
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	8,874	0	0	0	1	4
		女 Female	1,220	0	0	0	1	6
		計 Total	10,094	0	0	0	2	10
C00-C14²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	7,468	0	0	0	0	0
		女 Female	736	0	0	0	1	1
		計 Total	8,204	0	0	0	1	1
	口腔 ³ ORAL CAVITY	男 Male	4,776	0	0	0	0	0
		女 Female	564	0	0	0	1	0
		計 Total	5,340	0	0	0	1	0
	口咽 ³ OROPHARYNX	男 Male	1,516	0	0	0	0	0
		女 Female	133	0	0	0	0	1
		計 Total	1,649	0	0	0	0	1
	下咽 ³ HYPOPHARYNX	男 Male	1,176	0	0	0	0	0
		女 Female	39	0	0	0	0	0
		計 Total	1,215	0	0	0	0	0
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	266	0	0	0	0	0
		女 Female	29	0	0	0	0	0
		計 Total	295	0	0	0	0	0
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	1,987	0	0	0	0	0
		女 Female	327	0	0	0	0	0
		計 Total	2,314	0	0	0	0	0
C03	齒齦 GUM	男 Male	714	0	0	0	0	0
		女 Female	84	0	0	0	0	0
		計 Total	798	0	0	0	0	0
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	196	0	0	0	0	0
		女 Female	25	0	0	0	0	0
		計 Total	221	0	0	0	0	0
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	2,261	0	0	0	0	0
		女 Female	153	0	0	0	1	1
		計 Total	2,414	0	0	0	1	1
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	862	0	0	0	0	0
		女 Female	79	0	0	0	0	0
		計 Total	941	0	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

3. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
213	335	581	1,186	2,324	3,478	5,481	7,757	9,243	10,043	7,061	6,504	4,892	4,658	C00-C80
222	512	979	2,160	3,473	4,798	5,839	6,698	7,462	7,166	4,850	4,818	4,054	3,845	
435	847	1,560	3,346	5,797	8,276	11,320	14,455	16,705	17,209	11,911	11,322	8,946	8,503	
18	32	103	323	721	1,079	1,401	1,617	1,390	1,049	493	340	185	118	C00-C14
6	21	29	59	87	104	143	132	159	158	101	99	48	67	
24	53	132	382	808	1,183	1,544	1,749	1,549	1,207	594	439	233	185	
7	15	47	197	545	909	1,209	1,409	1,247	914	417	299	154	99	C00-C142
2	9	7	17	34	48	76	78	107	108	88	70	36	54	
9	24	54	214	579	957	1,285	1,487	1,354	1,022	505	369	190	153	
7	15	40	156	382	614	759	844	767	578	267	192	92	63	
2	8	4	13	26	37	53	54	70	85	71	63	32	45	
9	23	44	169	408	651	812	898	837	663	338	255	124	108	
0	0	6	32	96	172	255	293	280	185	95	57	28	17	
0	1	2	2	6	8	18	19	29	20	13	5	1	8	
0	1	8	34	102	180	273	312	309	205	108	62	29	25	
0	0	1	9	67	123	195	272	200	151	55	50	34	19	
0	0	1	2	2	3	5	5	8	3	4	2	3	1	
0	0	2	11	69	126	200	277	208	154	59	52	37	20	
0	0	1	6	20	39	39	44	44	33	22	6	7	5	C00
0	0	0	0	0	0	2	0	3	7	5	3	3	6	
0	0	1	6	20	39	41	44	47	40	27	9	10	11	
4	6	26	61	160	254	325	363	303	245	101	75	43	21	C01-C02
2	4	5	11	17	24	33	35	39	51	40	32	18	16	
6	10	31	72	177	278	358	398	342	296	141	107	61	37	
1	3	1	12	33	97	97	114	123	100	56	38	21	18	C03
0	1	0	0	3	1	9	7	11	11	16	13	4	8	
1	4	1	12	36	98	106	121	134	111	72	51	25	26	
0	0	0	4	14	27	25	38	38	29	11	5	2	3	C04
0	1	0	1	1	2	4	5	0	4	1	5	1	0	
0	1	0	5	15	29	29	43	38	33	12	10	3	3	
2	6	16	85	194	273	379	414	372	253	117	96	31	23	C05-C06
0	2	0	3	7	12	12	16	27	19	16	12	6	19	
2	8	16	88	201	285	391	430	399	272	133	108	37	42	
0	0	2	20	57	94	148	164	165	102	55	29	16	10	C09-C10
0	1	1	0	4	6	11	10	19	13	6	3	1	4	
0	1	3	20	61	100	159	174	184	115	61	32	17	14	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計 GENDER TOTAL	0	1 4	5 9	10 14	15 19
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male 1,168 女 Female 38 計 Total 1,206	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male 14 女 Female 1 計 Total 15	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male 190 女 Female 140 計 Total 330	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 5 8
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male 1,216 女 Female 344 計 Total 1,560	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	1 0 1
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male 25,179 女 Female 14,941 計 Total 40,120	5 2 7	11 4 15	4 2 6	4 3 7	7 8 15
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male 2,639 女 Female 194 計 Total 2,833	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C16	胃 STOMACH	男 Male 2,389 女 Female 1,549 計 Total 3,938	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male 256 女 Female 222 計 Total 478	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male 9,893 女 Female 7,409 計 Total 17,302	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2	3 3 6
C18	結腸 COLON	男 Male 6,038 女 Female 4,993 計 Total 11,031	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 1 2	3 3 6
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male 3,855 女 Female 2,416 計 Total 6,271	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	1	9	67	120	194	271	200	151	54	49	34	18	C12-C13
0	0	1	2	2	3	5	5	8	2	4	2	3	1	
0	0	2	11	69	123	199	276	208	153	58	51	37	19	
0	0	0	0	0	5	2	1	2	1	1	1	0	1	C14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	5	2	1	2	2	1	1	0	1	
3	4	3	14	9	10	16	28	28	29	17	11	7	8	C07-C08
3	6	4	8	4	13	22	22	18	13	3	7	4	8	
6	10	7	22	13	23	38	50	46	42	20	18	11	16	
8	13	53	112	167	160	176	180	115	106	59	30	24	11	C11
1	6	18	34	49	43	45	32	34	37	10	22	8	5	
9	19	71	146	216	203	221	212	149	143	69	52	32	16	
29	59	116	342	815	1,316	2,301	3,320	3,943	4,058	2,718	2,434	1,862	1,835	C15-C26, C48
10	42	94	214	430	692	1,043	1,323	1,827	2,134	1,725	1,852	1,750	1,786	
39	101	210	556	1,245	2,008	3,344	4,643	5,770	6,192	4,443	4,286	3,612	3,621	
1	1	3	17	119	248	385	551	507	361	163	127	80	76	C15
0	0	1	5	4	14	19	23	28	25	13	21	19	22	
1	1	4	22	123	262	404	574	535	386	176	148	99	98	
7	5	10	21	54	69	147	248	330	370	266	272	245	344	C16
1	1	15	26	53	77	101	150	189	187	142	213	179	215	
8	6	25	47	107	146	248	398	519	557	408	485	424	559	
1	2	7	8	11	14	25	26	42	49	16	20	15	20	C17
0	1	5	4	7	8	12	21	36	36	30	21	20	20	
1	3	12	12	18	22	37	47	78	85	46	41	35	40	
17	35	55	182	362	515	865	1,134	1,495	1,579	1,055	979	842	774	C18-C21
7	21	46	138	280	470	671	718	886	976	742	764	803	883	
24	56	101	320	642	985	1,536	1,852	2,381	2,555	1,797	1,743	1,645	1,657	
6	15	28	88	202	284	471	653	882	982	671	636	568	548	C18
4	12	26	81	172	298	414	463	582	668	485	553	582	649	
10	27	54	169	374	582	885	1,116	1,464	1,650	1,156	1,189	1,150	1,197	
11	20	27	94	160	231	394	481	613	597	384	343	274	226	C19-C21
3	9	20	57	108	172	257	255	304	308	257	211	221	234	
14	29	47	151	268	403	651	736	917	905	641	554	495	460	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別	總計	0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL		4	9	14	19
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	7,757	4	7	3	1	0
		女 Female	3,515	1	3	0	2	1
		計 Total	11,272	5	10	3	3	1
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	622	0	0	0	0	0
		女 Female	551	0	0	0	0	0
		計 Total	1,173	0	0	0	0	0
C25	胰 PANCREAS	男 Male	1,510	0	0	0	1	2
		女 Female	1,293	0	0	2	0	2
		計 Total	2,803	0	0	2	1	4
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	97	0	4	1	1	2
		女 Female	203	1	1	0	0	1
		計 Total	300	1	5	1	1	3
C26	消化器官之其他部位及與腹膜間分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	16	0	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0	0
		計 Total	21	0	0	0	0	0
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	10,217	1	0	1	2	6
		女 Female	7,795	0	3	0	0	0
		計 Total	18,012	1	3	1	2	6
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	181	1	0	0	0	0
		女 Female	81	0	0	0	0	0
		計 Total	262	1	0	0	0	0
C32	喉 LARYNX	男 Male	798	0	0	0	0	0
		女 Female	48	0	0	0	0	0
		計 Total	846	0	0	0	0	0
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	8,847	0	0	0	0	1
		女 Female	7,386	0	0	0	0	0
		計 Total	16,233	0	0	0	0	1
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	61	0	0	0	0	0
		女 Female	21	0	0	0	0	0
		計 Total	82	0	0	0	0	0
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	330	0	0	1	2	5
		女 Female	259	0	3	0	0	0
		計 Total	589	0	3	1	2	5

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
2 0 2	8 8 16	25 8 33	92 22 114	220 54 274	385 57 442	708 128 836	1,109 223 1,332	1,270 412 1,682	1,325 598 1,923	916 537 1,453	755 574 1,329	500 485 985	427 402 829	C22
0 0 0	0 0 0	4 2 6	6 2 8	8 4 12	17 7 24	37 25 62	58 44 102	70 63 133	113 89 202	98 73 171	85 81 166	64 78 142	62 83 145	C23-C24
1 0 1	3 10 13	9 10 19	13 16 29	35 18 53	62 46 108	125 75 200	187 120 307	214 174 388	247 201 448	191 162 353	185 158 343	108 149 257	127 150 277	C25
0 2 2	5 1 6	3 7 10	3 1 4	6 10 16	6 13 19	6 11 17	7 24 31	14 38 52	13 22 35	11 25 36	8 19 27	4 17 21	3 10 13	C48
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 1 4	0 0 0	1 1 2	1 0 1	2 1 3	3 1 4	4 0 4	2 1 3	C26
10 4 14	21 15 36	36 48 84	109 135 244	240 277 517	379 416 795	768 723 1,491	1,215 1,019 2,234	1,560 1,202 2,762	1,802 1,229 3,031	1,223 845 2,068	1,214 802 2,016	857 587 1,444	773 490 1,263	C30-C39
1 0 1	2 2 4	10 5 15	2 2 4	13 7 20	14 7 21	18 9 27	32 11 43	25 8 33	21 12 33	10 8 18	11 4 15	13 3 16	8 3 11	C30-C31
0 0 0	0 0 0	0 1 1	2 0 2	24 3 27	36 1 37	105 1 106	134 7 141	145 9 154	129 13 142	77 4 81	82 4 86	38 1 39	26 4 30	C32
1 3 4	13 9 22	21 37 58	81 119 200	174 249 423	296 387 683	606 683 1,289	1,006 961 1,967	1,326 1,134 2,460	1,599 1,170 2,769	1,102 804 1,906	1,100 781 1,881	792 574 1,366	729 475 1,204	C33-C34
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0 1 1	4 1 5	4 1 5	12 4 16	12 3 15	8 5 13	7 4 11	9 1 10	5 0 5	C38.4
8 1 9	6 4 10	5 5 10	24 13 37	29 18 47	33 20 53	35 29 64	39 39 78	52 47 99	41 31 72	26 24 50	14 9 23	5 8 13	5 8 13	C37-38.3, C38.8

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	男 Male	1,529	3	45	17	18	28	
		女 Female	1,083	4	23	14	12	14	
		計 Total	2,612	7	68	31	30	42	
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	99	0	1	5	9	10	
		女 Female	77	0	1	4	7	2	
		計 Total	176	0	2	9	16	12	
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	333	2	2	6	3	4	
		女 Female	276	0	2	0	5	5	
		計 Total	609	2	4	6	8	9	
C44	皮膚 SKIN	男 Male	2,356	0	0	0	0	0	
		女 Female	2,086	0	0	0	0	2	
		計 Total	4,442	0	0	0	0	2	
C44⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	154	0	0	0	0	0	
		女 Female	134	0	0	0	0	0	
		計 Total	288	0	0	0	0	0	
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	2,202	0	0	0	0	0	
		女 Female	1,952	0	0	0	0	2	
		計 Total	4,154	0	0	0	0	2	
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	14,856	0	0	0	0	0	
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	53	0	0	0	0	0	
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	6,396	0	3	1	3	14	
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	14	0	0	0	0	0	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
22 18 40	30 29 59	30 29 59	61 56 117	64 51 115	87 48 135	103 76 179	161 100 261	160 130 290	173 122 295	143 88 231	148 106 254	113 87 200	123 76 199	C42⁴
8 9 17	3 3 6	4 3 7	9 2 11	6 5 11	3 5 8	4 4 8	7 8 15	9 2 11	7 6 13	6 8 14	6 5 11	1 3 4	1 0 1	C40-C41
5 10 15	9 10 19	18 10 28	15 12 27	25 17 42	25 18 43	20 11 31	28 32 60	43 31 74	33 35 68	30 24 54	22 24 46	23 15 38	20 15 35	C47, C49
4 2 6	4 3 7	16 16 32	21 28 49	53 34 87	56 48 104	125 82 207	176 124 300	231 157 388	279 229 508	258 209 467	297 309 606	361 314 675	475 529 1,004	C44
0 1 1	0 0 0	4 6 10	1 5 6	8 9 17	12 9 21	13 12 25	18 11 29	9 13 22	18 20 38	17 13 30	15 12 27	15 8 23	24 15 39	C44 ⁵
4 1 5	4 3 7	12 10 22	20 23 43	45 25 70	44 39 83	112 70 182	158 113 271	222 144 366	261 209 470	241 196 437	282 297 579	346 306 652	451 514 965	C44
11	83	277	773	1,509	2,146	2,002	2,072	2,107	1,627	823	714	450	262	C50
0	1	3	2	1	1	2	6	9	7	8	4	3	6	C50
35	90	188	359	505	709	1,004	991	874	665	351	243	223	138	C51-C58
0	0	0	1	1	3	1	4	1	0	0	0	1	2	C55

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,393	0	0	0	1	1	
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	3,124	0	0	0	0	1	
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,677	0	3	1	2	12	
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖 器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	188	0	0	0	0	0	
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	7,500	3	2	0	1	15	
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	7,115	0	0	0	0	0	
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	283	3	2	0	1	15	
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	102	0	0	0	0	0	
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	3,555	1	3	2	1	1	
		女 Female	2,222	1	4	1	1	1	
		計 Total	5,777	2	7	3	2	2	
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,690	0	0	0	0	0	
		女 Female	720	0	1	0	0	0	
		計 Total	2,410	0	1	0	0	0	
C64	腎 KIDNEY	男 Male	1,111	1	3	2	1	1	
		女 Female	504	1	3	1	1	1	
		計 Total	1,615	2	6	3	2	2	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
3	19	66	119	106	132	163	170	173	126	82	76	91	65	C53
6	28	64	146	224	348	548	581	486	344	175	84	58	31	C54
26	43	57	87	168	214	282	217	192	164	77	59	50	23	C56, C57.0-C57.4
0	0	1	6	6	12	10	19	22	31	17	24	23	17	C51-C52, C57.7-C57.9
26	71	75	43	27	42	119	346	856	1,505	1,395	1,337	919	718	C60-C63
0	0	1	1	6	25	104	328	838	1,488	1,386	1,325	912	701	C61
26	69	73	41	21	13	2	6	2	4	2	2	0	1	C62
0	2	1	1	0	4	13	12	16	13	7	10	7	16	C60,C63
8 5 13	11 3 14	30 7 37	47 22 69	93 33 126	147 41 188	262 92 354	377 172 549	504 293 797	583 331 914	436 309 745	394 354 748	329 303 632	326 249 575	C64-C68
3 0 3	3 1 4	3 1 4	10 1 11	20 7 27	34 7 41	88 23 111	148 47 195	218 96 314	278 103 381	238 79 317	229 130 359	195 118 313	223 106 329	C67
5 5 10	8 1 9	27 6 33	33 20 53	65 19 84	96 26 122	138 51 189	158 65 223	164 74 238	163 69 232	100 49 149	58 53 111	53 36 89	35 23 58	C64

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	412	0	0	0	0	0	
		女 Female	555	0	0	0	0	0	
		計 Total	967	0	0	0	0	0	
C66	輸尿管 URETER	男 Male	311	0	0	0	0	0	
		女 Female	427	0	0	0	0	0	
		計 Total	738	0	0	0	0	0	
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	19	0	0	0	0	0	
		女 Female	8	0	0	0	0	0	
		計 Total	27	0	0	0	0	0	
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male	1	0	0	0	0	0	
		女 Female	1	0	0	0	0	0	
		計 Total	2	0	0	0	0	0	
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male	11	0	0	0	0	0	
		女 Female	7	0	0	0	0	0	
		計 Total	18	0	0	0	0	0	
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	31	3	2	1	0	0	
		女 Female	30	2	5	0	0	0	
		計 Total	61	5	7	1	0	0	
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	446	2	7	12	10	13	
		女 Female	350	2	6	12	9	9	
		計 Total	796	4	13	24	19	22	
C71	腦 BRAIN	男 Male	410	2	7	12	10	13	
		女 Female	308	0	6	11	7	8	
		計 Total	718	2	13	23	17	21	
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	36	0	0	0	0	0	
		女 Female	42	2	0	1	2	1	
		計 Total	78	2	0	1	2	1	
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	1,268	0	0	0	3	5	
		女 Female	3,582	0	0	0	7	37	
		計 Total	4,850	0	0	0	10	42	
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	86	4	6	4	4	5	
		女 Female	87	3	1	1	1	1	
		計 Total	173	7	7	5	5	6	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	3	4	13	21	43	60	82	55	52	44	35	C65
0	0	0	1	4	4	11	37	77	86	103	86	81	65	
0	0	0	4	8	17	32	80	137	168	158	138	125	100	
0	0	0	1	3	2	15	25	57	58	41	49	32	28	C66
0	0	0	0	3	4	7	20	44	72	74	83	66	54	
0	0	0	1	6	6	22	45	101	130	115	132	98	82	
0	0	0	0	1	1	0	2	3	1	2	4	3	2	C68.0-C68.1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	
0	0	0	0	1	1	0	3	4	2	4	5	5	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	C68.8
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	2	3	C68.9
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	
0	1	0	0	0	1	0	2	3	1	2	2	2	4	
0	0	0	1	2	6	1	3	4	1	2	0	4	1	C69
0	1	1	1	0	2	2	1	2	1	2	4	2	4	
0	1	1	2	2	8	3	4	6	2	4	4	6	5	
17	16	17	24	32	33	29	39	52	55	36	26	10	16	C70-C72
8	19	16	29	26	14	23	32	28	57	22	16	15	7	
25	35	33	53	58	47	52	71	80	112	58	42	25	23	
15	14	16	21	28	30	26	36	48	48	33	25	10	16	C71
7	18	14	23	24	12	18	28	24	53	20	15	13	7	
22	32	30	44	52	42	44	64	72	101	53	40	23	23	
2	2	1	3	4	3	3	3	4	7	3	1	0	0	C70, C72
1	1	2	6	2	2	5	4	4	4	2	1	2	0	
3	3	3	9	6	5	8	7	8	11	5	2	2	0	
27	39	79	118	151	157	173	175	141	115	38	25	16	6	C73
68	144	226	396	420	458	488	475	355	258	133	59	36	22	
95	183	305	514	571	615	661	650	496	373	171	84	52	28	
2	2	2	9	9	6	4	8	8	6	5	1	1	0	C74-C75
4	4	3	7	6	11	9	12	8	9	2	3	2	0	
6	6	5	16	15	17	13	20	16	15	7	4	3	0	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性 別 總 計		0 1 5 10 15 4 9 14 19					
		GENDER	TOTAL						
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	54	0	0	1	0	0	
		女 Female	13	0	0	0	0	0	
		計 Total	67	0	0	1	0	0	
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	368	0	0	0	0	0	
		女 Female	298	0	0	0	0	0	
		計 Total	666	0	0	0	0	0	
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,161	3	3	3	13	21	
		女 Female	1,828	1	2	1	4	12	
		計 Total	3,989	4	5	4	17	33	

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	2	4	2	3	8	15	9	2	2	1	5	C76
1	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	2	0	1	
1	0	0	2	4	2	5	11	17	10	3	4	1	6	
0	1	0	4	17	17	24	32	49	48	40	40	39	57	C80
0	0	3	5	9	13	17	32	21	25	22	37	44	70	
0	1	3	9	26	30	41	64	70	73	62	77	83	127	
37	36	52	56	64	122	142	239	269	313	228	214	168	178	
31	45	29	62	63	73	118	170	263	278	185	189	174	128	
68	81	81	118	127	195	260	409	532	591	413	403	342	306	

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 108 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性 別	總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
GENDER	TOTAL						
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	男 Male	1,529	3	45	17	18	28
	女 Female	1,083	4	23	14	12	14
	計 Total	2,612	7	68	31	30	42
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	男 Male	474	0	4	2	4	6
	女 Female	367	3	3	1	5	5
	計 Total	841	3	7	3	9	11
急性骨髓性白血病合併基因變異 AML with recurrent genetic abnormalities	男 Male	131	0	0	1	3	4
	女 Female	126	0	1	0	4	3
	計 Total	257	0	1	1	7	7
急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現 AML with myelodysplasia-related changes	男 Male	68	0	0	1	0	0
	女 Female	43	0	0	0	0	0
	計 Total	111	0	0	1	0	0
急性骨髓性白血病，治療相關 Therapy-related myeloid neoplasms	男 Male	27	0	0	0	0	0
	女 Female	19	0	0	0	0	0
	計 Total	46	0	0	0	0	0
急性骨髓性白血病，無法歸類 Acute myeloid leukemia, NOS	男 Male	143	0	0	0	0	1
	女 Female	111	2	1	1	0	0
	計 Total	254	2	1	1	0	1
其他急性骨髓性白血病 Other acute myeloid leukemia	男 Male	97	0	3	0	1	1
	女 Female	63	1	1	0	1	2
	計 Total	160	1	4	0	2	3
骨髓性肉瘤 Myeloid sarcoma	男 Male	5	0	0	0	0	0
	女 Female	3	0	0	0	0	0
	計 Total	8	0	0	0	0	0
唐氏症相關骨髓性增生 Myeloid proliferations related to Down Syndrome	男 Male	1	0	1	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	1	0	1	0	0	0
芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	男 Male	2	0	0	0	0	0
	女 Female	2	0	0	0	0	0
	計 Total	4	0	0	0	0	0
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	男 Male	174	3	39	14	14	17
	女 Female	128	1	20	13	7	6
	計 Total	302	4	59	27	21	23

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
22	30	30	61	64	87	103	161	160	173	143	148	113	123
18	29	29	56	51	48	76	100	130	122	88	106	87	76
40	59	59	117	115	135	179	261	290	295	231	254	200	199
5	9	9	19	22	30	34	46	51	65	46	43	40	39
7	10	9	23	16	15	28	33	42	46	33	35	30	23
12	19	18	42	38	45	62	79	93	111	79	78	70	62
2	6	3	4	11	14	16	16	10	12	9	7	6	7
3	4	3	17	8	6	14	13	18	18	8	2	3	1
5	10	6	21	19	20	30	29	28	30	17	9	9	8
0	0	1	0	1	1	3	8	6	16	5	8	13	5
0	1	1	1	2	3	2	1	9	6	3	6	4	4
0	1	2	1	3	4	5	9	15	22	8	14	17	9
0	1	1	0	1	1	2	2	5	6	2	1	1	4
0	0	0	0	2	1	1	4	0	3	4	4	0	0
0	1	1	0	3	2	3	6	5	9	6	5	1	4
2	2	3	7	3	7	6	13	21	19	16	17	11	15
1	2	3	4	2	1	6	8	9	15	11	17	15	13
3	4	6	11	5	8	12	21	30	34	27	34	26	28
1	0	1	8	4	7	6	5	9	10	14	10	9	8
2	3	2	1	2	4	4	6	6	4	7	5	7	5
3	3	3	9	6	11	10	11	15	14	21	15	16	13
0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
7	7	6	12	8	7	6	9	9	2	5	5	1	3
6	5	3	4	7	2	10	14	9	7	6	4	4	0
13	12	9	16	15	9	16	23	18	9	11	9	5	3

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 108 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
GENDER TOTAL						
急性 B 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 B lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 138	3	39	11	10	9
	女 Female 112	1	19	9	6	3
	計 Total 250	4	58	20	16	12
急性 T 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 T lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male 36	0	0	3	4	8
	女 Female 16	0	1	4	1	3
	計 Total 52	0	1	7	5	11
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	男 Male 164	0	0	1	0	4
	女 Female 110	0	0	0	0	0
	計 Total 274	0	0	1	0	4
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	男 Male 150	0	0	0	0	0
	女 Female 87	0	0	0	0	0
	計 Total 237	0	0	0	0	0
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	男 Male 9	0	0	0	0	0
	女 Female 12	0	0	0	0	0
	計 Total 21	0	0	0	0	0
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	男 Male 324	0	0	0	0	1
	女 Female 235	0	0	0	0	2
	計 Total 559	0	0	0	0	3
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	男 Male 230	0	2	0	0	0
	女 Female 141	0	0	0	0	1
	計 Total 371	0	2	0	0	1
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	男 Male 0	0	0	0	0	0
	女 Female 0	0	0	0	0	0
	計 Total 0	0	0	0	0	0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	男 Male 1	0	0	0	0	0
	女 Female 0	0	0	0	0	0
	計 Total 1	0	0	0	0	0
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	男 Male 3	0	0	0	0	0
	女 Female 3	0	0	0	0	0
	計 Total 6	0	0	0	0	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	4	5	9	5	6	5	8	8	1	3	4	1	2
5	4	3	4	7	2	9	13	9	6	5	3	4	0
10	8	8	13	12	8	14	21	17	7	8	7	5	2
2	3	1	3	3	1	1	1	1	1	2	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
3	4	1	3	3	1	2	2	1	2	3	2	0	1
10	9	6	15	12	16	17	20	12	13	11	7	6	5
3	6	8	12	4	9	10	16	15	6	7	5	5	4
13	15	14	27	16	25	27	36	27	19	18	12	11	9
0	1	2	0	1	3	9	23	24	27	20	18	11	11
0	0	0	1	3	3	11	8	11	13	10	13	11	3
0	1	2	1	4	6	20	31	35	40	30	31	22	14
0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	4
0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	6
0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	1	0	1	10
0	2	7	12	18	18	24	40	39	42	28	38	27	28
2	8	8	16	17	15	15	18	31	27	18	25	12	21
2	10	15	28	35	33	39	58	70	69	46	63	39	49
0	2	0	3	3	11	12	22	23	24	33	37	26	32
0	0	1	0	4	3	2	9	21	22	13	23	25	17
0	2	1	3	7	14	14	31	44	46	46	60	51	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 108 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別	總 計	0	1	5	10	15
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	2,161	3	3	3	13	21
	女 Female	1,828	1	2	1	4	12
	計 Total	3,989	4	5	4	17	33
 何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	97	0	0	0	3	11
	女 Female	97	0	0	0	1	3
	計 Total	194	0	0	0	4	14
 非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	男 Male	1,602	0	2	2	9	9
	女 Female	1,365	0	0	1	3	9
	計 Total	2,967	0	2	3	12	18
 B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	男 Male	1,356	0	2	2	6	8
	女 Female	1,240	0	0	1	1	4
	計 Total	2,596	0	2	3	7	12
 邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織） Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	男 Male	163	0	0	0	1	0
	女 Female	172	0	0	0	0	1
	計 Total	335	0	0	0	1	1
 胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤 MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)	男 Male	39	0	0	0	0	0
	女 Female	43	0	0	0	0	0
	計 Total	82	0	0	0	0	0
 淋巴性漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma	男 Male	36	0	0	0	0	0
	女 Female	23	0	0	0	0	0
	計 Total	59	0	0	0	0	0
 濾泡型淋巴瘤 Follicular lymphoma	男 Male	188	0	0	0	1	1
	女 Female	217	0	0	0	0	0
	計 Total	405	0	0	0	1	1
 被套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma	男 Male	66	0	0	0	0	0
	女 Female	18	0	0	0	0	0
	計 Total	84	0	0	0	0	0
 Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma	男 Male	38	0	1	1	3	1
	女 Female	8	0	0	0	0	0
	計 Total	46	0	1	1	3	1
 瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	男 Male	813	0	1	1	0	2
	女 Female	757	0	0	1	1	3
	計 Total	1,570	0	1	2	1	5

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
37	36	52	56	64	122	142	239	269	313	228	214	168	178
31	45	29	62	63	73	118	170	263	278	185	189	174	128
68	81	81	118	127	195	260	409	532	591	413	403	342	306
13	6	12	6	5	4	3	7	8	6	3	3	5	2
20	20	8	7	6	2	2	4	10	3	6	2	2	1
33	26	20	13	11	6	5	11	18	9	9	5	7	3
21	29	38	48	55	98	109	176	206	225	166	148	129	132
11	24	20	52	52	59	99	127	198	203	132	147	130	98
32	53	58	100	107	157	208	303	404	428	298	295	259	230
17	26	32	35	44	83	92	150	169	201	139	125	111	114
10	18	18	44	46	51	91	117	190	184	118	137	119	91
27	44	50	79	90	134	183	267	359	385	257	262	230	205
1	2	3	7	4	17	16	18	26	21	11	12	17	7
2	3	2	7	13	9	18	18	23	18	22	14	14	8
3	5	5	14	17	26	34	36	49	39	33	26	31	15
0	0	0	2	1	4	5	5	2	10	2	1	5	2
1	0	0	1	1	1	5	6	4	3	8	4	4	5
1	0	0	3	2	5	10	11	6	13	10	5	9	7
0	0	0	0	0	0	3	1	4	9	5	6	3	5
0	0	0	0	2	0	2	1	6	4	3	2	2	1
0	0	0	0	2	0	5	2	10	13	8	8	5	6
1	2	6	5	7	17	12	42	28	29	10	12	9	6
0	1	1	12	11	15	21	28	48	36	19	12	4	9
1	3	7	17	18	32	33	70	76	65	29	24	13	15
0	0	0	0	3	3	3	3	7	15	8	11	6	7
0	0	0	1	0	0	0	5	0	2	3	3	2	2
0	0	0	1	3	3	3	8	7	17	11	14	8	9
2	1	2	2	1	2	5	4	3	5	1	0	2	2
0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	1	0	1	0
2	1	2	3	1	3	6	5	5	5	2	0	3	2
8	14	15	19	26	43	50	79	98	120	102	80	72	83
4	4	8	18	18	24	46	63	109	121	68	103	96	70
12	18	23	37	44	67	96	142	207	241	170	183	168	153

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 108 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤	性 別	總 計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	GENDER	TOTAL					
原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	男 Male	26	0	0	0	1	4
	女 Female	30	0	0	0	0	0
	計 Total	56	0	0	0	1	4
其他 B 細胞淋巴瘤 Other B-cell lymphomas	男 Male	26	0	0	0	0	0
	女 Female	15	0	0	0	0	0
	計 Total	41	0	0	0	0	0
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	男 Male	246	0	0	0	3	1
	女 Female	125	0	0	0	2	5
	計 Total	371	0	0	0	5	6
結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他 Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	男 Male	40	0	0	0	0	0
	女 Female	18	0	0	0	0	0
	計 Total	58	0	0	0	0	0
皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群） Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome)	男 Male	39	0	0	0	0	0
	女 Female	20	0	0	0	0	1
	計 Total	59	0	0	0	0	1
腸病變 T 細胞淋巴瘤 Enteropathy-type T-cell lymphoma	男 Male	15	0	0	0	0	0
	女 Female	3	0	0	0	0	0
	計 Total	18	0	0	0	0	0
肝脾 T 細胞淋巴瘤 Hepatosplenic T-cell lymphoma	男 Male	0	0	0	0	0	0
	女 Female	2	0	0	0	1	1
	計 Total	2	0	0	0	1	1
皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤 Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	男 Male	2	0	0	0	0	0
	女 Female	2	0	0	0	0	1
	計 Total	4	0	0	0	0	1
周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類 Peripheral T-cell lymphoma, NOS	男 Male	59	0	0	0	1	0
	女 Female	29	0	0	0	0	2
	計 Total	88	0	0	0	1	2
血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	男 Male	41	0	0	0	0	0
	女 Female	27	0	0	0	0	0
	計 Total	68	0	0	0	0	0
分化不良大細胞淋巴瘤 Anaplastic large cell lymphoma	男 Male	26	0	0	0	2	1
	女 Female	11	0	0	0	1	0
	計 Total	37	0	0	0	3	1

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	6	4	1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	10	6	5	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0
9	16	10	6	3	1	2	1	0	1	0	2	0	0
0	1	2	1	0	1	3	2	3	2	2	3	2	4
0	0	1	0	2	1	1	1	2	2	2	2	0	1
0	1	3	1	2	2	4	3	5	4	4	5	2	5
4	3	6	13	11	15	17	26	37	24	27	23	18	18
1	6	2	8	6	8	8	10	8	19	14	10	11	7
5	9	8	21	17	23	25	36	45	43	41	33	29	25
0	0	1	2	2	4	4	4	8	0	4	3	3	5
1	0	0	2	1	2	5	0	0	2	1	2	1	1
1	0	1	4	3	6	9	4	8	2	5	5	4	6
2	0	2	4	1	3	3	3	5	4	4	4	4	0
0	1	1	5	3	3	1	0	2	1	1	1	0	0
2	1	3	9	4	6	4	3	7	5	5	5	4	0
0	0	0	0	3	1	1	3	4	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	3	2	1	3	4	4	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	3	1	1	4	6	7	6	9	5	5	8
0	2	1	0	1	2	0	2	2	4	4	4	3	2
0	4	2	3	2	3	4	8	9	10	13	9	8	10
0	0	0	0	1	0	2	8	7	4	5	9	3	2
0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	7	3	5	1
0	0	0	0	1	0	3	10	8	11	12	12	8	3
2	1	0	2	2	3	1	1	4	3	3	0	1	0
0	2	0	1	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0
2	3	0	3	3	3	1	2	5	7	3	0	1	0

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 108 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續完)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2019
(CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別	總計	0	1 4	5 9	10 14	15 19
成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病 Adult T-cell lymphoma / leukemia	男 Male	9	0	0	0	0	0
	女 Female	5	0	0	0	0	0
	計 Total	14	0	0	0	0	0
其他 T 細胞淋巴瘤 Other T-cell lymphoma	男 Male	15	0	0	0	0	0
	女 Female	8	0	0	0	0	0
	計 Total	23	0	0	0	0	0
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	男 Male	403	0	0	0	0	0
	女 Female	316	0	0	0	0	0
	計 Total	719	0	0	0	0	0
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	男 Male	17	3	1	1	0	1
	女 Female	18	1	2	0	0	0
	計 Total	35	4	3	1	0	1
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	男 Male	42	0	0	0	1	0
	女 Female	32	0	0	0	0	0
	計 Total	74	0	0	0	1	0

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	2	1	1	2
0	0	2	1	1	1	1	0	1	3	1	1	1	2
0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	2	1
0	0	2	1	1	1	2	3	2	3	1	1	3	3
1	1	0	1	4	19	24	50	51	73	55	59	32	33
0	0	0	1	3	10	17	35	46	64	42	37	38	23
1	1	0	2	7	29	41	85	97	137	97	96	70	56
2	0	0	0	0	0	3	1	0	2	2	0	0	1
0	1	0	1	1	2	0	2	4	2	2	0	0	0
2	1	0	1	1	2	3	3	4	4	4	0	0	1
0	0	2	1	0	1	3	5	4	7	2	4	2	10
0	0	1	1	1	0	0	2	5	6	3	3	4	6
0	0	3	2	1	1	3	7	9	13	5	7	6	16

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C00-C14 ⁴	口腔、口腔及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
	口腔 ⁵ ORAL CAVITY
	口腔 ⁵ OROPHARYNX
	下咽 ⁵ HYPOPHARYNX
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	口腔底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	口腔 ⁵ OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口腔及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed. 分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
121,254	513.72	284.28	315.86	64,109	547.70	308.57	345.37	57,145	480.29	264.80	292.66	C00-C80
10,094	42.77	25.76	27.77	8,874	75.81	46.78	50.39	1,220	10.25	5.93	6.50	C00-C14
8,204	34.76	20.61	22.14	7,468	63.80	38.95	41.82	736	6.19	3.33	3.66	C00-C14 ⁴
5,340	22.62	13.50	14.53	4,776	40.80	25.14	27.01	564	4.74	2.52	2.79	
1,649	6.99	4.13	4.41	1,516	12.95	7.85	8.40	133	1.12	0.63	0.67	
1,215	5.15	2.97	3.20	1,176	10.05	5.95	6.41	39	0.33	0.18	0.20	
295	1.25	0.73	0.78	266	2.27	1.40	1.49	29	0.24	0.11	0.12	C00
2,314	9.80	5.87	6.34	1,987	16.98	10.48	11.28	327	2.75	1.51	1.67	C01-C02
798	3.38	1.95	2.10	714	6.10	3.67	3.94	84	0.71	0.35	0.39	C03
221	0.94	0.56	0.59	196	1.67	1.02	1.08	25	0.21	0.12	0.13	C04
2,414	10.23	6.15	6.60	2,261	19.32	11.92	12.81	153	1.29	0.70	0.75	C05-C06
941	3.99	2.36	2.51	862	7.36	4.47	4.77	79	0.66	0.37	0.39	C09-C10
1,206	5.11	2.95	3.17	1,168	9.98	5.91	6.36	38	0.32	0.18	0.20	C12-C13
15	0.06	0.04	0.04	14	0.12	0.08	0.08	1	0.01	0.00	0.00	C14
330	1.40	0.88	0.95	190	1.62	1.01	1.10	140	1.18	0.77	0.83	C07-C08
1,560	6.61	4.27	4.68	1,216	10.39	6.83	7.48	344	2.89	1.83	2.02	C11
40,120	169.98	88.03	99.03	25,179	215.11	118.73	132.76	14,941	125.58	59.90	68.38	C15-C26, C48

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
2,833	12.00	6.78	7.29	2,639	22.55	13.18	14.18	194	1.63	0.80	0.90	C15
3,938	16.68	8.19	9.40	2,389	20.41	10.56	12.14	1,549	13.02	6.11	7.04	C16
478	2.03	1.09	1.21	256	2.19	1.25	1.38	222	1.87	0.94	1.05	C17
17,302	73.30	38.09	42.94	9,893	84.52	46.40	52.26	7,409	62.27	30.58	34.61	C18-C21
11,031	46.74	23.79	27.00	6,038	51.58	27.83	31.56	4,993	41.97	20.19	22.98	C18
6,271	26.57	14.30	15.93	3,855	32.93	18.57	20.70	2,416	20.31	10.39	11.63	C19-C21
11,272	47.76	24.62	27.66	7,757	66.27	36.89	40.95	3,515	29.54	13.28	15.44	C22
1,173	4.97	2.37	2.76	622	5.31	2.77	3.21	551	4.63	2.01	2.35	C23-C24
2,803	11.88	6.05	6.85	1,510	12.90	6.99	7.91	1,293	10.87	5.19	5.90	C25
300	1.27	0.81	0.86	97	0.83	0.63	0.64	203	1.71	0.97	1.05	C48
21	0.09	0.04	0.05	16	0.14	0.07	0.08	5	0.04	0.02	0.02	C26
18,012	76.31	39.73	44.51	10,217	87.29	46.99	53.18	7,795	65.52	33.49	37.19	C30-C39
262	1.11	0.66	0.73	181	1.55	0.94	1.04	81	0.68	0.40	0.45	C30-C31
846	3.58	1.93	2.11	798	6.82	3.81	4.20	48	0.40	0.21	0.22	C32
16,233	68.77	35.37	39.77	8,847	75.58	40.09	45.61	7,386	62.08	31.46	35.01	C33-C34
82	0.35	0.17	0.19	61	0.52	0.26	0.30	21	0.18	0.09	0.10	C38.4
589	2.50	1.61	1.71	330	2.82	1.89	2.02	259	2.18	1.33	1.41	C37-C38.3, C38.8

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C42⁶	白血病 LEUKEMIA
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES
C44	皮膚 SKIN
C44 ⁷	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	女性乳房 FEMALE BREAST
C50	男性乳房 MALE BREAST
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

7. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
2,612	11.07	7.57	8.00	1,529	13.06	9.13	9.70	1,083	9.10	6.12	6.46	C42 ⁶
176	0.75	0.75	0.76	99	0.85	0.85	0.86	77	0.65	0.64	0.65	C40-C41
609	2.58	1.75	1.88	333	2.84	1.97	2.13	276	2.32	1.54	1.65	C47, C49
4,442	18.82	8.47	10.14	2,356	20.13	9.85	11.81	2,086	17.53	7.27	8.72	C44
288	1.22	0.65	0.74	154	1.32	0.71	0.82	134	1.13	0.60	0.68	C44 ⁷
4,154	17.60	7.82	9.40	2,202	18.81	9.14	10.98	1,952	16.41	6.67	8.04	C44
14,856	124.86	74.84	80.99	-	-	-	-	14,856	124.86	74.84	80.99	C50
53	0.45	0.26	0.29	53	0.45	0.26	0.29	-	-	-	-	C50
6,396	53.76	32.68	35.47	-	-	-	-	6,396	53.76	32.68	35.47	C51-C58
14	0.12	0.07	0.07	-	-	-	-	14	0.12	0.07	0.07	C55
1,393	11.71	6.88	7.67	-	-	-	-	1,393	11.71	6.88	7.67	C53
3,124	26.26	15.81	17.00	-	-	-	-	3,124	26.26	15.81	17.00	C54
1,677	14.09	9.16	9.86	-	-	-	-	1,677	14.09	9.16	9.86	C56, C57.0-C57.4
188	1.58	0.76	0.87	-	-	-	-	188	1.58	0.76	0.87	C51-C52, C57.7-C57.9
7,500	64.07	33.05	38.89	7,500	64.07	33.05	38.89	-	-	-	-	C60-C63

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT
C67	膀胱 BLADDER
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C71	腦 BRAIN
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C73	甲狀腺 THYROID GLAND
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
7,115	60.79	30.22	35.83	7,115	60.79	30.22	35.83	-	-	-	-	C61
283	2.42	2.37	2.54	283	2.42	2.37	2.54	-	-	-	-	C62
102	0.87	0.47	0.53	102	0.87	0.47	0.53	-	-	-	-	C60,C63
5,777	24.48	12.33	14.07	3,555	30.37	16.46	18.68	2,222	18.68	8.56	9.90	C64-C68
2,410	10.21	4.80	5.60	1,690	14.44	7.34	8.55	720	6.05	2.57	3.04	C67
1,615	6.84	4.03	4.39	1,111	9.49	5.80	6.31	504	4.24	2.37	2.60	C64
967	4.10	1.95	2.26	412	3.52	1.83	2.10	555	4.66	2.04	2.38	C65
738	3.13	1.45	1.70	311	2.66	1.36	1.56	427	3.59	1.52	1.81	C66
27	0.11	0.05	0.06	19	0.16	0.08	0.10	8	0.07	0.03	0.04	C68.0-C68.1
2	0.01	0.00	0.00	1	0.01	0.00	0.01	1	0.01	0.00	0.00	C68.8
18	0.08	0.04	0.04	11	0.09	0.04	0.05	7	0.06	0.03	0.04	C68.9
61	0.26	0.27	0.25	31	0.26	0.27	0.25	30	0.25	0.28	0.25	C69
796	3.37	2.71	2.79	446	3.81	3.03	3.13	350	2.94	2.41	2.47	C70-C72
718	3.04	2.44	2.51	410	3.50	2.81	2.90	308	2.59	2.09	2.15	C71
78	0.33	0.26	0.27	36	0.31	0.21	0.23	42	0.35	0.32	0.32	C70, C72
4,850	20.55	14.25	15.46	1,268	10.83	7.43	8.07	3,582	30.11	20.94	22.70	C73
173	0.73	0.72	0.70	86	0.73	0.82	0.77	87	0.73	0.61	0.62	C74-C75

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
67	0.28	0.16	0.17	54	0.46	0.27	0.29	13	0.11	0.06	0.07	C76
666	2.82	1.35	1.57	368	3.14	1.64	1.88	298	2.50	1.08	1.29	C80
3,989	16.90	9.68	10.75	2,161	18.46	11.04	12.31	1,828	15.36	8.43	9.34	

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病與骨髓增生性腫瘤

LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL

急性骨髓性白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA

急性骨髓性白血病合併基因變異

AML with recurrent genetic abnormalities

急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現

AML with myelodysplasia-related changes

急性骨髓性白血病，治療相關

Therapy-related myeloid neoplasms

急性骨髓性白血病，無法歸類

Acute myeloid leukemia, NOS

其他急性骨髓性白血病

Other acute myeloid leukemia

骨髓性肉瘤

Myeloid sarcoma

唐氏症相關骨髓性增生

Myeloid proliferations related to Down Syndrome

芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm

急性淋巴性白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

急性 B 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤

B lymphoblastic leukemia / lymphoma

急性 T 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤

T lymphoblastic leukemia / lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
2,612	11.07	7.57	8.00	1,529	13.06	9.13	9.70	1,083	9.10	6.12	6.46
841	3.56	2.23	2.43	474	4.05	2.53	2.79	367	3.08	1.98	2.12
257	1.09	0.78	0.83	131	1.12	0.79	0.85	126	1.06	0.77	0.81
111	0.47	0.24	0.28	68	0.58	0.30	0.36	43	0.36	0.19	0.21
46	0.19	0.11	0.12	27	0.23	0.13	0.14	19	0.16	0.08	0.10
254	1.08	0.60	0.68	143	1.22	0.69	0.79	111	0.93	0.53	0.58
160	0.68	0.46	0.49	97	0.83	0.55	0.60	63	0.53	0.38	0.40
8	0.03	0.02	0.02	5	0.04	0.03	0.03	3	0.03	0.01	0.01
1	0.00	0.01	0.01	1	0.01	0.02	0.02	0	0.00	0.00	0.00
4	0.02	0.01	0.01	2	0.02	0.01	0.01	2	0.02	0.02	0.02
302	1.28	1.89	1.68	174	1.49	2.27	2.00	128	1.08	1.47	1.33
250	1.06	1.59	1.39	138	1.18	1.90	1.63	112	0.94	1.26	1.13
52	0.22	0.29	0.28	36	0.31	0.37	0.37	16	0.13	0.21	0.20

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年【依據 WHO 2017 年的分類編修¹】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

慢性骨髓性白血病⁸

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

慢性淋巴性白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

分化不明之急性白血病

ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE

骨髓增生性腫瘤

MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS

骨髓分化不良症候群

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES

急性雙表現型白血病

ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA

其他白血病

OTHER LEUKEMIA

白血病，無法歸類

LEUKEMIA, NOS

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

8. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
274	1.16	0.80	0.87	164	1.40	1.00	1.09	110	0.92	0.60	0.66
237	1.00	0.51	0.58	150	1.28	0.68	0.77	87	0.73	0.36	0.41
21	0.09	0.04	0.04	9	0.08	0.04	0.04	12	0.10	0.04	0.05
559	2.37	1.32	1.49	324	2.77	1.54	1.77	235	1.98	1.14	1.26
371	1.57	0.77	0.90	230	1.96	1.05	1.22	141	1.19	0.52	0.61
0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	1	0.01	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	0.03	0.01	0.01	3	0.03	0.02	0.02	3	0.03	0.01	0.01

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA

B 細胞淋巴瘤

B-cell lymphoid neoplasms

邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織）

Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)

胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤

MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)

淋巴性漿細胞性淋巴瘤

Lymphoplasmacytic lymphoma

濾泡型淋巴瘤

Follicular lymphoma

被套細胞淋巴瘤

Mantle cell lymphoma

Burkitt 氏淋巴瘤

Burkitt lymphoma

瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型)

Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)

原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
3,989	16.90	9.68	10.75	2,161	18.46	11.04	12.31	1,828	15.36	8.43	9.34
194	0.82	0.75	0.79	97	0.83	0.74	0.79	97	0.82	0.77	0.81
2,967	12.57	7.07	7.89	1,602	13.69	8.09	9.05	1,365	11.47	6.13	6.84
2,596	11.00	6.12	6.83	1,356	11.58	6.82	7.63	1,240	10.42	5.46	6.11
335	1.42	0.81	0.90	163	1.39	0.82	0.92	172	1.45	0.81	0.90
82	0.35	0.18	0.21	39	0.33	0.19	0.21	43	0.36	0.18	0.21
59	0.25	0.12	0.14	36	0.31	0.15	0.18	23	0.19	0.10	0.11
405	1.72	0.99	1.07	188	1.61	0.96	1.06	217	1.82	1.02	1.09
84	0.36	0.17	0.20	66	0.56	0.29	0.34	18	0.15	0.07	0.08
46	0.19	0.16	0.17	38	0.32	0.28	0.29	8	0.07	0.04	0.04
1,570	6.65	3.51	3.98	813	6.95	3.93	4.44	757	6.36	3.11	3.55
56	0.24	0.25	0.26	26	0.22	0.24	0.25	30	0.25	0.25	0.27

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

其他 B 細胞淋巴瘤

Other B-cell lymphomas

T/NK 細胞淋巴瘤

T/NK-cell lymphoid neoplasms

結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他

Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type

皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕁狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群）

Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome)

腸病變 T 細胞淋巴瘤

Enteropathy-type T-cell lymphoma

肝脾 T 細胞淋巴瘤

Hepatosplenic T-cell lymphoma

皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤

Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma

周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類

Peripheral T-cell lymphoma, NOS

血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

分化不良大細胞淋巴瘤

Anaplastic large cell lymphoma

成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病

Adult T-cell lymphoma / leukemia

其他 T 細胞淋巴瘤

Other T-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
41	0.17	0.10	0.11	26	0.22	0.13	0.15	15	0.13	0.07	0.08
371	1.57	0.95	1.06	246	2.10	1.27	1.42	125	1.05	0.67	0.73
58	0.25	0.14	0.16	40	0.34	0.20	0.22	18	0.15	0.09	0.10
59	0.25	0.16	0.18	39	0.33	0.21	0.24	20	0.17	0.13	0.14
18	0.08	0.04	0.05	15	0.13	0.08	0.08	3	0.03	0.01	0.01
2	0.01	0.02	0.02	0	0.00	0.00	0.00	2	0.02	0.03	0.03
4	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.01	2	0.02	0.03	0.02
88	0.37	0.22	0.24	59	0.50	0.29	0.33	29	0.24	0.15	0.17
68	0.29	0.14	0.16	41	0.35	0.18	0.21	27	0.23	0.10	0.12
37	0.16	0.13	0.13	26	0.22	0.19	0.19	11	0.09	0.08	0.08
14	0.06	0.03	0.03	9	0.08	0.04	0.05	5	0.04	0.02	0.02
23	0.10	0.05	0.06	15	0.13	0.08	0.09	8	0.07	0.03	0.03

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 108 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 1】(續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

漿細胞瘤

Plasma cell neoplasm

組織細胞與樹突狀細胞瘤

Histiocytic and dendritic cell neoplasms

惡性淋巴瘤，無法歸類

Malignant lymphoma, NOS and others

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

2. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
719	3.05	1.52	1.73	403	3.44	1.83	2.09	316	2.66	1.25	1.41
35	0.15	0.18	0.15	17	0.15	0.19	0.17	18	0.15	0.16	0.14
74	0.31	0.16	0.18	42	0.36	0.20	0.22	32	0.27	0.12	0.14

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019

全癌症（總計）C00 - C80

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		6,394	1,260,049	507.44	254.79	286.41	7,197	1,384,992	519.64	266.21	294.33
新北市		10,162	1,963,658	517.50	301.21	336.95	9,939	2,055,038	483.64	270.61	299.82
桃園市		4,918	1,116,111	440.64	287.58	321.93	4,561	1,132,926	402.59	251.83	277.99
台中市		7,200	1,384,164	520.17	326.55	366.42	6,646	1,431,097	464.40	276.95	306.89
台南市		5,581	937,342	595.41	322.92	362.10	4,978	943,564	527.57	279.92	309.85
高雄市		8,607	1,369,850	628.32	348.38	387.84	7,282	1,403,348	518.90	281.08	310.40
基隆市		1,032	184,139	560.45	289.08	326.38	980	184,754	530.44	272.57	302.34
新竹市		998	221,265	451.04	301.75	335.73	1,042	227,538	457.95	283.64	314.87
嘉義市		765	129,794	589.40	334.32	373.97	683	137,896	495.30	267.58	294.29
新竹縣		1,251	287,837	434.62	276.17	310.72	1,081	276,096	391.53	249.31	274.12
宜蘭縣		1,408	229,222	614.25	320.75	361.52	1,047	224,956	465.42	239.52	265.25
苗栗縣		1,615	281,290	574.14	309.83	346.88	1,259	264,169	476.59	266.03	291.95
彰化縣		3,800	647,449	586.92	325.09	364.11	2,930	625,353	468.54	256.50	283.38
南投縣		1,501	252,705	593.97	303.32	339.68	1,156	241,407	478.86	252.44	275.99
雲林縣		2,216	352,821	628.08	316.57	355.62	1,476	328,485	449.34	226.08	249.76
嘉義縣		1,743	261,238	667.21	315.56	353.02	1,264	241,875	522.58	247.42	274.64
屏東縣		2,685	417,815	642.63	335.06	372.36	1,963	401,369	489.08	251.36	277.64
澎湖縣		286	54,283	526.87	301.48	331.79	189	50,924	371.14	199.38	217.47
花蓮縣		988	165,073	598.52	316.50	356.65	799	161,174	495.74	256.51	284.53
台東縣		750	111,570	672.22	361.61	398.53	529	105,211	502.80	270.45	296.87
金門縣		170	70,010	242.82	130.82	148.82	129	70,175	183.83	97.35	108.22
連江縣		22	7,501	293.29	183.88	205.19	10	5,588	178.95	108.54	115.81
北部		27,778	5,543,571	501.08	287.33	322.01	27,106	5,750,469	471.37	263.88	291.79
中部		14,717	2,637,139	558.07	321.79	360.82	12,208	2,626,342	464.83	262.25	289.63
南部		19,667	3,170,322	620.35	334.89	373.61	16,359	3,178,976	514.60	272.43	300.98
東部		1,738	276,643	628.25	334.79	373.65	1,328	266,385	498.53	261.90	289.30
金馬地區		192	77,511	247.71	135.92	154.20	139	75,763	183.47	98.60	109.35
直轄市		42,862	8,031,174	533.70	306.85	343.44	40,603	8,350,965	486.21	271.27	300.14
中央政府 管轄市		2,795	535,198	522.24	306.05	342.83	2,705	550,188	491.65	275.76	305.45
縣轄市		2,717	792,262	342.94	197.32	223.10	2,242	805,316	278.40	151.31	168.86
鎮		4,167	855,169	487.27	255.60	288.48	3,320	827,785	401.07	212.25	233.40
鄉		11,551	1,491,383	774.52	400.13	444.78	8,270	1,363,681	606.45	321.27	353.34
山地鄉 ⁴		473	105,407	448.74	296.16	330.01	353	96,738	364.90	234.25	258.48
總計		64,109	11,705,186	547.70	308.57	345.37	57,145	11,897,935	480.29	264.80	292.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

口腔、咽喉及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		433	1,260,049	34.36	19.86	21.33	79	1,384,992	5.70	2.80	3.05
新北市		1,078	1,963,658	54.90	32.87	35.40	125	2,055,038	6.08	3.28	3.63
桃園市		530	1,116,111	47.49	32.04	34.44	61	1,132,926	5.38	3.34	3.66
台中市		899	1,384,164	64.95	42.43	45.75	81	1,431,097	5.66	3.27	3.60
台南市		579	937,342	61.77	36.78	39.28	55	943,564	5.83	3.31	3.49
高雄市		1,116	1,369,850	81.47	49.04	52.19	75	1,403,348	5.34	2.77	3.07
基隆市		89	184,139	48.33	28.11	30.49	12	184,754	6.50	3.53	3.97
新竹市		82	221,265	37.06	25.94	27.54	13	227,538	5.71	3.36	3.91
嘉義市		78	129,794	60.10	37.03	39.78	13	137,896	9.43	5.91	6.46
新竹縣		113	287,837	39.26	26.62	28.87	11	276,096	3.98	2.28	2.61
宜蘭縣		145	229,222	63.26	38.47	41.34	7	224,956	3.11	1.47	1.72
苗栗縣		183	281,290	65.06	40.55	43.56	20	264,169	7.57	4.23	4.58
彰化縣		599	647,449	92.52	56.74	61.03	30	625,353	4.80	2.54	2.85
南投縣		251	252,705	99.33	57.04	61.83	24	241,407	9.94	5.21	5.74
雲林縣		336	352,821	95.23	54.54	58.97	19	328,485	5.78	3.17	3.41
嘉義縣		253	261,238	96.85	53.63	56.87	9	241,875	3.72	1.81	1.95
屏東縣		386	417,815	92.39	54.22	57.93	47	401,369	11.71	5.70	6.21
澎湖縣		34	54,283	62.63	40.59	44.02	1	50,924	1.96	1.04	1.15
花蓮縣		152	165,073	92.08	53.40	58.45	28	161,174	17.37	8.55	9.19
台東縣		122	111,570	109.35	62.13	65.84	25	105,211	23.76	11.57	12.77
金門縣		8	70,010	11.43	5.83	6.11	1	70,175	1.43	1.05	1.16
連江縣		1	7,501	13.33	9.32	9.32	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		2,653	5,543,571	47.86	29.58	31.81	328	5,750,469	5.70	3.11	3.43
中部		2,085	2,637,139	79.06	49.13	53.03	154	2,626,342	5.86	3.24	3.57
南部		2,446	3,170,322	77.15	45.93	48.96	200	3,178,976	6.29	3.33	3.62
東部		274	276,643	99.04	56.78	61.28	53	266,385	19.90	9.78	10.65
金馬地區		9	77,511	11.61	6.30	6.55	1	75,763	1.32	0.96	1.05
直轄市		4,635	8,031,174	57.71	35.55	38.12	476	8,350,965	5.70	3.10	3.40
中央政府 管轄市		249	535,198	46.52	29.41	31.62	38	550,188	6.91	4.02	4.52
縣轄市		314	792,262	39.63	25.17	27.06	30	805,316	3.73	1.91	2.17
鎮		485	855,169	56.71	34.19	36.52	46	827,785	5.56	3.10	3.30
鄉		1,784	1,491,383	119.62	68.43	73.67	146	1,363,681	10.71	5.40	5.92
山地鄉 ⁴		74	105,407	70.20	46.51	49.85	21	96,738	21.71	13.27	14.36
總計		7,468	11,705,186	63.80	38.95	41.82	736	11,897,935	6.19	3.33	3.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		13	1,260,049	1.03	0.62	0.65	2	1,384,992	0.14	0.04	0.06
新北市		25	1,963,658	1.27	0.75	0.80	3	2,055,038	0.15	0.07	0.08
桃園市		14	1,116,111	1.25	0.86	0.91	0	1,132,926	0.00	0.00	0.00
台中市		28	1,384,164	2.02	1.29	1.45	3	1,431,097	0.21	0.12	0.13
台南市		16	937,342	1.71	1.04	1.09	1	943,564	0.11	0.05	0.05
高雄市		49	1,369,850	3.58	2.22	2.36	1	1,403,348	0.07	0.02	0.03
基隆市		3	184,139	1.63	0.96	0.94	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	221,265	0.00	0.00	0.00	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		1	129,794	0.77	0.48	0.53	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		5	287,837	1.74	1.17	1.26	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		1	229,222	0.44	0.35	0.38	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		6	281,290	2.13	1.30	1.33	2	264,169	0.76	0.27	0.28
彰化縣		25	647,449	3.86	2.61	2.69	2	625,353	0.32	0.12	0.14
南投縣		12	252,705	4.75	2.73	2.96	1	241,407	0.41	0.08	0.09
雲林縣		18	352,821	5.10	2.77	2.94	3	328,485	0.91	0.37	0.41
嘉義縣		17	261,238	6.51	3.62	3.80	1	241,875	0.41	0.19	0.21
屏東縣		20	417,815	4.79	2.60	2.77	4	401,369	1.00	0.41	0.44
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		6	165,073	3.63	1.81	2.26	3	161,174	1.86	0.65	0.75
台東縣		7	111,570	6.27	3.57	3.80	3	105,211	2.85	1.68	1.78
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		67	5,543,571	1.21	0.76	0.80	7	5,750,469	0.12	0.05	0.06
中部		83	2,637,139	3.15	1.99	2.13	9	2,626,342	0.34	0.15	0.17
南部		103	3,170,322	3.25	1.95	2.07	7	3,178,976	0.22	0.09	0.10
東部		13	276,643	4.70	2.52	2.88	6	266,385	2.25	1.06	1.16
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		145	8,031,174	1.81	1.13	1.21	10	8,350,965	0.12	0.05	0.06
中央政府 管轄市		4	535,198	0.75	0.49	0.50	0	550,188	0.00	0.00	0.00
縣轄市		14	792,262	1.77	1.11	1.21	1	805,316	0.12	0.07	0.07
鎮		11	855,169	1.29	0.72	0.79	5	827,785	0.60	0.21	0.24
鄉		92	1,491,383	6.17	3.56	3.76	13	1,363,681	0.95	0.41	0.45
山地鄉 ⁴		5	105,407	4.74	3.09	3.65	3	96,738	3.10	1.78	1.93
總計		266	11,705,186	2.27	1.40	1.49	29	11,897,935	0.24	0.11	0.12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		108	1,260,049	8.57	4.97	5.37	29	1,384,992	2.09	0.98	1.09
新北市		302	1,963,658	15.38	9.32	10.05	63	2,055,038	3.07	1.67	1.85
桃園市		141	1,116,111	12.63	8.59	9.24	27	1,132,926	2.38	1.50	1.62
台中市		235	1,384,164	16.98	11.16	12.05	36	1,431,097	2.52	1.47	1.66
台南市		166	937,342	17.71	10.68	11.40	25	943,564	2.65	1.38	1.52
高雄市		301	1,369,850	21.97	13.59	14.43	44	1,403,348	3.14	1.62	1.83
基隆市		20	184,139	10.86	6.65	7.20	6	184,754	3.25	2.03	2.31
新竹市		26	221,265	11.75	8.14	8.43	7	227,538	3.08	2.29	2.51
嘉義市		18	129,794	13.87	7.43	8.37	4	137,896	2.90	2.15	2.28
新竹縣		27	287,837	9.38	6.77	7.12	5	276,096	1.81	0.79	1.07
宜蘭縣		38	229,222	16.58	9.79	10.43	2	224,956	0.89	0.48	0.54
苗栗縣		46	281,290	16.35	10.51	11.37	8	264,169	3.03	2.08	2.26
彰化縣		172	647,449	26.57	16.57	17.80	20	625,353	3.20	1.64	1.88
南投縣		67	252,705	26.51	15.81	17.52	10	241,407	4.14	2.24	2.47
雲林縣		83	352,821	23.52	13.62	15.04	6	328,485	1.83	1.13	1.22
嘉義縣		55	261,238	21.05	11.76	12.43	3	241,875	1.24	0.59	0.63
屏東縣		95	417,815	22.74	13.47	14.59	18	401,369	4.48	2.37	2.57
澎湖縣		11	54,283	20.26	12.39	13.65	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		42	165,073	25.44	15.21	16.51	10	161,174	6.20	3.17	3.24
台東縣		28	111,570	25.10	13.78	14.87	4	105,211	3.80	2.28	2.42
金門縣		4	70,010	5.71	3.18	3.65	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	7,501	13.33	9.32	9.32	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		708	5,543,571	12.77	7.97	8.56	147	5,750,469	2.56	1.42	1.58
中部		557	2,637,139	21.12	13.26	14.40	72	2,626,342	2.74	1.53	1.71
南部		646	3,170,322	20.38	12.30	13.15	94	3,178,976	2.96	1.56	1.72
東部		70	276,643	25.30	14.57	15.79	14	266,385	5.26	2.83	2.93
金馬地區		5	77,511	6.45	3.90	4.33	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		1,253	8,031,174	15.60	9.74	10.45	224	8,350,965	2.68	1.45	1.61
中央政府 管轄市		64	535,198	11.96	7.36	7.93	17	550,188	3.09	2.12	2.33
縣轄市		89	792,262	11.23	7.24	7.81	12	805,316	1.49	0.76	0.86
鎮		127	855,169	14.85	9.02	9.74	18	827,785	2.17	1.11	1.22
鄉		453	1,491,383	30.37	17.64	19.09	56	1,363,681	4.11	2.34	2.54
山地鄉 ⁴		15	105,407	14.23	8.97	9.80	5	96,738	5.17	3.95	4.05
總計		1,987	11,705,186	16.98	10.48	11.28	327	11,897,935	2.75	1.51	1.67

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

齒齦 C03

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		40	1,260,049	3.17	1.73	1.88	5	1,384,992	0.36	0.13	0.15
新北市		108	1,963,658	5.50	3.26	3.47	16	2,055,038	0.78	0.42	0.47
桃園市		51	1,116,111	4.57	3.13	3.44	13	1,132,926	1.15	0.65	0.73
台中市		77	1,384,164	5.56	3.58	3.83	6	1,431,097	0.42	0.22	0.26
台南市		62	937,342	6.61	3.84	4.06	6	943,564	0.64	0.28	0.32
高雄市		109	1,369,850	7.96	4.63	4.92	2	1,403,348	0.14	0.07	0.07
基隆市		7	184,139	3.80	2.24	2.22	1	184,754	0.54	0.11	0.21
新竹市		11	221,265	4.97	3.37	3.58	2	227,538	0.88	0.39	0.54
嘉義市		14	129,794	10.79	7.13	7.71	1	137,896	0.73	0.24	0.36
新竹縣		17	287,837	5.91	3.81	4.21	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		13	229,222	5.67	3.58	3.91	2	224,956	0.89	0.18	0.22
苗栗縣		11	281,290	3.91	2.24	2.45	5	264,169	1.89	1.28	1.33
彰化縣		61	647,449	9.42	5.73	6.26	2	625,353	0.32	0.20	0.22
南投縣		27	252,705	10.68	6.01	6.47	4	241,407	1.66	0.79	0.92
雲林縣		27	352,821	7.65	4.19	4.61	3	328,485	0.91	0.52	0.54
嘉義縣		21	261,238	8.04	4.73	4.97	2	241,875	0.83	0.29	0.28
屏東縣		33	417,815	7.90	4.58	4.90	4	401,369	1.00	0.32	0.40
澎湖縣		3	54,283	5.53	4.02	4.17	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		13	165,073	7.88	4.50	4.84	3	161,174	1.86	0.79	0.92
台東縣		9	111,570	8.07	4.66	4.91	6	105,211	5.70	2.78	3.06
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	1	70,175	1.43	1.05	1.16
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		258	5,543,571	4.65	2.83	3.05	44	5,750,469	0.77	0.39	0.44
中部		192	2,637,139	7.28	4.46	4.83	15	2,626,342	0.57	0.31	0.35
南部		242	3,170,322	7.63	4.47	4.74	15	3,178,976	0.47	0.19	0.21
東部		22	276,643	7.95	4.56	4.87	9	266,385	3.38	1.58	1.77
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	1	75,763	1.32	0.96	1.05
直轄市		447	8,031,174	5.57	3.36	3.59	48	8,350,965	0.57	0.29	0.32
中央政府 管轄市		32	535,198	5.98	3.87	4.10	4	550,188	0.73	0.25	0.36
縣轄市		34	792,262	4.29	2.75	2.89	3	805,316	0.37	0.15	0.19
鎮		35	855,169	4.09	2.49	2.58	6	827,785	0.72	0.46	0.49
鄉		166	1,491,383	11.13	6.26	6.87	23	1,363,681	1.69	0.77	0.84
山地鄉 ⁴		8	105,407	7.59	5.72	6.30	3	96,738	3.10	1.97	1.98
總計		714	11,705,186	6.10	3.67	3.94	84	11,897,935	0.71	0.35	0.39

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

□底 C04

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		12	1,260,049	0.95	0.50	0.54	3	1,384,992	0.22	0.12	0.13
新北市		28	1,963,658	1.43	0.88	0.91	2	2,055,038	0.10	0.06	0.06
桃園市		11	1,116,111	0.99	0.64	0.68	2	1,132,926	0.18	0.13	0.14
台中市		30	1,384,164	2.17	1.44	1.53	1	1,431,097	0.07	0.04	0.05
台南市		16	937,342	1.71	0.96	1.02	1	943,564	0.11	0.13	0.13
高雄市		41	1,369,850	2.99	1.79	1.87	4	1,403,348	0.29	0.14	0.18
基隆市		1	184,139	0.54	0.33	0.37	2	184,754	1.08	0.66	0.70
新竹市		0	221,265	0.00	0.00	0.00	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		2	129,794	1.54	1.03	1.09	1	137,896	0.73	0.24	0.36
新竹縣		5	287,837	1.74	1.21	1.31	1	276,096	0.36	0.22	0.25
宜蘭縣		3	229,222	1.31	0.80	0.87	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		3	281,290	1.07	0.73	0.73	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		7	647,449	1.08	0.75	0.80	0	625,353	0.00	0.00	0.00
南投縣		4	252,705	1.58	1.12	1.13	1	241,407	0.41	0.12	0.17
雲林縣		9	352,821	2.55	1.30	1.42	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		6	261,238	2.30	1.36	1.36	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		11	417,815	2.63	1.25	1.48	4	401,369	1.00	0.44	0.49
澎湖縣		1	54,283	1.84	1.06	0.98	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	165,073	2.42	1.37	1.46	2	161,174	1.24	0.49	0.63
台東縣		2	111,570	1.79	0.99	0.92	1	105,211	0.95	0.45	0.45
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		63	5,543,571	1.14	0.71	0.74	10	5,750,469	0.17	0.11	0.11
中部		50	2,637,139	1.90	1.22	1.30	2	2,626,342	0.08	0.04	0.05
南部		77	3,170,322	2.43	1.40	1.48	10	3,178,976	0.31	0.16	0.19
東部		6	276,643	2.17	1.21	1.24	3	266,385	1.13	0.48	0.56
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		138	8,031,174	1.72	1.06	1.11	13	8,350,965	0.16	0.10	0.11
中央政府 管轄市		3	535,198	0.56	0.37	0.39	3	550,188	0.55	0.30	0.35
縣轄市		5	792,262	0.63	0.40	0.43	3	805,316	0.37	0.15	0.20
鎮		9	855,169	1.05	0.65	0.70	2	827,785	0.24	0.13	0.13
鄉		41	1,491,383	2.75	1.54	1.64	4	1,363,681	0.29	0.13	0.15
山地鄉 ⁴		5	105,407	4.74	3.66	3.86	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		196	11,705,186	1.67	1.02	1.08	25	11,897,935	0.21	0.12	0.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		124	1,260,049	9.84	6.01	6.44	24	1,384,992	1.73	0.89	0.95
新北市		316	1,963,658	16.09	9.77	10.60	22	2,055,038	1.07	0.54	0.61
桃園市		161	1,116,111	14.43	9.65	10.46	12	1,132,926	1.06	0.65	0.74
台中市		276	1,384,164	19.94	13.09	14.17	18	1,431,097	1.26	0.73	0.78
台南市		175	937,342	18.67	11.31	12.00	14	943,564	1.48	0.99	0.97
高雄市		330	1,369,850	24.09	14.56	15.61	12	1,403,348	0.86	0.47	0.48
基隆市		26	184,139	14.12	8.47	9.38	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		18	221,265	8.14	6.02	6.68	3	227,538	1.32	0.41	0.56
嘉義市		29	129,794	22.34	14.18	15.33	6	137,896	4.35	2.85	3.07
新竹縣		32	287,837	11.12	7.60	8.11	3	276,096	1.09	0.74	0.77
宜蘭縣		42	229,222	18.32	11.68	12.64	1	224,956	0.44	0.09	0.11
苗栗縣		50	281,290	17.78	11.44	12.33	2	264,169	0.76	0.27	0.31
彰化縣		200	647,449	30.89	18.86	20.16	1	625,353	0.16	0.09	0.10
南投縣		70	252,705	27.70	15.71	16.93	5	241,407	2.07	1.38	1.45
雲林縣		108	352,821	30.61	18.28	19.44	4	328,485	1.22	0.50	0.55
嘉義縣		85	261,238	32.54	18.02	18.98	3	241,875	1.24	0.74	0.82
屏東縣		123	417,815	29.44	17.66	18.78	10	401,369	2.49	1.20	1.32
澎湖縣		12	54,283	22.11	13.94	15.26	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		46	165,073	27.87	16.80	18.17	4	161,174	2.48	1.52	1.70
台東縣		37	111,570	33.16	19.05	20.43	9	105,211	8.55	3.73	4.18
金門縣		1	70,010	1.43	0.66	0.61	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		769	5,543,571	13.87	8.72	9.44	67	5,750,469	1.17	0.60	0.66
中部		654	2,637,139	24.80	15.52	16.67	28	2,626,342	1.07	0.60	0.65
南部		754	3,170,322	23.78	14.28	15.23	45	3,178,976	1.42	0.83	0.86
東部		83	276,643	30.00	17.70	19.08	13	266,385	4.88	2.40	2.69
金馬地區		1	77,511	1.29	0.60	0.56	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		1,382	8,031,174	17.21	10.72	11.54	102	8,350,965	1.22	0.68	0.72
中央政府 管轄市		73	535,198	13.64	8.84	9.71	9	550,188	1.64	0.87	0.98
縣轄市		98	792,262	12.37	8.04	8.52	5	805,316	0.62	0.33	0.37
鎮		138	855,169	16.14	10.02	10.61	10	827,785	1.21	0.81	0.82
鄉		570	1,491,383	38.22	22.00	23.57	27	1,363,681	1.98	0.89	1.00
山地鄉 ⁴		21	105,407	19.92	13.00	13.70	8	96,738	8.27	4.72	5.23
總計		2,261	11,705,186	19.32	11.92	12.81	153	11,897,935	1.29	0.70	0.75

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 ³
台北市		80	1,260,049	6.35	3.67	3.86	12	1,384,992	0.87	0.45	0.47
新北市		127	1,963,658	6.47	3.81	4.06	11	2,055,038	0.54	0.27	0.30
桃園市		46	1,116,111	4.12	2.85	3.00	5	1,132,926	0.44	0.32	0.33
台中市		120	1,384,164	8.67	5.62	6.04	11	1,431,097	0.77	0.47	0.47
台南市		70	937,342	7.47	4.46	4.83	6	943,564	0.64	0.39	0.39
高雄市		124	1,369,850	9.05	5.32	5.71	8	1,403,348	0.57	0.30	0.33
基隆市		15	184,139	8.15	4.70	4.94	2	184,754	1.08	0.48	0.52
新竹市		9	221,265	4.07	2.76	3.00	1	227,538	0.44	0.27	0.31
嘉義市		7	129,794	5.39	3.34	3.17	1	137,896	0.73	0.43	0.40
新竹縣		12	287,837	4.17	2.72	3.17	1	276,096	0.36	0.27	0.27
宜蘭縣		20	229,222	8.73	5.11	5.50	2	224,956	0.89	0.72	0.85
苗栗縣		20	281,290	7.11	4.16	4.50	3	264,169	1.14	0.34	0.39
彰化縣		43	647,449	6.64	4.09	4.30	4	625,353	0.64	0.35	0.37
南投縣		30	252,705	11.87	6.64	7.32	2	241,407	0.83	0.40	0.40
雲林縣		36	352,821	10.20	5.79	6.20	2	328,485	0.61	0.39	0.43
嘉義縣		32	261,238	12.25	6.72	7.29	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		41	417,815	9.81	5.78	6.04	5	401,369	1.25	0.70	0.74
澎湖縣		1	54,283	1.84	1.15	1.26	1	50,924	1.96	1.04	1.15
花蓮縣		15	165,073	9.09	5.90	5.88	2	161,174	1.24	0.73	0.74
台東縣		14	111,570	12.55	7.43	7.69	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		329	5,543,571	5.93	3.64	3.88	37	5,750,469	0.64	0.36	0.39
中部		229	2,637,139	8.68	5.36	5.75	19	2,626,342	0.72	0.42	0.43
南部		275	3,170,322	8.67	5.11	5.47	21	3,178,976	0.66	0.37	0.39
東部		29	276,643	10.48	6.47	6.56	2	266,385	0.75	0.44	0.45
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		567	8,031,174	7.06	4.30	4.60	53	8,350,965	0.63	0.36	0.38
中央政府 管轄市		31	535,198	5.79	3.66	3.80	4	550,188	0.73	0.39	0.41
縣轄市		30	792,262	3.79	2.31	2.51	3	805,316	0.37	0.24	0.26
鎮		61	855,169	7.13	4.38	4.57	4	827,785	0.48	0.33	0.33
鄉		173	1,491,383	11.60	6.64	7.13	15	1,363,681	1.10	0.55	0.61
山地鄉 ⁴		11	105,407	10.44	6.70	6.93	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		862	11,705,186	7.36	4.47	4.77	79	11,897,935	0.66	0.37	0.39

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		56	1,260,049	4.44	2.35	2.58	4	1,384,992	0.29	0.20	0.21
新北市		169	1,963,658	8.61	5.00	5.43	7	2,055,038	0.34	0.22	0.25
桃園市		106	1,116,111	9.50	6.30	6.71	2	1,132,926	0.18	0.10	0.11
台中市		131	1,384,164	9.46	6.16	6.58	6	1,431,097	0.42	0.22	0.26
台南市		73	937,342	7.79	4.42	4.78	2	943,564	0.21	0.08	0.11
高雄市		160	1,369,850	11.68	6.84	7.20	4	1,403,348	0.29	0.15	0.17
基隆市		17	184,139	9.23	4.76	5.45	1	184,754	0.54	0.23	0.23
新竹市		18	221,265	8.14	5.65	5.84	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		7	129,794	5.39	3.43	3.58	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		15	287,837	5.21	3.34	3.69	1	276,096	0.36	0.27	0.25
宜蘭縣		28	229,222	12.22	7.15	7.60	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		45	281,290	16.00	9.58	10.26	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		90	647,449	13.90	8.06	8.93	1	625,353	0.16	0.14	0.14
南投縣		41	252,705	16.22	9.02	9.51	1	241,407	0.41	0.20	0.23
雲林縣		53	352,821	15.02	8.34	9.04	1	328,485	0.30	0.26	0.26
嘉義縣		37	261,238	14.16	7.43	8.04	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		62	417,815	14.84	8.67	9.17	2	401,369	0.50	0.25	0.26
澎湖縣		6	54,283	11.05	8.02	8.70	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		26	165,073	15.75	7.82	9.31	4	161,174	2.48	1.19	1.21
台東縣		25	111,570	22.41	12.66	13.21	2	105,211	1.90	0.66	0.87
金門縣		3	70,010	4.29	1.99	1.84	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		454	5,543,571	8.19	4.89	5.29	15	5,750,469	0.26	0.17	0.18
中部		315	2,637,139	11.94	7.24	7.83	9	2,626,342	0.34	0.19	0.21
南部		345	3,170,322	10.88	6.33	6.73	8	3,178,976	0.25	0.12	0.14
東部		51	276,643	18.44	9.76	10.88	6	266,385	2.25	0.99	1.08
金馬地區		3	77,511	3.87	1.80	1.67	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		695	8,031,174	8.65	5.18	5.55	25	8,350,965	0.30	0.17	0.19
中央政府 管轄市		42	535,198	7.85	4.82	5.19	1	550,188	0.18	0.09	0.09
縣轄市		43	792,262	5.43	3.27	3.60	3	805,316	0.37	0.21	0.23
鎮		102	855,169	11.93	6.73	7.33	1	827,785	0.12	0.06	0.07
鄉		286	1,491,383	19.18	10.69	11.49	8	1,363,681	0.59	0.31	0.32
山地鄉 ⁴		9	105,407	8.54	5.38	5.61	2	96,738	2.07	0.85	1.18
總計		1,168	11,705,186	9.98	5.91	6.36	38	11,897,935	0.32	0.18	0.20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		0	1,260,049	0.00	0.00	0.00	0	1,384,992	0.00	0.00	0.00
新北市		3	1,963,658	0.15	0.09	0.09	1	2,055,038	0.05	0.02	0.02
桃園市		0	1,116,111	0.00	0.00	0.00	0	1,132,926	0.00	0.00	0.00
台中市		2	1,384,164	0.14	0.09	0.10	0	1,431,097	0.00	0.00	0.00
台南市		1	937,342	0.11	0.09	0.09	0	943,564	0.00	0.00	0.00
高雄市		2	1,369,850	0.15	0.10	0.09	0	1,403,348	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	184,139	0.00	0.00	0.00	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	221,265	0.00	0.00	0.00	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	287,837	0.00	0.00	0.00	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		2	281,290	0.71	0.59	0.59	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		1	647,449	0.15	0.06	0.09	0	625,353	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	0	241,407	0.00	0.00	0.00
雲林縣		2	352,821	0.57	0.26	0.29	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		1	417,815	0.24	0.19	0.19	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		5	5,543,571	0.09	0.06	0.06	1	5,750,469	0.02	0.01	0.01
中部		5	2,637,139	0.19	0.10	0.12	0	2,626,342	0.00	0.00	0.00
南部		4	3,170,322	0.13	0.09	0.09	0	3,178,976	0.00	0.00	0.00
東部		0	276,643	0.00	0.00	0.00	0	266,385	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		8	8,031,174	0.10	0.06	0.07	1	8,350,965	0.01	0.01	0.01
中央政府 管轄市		0	535,198	0.00	0.00	0.00	0	550,188	0.00	0.00	0.00
縣轄市		1	792,262	0.13	0.06	0.08	0	805,316	0.00	0.00	0.00
鎮		2	855,169	0.23	0.19	0.19	0	827,785	0.00	0.00	0.00
鄉		3	1,491,383	0.20	0.11	0.12	0	1,363,681	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		14	11,705,186	0.12	0.08	0.08	1	11,897,935	0.01	0.00	0.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		12	1,260,049	0.95	0.45	0.55	11	1,384,992	0.79	0.43	0.45
新北市		27	1,963,658	1.37	0.83	0.91	28	2,055,038	1.36	0.91	0.99
桃園市		14	1,116,111	1.25	0.88	0.96	13	1,132,926	1.15	0.78	0.87
台中市		27	1,384,164	1.95	1.30	1.38	14	1,431,097	0.98	0.83	0.85
台南市		17	937,342	1.81	1.22	1.27	16	943,564	1.70	1.14	1.22
高雄市		35	1,369,850	2.56	1.70	1.81	15	1,403,348	1.07	0.59	0.63
基隆市		4	184,139	2.17	1.24	1.35	4	184,754	2.17	1.64	1.68
新竹市		6	221,265	2.71	2.13	2.29	2	227,538	0.88	0.57	0.64
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		6	287,837	2.08	1.28	1.53	2	276,096	0.72	0.36	0.46
宜蘭縣		1	229,222	0.44	0.71	0.67	6	224,956	2.67	1.29	1.38
苗栗縣		2	281,290	0.71	0.44	0.52	1	264,169	0.38	0.20	0.20
彰化縣		11	647,449	1.70	0.86	0.99	10	625,353	1.60	0.86	1.00
南投縣		5	252,705	1.98	1.08	1.14	2	241,407	0.83	0.60	0.65
雲林縣		6	352,821	1.70	0.75	0.85	4	328,485	1.22	1.13	1.15
嘉義縣		3	261,238	1.15	0.61	0.67	5	241,875	2.07	0.83	0.88
屏東縣		8	417,815	1.91	1.08	1.18	4	401,369	1.00	0.81	0.86
澎湖縣		1	54,283	1.84	1.05	1.05	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		3	165,073	1.82	0.91	1.07	1	161,174	0.62	0.30	0.30
台東縣		1	111,570	0.90	0.70	0.77	1	105,211	0.95	0.48	0.55
金門縣		1	70,010	1.43	0.59	0.68	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	1	5,588	17.90	13.82	13.82
北部		72	5,543,571	1.30	0.80	0.90	67	5,750,469	1.17	0.74	0.80
中部		49	2,637,139	1.86	1.10	1.20	30	2,626,342	1.14	0.86	0.91
南部		64	3,170,322	2.02	1.31	1.40	40	3,178,976	1.26	0.77	0.83
東部		4	276,643	1.45	0.83	0.95	2	266,385	0.75	0.37	0.39
金馬地區		1	77,511	1.29	0.54	0.62	1	75,763	1.32	1.06	1.06
直轄市		132	8,031,174	1.64	1.04	1.13	97	8,350,965	1.16	0.78	0.83
中央政府 管轄市		10	535,198	1.87	1.26	1.37	6	550,188	1.09	0.79	0.83
縣轄市		7	792,262	0.88	0.50	0.56	2	805,316	0.25	0.13	0.15
鎮		13	855,169	1.52	0.92	1.00	7	827,785	0.85	0.55	0.58
鄉		28	1,491,383	1.88	1.00	1.12	28	1,363,681	2.05	1.19	1.29
山地鄉 ⁴		1	105,407	0.95	0.75	0.75	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		190	11,705,186	1.62	1.01	1.10	140	11,897,935	1.18	0.77	0.83

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		105	1,260,049	8.33	5.39	5.83	33	1,384,992	2.38	1.33	1.44
新北市		211	1,963,658	10.75	7.02	7.63	57	2,055,038	2.77	1.76	1.97
桃園市		116	1,116,111	10.39	7.17	7.89	33	1,132,926	2.91	1.97	2.14
台中市		167	1,384,164	12.07	8.30	9.18	38	1,431,097	2.66	1.78	1.89
台南市		90	937,342	9.60	6.13	6.71	36	943,564	3.82	2.37	2.65
高雄市		167	1,369,850	12.19	7.74	8.53	49	1,403,348	3.49	2.16	2.38
基隆市		14	184,139	7.60	4.41	4.72	6	184,754	3.25	2.19	2.45
新竹市		29	221,265	13.11	9.75	10.52	7	227,538	3.08	1.84	2.08
嘉義市		9	129,794	6.93	4.83	5.16	4	137,896	2.90	1.84	2.00
新竹縣		24	287,837	8.34	5.99	6.24	6	276,096	2.17	1.55	2.01
宜蘭縣		25	229,222	10.91	6.68	7.32	4	224,956	1.78	0.71	0.84
苗栗縣		33	281,290	11.73	8.15	9.04	9	264,169	3.41	2.34	2.48
彰化縣		57	647,449	8.80	5.98	6.53	13	625,353	2.08	1.16	1.38
南投縣		17	252,705	6.73	4.61	5.00	4	241,407	1.66	1.32	1.48
雲林縣		24	352,821	6.80	4.25	4.79	11	328,485	3.35	2.21	2.49
嘉義縣		24	261,238	9.19	5.58	6.25	10	241,875	4.13	2.49	2.79
屏東縣		59	417,815	14.12	8.65	9.52	17	401,369	4.24	2.74	2.88
澎湖縣		3	54,283	5.53	3.82	4.15	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		15	165,073	9.09	5.31	5.55	2	161,174	1.24	1.00	1.10
台東縣		26	111,570	23.30	13.62	15.29	4	105,211	3.80	1.99	1.92
金門縣		1	70,010	1.43	1.13	1.13	1	70,175	1.43	1.15	1.26
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		557	5,543,571	10.05	6.70	7.29	155	5,750,469	2.70	1.70	1.89
中部		265	2,637,139	10.05	6.79	7.48	66	2,626,342	2.51	1.65	1.81
南部		352	3,170,322	11.10	7.03	7.74	116	3,178,976	3.65	2.27	2.50
東部		41	276,643	14.82	8.70	9.52	6	266,385	2.25	1.38	1.42
金馬地區		1	77,511	1.29	1.01	1.01	1	75,763	1.32	1.06	1.16
直轄市		856	8,031,174	10.66	7.03	7.71	246	8,350,965	2.95	1.86	2.04
中央政府 管轄市		52	535,198	9.72	6.74	7.24	17	550,188	3.09	1.95	2.17
縣轄市		38	792,262	4.80	3.23	3.50	8	805,316	0.99	0.68	0.71
鎮		40	855,169	4.68	3.03	3.32	12	827,785	1.45	0.88	1.00
鄉		230	1,491,383	15.42	9.71	10.66	61	1,363,681	4.47	2.85	3.19
山地鄉 ⁴		32	105,407	30.36	20.24	22.70	4	96,738	4.13	3.35	3.97
總計		1,216	11,705,186	10.39	6.83	7.48	344	11,897,935	2.89	1.83	2.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		171	1,260,049	13.57	7.13	7.71	24	1,384,992	1.73	0.73	0.81
新北市		413	1,963,658	21.03	12.08	12.98	33	2,055,038	1.61	0.79	0.92
桃園市		202	1,116,111	18.10	11.78	12.78	25	1,132,926	2.21	1.26	1.43
台中市		331	1,384,164	23.91	15.20	16.40	25	1,431,097	1.75	0.96	1.10
台南市		184	937,342	19.63	10.86	11.96	9	943,564	0.95	0.37	0.45
高雄市		349	1,369,850	25.48	14.64	15.60	18	1,403,348	1.28	0.72	0.77
基隆市		44	184,139	23.89	12.88	14.52	8	184,754	4.33	2.26	2.27
新竹市		34	221,265	15.37	10.49	10.97	1	227,538	0.44	0.28	0.30
嘉義市		17	129,794	13.10	7.63	8.38	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		48	287,837	16.68	10.93	11.88	3	276,096	1.09	0.68	0.73
宜蘭縣		69	229,222	30.10	16.59	18.24	6	224,956	2.67	0.98	1.28
苗栗縣		82	281,290	29.15	18.34	19.38	3	264,169	1.14	0.59	0.71
彰化縣		153	647,449	23.63	14.24	15.25	7	625,353	1.12	0.27	0.36
南投縣		76	252,705	30.07	17.22	18.83	2	241,407	0.83	0.27	0.36
雲林縣		88	352,821	24.94	13.63	14.64	2	328,485	0.61	0.40	0.45
嘉義縣		74	261,238	28.33	15.25	16.10	5	241,875	2.07	0.95	1.02
屏東縣		147	417,815	35.18	20.14	21.26	9	401,369	2.24	1.23	1.26
澎湖縣		19	54,283	35.00	20.74	21.58	2	50,924	3.93	1.54	1.51
花蓮縣		64	165,073	38.77	22.13	23.47	5	161,174	3.10	1.83	1.92
台東縣		59	111,570	52.88	29.39	31.47	2	105,211	1.90	0.49	0.67
金門縣		14	70,010	20.00	10.27	11.26	5	70,175	7.13	2.44	3.17
連江縣		1	7,501	13.33	6.04	6.95	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		1,063	5,543,571	19.18	11.28	12.18	103	5,750,469	1.79	0.89	1.01
中部		648	2,637,139	24.57	14.81	15.95	36	2,626,342	1.37	0.65	0.76
南部		790	3,170,322	24.92	14.14	15.14	43	3,178,976	1.35	0.68	0.74
東部		123	276,643	44.46	25.08	26.72	7	266,385	2.63	1.31	1.43
金馬地區		15	77,511	19.35	9.86	10.86	5	75,763	6.60	2.28	2.96
直轄市		1,650	8,031,174	20.54	12.05	12.99	134	8,350,965	1.60	0.81	0.91
中央政府 管轄市		95	535,198	17.75	10.58	11.57	9	550,188	1.64	0.98	1.00
縣轄市		113	792,262	14.26	8.82	9.31	5	805,316	0.62	0.19	0.25
鎮		145	855,169	16.96	9.87	10.50	9	827,785	1.09	0.37	0.44
鄉		636	1,491,383	42.64	23.69	25.41	37	1,363,681	2.71	1.32	1.45
山地鄉 ⁴		22	105,407	20.87	13.38	15.79	4	96,738	4.13	2.73	2.82
總計		2,639	11,705,186	22.55	13.18	14.18	194	11,897,935	1.63	0.80	0.90

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3. 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

胃 C16

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		288	1,260,049	22.86	10.25	11.85	214	1,384,992	15.45	6.60	7.57
新北市		422	1,963,658	21.49	11.65	13.45	280	2,055,038	13.63	6.80	7.88
桃園市		200	1,116,111	17.92	11.16	12.65	113	1,132,926	9.97	5.78	6.55
台中市		266	1,384,164	19.22	11.19	12.90	198	1,431,097	13.84	7.18	8.38
台南市		153	937,342	16.32	8.21	9.54	112	943,564	11.87	5.60	6.33
高雄市		262	1,369,850	19.13	9.98	11.28	142	1,403,348	10.12	4.84	5.46
基隆市		67	184,139	36.39	16.63	19.75	36	184,754	19.49	8.41	9.68
新竹市		45	221,265	20.34	12.35	14.03	17	227,538	7.47	3.92	4.61
嘉義市		17	129,794	13.10	5.81	6.86	15	137,896	10.88	5.10	5.61
新竹縣		52	287,837	18.07	10.28	11.90	26	276,096	9.42	4.98	5.60
宜蘭縣		74	229,222	32.28	13.56	16.97	59	224,956	26.23	10.95	12.53
苗栗縣		58	281,290	20.62	10.33	11.57	37	264,169	14.01	5.27	6.61
彰化縣		129	647,449	19.92	9.75	11.36	69	625,353	11.03	4.93	5.69
南投縣		50	252,705	19.79	9.49	10.83	31	241,407	12.84	5.15	6.14
雲林縣		55	352,821	15.59	7.24	8.31	39	328,485	11.87	4.19	4.95
嘉義縣		50	261,238	19.14	8.88	9.99	43	241,875	17.78	5.58	6.83
屏東縣		84	417,815	20.10	9.80	10.98	48	401,369	11.96	5.54	6.35
澎湖縣		12	54,283	22.11	11.01	12.43	7	50,924	13.75	6.95	7.73
花蓮縣		54	165,073	32.71	16.41	18.84	40	161,174	24.82	11.28	12.97
台東縣		37	111,570	33.16	16.09	18.48	21	105,211	19.96	7.67	9.19
金門縣		11	70,010	15.71	8.37	9.96	2	70,175	2.85	0.99	1.38
連江縣		3	7,501	39.99	23.18	23.81	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		1,206	5,543,571	21.75	11.40	13.17	782	5,750,469	13.60	6.54	7.55
中部		500	2,637,139	18.96	9.99	11.51	337	2,626,342	12.83	5.95	6.92
南部		578	3,170,322	18.23	9.18	10.44	367	3,178,976	11.54	5.29	6.04
東部		91	276,643	32.89	16.40	18.81	61	266,385	22.90	9.84	11.47
金馬地區		14	77,511	18.06	9.82	11.35	2	75,763	2.64	0.93	1.30
直轄市		1,591	8,031,174	19.81	10.56	12.11	1,059	8,350,965	12.68	6.20	7.11
中央政府 管轄市		129	535,198	24.10	12.43	14.49	68	550,188	12.36	5.82	6.68
縣轄市		113	792,262	14.26	7.49	8.84	58	805,316	7.20	3.37	3.96
鎮		127	855,169	14.85	7.08	8.30	83	827,785	10.03	3.88	4.55
鄉		429	1,491,383	28.77	13.34	15.19	281	1,363,681	20.61	8.47	9.85
山地鄉 ⁴		23	105,407	21.82	13.64	15.57	22	96,738	22.74	13.35	16.02
總計		2,389	11,705,186	20.41	10.56	12.14	1,549	11,897,935	13.02	6.11	7.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		19	1,260,049	1.51	0.82	0.90	31	1,384,992	2.24	0.99	1.13
新北市		45	1,963,658	2.29	1.41	1.53	29	2,055,038	1.41	0.71	0.80
桃園市		25	1,116,111	2.24	1.44	1.58	17	1,132,926	1.50	0.88	1.03
台中市		34	1,384,164	2.46	1.52	1.72	22	1,431,097	1.54	0.91	1.02
台南市		16	937,342	1.71	0.91	1.00	20	943,564	2.12	1.00	1.08
高雄市		31	1,369,850	2.26	1.22	1.34	28	1,403,348	2.00	1.05	1.13
基隆市		4	184,139	2.17	1.54	1.56	2	184,754	1.08	0.36	0.49
新竹市		2	221,265	0.90	0.63	0.61	2	227,538	0.88	0.47	0.59
嘉義市		3	129,794	2.31	1.29	1.55	4	137,896	2.90	1.48	1.65
新竹縣		6	287,837	2.08	1.12	1.31	4	276,096	1.45	0.74	0.85
宜蘭縣		3	229,222	1.31	0.78	0.88	3	224,956	1.33	0.44	0.56
苗栗縣		15	281,290	5.33	3.20	3.41	5	264,169	1.89	0.95	1.00
彰化縣		13	647,449	2.01	1.22	1.36	20	625,353	3.20	1.47	1.68
南投縣		7	252,705	2.77	1.20	1.45	8	241,407	3.31	1.33	1.49
雲林縣		7	352,821	1.98	1.00	1.17	7	328,485	2.13	1.04	1.13
嘉義縣		6	261,238	2.30	1.05	1.11	4	241,875	1.65	0.95	1.05
屏東縣		10	417,815	2.39	1.13	1.33	11	401,369	2.74	1.57	1.62
澎湖縣		2	54,283	3.68	0.92	1.66	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		3	165,073	1.82	0.78	0.97	2	161,174	1.24	0.54	0.67
台東縣		4	111,570	3.59	1.74	1.83	2	105,211	1.90	0.69	0.80
金門縣		1	70,010	1.43	0.78	0.78	1	70,175	1.43	0.70	0.65
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		119	5,543,571	2.15	1.29	1.39	93	5,750,469	1.62	0.80	0.92
中部		61	2,637,139	2.31	1.34	1.52	57	2,626,342	2.17	1.13	1.27
南部		68	3,170,322	2.14	1.11	1.24	67	3,178,976	2.11	1.09	1.17
東部		7	276,643	2.53	1.17	1.32	4	266,385	1.50	0.59	0.72
金馬地區		1	77,511	1.29	0.71	0.71	1	75,763	1.32	0.65	0.61
直轄市		170	8,031,174	2.12	1.23	1.35	147	8,350,965	1.76	0.92	1.03
中央政府 管轄市		9	535,198	1.68	1.10	1.17	8	550,188	1.45	0.69	0.83
縣轄市		12	792,262	1.51	0.76	0.93	15	805,316	1.86	1.09	1.22
鎮		24	855,169	2.81	1.38	1.57	23	827,785	2.78	1.13	1.25
鄉		41	1,491,383	2.75	1.48	1.64	29	1,363,681	2.13	1.01	1.11
山地鄉 ⁴		6	105,407	5.69	3.38	3.78	2	96,738	2.07	0.93	1.13
總計		256	11,705,186	2.19	1.25	1.38	222	11,897,935	1.87	0.94	1.05

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門 C18 - C21

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		1,039	1,260,049	82.46	40.13	45.45	862	1,384,992	62.24	27.39	31.01
新北市		1,501	1,963,658	76.44	43.13	48.64	1,198	2,055,038	58.30	29.74	33.74
桃園市		820	1,116,111	73.47	46.63	52.59	581	1,132,926	51.28	29.09	33.44
台中市		1,210	1,384,164	87.42	54.32	61.06	868	1,431,097	60.65	33.37	38.18
台南市		924	937,342	98.58	52.08	58.96	692	943,564	73.34	34.95	39.38
高雄市		1,375	1,369,850	100.38	54.09	60.70	952	1,403,348	67.84	33.33	37.52
基隆市		164	184,139	89.06	45.54	52.27	125	184,754	67.66	28.73	33.24
新竹市		161	221,265	72.76	47.13	53.07	134	227,538	58.89	33.29	38.19
嘉義市		99	129,794	76.27	43.03	47.75	91	137,896	65.99	31.29	34.83
新竹縣		194	287,837	67.40	41.77	47.04	155	276,096	56.14	32.74	36.48
宜蘭縣		198	229,222	86.38	44.79	50.77	135	224,956	60.01	26.82	30.32
苗栗縣		243	281,290	86.39	44.18	49.39	182	264,169	68.90	33.50	37.51
彰化縣		540	647,449	83.40	45.11	51.07	447	625,353	71.48	33.36	38.07
南投縣		232	252,705	91.81	45.51	51.21	160	241,407	66.28	29.39	33.26
雲林縣		275	352,821	77.94	38.63	43.58	202	328,485	61.49	26.62	30.08
嘉義縣		231	261,238	88.43	41.03	46.40	165	241,875	68.22	30.30	33.38
屏東縣		367	417,815	87.84	43.61	49.00	262	401,369	65.28	30.15	33.52
澎湖縣		36	54,283	66.32	36.11	39.17	26	50,924	51.06	23.12	25.24
花蓮縣		140	165,073	84.81	45.13	50.88	96	161,174	59.56	26.67	30.11
台東縣		109	111,570	97.70	52.22	57.13	62	105,211	58.93	30.22	34.04
金門縣		27	70,010	38.57	20.01	22.53	13	70,175	18.53	9.00	10.33
連江縣		4	7,501	53.33	35.84	42.82	1	5,588	17.90	3.79	4.55
北部		4,320	5,543,571	77.93	43.31	48.89	3,372	5,750,469	58.64	29.18	33.14
中部		2,257	2,637,139	85.59	48.67	54.76	1,677	2,626,342	63.85	31.82	36.25
南部		3,032	3,170,322	95.64	50.12	56.37	2,188	3,178,976	68.83	32.82	36.79
東部		249	276,643	90.01	47.95	53.35	158	266,385	59.31	28.04	31.63
金馬地區		31	77,511	39.99	21.45	24.34	14	75,763	18.48	8.70	10.01
直轄市		6,869	8,031,174	85.53	47.89	53.99	5,153	8,350,965	61.71	31.01	35.18
中央政府 管轄市		424	535,198	79.22	45.41	51.34	350	550,188	63.61	31.23	35.67
縣轄市		419	792,262	52.89	30.67	34.18	349	805,316	43.34	20.94	23.89
鎮		665	855,169	77.76	39.55	45.02	490	827,785	59.19	27.11	30.64
鄉		1,512	1,491,383	101.38	50.67	56.84	1,067	1,363,681	78.24	36.18	40.39
山地鄉 ⁴		56	105,407	53.13	34.19	39.14	39	96,738	40.32	25.95	28.51
總計		9,893	11,705,186	84.52	46.40	52.26	7,409	11,897,935	62.27	30.58	34.61

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		667	1,260,049	52.93	24.82	28.43	595	1,384,992	42.96	18.54	21.15
新北市		883	1,963,658	44.97	25.02	28.55	789	2,055,038	38.39	19.27	21.99
桃園市		513	1,116,111	45.96	28.91	32.98	404	1,132,926	35.66	20.05	23.20
台中市		761	1,384,164	54.98	33.58	38.07	595	1,431,097	41.58	22.50	25.88
台南市		560	937,342	59.74	31.02	35.28	458	943,564	48.54	22.41	25.41
高雄市		860	1,369,850	62.78	33.25	37.63	630	1,403,348	44.89	21.71	24.54
基隆市		101	184,139	54.85	27.16	31.97	86	184,754	46.55	18.62	21.78
新竹市		93	221,265	42.03	27.55	30.90	99	227,538	43.51	24.15	27.84
嘉義市		52	129,794	40.06	22.36	24.72	64	137,896	46.41	22.06	24.50
新竹縣		107	287,837	37.17	22.85	25.69	101	276,096	36.58	20.59	23.18
宜蘭縣		140	229,222	61.08	30.51	35.07	88	224,956	39.12	16.64	18.81
苗栗縣		142	281,290	50.48	25.45	28.60	134	264,169	50.73	24.18	27.27
彰化縣		335	647,449	51.74	27.36	31.07	313	625,353	50.05	23.11	26.37
南投縣		136	252,705	53.82	25.83	29.67	109	241,407	45.15	19.32	21.90
雲林縣		171	352,821	48.47	24.78	27.39	132	328,485	40.18	16.21	18.37
嘉義縣		140	261,238	53.59	25.15	28.40	103	241,875	42.58	18.12	20.19
屏東縣		197	417,815	47.15	23.50	26.52	157	401,369	39.12	17.88	20.12
澎湖縣		17	54,283	31.32	16.32	17.80	18	50,924	35.35	16.43	17.81
花蓮縣		78	165,073	47.25	25.02	27.81	70	161,174	43.43	19.08	21.78
台東縣		62	111,570	55.57	28.68	31.60	41	105,211	38.97	19.03	21.83
金門縣		18	70,010	25.71	13.01	14.83	7	70,175	9.98	5.93	6.49
連江縣		3	7,501	39.99	24.93	30.82	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		2,646	5,543,571	47.73	26.00	29.66	2,296	5,750,469	39.93	19.50	22.29
中部		1,403	2,637,139	53.20	29.74	33.60	1,149	2,626,342	43.75	21.30	24.35
南部		1,826	3,170,322	57.60	29.77	33.66	1,430	3,178,976	44.98	21.02	23.69
東部		140	276,643	50.61	26.56	29.41	111	266,385	41.67	19.00	21.74
金馬地區		21	77,511	27.09	13.97	16.10	7	75,763	9.24	5.52	6.04
直轄市		4,244	8,031,174	52.84	29.04	33.04	3,471	8,350,965	41.56	20.51	23.41
中央政府 管轄市		246	535,198	45.96	26.11	29.75	249	550,188	45.26	21.70	24.89
縣轄市		261	792,262	32.94	18.76	21.11	238	805,316	29.55	13.64	15.85
鎮		401	855,169	46.89	23.35	26.73	347	827,785	41.92	18.73	21.18
鄉		884	1,491,383	59.27	29.47	33.03	688	1,363,681	50.45	22.97	25.73
山地鄉 ⁴		29	105,407	27.51	18.43	20.21	23	96,738	23.78	15.44	17.31
總計		6,038	11,705,186	51.58	27.83	31.56	4,993	11,897,935	41.97	20.19	22.98

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		372	1,260,049	29.52	15.31	17.02	267	1,384,992	19.28	8.85	9.86
新北市		618	1,963,658	31.47	18.10	20.09	409	2,055,038	19.90	10.48	11.75
桃園市		307	1,116,111	27.51	17.72	19.61	177	1,132,926	15.62	9.03	10.24
台中市		449	1,384,164	32.44	20.73	22.99	273	1,431,097	19.08	10.87	12.30
台南市		364	937,342	38.83	21.06	23.68	234	943,564	24.80	12.54	13.98
高雄市		515	1,369,850	37.60	20.84	23.07	322	1,403,348	22.95	11.62	12.98
基隆市		63	184,139	34.21	18.38	20.31	39	184,754	21.11	10.12	11.47
新竹市		68	221,265	30.73	19.58	22.18	35	227,538	15.38	9.14	10.35
嘉義市		47	129,794	36.21	20.67	23.03	27	137,896	19.58	9.23	10.33
新竹縣		87	287,837	30.23	18.92	21.35	54	276,096	19.56	12.14	13.30
宜蘭縣		58	229,222	25.30	14.29	15.70	47	224,956	20.89	10.18	11.51
苗栗縣		101	281,290	35.91	18.73	20.79	48	264,169	18.17	9.32	10.25
彰化縣		205	647,449	31.66	17.75	20.00	134	625,353	21.43	10.25	11.70
南投縣		96	252,705	37.99	19.68	21.54	51	241,407	21.13	10.07	11.36
雲林縣		104	352,821	29.48	13.85	16.19	70	328,485	21.31	10.41	11.70
嘉義縣		91	261,238	34.83	15.88	18.00	62	241,875	25.63	12.18	13.18
屏東縣		170	417,815	40.69	20.11	22.48	105	401,369	26.16	12.27	13.40
澎湖縣		19	54,283	35.00	19.79	21.37	8	50,924	15.71	6.70	7.44
花蓮縣		62	165,073	37.56	20.11	23.07	26	161,174	16.13	7.59	8.33
台東縣		47	111,570	42.13	23.55	25.53	21	105,211	19.96	11.20	12.21
金門縣		9	70,010	12.86	7.00	7.70	6	70,175	8.55	3.07	3.84
連江縣		1	7,501	13.33	10.91	12.00	1	5,588	17.90	3.79	4.55
北部		1,674	5,543,571	30.20	17.31	19.22	1,076	5,750,469	18.71	9.68	10.84
中部		854	2,637,139	32.38	18.93	21.16	528	2,626,342	20.10	10.52	11.90
南部		1,206	3,170,322	38.04	20.35	22.71	758	3,178,976	23.84	11.81	13.10
東部		109	276,643	39.40	21.38	23.94	47	266,385	17.64	9.04	9.89
金馬地區		10	77,511	12.90	7.48	8.25	7	75,763	9.24	3.18	3.97
直轄市		2,625	8,031,174	32.69	18.85	20.95	1,682	8,350,965	20.14	10.49	11.76
中央政府 管轄市		178	535,198	33.26	19.30	21.59	101	550,188	18.36	9.53	10.78
縣轄市		158	792,262	19.94	11.91	13.08	111	805,316	13.78	7.30	8.04
鎮		264	855,169	30.87	16.20	18.29	143	827,785	17.28	8.38	9.46
鄉		628	1,491,383	42.11	21.20	23.81	379	1,363,681	27.79	13.21	14.65
山地鄉 ⁴		27	105,407	25.61	15.76	18.92	16	96,738	16.54	10.51	11.20
總計		3,855	11,705,186	32.93	18.57	20.70	2,416	11,897,935	20.31	10.39	11.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		591	1,260,049	46.90	22.85	25.59	263	1,384,992	18.99	7.33	8.65
新北市		1,106	1,963,658	56.32	31.91	35.43	490	2,055,038	23.84	11.37	13.38
桃園市		559	1,116,111	50.08	33.03	36.75	236	1,132,926	20.83	11.42	13.48
台中市		826	1,384,164	59.68	37.03	41.39	371	1,431,097	25.92	13.57	15.90
台南市		786	937,342	83.85	45.19	50.09	380	943,564	40.27	16.79	19.74
高雄市		1,134	1,369,850	82.78	45.57	50.14	533	1,403,348	37.98	17.15	19.74
基隆市		109	184,139	59.19	29.94	33.91	55	184,754	29.77	14.28	15.69
新竹市		107	221,265	48.36	32.47	35.81	56	227,538	24.61	12.86	15.07
嘉義市		121	129,794	93.22	52.73	57.89	70	137,896	50.76	21.70	25.91
新竹縣		119	287,837	41.34	25.04	28.33	39	276,096	14.13	7.29	8.39
宜蘭縣		181	229,222	78.96	40.82	45.10	99	224,956	44.01	17.95	20.76
苗栗縣		215	281,290	76.43	41.98	46.04	81	264,169	30.66	12.73	14.97
彰化縣		473	647,449	73.06	40.16	44.08	201	625,353	32.14	13.97	16.22
南投縣		170	252,705	67.27	34.17	38.05	77	241,407	31.90	13.13	14.54
雲林縣		388	352,821	109.97	54.61	61.22	158	328,485	48.10	19.23	21.64
嘉義縣		277	261,238	106.03	48.93	54.73	125	241,875	51.68	17.00	19.64
屏東縣		327	417,815	78.26	40.80	44.69	148	401,369	36.87	16.05	18.00
澎湖縣		35	54,283	64.48	34.22	37.00	15	50,924	29.46	10.85	13.01
花蓮縣		93	165,073	56.34	29.39	32.67	67	161,174	41.57	16.93	19.59
台東縣		103	111,570	92.32	49.29	54.78	43	105,211	40.87	17.87	19.74
金門縣		31	70,010	44.28	25.28	28.36	5	70,175	7.13	3.45	4.47
連江縣		4	7,501	53.33	33.92	38.55	2	5,588	35.79	19.69	20.07
北部		2,987	5,543,571	53.88	30.44	33.85	1,319	5,750,469	22.94	10.55	12.37
中部		1,857	2,637,139	70.42	40.10	44.66	807	2,626,342	30.73	14.27	16.48
南部		2,680	3,170,322	84.53	45.22	49.93	1,271	3,178,976	39.98	17.01	19.68
東部		196	276,643	70.85	37.48	41.66	110	266,385	41.29	17.28	19.61
金馬地區		35	77,511	45.15	26.02	29.17	7	75,763	9.24	4.83	5.84
直轄市		5,002	8,031,174	62.28	35.41	39.29	2,273	8,350,965	27.22	12.62	14.77
中央政府 管轄市		337	535,198	62.97	36.33	40.35	181	550,188	32.90	15.48	18.00
縣轄市		315	792,262	39.76	22.89	25.66	164	805,316	20.36	9.69	11.11
鎮		542	855,169	63.38	33.15	36.78	258	827,785	31.17	12.91	14.87
鄉		1,559	1,491,383	104.53	52.75	58.26	638	1,363,681	46.79	18.56	21.12
山地鄉 ⁴		59	105,407	55.97	35.67	38.68	35	96,738	36.18	20.97	23.15
總計		7,757	11,705,186	66.27	36.89	40.95	3,515	11,897,935	29.54	13.28	15.44

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		64	1,260,049	5.08	2.36	2.75	57	1,384,992	4.12	1.38	1.68
新北市		98	1,963,658	4.99	2.70	3.14	99	2,055,038	4.82	2.22	2.62
桃園市		48	1,116,111	4.30	2.69	3.11	37	1,132,926	3.27	1.76	2.04
台中市		66	1,384,164	4.77	2.86	3.30	60	1,431,097	4.19	2.19	2.51
台南市		66	937,342	7.04	3.44	4.02	57	943,564	6.04	2.55	2.91
高雄市		82	1,369,850	5.99	3.12	3.55	65	1,403,348	4.63	2.03	2.34
基隆市		10	184,139	5.43	2.57	2.90	13	184,754	7.04	3.07	3.53
新竹市		7	221,265	3.16	2.01	2.20	7	227,538	3.08	1.59	1.85
嘉義市		9	129,794	6.93	4.33	4.74	3	137,896	2.18	0.69	0.94
新竹縣		15	287,837	5.21	2.95	3.62	11	276,096	3.98	2.03	2.36
宜蘭縣		9	229,222	3.93	1.92	2.32	6	224,956	2.67	1.04	1.21
苗栗縣		19	281,290	6.75	2.75	3.54	10	264,169	3.79	1.70	2.00
彰化縣		30	647,449	4.63	2.27	2.68	27	625,353	4.32	1.84	2.16
南投縣		9	252,705	3.56	1.66	1.95	21	241,407	8.70	2.77	3.52
雲林縣		20	352,821	5.67	2.77	3.13	22	328,485	6.70	2.86	3.32
嘉義縣		17	261,238	6.51	2.58	2.97	14	241,875	5.79	2.01	2.34
屏東縣		36	417,815	8.62	4.09	4.77	27	401,369	6.73	2.53	2.94
澎湖縣		2	54,283	3.68	2.55	2.55	2	50,924	3.93	2.68	3.12
花蓮縣		9	165,073	5.45	2.65	2.96	4	161,174	2.48	0.89	0.98
台東縣		5	111,570	4.48	2.20	2.35	8	105,211	7.60	2.65	3.29
金門縣		1	70,010	1.43	0.59	0.68	1	70,175	1.43	0.34	0.41
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		270	5,543,571	4.87	2.58	3.02	240	5,750,469	4.17	1.84	2.17
中部		125	2,637,139	4.74	2.55	2.95	130	2,626,342	4.95	2.25	2.64
南部		212	3,170,322	6.69	3.34	3.84	168	3,178,976	5.28	2.19	2.53
東部		14	276,643	5.06	2.47	2.72	12	266,385	4.50	1.59	1.90
金馬地區		1	77,511	1.29	0.54	0.62	1	75,763	1.32	0.31	0.38
直轄市		424	8,031,174	5.28	2.83	3.27	375	8,350,965	4.49	2.01	2.35
中央政府 管轄市		26	535,198	4.86	2.78	3.08	23	550,188	4.18	1.91	2.24
縣轄市		25	792,262	3.16	1.77	2.05	22	805,316	2.73	1.21	1.44
鎮		41	855,169	4.79	2.07	2.61	36	827,785	4.35	1.60	1.92
鄉		106	1,491,383	7.11	3.28	3.75	95	1,363,681	6.97	2.78	3.25
山地鄉 ⁴		4	105,407	3.79	2.36	2.58	3	96,738	3.10	1.68	2.00
總計		622	11,705,186	5.31	2.77	3.21	551	11,897,935	4.63	2.01	2.35

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

胰 C25

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		172	1,260,049	13.65	6.45	7.25	174	1,384,992	12.56	5.39	6.04
新北市		231	1,963,658	11.76	6.55	7.39	215	2,055,038	10.46	5.24	6.05
桃園市		113	1,116,111	10.12	6.39	7.14	103	1,132,926	9.09	5.13	5.89
台中市		183	1,384,164	13.22	8.11	9.22	159	1,431,097	11.11	5.86	6.84
台南市		131	937,342	13.98	7.27	8.14	132	943,564	13.99	6.29	7.15
高雄市		197	1,369,850	14.38	7.52	8.77	150	1,403,348	10.69	5.00	5.69
基隆市		28	184,139	15.21	7.42	8.22	19	184,754	10.28	4.02	4.78
新竹市		17	221,265	7.68	4.99	5.48	20	227,538	8.79	5.16	5.80
嘉義市		18	129,794	13.87	7.48	8.86	16	137,896	11.60	6.68	7.10
新竹縣		37	287,837	12.85	8.60	9.72	23	276,096	8.33	5.54	6.11
宜蘭縣		33	229,222	14.40	7.57	8.69	28	224,956	12.45	5.08	5.92
苗栗縣		46	281,290	16.35	8.81	9.97	23	264,169	8.71	4.07	4.61
彰化縣		65	647,449	10.04	5.31	5.98	60	625,353	9.59	4.21	4.71
南投縣		40	252,705	15.83	7.54	8.38	24	241,407	9.94	4.40	5.00
雲林縣		37	352,821	10.49	5.00	5.64	26	328,485	7.92	3.94	4.20
嘉義縣		44	261,238	16.84	8.37	9.21	25	241,875	10.34	4.67	5.04
屏東縣		61	417,815	14.60	7.63	8.50	58	401,369	14.45	6.82	7.64
澎湖縣		7	54,283	12.90	7.55	7.99	1	50,924	1.96	0.67	1.00
花蓮縣		30	165,073	18.17	8.55	10.10	20	161,174	12.41	4.76	5.71
台東縣		17	111,570	15.24	7.80	8.93	13	105,211	12.36	4.91	5.62
金門縣		2	70,010	2.86	1.33	1.23	4	70,175	5.70	2.91	3.09
連江縣		1	7,501	13.33	10.05	11.06	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		677	5,543,571	12.21	6.76	7.61	605	5,750,469	10.52	5.14	5.87
中部		325	2,637,139	12.32	6.85	7.73	269	2,626,342	10.24	4.96	5.63
南部		458	3,170,322	14.45	7.48	8.50	382	3,178,976	12.02	5.55	6.26
東部		47	276,643	16.99	8.30	9.68	33	266,385	12.39	4.80	5.67
金馬地區		3	77,511	3.87	2.14	2.14	4	75,763	5.28	2.68	2.85
直轄市		1,027	8,031,174	12.79	7.02	7.96	933	8,350,965	11.17	5.40	6.18
中央政府 管轄市		63	535,198	11.77	6.62	7.47	55	550,188	10.00	5.14	5.77
縣轄市		63	792,262	7.95	4.48	5.15	50	805,316	6.21	2.91	3.29
鎮		73	855,169	8.54	4.38	5.03	64	827,785	7.73	3.79	4.31
鄉		284	1,491,383	19.04	9.69	10.77	191	1,363,681	14.01	6.31	7.00
山地鄉 ⁴		13	105,407	12.33	8.18	9.48	6	96,738	6.20	3.27	3.98
總計		1,510	11,705,186	12.90	6.99	7.91	1,293	11,897,935	10.87	5.19	5.90

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		9	1,260,049	0.71	0.57	0.57	35	1,384,992	2.53	1.17	1.32
新北市		19	1,963,658	0.97	0.55	0.61	35	2,055,038	1.70	0.90	1.00
桃園市		10	1,116,111	0.90	0.67	0.73	26	1,132,926	2.29	1.65	1.73
台中市		10	1,384,164	0.72	0.51	0.53	25	1,431,097	1.75	1.07	1.19
台南市		9	937,342	0.96	0.77	0.76	15	943,564	1.59	1.10	1.11
高雄市		13	1,369,850	0.95	1.01	0.93	21	1,403,348	1.50	0.81	0.87
基隆市		2	184,139	1.09	0.44	0.58	4	184,754	2.17	0.91	0.97
新竹市		1	221,265	0.45	0.30	0.30	4	227,538	1.76	1.00	1.16
嘉義市		2	129,794	1.54	2.15	2.08	2	137,896	1.45	0.86	0.79
新竹縣		2	287,837	0.69	0.56	0.63	1	276,096	0.36	0.34	0.43
宜蘭縣		1	229,222	0.44	0.24	0.24	3	224,956	1.33	0.84	0.90
苗栗縣		2	281,290	0.71	0.33	0.39	5	264,169	1.89	1.41	1.58
彰化縣		8	647,449	1.24	1.09	1.02	8	625,353	1.28	0.65	0.72
南投縣		1	252,705	0.40	0.19	0.21	3	241,407	1.24	0.59	0.69
雲林縣		1	352,821	0.28	0.09	0.14	7	328,485	2.13	0.49	0.61
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	3	241,875	1.24	0.63	0.67
屏東縣		4	417,815	0.96	0.78	0.81	5	401,369	1.25	0.50	0.57
澎湖縣		1	54,283	1.84	1.40	1.68	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	1	161,174	0.62	0.32	0.30
台東縣		1	111,570	0.90	0.84	1.07	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,010	1.43	1.37	1.36	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		46	5,543,571	0.83	0.54	0.59	113	5,750,469	1.97	1.13	1.23
中部		20	2,637,139	0.76	0.56	0.57	43	2,626,342	1.64	0.88	1.00
南部		29	3,170,322	0.91	0.90	0.86	46	3,178,976	1.45	0.84	0.87
東部		1	276,643	0.36	0.34	0.43	1	266,385	0.38	0.20	0.18
金馬地區		1	77,511	1.29	1.23	1.22	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		70	8,031,174	0.87	0.65	0.67	157	8,350,965	1.88	1.09	1.18
中央政府 管轄市		5	535,198	0.93	0.78	0.82	10	550,188	1.82	0.93	0.99
縣轄市		5	792,262	0.63	0.69	0.61	5	805,316	0.62	0.34	0.34
鎮		8	855,169	0.94	0.68	0.71	15	827,785	1.81	0.79	0.93
鄉		9	1,491,383	0.60	0.36	0.42	16	1,363,681	1.17	0.64	0.71
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		97	11,705,186	0.83	0.63	0.64	203	11,897,935	1.71	0.97	1.05

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 C26

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		3	1,260,049	0.24	0.09	0.12	0	1,384,992	0.00	0.00	0.00
新北市		1	1,963,658	0.05	0.03	0.04	3	2,055,038	0.15	0.07	0.08
桃園市		2	1,116,111	0.18	0.07	0.08	1	1,132,926	0.09	0.04	0.04
台中市		0	1,384,164	0.00	0.00	0.00	1	1,431,097	0.07	0.04	0.05
台南市		2	937,342	0.21	0.14	0.15	0	943,564	0.00	0.00	0.00
高雄市		2	1,369,850	0.15	0.05	0.09	0	1,403,348	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	184,139	0.00	0.00	0.00	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	221,265	0.00	0.00	0.00	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		1	129,794	0.77	0.23	0.42	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		1	287,837	0.35	0.25	0.23	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	281,290	0.36	0.22	0.25	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	647,449	0.00	0.00	0.00	0	625,353	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	0	241,407	0.00	0.00	0.00
雲林縣		2	352,821	0.57	0.26	0.32	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		0	417,815	0.00	0.00	0.00	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		1	165,073	0.61	0.24	0.36	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		8	5,543,571	0.14	0.07	0.08	4	5,750,469	0.07	0.03	0.04
中部		2	2,637,139	0.08	0.04	0.05	1	2,626,342	0.04	0.03	0.03
南部		5	3,170,322	0.16	0.07	0.09	0	3,178,976	0.00	0.00	0.00
東部		1	276,643	0.36	0.14	0.21	0	266,385	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		10	8,031,174	0.12	0.06	0.08	5	8,350,965	0.06	0.03	0.03
中央政府 管轄市		1	535,198	0.19	0.07	0.12	0	550,188	0.00	0.00	0.00
縣轄市		1	792,262	0.13	0.06	0.08	0	805,316	0.00	0.00	0.00
鎮		0	855,169	0.00	0.00	0.00	0	827,785	0.00	0.00	0.00
鄉		4	1,491,383	0.27	0.14	0.15	0	1,363,681	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		16	11,705,186	0.14	0.07	0.08	5	11,897,935	0.04	0.02	0.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		19	1,260,049	1.51	0.78	0.91	10	1,384,992	0.72	0.41	0.44
新北市		35	1,963,658	1.78	1.16	1.31	17	2,055,038	0.83	0.51	0.56
桃園市		12	1,116,111	1.08	0.65	0.80	8	1,132,926	0.71	0.45	0.47
台中市		20	1,384,164	1.44	0.98	1.07	4	1,431,097	0.28	0.13	0.15
台南市		20	937,342	2.13	1.24	1.35	5	943,564	0.53	0.26	0.29
高雄市		18	1,369,850	1.31	0.94	0.94	10	1,403,348	0.71	0.41	0.44
基隆市		4	184,139	2.17	1.05	1.23	2	184,754	1.08	0.23	0.41
新竹市		7	221,265	3.16	2.21	2.61	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		1	129,794	0.77	0.41	0.47	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		2	287,837	0.69	0.39	0.41	5	276,096	1.81	1.22	1.38
宜蘭縣		6	229,222	2.62	1.37	1.46	2	224,956	0.89	0.44	0.50
苗栗縣		5	281,290	1.78	0.67	0.90	4	264,169	1.51	1.19	1.20
彰化縣		5	647,449	0.77	0.42	0.44	5	625,353	0.80	0.55	0.61
南投縣		3	252,705	1.19	0.83	0.92	3	241,407	1.24	0.81	0.98
雲林縣		7	352,821	1.98	1.14	1.19	1	328,485	0.30	0.23	0.25
嘉義縣		6	261,238	2.30	0.96	1.13	3	241,875	1.24	0.62	0.68
屏東縣		7	417,815	1.68	0.91	0.93	1	401,369	0.25	0.20	0.24
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	165,073	1.21	0.85	0.88	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		2	111,570	1.79	0.99	0.92	1	105,211	0.95	0.62	0.66
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		90	5,543,571	1.62	0.96	1.12	48	5,750,469	0.83	0.50	0.55
中部		35	2,637,139	1.33	0.84	0.90	13	2,626,342	0.49	0.30	0.34
南部		52	3,170,322	1.64	1.00	1.06	19	3,178,976	0.60	0.33	0.36
東部		4	276,643	1.45	0.89	0.88	1	266,385	0.38	0.25	0.27
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		124	8,031,174	1.54	0.97	1.08	54	8,350,965	0.65	0.37	0.41
中央政府 管轄市		12	535,198	2.24	1.34	1.57	2	550,188	0.36	0.09	0.16
縣轄市		9	792,262	1.14	0.67	0.71	1	805,316	0.12	0.07	0.08
鎮		8	855,169	0.94	0.54	0.63	9	827,785	1.09	0.85	0.95
鄉		28	1,491,383	1.88	0.95	1.02	15	1,363,681	1.10	0.63	0.70
山地鄉 ⁴		2	105,407	1.90	1.22	1.58	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		181	11,705,186	1.55	0.94	1.04	81	11,897,935	0.68	0.40	0.45

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		78	1,260,049	6.19	3.01	3.43	7	1,384,992	0.51	0.23	0.25
新北市		132	1,963,658	6.72	3.83	4.24	11	2,055,038	0.54	0.29	0.32
桃園市		61	1,116,111	5.47	3.48	3.96	5	1,132,926	0.44	0.26	0.27
台中市		79	1,384,164	5.71	3.56	3.99	2	1,431,097	0.14	0.07	0.08
台南市		63	937,342	6.72	3.77	4.14	5	943,564	0.53	0.29	0.30
高雄市		108	1,369,850	7.88	4.31	4.62	8	1,403,348	0.57	0.24	0.29
基隆市		13	184,139	7.06	3.93	4.44	1	184,754	0.54	0.26	0.24
新竹市		7	221,265	3.16	2.07	2.26	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		7	129,794	5.39	3.03	3.29	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		13	287,837	4.52	2.95	3.11	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		12	229,222	5.24	2.71	2.94	3	224,956	1.33	0.72	0.68
苗栗縣		32	281,290	11.38	6.38	7.04	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		62	647,449	9.58	5.25	5.85	1	625,353	0.16	0.09	0.09
南投縣		20	252,705	7.91	4.01	4.39	1	241,407	0.41	0.08	0.09
雲林縣		19	352,821	5.39	2.70	2.93	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		17	261,238	6.51	3.39	3.51	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		41	417,815	9.81	5.11	5.49	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		2	54,283	3.68	2.35	2.53	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		20	165,073	12.12	6.66	7.56	3	161,174	1.86	0.95	0.96
台東縣		10	111,570	8.96	4.40	4.98	1	105,211	0.95	0.48	0.55
金門縣		2	70,010	2.86	1.34	1.62	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		348	5,543,571	6.28	3.54	3.95	27	5,750,469	0.47	0.25	0.26
中部		180	2,637,139	6.83	3.88	4.31	4	2,626,342	0.15	0.07	0.07
南部		238	3,170,322	7.51	4.10	4.42	13	3,178,976	0.41	0.19	0.21
東部		30	276,643	10.84	5.74	6.51	4	266,385	1.50	0.76	0.79
金馬地區		2	77,511	2.58	1.23	1.50	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		521	8,031,174	6.49	3.68	4.08	38	8,350,965	0.46	0.23	0.26
中央政府 管轄市		27	535,198	5.04	2.92	3.24	1	550,188	0.18	0.11	0.10
縣轄市		30	792,262	3.79	2.22	2.52	1	805,316	0.12	0.03	0.04
鎮		53	855,169	6.20	3.34	3.63	1	827,785	0.12	0.02	0.03
鄉		167	1,491,383	11.20	5.74	6.25	7	1,363,681	0.51	0.30	0.29
山地鄉 ⁴		6	105,407	5.69	3.75	4.66	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		798	11,705,186	6.82	3.81	4.20	48	11,897,935	0.40	0.21	0.22

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		961	1,260,049	76.27	36.12	41.28	1,098	1,384,992	79.28	36.90	41.32
新北市		1,479	1,963,658	75.32	41.37	47.41	1,327	2,055,038	64.57	32.95	36.84
桃園市		687	1,116,111	61.55	38.91	44.36	572	1,132,926	50.49	29.65	33.01
台中市		933	1,384,164	67.41	40.72	46.33	797	1,431,097	55.69	31.10	34.67
台南市		773	937,342	82.47	42.16	48.07	645	943,564	68.36	33.80	37.30
高雄市		1,101	1,369,850	80.37	41.89	47.09	818	1,403,348	58.29	28.20	31.35
基隆市		160	184,139	86.89	41.70	47.40	108	184,754	58.46	26.16	29.37
新竹市		153	221,265	69.15	43.55	50.71	148	227,538	65.04	38.26	43.37
嘉義市		125	129,794	96.31	51.94	59.07	95	137,896	68.89	35.71	39.83
新竹縣		179	287,837	62.19	37.02	42.37	148	276,096	53.60	33.23	36.24
宜蘭縣		198	229,222	86.38	43.07	48.87	124	224,956	55.12	25.97	29.07
苗栗縣		208	281,290	73.95	35.93	41.35	145	264,169	54.89	29.52	32.77
彰化縣		555	647,449	85.72	44.19	50.53	424	625,353	67.80	36.00	39.20
南投縣		180	252,705	71.23	34.69	38.79	134	241,407	55.51	25.95	28.70
雲林縣		319	352,821	90.41	43.54	48.70	206	328,485	62.71	29.28	32.91
嘉義縣		246	261,238	94.17	40.88	46.91	171	241,875	70.70	29.01	32.79
屏東縣		312	417,815	74.67	36.44	40.64	218	401,369	54.31	24.01	27.20
澎湖縣		58	54,283	106.85	57.02	63.67	43	50,924	84.44	47.91	51.27
花蓮縣		118	165,073	71.48	33.63	39.53	76	161,174	47.15	22.28	25.06
台東縣		82	111,570	73.50	37.16	41.72	68	105,211	64.63	30.17	32.40
金門縣		18	70,010	25.71	13.16	15.23	18	70,175	25.65	10.72	12.57
連江縣		2	7,501	26.66	19.31	24.94	2	5,588	35.79	22.68	23.74
北部		4,025	5,543,571	72.61	39.17	44.79	3,670	5,750,469	63.82	32.86	36.70
中部		1,987	2,637,139	75.35	41.29	46.83	1,561	2,626,342	59.44	31.31	34.66
南部		2,615	3,170,322	82.48	41.78	47.24	1,990	3,178,976	62.60	30.00	33.37
東部		200	276,643	72.30	35.08	40.43	144	266,385	54.06	25.37	27.93
金馬地區		20	77,511	25.80	13.57	15.89	20	75,763	26.40	11.70	13.53
直轄市		5,934	8,031,174	73.89	40.16	45.72	5,257	8,350,965	62.95	32.21	35.91
中央政府 管轄市		438	535,198	81.84	45.37	52.00	351	550,188	63.80	33.52	37.71
縣轄市		396	792,262	49.98	27.75	31.70	267	805,316	33.15	17.23	19.25
鎮		558	855,169	65.25	31.64	36.03	479	827,785	57.87	28.94	32.15
鄉		1,521	1,491,383	101.99	48.53	54.91	1,031	1,363,681	75.60	36.16	39.89
山地鄉 ⁴		57	105,407	54.08	35.64	39.59	32	96,738	33.08	18.96	20.79
總計		8,847	11,705,186	75.58	40.09	45.61	7,386	11,897,935	62.08	31.46	35.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		7	1,260,049	0.56	0.21	0.26	2	1,384,992	0.14	0.10	0.09
新北市		8	1,963,658	0.41	0.24	0.26	4	2,055,038	0.19	0.10	0.12
桃園市		2	1,116,111	0.18	0.09	0.11	0	1,132,926	0.00	0.00	0.00
台中市		3	1,384,164	0.22	0.13	0.12	0	1,431,097	0.00	0.00	0.00
台南市		5	937,342	0.53	0.23	0.31	0	943,564	0.00	0.00	0.00
高雄市		17	1,369,850	1.24	0.64	0.70	6	1,403,348	0.43	0.22	0.25
基隆市		4	184,139	2.17	0.95	1.15	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		1	221,265	0.45	0.20	0.35	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		2	287,837	0.69	0.38	0.40	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	1	224,956	0.44	0.25	0.23
苗栗縣		5	281,290	1.78	0.93	1.04	2	264,169	0.76	0.41	0.43
彰化縣		2	647,449	0.31	0.20	0.20	1	625,353	0.16	0.05	0.08
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	0	241,407	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	352,821	0.00	0.00	0.00	2	328,485	0.61	0.37	0.34
嘉義縣		4	261,238	1.53	0.51	0.68	1	241,875	0.41	0.20	0.20
屏東縣		1	417,815	0.24	0.12	0.12	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	1	161,174	0.62	0.13	0.23
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	1	105,211	0.95	0.28	0.41
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		29	5,543,571	0.52	0.27	0.32	9	5,750,469	0.16	0.09	0.09
中部		5	2,637,139	0.19	0.11	0.11	3	2,626,342	0.11	0.06	0.06
南部		27	3,170,322	0.85	0.41	0.47	7	3,178,976	0.22	0.11	0.12
東部		0	276,643	0.00	0.00	0.00	2	266,385	0.75	0.19	0.30
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		42	8,031,174	0.52	0.27	0.31	12	8,350,965	0.14	0.08	0.09
中央政府 管轄市		5	535,198	0.93	0.45	0.57	0	550,188	0.00	0.00	0.00
縣轄市		1	792,262	0.13	0.09	0.09	2	805,316	0.25	0.07	0.12
鎮		4	855,169	0.47	0.23	0.26	2	827,785	0.24	0.13	0.13
鄉		9	1,491,383	0.60	0.26	0.30	5	1,363,681	0.37	0.18	0.18
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		61	11,705,186	0.52	0.26	0.30	21	11,897,935	0.18	0.09	0.10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3, C38.8

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		46	1,260,049	3.65	2.57	2.77	27	1,384,992	1.95	1.15	1.26
新北市		63	1,963,658	3.21	2.24	2.39	35	2,055,038	1.70	1.08	1.10
桃園市		29	1,116,111	2.60	1.92	2.00	22	1,132,926	1.94	1.31	1.40
台中市		26	1,384,164	1.88	1.21	1.29	29	1,431,097	2.03	1.24	1.36
台南市		35	937,342	3.73	2.29	2.47	29	943,564	3.07	1.61	1.79
高雄市		41	1,369,850	2.99	1.98	2.13	35	1,403,348	2.49	1.77	1.70
基隆市		4	184,139	2.17	1.14	1.37	6	184,754	3.25	1.77	1.82
新竹市		9	221,265	4.07	2.91	3.33	5	227,538	2.20	1.41	1.55
嘉義市		1	129,794	0.77	0.51	0.55	1	137,896	0.73	0.46	0.49
新竹縣		4	287,837	1.39	1.16	1.18	2	276,096	0.72	0.69	0.74
宜蘭縣		7	229,222	3.05	1.93	1.94	14	224,956	6.22	3.82	4.02
苗栗縣		5	281,290	1.78	1.31	1.32	3	264,169	1.14	0.77	0.81
彰化縣		21	647,449	3.24	2.12	2.29	19	625,353	3.04	1.82	1.99
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	5	241,407	2.07	1.29	1.38
雲林縣		12	352,821	3.40	2.18	2.31	4	328,485	1.22	0.49	0.54
嘉義縣		8	261,238	3.06	1.54	1.60	4	241,875	1.65	0.67	0.75
屏東縣		13	417,815	3.11	1.97	2.05	10	401,369	2.49	1.30	1.42
澎湖縣		1	54,283	1.84	1.58	2.00	1	50,924	1.96	1.07	1.23
花蓮縣		1	165,073	0.61	0.37	0.40	4	161,174	2.48	1.61	1.57
台東縣		2	111,570	1.79	1.18	1.22	4	105,211	3.80	2.45	2.66
金門縣		2	70,010	2.86	1.69	1.75	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		167	5,543,571	3.01	2.11	2.25	114	5,750,469	1.98	1.24	1.32
中部		59	2,637,139	2.24	1.45	1.54	57	2,626,342	2.17	1.28	1.41
南部		99	3,170,322	3.12	1.98	2.12	80	3,178,976	2.52	1.51	1.56
東部		3	276,643	1.08	0.71	0.75	8	266,385	3.00	1.95	2.00
金馬地區		2	77,511	2.58	1.53	1.58	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		240	8,031,174	2.99	2.03	2.17	177	8,350,965	2.12	1.31	1.38
中央政府 管轄市		14	535,198	2.62	1.68	1.93	12	550,188	2.18	1.34	1.43
縣轄市		11	792,262	1.39	1.00	1.07	16	805,316	1.99	1.11	1.17
鎮		27	855,169	3.16	1.99	2.09	19	827,785	2.30	1.34	1.47
鄉		38	1,491,383	2.55	1.65	1.73	35	1,363,681	2.57	1.62	1.73
山地鄉 ⁴		2	105,407	1.90	1.16	1.16	3	96,738	3.10	2.10	2.10
總計		330	11,705,186	2.82	1.89	2.02	259	11,897,935	2.18	1.33	1.41

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		165	1,260,049	13.09	8.73	8.97	136	1,384,992	9.82	5.55	6.03
新北市		255	1,963,658	12.99	10.46	10.83	177	2,055,038	8.61	6.13	6.51
桃園市		138	1,116,111	12.36	10.11	10.44	99	1,132,926	8.74	7.03	7.12
台中市		170	1,384,164	12.28	8.70	9.48	122	1,431,097	8.52	6.30	6.58
台南市		119	937,342	12.70	7.92	8.78	103	943,564	10.92	7.36	7.72
高雄市		173	1,369,850	12.63	8.49	9.02	148	1,403,348	10.55	6.98	7.49
基隆市		25	184,139	13.58	6.94	8.40	13	184,754	7.04	2.68	3.09
新竹市		41	221,265	18.53	12.67	13.92	15	227,538	6.59	3.88	4.21
嘉義市		20	129,794	15.41	10.10	10.97	12	137,896	8.70	5.64	5.98
新竹縣		37	287,837	12.85	10.18	10.75	19	276,096	6.88	5.41	5.60
宜蘭縣		26	229,222	11.34	6.65	7.35	23	224,956	10.22	4.15	4.83
苗栗縣		42	281,290	14.93	8.62	9.37	27	264,169	10.22	8.05	7.79
彰化縣		97	647,449	14.98	11.17	11.62	60	625,353	9.59	6.68	6.94
南投縣		34	252,705	13.45	8.98	9.67	27	241,407	11.18	7.78	8.09
雲林縣		43	352,821	12.19	7.46	8.23	20	328,485	6.09	4.34	4.47
嘉義縣		38	261,238	14.55	7.12	7.98	29	241,875	11.99	6.44	7.30
屏東縣		65	417,815	15.56	8.15	9.33	28	401,369	6.98	3.48	3.94
澎湖縣		3	54,283	5.53	7.06	7.21	1	50,924	1.96	1.21	1.12
花蓮縣		27	165,073	16.36	9.17	10.01	12	161,174	7.45	4.54	4.91
台東縣		9	111,570	8.07	6.09	5.62	9	105,211	8.55	4.39	4.76
金門縣		1	70,010	1.43	0.61	0.73	2	70,175	2.85	1.41	1.30
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		729	5,543,571	13.15	9.73	10.17	509	5,750,469	8.85	5.97	6.29
中部		344	2,637,139	13.04	9.08	9.79	229	2,626,342	8.72	6.24	6.48
南部		418	3,170,322	13.18	8.24	8.98	321	3,178,976	10.10	6.50	6.96
東部		36	276,643	13.01	7.84	8.17	21	266,385	7.88	4.46	4.83
金馬地區		1	77,511	1.29	0.56	0.68	2	75,763	2.64	1.31	1.21
直轄市		1,020	8,031,174	12.70	9.24	9.73	785	8,350,965	9.40	6.49	6.85
中央政府 管轄市		86	535,198	16.07	9.96	11.17	40	550,188	7.27	3.98	4.34
縣轄市		71	792,262	8.96	5.23	5.92	55	805,316	6.83	4.04	4.38
鎮		106	855,169	12.40	7.55	8.26	67	827,785	8.09	6.19	6.23
鄉		245	1,491,383	16.43	11.58	12.09	135	1,363,681	9.90	6.05	6.46
山地鄉 ⁴		11	105,407	10.44	6.36	7.26	9	96,738	9.30	7.56	7.95
總計		1,529	11,705,186	13.06	9.13	9.70	1,083	11,897,935	9.10	6.12	6.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

急性骨髓性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		60	1,260,049	4.76	2.87	3.03	51	1,384,992	3.68	1.88	2.18
新北市		77	1,963,658	3.92	2.63	2.90	72	2,055,038	3.50	2.52	2.63
桃園市		42	1,116,111	3.76	2.88	3.01	39	1,132,926	3.44	2.62	2.79
台中市		46	1,384,164	3.32	2.24	2.51	39	1,431,097	2.73	1.77	1.94
台南市		42	937,342	4.48	2.85	3.17	27	943,564	2.86	1.69	1.87
高雄市		53	1,369,850	3.87	2.24	2.55	47	1,403,348	3.35	2.25	2.33
基隆市		10	184,139	5.43	2.96	3.72	2	184,754	1.08	0.58	0.59
新竹市		6	221,265	2.71	1.79	1.95	4	227,538	1.76	0.79	1.01
嘉義市		7	129,794	5.39	3.02	3.42	2	137,896	1.45	0.34	0.50
新竹縣		11	287,837	3.82	2.57	2.79	8	276,096	2.90	2.28	2.32
宜蘭縣		8	229,222	3.49	2.22	2.43	5	224,956	2.22	0.96	1.07
苗栗縣		11	281,290	3.91	1.91	2.11	6	264,169	2.27	2.48	2.16
彰化縣		31	647,449	4.79	2.86	3.20	17	625,353	2.72	1.95	2.11
南投縣		11	252,705	4.35	1.71	2.16	8	241,407	3.31	1.21	1.32
雲林縣		16	352,821	4.53	2.70	3.00	8	328,485	2.44	1.19	1.40
嘉義縣		12	261,238	4.59	2.14	2.39	15	241,875	6.20	3.76	4.24
屏東縣		21	417,815	5.03	2.62	2.93	10	401,369	2.49	1.12	1.25
澎湖縣		1	54,283	1.84	1.40	1.68	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	165,073	2.42	1.27	1.27	3	161,174	1.86	1.96	1.96
台東縣		5	111,570	4.48	2.01	2.04	3	105,211	2.85	1.15	1.30
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	1	70,175	1.43	0.70	0.65
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		225	5,543,571	4.06	2.67	2.89	187	5,750,469	3.25	2.17	2.32
中部		104	2,637,139	3.94	2.41	2.73	72	2,626,342	2.74	1.68	1.83
南部		136	3,170,322	4.29	2.47	2.78	101	3,178,976	3.18	1.95	2.10
東部		9	276,643	3.25	1.56	1.57	6	266,385	2.25	1.63	1.69
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	1	75,763	1.32	0.65	0.61
直轄市		320	8,031,174	3.98	2.61	2.86	275	8,350,965	3.29	2.15	2.32
中央政府 管轄市		23	535,198	4.30	2.48	2.92	8	550,188	1.45	0.61	0.74
縣轄市		21	792,262	2.65	1.52	1.73	13	805,316	1.61	0.90	1.01
鎮		31	855,169	3.63	2.22	2.41	21	827,785	2.54	2.02	1.96
鄉		79	1,491,383	5.30	2.75	3.08	50	1,363,681	3.67	2.12	2.32
山地鄉 ⁴		2	105,407	1.90	1.02	1.50	3	96,738	3.10	3.45	3.12
總計		474	11,705,186	4.05	2.53	2.79	367	11,897,935	3.08	1.98	2.12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

急性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		17	1,260,049	1.35	2.28	1.86	14	1,384,992	1.01	1.32	1.19
新北市		41	1,963,658	2.09	3.56	3.09	25	2,055,038	1.22	1.44	1.40
桃園市		20	1,116,111	1.79	2.47	2.13	17	1,132,926	1.50	2.15	1.84
台中市		18	1,384,164	1.30	1.58	1.44	17	1,431,097	1.19	1.66	1.43
台南市		14	937,342	1.49	1.59	1.59	12	943,564	1.27	2.05	1.79
高雄市		12	1,369,850	0.88	1.59	1.33	22	1,403,348	1.57	1.55	1.60
基隆市		0	184,139	0.00	0.00	0.00	1	184,754	0.54	0.17	0.26
新竹市		5	221,265	2.26	2.24	2.27	1	227,538	0.44	0.75	0.66
嘉義市		1	129,794	0.77	0.85	0.84	1	137,896	0.73	1.69	1.47
新竹縣		7	287,837	2.43	3.45	3.12	2	276,096	0.72	0.79	0.79
宜蘭縣		1	229,222	0.44	0.71	0.67	1	224,956	0.44	0.26	0.28
苗栗縣		2	281,290	0.71	2.03	1.60	2	264,169	0.76	2.16	1.70
彰化縣		19	647,449	2.93	4.38	3.92	7	625,353	1.12	1.74	1.43
南投縣		3	252,705	1.19	3.26	2.84	3	241,407	1.24	2.45	2.19
雲林縣		1	352,821	0.28	0.77	0.67	2	328,485	0.61	1.25	0.97
嘉義縣		2	261,238	0.77	0.94	0.93	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		5	417,815	1.20	1.00	1.15	1	401,369	0.25	0.13	0.12
澎湖縣		1	54,283	1.84	5.19	4.96	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	165,073	1.21	0.81	0.88	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		3	111,570	2.69	3.82	3.27	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		93	5,543,571	1.68	2.69	2.32	63	5,750,469	1.10	1.48	1.34
中部		41	2,637,139	1.55	2.27	2.04	29	2,626,342	1.10	1.70	1.44
南部		35	3,170,322	1.10	1.49	1.39	36	3,178,976	1.13	1.41	1.34
東部		5	276,643	1.81	1.96	1.80	0	266,385	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		122	8,031,174	1.52	2.31	2.01	107	8,350,965	1.28	1.68	1.53
中央政府 管轄市		6	535,198	1.12	1.20	1.21	3	550,188	0.55	0.85	0.78
縣轄市		5	792,262	0.63	0.56	0.60	4	805,316	0.50	0.60	0.52
鎮		7	855,169	0.82	1.57	1.37	6	827,785	0.72	1.46	1.20
鄉		34	1,491,383	2.28	4.26	3.79	8	1,363,681	0.59	1.10	0.93
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		174	11,705,186	1.49	2.27	2.00	128	11,897,935	1.08	1.47	1.33

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		15	1,260,049	1.19	0.84	0.91	13	1,384,992	0.94	0.47	0.52
新北市		31	1,963,658	1.58	1.13	1.27	20	2,055,038	0.97	0.67	0.74
桃園市		16	1,116,111	1.43	1.10	1.17	3	1,132,926	0.26	0.16	0.17
台中市		20	1,384,164	1.44	1.03	1.17	14	1,431,097	0.98	0.73	0.82
台南市		10	937,342	1.07	0.67	0.71	11	943,564	1.17	0.76	0.82
高雄市		21	1,369,850	1.53	1.17	1.25	12	1,403,348	0.86	0.68	0.73
基隆市		2	184,139	1.09	0.74	0.91	3	184,754	1.62	0.67	0.74
新竹市		4	221,265	1.81	1.20	1.30	2	227,538	0.88	0.53	0.61
嘉義市		2	129,794	1.54	1.71	1.65	2	137,896	1.45	0.76	0.88
新竹縣		1	287,837	0.35	0.11	0.20	1	276,096	0.36	0.27	0.25
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	4	224,956	1.78	0.92	1.02
苗栗縣		2	281,290	0.71	0.23	0.31	3	264,169	1.14	0.56	0.62
彰化縣		12	647,449	1.85	1.34	1.43	11	625,353	1.76	0.97	1.10
南投縣		2	252,705	0.79	0.56	0.63	1	241,407	0.41	0.41	0.52
雲林縣		12	352,821	3.40	2.27	2.47	2	328,485	0.61	0.19	0.21
嘉義縣		4	261,238	1.53	1.14	1.18	2	241,875	0.83	0.58	0.63
屏東縣		4	417,815	0.96	0.62	0.65	4	401,369	1.00	0.74	0.85
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		5	165,073	3.03	2.22	2.36	1	161,174	0.62	0.41	0.44
台東縣		1	111,570	0.90	0.26	0.31	1	105,211	0.95	0.75	0.75
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		71	5,543,571	1.28	0.91	1.00	49	5,750,469	0.85	0.51	0.56
中部		46	2,637,139	1.74	1.23	1.35	28	2,626,342	1.07	0.71	0.80
南部		41	3,170,322	1.29	0.97	1.01	31	3,178,976	0.98	0.69	0.76
東部		6	276,643	2.17	1.42	1.52	2	266,385	0.75	0.54	0.56
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		113	8,031,174	1.41	1.02	1.11	73	8,350,965	0.87	0.60	0.66
中央政府 管轄市		8	535,198	1.49	1.19	1.27	7	550,188	1.27	0.65	0.73
縣轄市		10	792,262	1.26	0.82	0.89	8	805,316	0.99	0.58	0.64
鎮		9	855,169	1.05	0.63	0.71	8	827,785	0.97	0.57	0.66
鄉		24	1,491,383	1.61	1.14	1.21	14	1,363,681	1.03	0.62	0.69
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	1	96,738	1.03	0.80	0.96
總計		164	11,705,186	1.40	1.00	1.09	110	11,897,935	0.92	0.60	0.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

慢性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		16	1,260,049	1.27	0.60	0.69	15	1,384,992	1.08	0.46	0.54
新北市		32	1,963,658	1.63	0.88	1.01	13	2,055,038	0.63	0.32	0.37
桃園市		11	1,116,111	0.99	0.61	0.78	5	1,132,926	0.44	0.26	0.29
台中市		18	1,384,164	1.30	0.81	0.89	9	1,431,097	0.63	0.32	0.39
台南市		7	937,342	0.75	0.40	0.41	11	943,564	1.17	0.60	0.65
高雄市		16	1,369,850	1.17	0.65	0.68	13	1,403,348	0.93	0.42	0.52
基隆市		1	184,139	0.54	0.33	0.37	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		7	221,265	3.16	1.91	2.27	1	227,538	0.44	0.26	0.26
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	1	137,896	0.73	0.38	0.38
新竹縣		7	287,837	2.43	1.76	1.94	2	276,096	0.72	0.51	0.49
宜蘭縣		8	229,222	3.49	1.90	2.01	1	224,956	0.44	0.26	0.28
苗栗縣		4	281,290	1.42	0.81	0.99	4	264,169	1.51	0.61	0.76
彰化縣		6	647,449	0.93	0.41	0.51	2	625,353	0.32	0.17	0.18
南投縣		5	252,705	1.98	0.89	1.05	3	241,407	1.24	0.59	0.70
雲林縣		2	352,821	0.57	0.29	0.34	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		1	261,238	0.38	0.08	0.14	1	241,875	0.41	0.21	0.24
屏東縣		7	417,815	1.68	0.74	0.81	3	401,369	0.75	0.39	0.36
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		2	165,073	1.21	0.64	0.61	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	3	105,211	2.85	1.28	1.42
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		86	5,543,571	1.55	0.84	0.97	41	5,750,469	0.71	0.35	0.40
中部		31	2,637,139	1.18	0.64	0.73	14	2,626,342	0.53	0.26	0.31
南部		31	3,170,322	0.98	0.51	0.54	29	3,178,976	0.91	0.44	0.50
東部		2	276,643	0.72	0.39	0.37	3	266,385	1.13	0.52	0.57
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		100	8,031,174	1.25	0.68	0.77	66	8,350,965	0.79	0.39	0.45
中央政府 管轄市		8	535,198	1.49	0.80	0.94	2	550,188	0.36	0.19	0.19
縣轄市		5	792,262	0.63	0.35	0.37	1	805,316	0.12	0.03	0.04
鎮		11	855,169	1.29	0.68	0.79	7	827,785	0.85	0.42	0.44
鄉		26	1,491,383	1.74	0.82	0.93	11	1,363,681	0.81	0.40	0.44
山地鄉 ⁴		2	105,407	1.90	1.16	1.16	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		150	11,705,186	1.28	0.68	0.77	87	11,897,935	0.73	0.36	0.41

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

骨髓增生性腫瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		26	1,260,049	2.06	1.03	1.20	27	1,384,992	1.95	0.96	1.06
新北市		45	1,963,658	2.29	1.39	1.57	32	2,055,038	1.56	0.84	0.95
桃園市		30	1,116,111	2.69	1.64	1.90	26	1,132,926	2.29	1.44	1.56
台中市		40	1,384,164	2.89	1.83	2.09	20	1,431,097	1.40	0.98	1.01
台南市		25	937,342	2.67	1.35	1.58	20	943,564	2.12	1.35	1.49
高雄市		42	1,369,850	3.07	1.72	1.95	34	1,403,348	2.42	1.42	1.60
基隆市		5	184,139	2.72	1.18	1.48	6	184,754	3.25	1.02	1.27
新竹市		13	221,265	5.88	3.75	4.25	4	227,538	1.76	0.96	0.97
嘉義市		8	129,794	6.16	3.64	4.14	4	137,896	2.90	1.06	1.29
新竹縣		7	287,837	2.43	1.59	1.73	5	276,096	1.81	1.30	1.50
宜蘭縣		2	229,222	0.87	0.52	0.55	3	224,956	1.33	0.61	0.68
苗栗縣		14	281,290	4.98	2.30	2.72	9	264,169	3.41	1.88	2.14
彰化縣		13	647,449	2.01	1.02	1.11	13	625,353	2.08	1.18	1.34
南投縣		8	252,705	3.17	1.79	2.07	7	241,407	2.90	2.07	2.27
雲林縣		8	352,821	2.27	1.08	1.27	4	328,485	1.22	1.18	1.32
嘉義縣		11	261,238	4.21	1.49	1.76	8	241,875	3.31	1.64	1.79
屏東縣		17	417,815	4.07	2.19	2.59	5	401,369	1.25	0.78	0.89
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		8	165,073	4.85	2.34	2.59	6	161,174	3.72	1.56	1.87
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,010	1.43	0.61	0.73	1	70,175	1.43	0.70	0.65
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		142	5,543,571	2.56	1.46	1.67	112	5,750,469	1.95	1.05	1.17
中部		69	2,637,139	2.62	1.50	1.70	44	2,626,342	1.68	1.13	1.22
南部		103	3,170,322	3.25	1.71	1.98	71	3,178,976	2.23	1.29	1.44
東部		8	276,643	2.89	1.40	1.54	6	266,385	2.25	0.94	1.12
金馬地區		1	77,511	1.29	0.56	0.68	1	75,763	1.32	0.65	0.61
直轄市		208	8,031,174	2.59	1.50	1.72	159	8,350,965	1.90	1.12	1.23
中央政府 管轄市		26	535,198	4.86	2.73	3.15	14	550,188	2.54	1.01	1.17
縣轄市		17	792,262	2.15	1.15	1.30	18	805,316	2.24	1.29	1.45
鎮		25	855,169	2.92	1.45	1.67	14	827,785	1.69	1.24	1.40
鄉		47	1,491,383	3.15	1.58	1.82	29	1,363,681	2.13	1.20	1.34
山地鄉 ⁴		3	105,407	2.85	1.76	1.87	3	96,738	3.10	2.23	2.47
總計		324	11,705,186	2.77	1.54	1.77	235	11,897,935	1.98	1.14	1.26

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

骨髓分化不良症候群 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		28	1,260,049	2.22	0.98	1.15	15	1,384,992	1.08	0.41	0.49
新北市		29	1,963,658	1.48	0.86	0.99	15	2,055,038	0.73	0.34	0.42
桃園市		18	1,116,111	1.61	1.34	1.37	9	1,132,926	0.79	0.40	0.47
台中市		26	1,384,164	1.88	1.12	1.30	21	1,431,097	1.47	0.76	0.90
台南市		21	937,342	2.24	1.06	1.31	19	943,564	2.01	0.81	0.98
高雄市		28	1,369,850	2.04	1.07	1.22	18	1,403,348	1.28	0.57	0.62
基隆市		5	184,139	2.72	1.36	1.48	1	184,754	0.54	0.23	0.23
新竹市		6	221,265	2.71	1.78	1.89	2	227,538	0.88	0.44	0.53
嘉義市		2	129,794	1.54	0.88	0.91	2	137,896	1.45	1.41	1.46
新竹縣		4	287,837	1.39	0.71	0.97	1	276,096	0.36	0.27	0.25
宜蘭縣		7	229,222	3.05	1.31	1.69	9	224,956	4.00	1.15	1.49
苗栗縣		8	281,290	2.84	1.23	1.52	2	264,169	0.76	0.29	0.33
彰化縣		16	647,449	2.47	1.17	1.44	8	625,353	1.28	0.54	0.65
南投縣		5	252,705	1.98	0.76	0.93	4	241,407	1.66	0.98	0.99
雲林縣		3	352,821	0.85	0.28	0.37	4	328,485	1.22	0.53	0.57
嘉義縣		8	261,238	3.06	1.34	1.57	2	241,875	0.83	0.15	0.25
屏東縣		9	417,815	2.15	0.85	1.01	4	401,369	1.00	0.27	0.39
澎湖縣		1	54,283	1.84	0.47	0.57	1	50,924	1.96	1.21	1.12
花蓮縣		6	165,073	3.63	1.90	2.31	2	161,174	1.24	0.61	0.64
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	2	105,211	1.90	1.21	1.29
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		105	5,543,571	1.89	1.09	1.24	54	5,750,469	0.94	0.39	0.47
中部		50	2,637,139	1.90	0.98	1.17	37	2,626,342	1.41	0.69	0.79
南部		69	3,170,322	2.18	1.05	1.23	46	3,178,976	1.45	0.62	0.72
東部		6	276,643	2.17	1.12	1.37	4	266,385	1.50	0.84	0.89
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		150	8,031,174	1.87	1.06	1.21	97	8,350,965	1.16	0.52	0.61
中央政府 管轄市		13	535,198	2.43	1.43	1.52	5	550,188	0.91	0.63	0.67
縣轄市		11	792,262	1.39	0.74	0.90	10	805,316	1.24	0.56	0.65
鎮		22	855,169	2.57	0.97	1.26	8	827,785	0.97	0.41	0.45
鄉		34	1,491,383	2.28	1.02	1.22	21	1,363,681	1.54	0.59	0.70
山地鄉 ⁴		4	105,407	3.79	2.42	2.73	2	96,738	2.07	1.07	1.40
總計		230	11,705,186	1.96	1.05	1.22	141	11,897,935	1.19	0.52	0.61

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		14	1,260,049	1.11	0.91	0.94	9	1,384,992	0.65	0.62	0.65
新北市		16	1,963,658	0.81	0.81	0.84	10	2,055,038	0.49	0.65	0.60
桃園市		13	1,116,111	1.16	1.24	1.20	7	1,132,926	0.62	0.49	0.52
台中市		11	1,384,164	0.79	0.85	0.85	11	1,431,097	0.77	0.59	0.64
台南市		9	937,342	0.96	0.99	0.99	7	943,564	0.74	0.72	0.76
高雄市		14	1,369,850	1.02	1.10	1.11	10	1,403,348	0.71	0.73	0.72
基隆市		2	184,139	1.09	1.94	1.74	2	184,754	1.08	1.58	1.56
新竹市		3	221,265	1.36	1.28	1.27	2	227,538	0.88	0.89	0.96
嘉義市		1	129,794	0.77	0.43	0.43	4	137,896	2.90	2.93	2.84
新竹縣		1	287,837	0.35	0.25	0.29	2	276,096	0.72	1.08	1.01
宜蘭縣		4	229,222	1.75	1.04	1.36	1	224,956	0.44	0.35	0.39
苗栗縣		0	281,290	0.00	0.00	0.00	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		3	647,449	0.46	0.43	0.42	3	625,353	0.48	0.49	0.51
南投縣		2	252,705	0.79	1.10	1.09	1	241,407	0.41	0.20	0.23
雲林縣		0	352,821	0.00	0.00	0.00	2	328,485	0.61	0.79	0.78
嘉義縣		1	261,238	0.38	0.62	0.59	2	241,875	0.83	1.49	1.56
屏東縣		5	417,815	1.20	0.99	1.09	3	401,369	0.75	0.32	0.44
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	1	161,174	0.62	0.31	0.34
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		53	5,543,571	0.96	0.93	0.95	33	5,750,469	0.57	0.62	0.62
中部		16	2,637,139	0.61	0.65	0.65	17	2,626,342	0.65	0.56	0.59
南部		30	3,170,322	0.95	0.97	0.98	26	3,178,976	0.82	0.81	0.83
東部		0	276,643	0.00	0.00	0.00	1	266,385	0.38	0.19	0.20
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		77	8,031,174	0.96	0.98	0.98	54	8,350,965	0.65	0.62	0.63
中央政府 管轄市		6	535,198	1.12	1.16	1.10	8	550,188	1.45	1.54	1.55
縣轄市		2	792,262	0.25	0.22	0.23	3	805,316	0.37	0.29	0.34
鎮		5	855,169	0.58	0.40	0.49	4	827,785	0.48	0.36	0.39
鄉		9	1,491,383	0.60	0.65	0.67	8	1,363,681	0.59	0.84	0.83
山地鄉 ⁴		2	105,407	1.90	1.33	1.47	1	96,738	1.03	0.48	0.72
總計		99	11,705,186	0.85	0.85	0.86	77	11,897,935	0.65	0.64	0.65

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47，C49

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		37	1,260,049	2.94	1.78	1.99	28	1,384,992	2.02	1.22	1.30
新北市		56	1,963,658	2.85	2.25	2.31	46	2,055,038	2.24	1.40	1.51
桃園市		30	1,116,111	2.69	2.15	2.29	27	1,132,926	2.38	1.74	1.90
台中市		38	1,384,164	2.75	1.82	2.06	31	1,431,097	2.17	1.44	1.58
台南市		30	937,342	3.20	2.40	2.56	23	943,564	2.44	1.79	1.92
高雄市		44	1,369,850	3.21	1.97	2.25	47	1,403,348	3.35	2.38	2.55
基隆市		9	184,139	4.89	2.80	3.13	7	184,754	3.79	2.47	2.70
新竹市		8	221,265	3.62	3.42	3.34	2	227,538	0.88	0.60	0.60
嘉義市		9	129,794	6.93	4.26	4.81	3	137,896	2.18	0.71	0.87
新竹縣		8	287,837	2.78	2.15	2.51	5	276,096	1.81	1.36	1.52
宜蘭縣		5	229,222	2.18	2.45	2.13	3	224,956	1.33	0.67	0.74
苗栗縣		6	281,290	2.13	1.19	1.40	6	264,169	2.27	1.41	1.65
彰化縣		12	647,449	1.85	1.05	1.15	10	625,353	1.60	1.28	1.37
南投縣		7	252,705	2.77	1.53	1.74	6	241,407	2.49	1.27	1.30
雲林縣		8	352,821	2.27	1.53	1.62	6	328,485	1.83	1.11	1.22
嘉義縣		4	261,238	1.53	1.30	1.31	8	241,875	3.31	1.88	2.04
屏東縣		15	417,815	3.59	2.02	2.16	5	401,369	1.25	0.92	0.94
澎湖縣		1	54,283	1.84	0.94	1.08	3	50,924	5.89	3.76	3.98
花蓮縣		3	165,073	1.82	1.81	1.89	2	161,174	1.24	0.73	0.74
台東縣		2	111,570	1.79	1.12	1.26	8	105,211	7.60	3.53	3.66
金門縣		1	70,010	1.43	1.03	1.13	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		159	5,543,571	2.87	2.12	2.24	124	5,750,469	2.16	1.42	1.54
中部		65	2,637,139	2.46	1.55	1.73	53	2,626,342	2.02	1.34	1.44
南部		103	3,170,322	3.25	2.11	2.32	89	3,178,976	2.80	1.93	2.06
東部		5	276,643	1.81	1.55	1.65	10	266,385	3.75	1.85	1.91
金馬地區		1	77,511	1.29	0.93	1.03	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		235	8,031,174	2.93	2.03	2.21	202	8,350,965	2.42	1.65	1.77
中央政府 管轄市		26	535,198	4.86	3.60	3.80	12	550,188	2.18	1.32	1.45
縣轄市		7	792,262	0.88	0.45	0.57	17	805,316	2.11	1.41	1.43
鎮		14	855,169	1.64	0.92	1.05	13	827,785	1.57	0.82	0.92
鄉		51	1,491,383	3.42	2.55	2.64	32	1,363,681	2.35	1.58	1.73
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		333	11,705,186	2.84	1.97	2.13	276	11,897,935	2.32	1.54	1.65

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		218	1,260,049	17.30	7.36	8.78	203	1,384,992	14.66	5.32	6.35
新北市		287	1,963,658	14.62	7.87	9.40	256	2,055,038	12.46	5.77	6.95
桃園市		155	1,116,111	13.89	8.33	9.86	107	1,132,926	9.44	4.82	5.84
台中市		198	1,384,164	14.30	8.06	9.59	200	1,431,097	13.98	7.08	8.52
台南市		270	937,342	28.80	13.39	16.09	265	943,564	28.09	10.22	12.38
高雄市		387	1,369,850	28.25	13.96	16.43	384	1,403,348	27.36	11.74	14.04
基隆市		32	184,139	17.38	8.48	9.87	20	184,754	10.83	4.63	5.33
新竹市		24	221,265	10.85	5.75	7.16	19	227,538	8.35	4.72	5.24
嘉義市		27	129,794	20.80	9.25	11.76	22	137,896	15.95	5.88	7.18
新竹縣		34	287,837	11.81	6.75	7.69	26	276,096	9.42	3.98	4.94
宜蘭縣		50	229,222	21.81	9.33	11.13	43	224,956	19.11	7.38	8.58
苗栗縣		47	281,290	16.71	7.81	9.29	37	264,169	14.01	4.80	5.68
彰化縣		159	647,449	24.56	11.18	13.73	120	625,353	19.19	7.29	8.57
南投縣		54	252,705	21.37	9.28	10.80	48	241,407	19.88	7.37	8.77
雲林縣		86	352,821	24.37	9.72	12.06	87	328,485	26.49	8.49	10.10
嘉義縣		92	261,238	35.22	13.30	15.95	69	241,875	28.53	8.40	9.95
屏東縣		146	417,815	34.94	15.28	18.29	114	401,369	28.40	10.45	12.56
澎湖縣		8	54,283	14.74	7.11	8.88	7	50,924	13.75	5.78	6.61
花蓮縣		51	165,073	30.90	12.03	15.85	36	161,174	22.34	7.98	9.57
台東縣		27	111,570	24.20	11.89	14.36	21	105,211	19.96	8.91	10.30
金門縣		2	70,010	2.86	1.96	2.20	2	70,175	2.85	0.99	1.38
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		847	5,543,571	15.28	7.77	9.24	711	5,750,469	12.36	5.32	6.37
中部		497	2,637,139	18.85	9.29	11.24	455	2,626,342	17.32	7.39	8.83
南部		930	3,170,322	29.33	13.63	16.25	861	3,178,976	27.08	10.51	12.59
東部		78	276,643	28.20	11.96	15.23	57	266,385	21.40	8.36	9.87
金馬地區		2	77,511	2.58	1.77	1.98	2	75,763	2.64	0.93	1.30
直轄市		1,515	8,031,174	18.86	9.63	11.47	1,415	8,350,965	16.94	7.38	8.89
中央政府 管轄市		83	535,198	15.51	7.74	9.47	61	550,188	11.09	5.03	5.83
縣轄市		137	792,262	17.29	8.57	10.45	95	805,316	11.80	5.09	5.94
鎮		229	855,169	26.78	11.75	14.28	170	827,785	20.54	7.71	9.12
鄉		390	1,491,383	26.15	10.90	13.09	345	1,363,681	25.30	8.46	10.11
山地鄉 ⁴		10	105,407	9.49	5.87	7.16	9	96,738	9.30	3.57	4.96
總計		2,356	11,705,186	20.13	9.85	11.81	2,086	11,897,935	17.53	7.27	8.72

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		18	1,260,049	1.43	0.76	0.89	17	1,384,992	1.23	0.61	0.68
新北市		24	1,963,658	1.22	0.72	0.80	20	2,055,038	0.97	0.55	0.64
桃園市		19	1,116,111	1.70	1.13	1.31	2	1,132,926	0.18	0.11	0.11
台中市		9	1,384,164	0.65	0.42	0.47	14	1,431,097	0.98	0.61	0.72
台南市		12	937,342	1.28	0.58	0.68	11	943,564	1.17	0.49	0.61
高雄市		19	1,369,850	1.39	0.72	0.87	21	1,403,348	1.50	0.84	0.94
基隆市		4	184,139	2.17	0.97	1.29	4	184,754	2.17	0.93	0.98
新竹市		1	221,265	0.45	0.27	0.32	5	227,538	2.20	1.39	1.49
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		1	287,837	0.35	0.28	0.31	3	276,096	1.09	0.59	0.68
宜蘭縣		6	229,222	2.62	1.36	1.40	3	224,956	1.33	0.45	0.53
苗栗縣		4	281,290	1.42	0.55	0.68	4	264,169	1.51	1.17	1.17
彰化縣		8	647,449	1.24	0.62	0.70	9	625,353	1.44	0.74	0.83
南投縣		3	252,705	1.19	0.52	0.60	2	241,407	0.83	0.56	0.58
雲林縣		7	352,821	1.98	0.99	1.21	4	328,485	1.22	0.50	0.57
嘉義縣		7	261,238	2.68	1.33	1.51	2	241,875	0.83	0.68	0.71
屏東縣		4	417,815	0.96	0.31	0.44	9	401,369	2.24	0.97	1.01
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	1	50,924	1.96	1.07	1.23
花蓮縣		3	165,073	1.82	0.60	0.90	1	161,174	0.62	0.41	0.44
台東縣		5	111,570	4.48	2.51	2.63	1	105,211	0.95	0.77	0.84
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	1	70,175	1.43	0.65	0.97
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		77	5,543,571	1.39	0.78	0.90	58	5,750,469	1.01	0.54	0.61
中部		27	2,637,139	1.02	0.57	0.66	29	2,626,342	1.10	0.63	0.72
南部		42	3,170,322	1.32	0.64	0.76	44	3,178,976	1.38	0.70	0.78
東部		8	276,643	2.89	1.37	1.60	2	266,385	0.75	0.54	0.59
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	1	75,763	1.32	0.62	0.92
直轄市		101	8,031,174	1.26	0.71	0.82	85	8,350,965	1.02	0.56	0.64
中央政府 管轄市		5	535,198	0.93	0.47	0.61	9	550,188	1.64	0.86	0.91
縣轄市		7	792,262	0.88	0.41	0.48	6	805,316	0.75	0.44	0.49
鎮		8	855,169	0.94	0.50	0.56	8	827,785	0.97	0.65	0.67
鄉		33	1,491,383	2.21	1.02	1.18	26	1,363,681	1.91	0.87	0.95
山地鄉 ⁴		1	105,407	0.95	0.87	0.95	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		154	11,705,186	1.32	0.71	0.82	134	11,897,935	1.13	0.60	0.68

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

皮膚，非惡性黑色素瘤 C44（M-87203 - M-87903 除外）

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		200	1,260,049	15.87	6.60	7.89	186	1,384,992	13.43	4.71	5.67
新北市		263	1,963,658	13.39	7.15	8.60	236	2,055,038	11.48	5.22	6.31
桃園市		136	1,116,111	12.19	7.21	8.55	105	1,132,926	9.27	4.71	5.73
台中市		189	1,384,164	13.65	7.64	9.12	186	1,431,097	13.00	6.47	7.80
台南市		258	937,342	27.52	12.80	15.41	254	943,564	26.92	9.73	11.78
高雄市		368	1,369,850	26.86	13.24	15.56	363	1,403,348	25.87	10.90	13.10
基隆市		28	184,139	15.21	7.51	8.59	16	184,754	8.66	3.71	4.35
新竹市		23	221,265	10.39	5.48	6.84	14	227,538	6.15	3.33	3.75
嘉義市		27	129,794	20.80	9.25	11.76	22	137,896	15.95	5.88	7.18
新竹縣		33	287,837	11.46	6.47	7.38	23	276,096	8.33	3.39	4.26
宜蘭縣		44	229,222	19.20	7.97	9.72	40	224,956	17.78	6.93	8.05
苗栗縣		43	281,290	15.29	7.26	8.62	33	264,169	12.49	3.63	4.51
彰化縣		151	647,449	23.32	10.56	13.03	111	625,353	17.75	6.55	7.75
南投縣		51	252,705	20.18	8.76	10.20	46	241,407	19.05	6.81	8.19
雲林縣		79	352,821	22.39	8.72	10.85	83	328,485	25.27	7.98	9.53
嘉義縣		85	261,238	32.54	11.97	14.45	67	241,875	27.70	7.72	9.23
屏東縣		142	417,815	33.99	14.97	17.85	105	401,369	26.16	9.48	11.55
澎湖縣		8	54,283	14.74	7.11	8.88	6	50,924	11.78	4.71	5.38
花蓮縣		48	165,073	29.08	11.43	14.96	35	161,174	21.72	7.57	9.13
台東縣		22	111,570	19.72	9.38	11.73	20	105,211	19.01	8.15	9.45
金門縣		2	70,010	2.86	1.96	2.20	1	70,175	1.43	0.34	0.41
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		770	5,543,571	13.89	6.99	8.34	653	5,750,469	11.36	4.78	5.76
中部		470	2,637,139	17.82	8.72	10.58	426	2,626,342	16.22	6.76	8.11
南部		888	3,170,322	28.01	12.99	15.49	817	3,178,976	25.70	9.81	11.81
東部		70	276,643	25.30	10.59	13.62	55	266,385	20.65	7.82	9.27
金馬地區		2	77,511	2.58	1.77	1.98	1	75,763	1.32	0.31	0.38
直轄市		1,414	8,031,174	17.61	8.92	10.65	1,330	8,350,965	15.93	6.83	8.25
中央政府 管轄市		78	535,198	14.57	7.27	8.86	52	550,188	9.45	4.17	4.91
縣轄市		130	792,262	16.41	8.15	9.97	89	805,316	11.05	4.64	5.45
鎮		221	855,169	25.84	11.25	13.72	162	827,785	19.57	7.07	8.44
鄉		357	1,491,383	23.94	9.88	11.91	319	1,363,681	23.39	7.59	9.15
山地鄉 ⁴		9	105,407	8.54	5.00	6.21	9	96,738	9.30	3.57	4.96
總計		2,202	11,705,186	18.81	9.14	10.98	1,952	11,897,935	16.41	6.67	8.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

地區	性別	女性乳房					男性乳房				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		2,081	1,384,992	150.25	84.89	92.09	9	1,260,049	0.71	0.35	0.40
新北市		2,832	2,055,038	137.81	80.75	87.40	10	1,963,658	0.51	0.28	0.31
桃園市		1,341	1,132,926	118.37	76.58	82.84	2	1,116,111	0.18	0.12	0.12
台中市		1,851	1,431,097	129.34	81.22	87.70	3	1,384,164	0.22	0.13	0.15
台南市		1,114	943,564	118.06	69.64	75.48	7	937,342	0.75	0.42	0.46
高雄市		1,791	1,403,348	127.62	73.39	79.58	6	1,369,850	0.44	0.24	0.27
基隆市		245	184,754	132.61	74.14	80.89	1	184,139	0.54	0.58	0.57
新竹市		284	227,538	124.81	82.14	87.51	0	221,265	0.00	0.00	0.00
嘉義市		183	137,896	132.71	77.71	84.92	1	129,794	0.77	0.48	0.53
新竹縣		282	276,096	102.14	68.19	74.07	0	287,837	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		231	224,956	102.69	60.87	65.72	0	229,222	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		316	264,169	119.62	73.32	78.71	1	281,290	0.36	0.23	0.25
彰化縣		669	625,353	106.98	67.46	72.89	4	647,449	0.62	0.30	0.39
南投縣		245	241,407	101.49	60.07	64.95	2	252,705	0.79	0.31	0.33
雲林縣		299	328,485	91.02	55.62	59.83	3	352,821	0.85	0.37	0.41
嘉義縣		252	241,875	104.19	62.27	67.99	2	261,238	0.77	0.48	0.63
屏東縣		456	401,369	113.61	66.32	71.73	2	417,815	0.48	0.21	0.25
澎湖縣		34	50,924	66.77	39.51	42.67	0	54,283	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		213	161,174	132.16	79.12	86.19	0	165,073	0.00	0.00	0.00
台東縣		105	105,211	99.80	63.85	69.42	0	111,570	0.00	0.00	0.00
金門縣		30	70,175	42.75	25.65	26.99	0	70,010	0.00	0.00	0.00
連江縣		1	5,588	17.90	13.51	14.86	0	7,501	0.00	0.00	0.00
北部		7,612	5,750,469	132.37	79.25	85.79	23	5,543,571	0.41	0.24	0.27
中部		3,064	2,626,342	116.66	72.67	78.40	12	2,637,139	0.46	0.24	0.28
南部		3,830	3,178,976	120.48	70.12	76.02	18	3,170,322	0.57	0.32	0.36
東部		318	266,385	119.38	73.07	79.54	0	276,643	0.00	0.00	0.00
金馬地區		31	75,763	40.92	24.83	26.18	0	77,511	0.00	0.00	0.00
直轄市		11,010	8,350,965	131.84	78.52	85.04	37	8,031,174	0.46	0.26	0.29
中央政府 管轄市		712	550,188	129.41	77.92	84.20	2	535,198	0.37	0.34	0.35
縣轄市		491	805,316	60.97	35.79	39.33	3	792,262	0.38	0.22	0.29
鎮		627	827,785	75.74	44.85	48.63	8	855,169	0.94	0.47	0.54
鄉		2,015	1,363,681	147.76	92.73	99.90	3	1,491,383	0.20	0.08	0.10
山地鄉 ⁴		60	96,738	62.02	41.93	45.48	0	105,407	0.00	0.00	0.00
總計		14,856	11,897,935	124.86	74.84	80.99	53	11,705,186	0.45	0.26	0.29

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

子宮，非特定部位 C55；子宮頸 C53

地區	性別	子宮，非特定部位					子宮頸				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		1	1,384,992	0.07	0.05	0.05	150	1,384,992	10.83	6.22	6.92
新北市		2	2,055,038	0.10	0.06	0.06	243	2,055,038	11.82	7.23	8.08
桃園市		0	1,132,926	0.00	0.00	0.00	126	1,132,926	11.12	7.10	7.92
台中市		4	1,431,097	0.28	0.14	0.16	172	1,431,097	12.02	7.38	8.24
台南市		1	943,564	0.11	0.08	0.08	91	943,564	9.64	5.36	6.05
高雄市		4	1,403,348	0.29	0.18	0.20	165	1,403,348	11.76	6.63	7.49
基隆市		0	184,754	0.00	0.00	0.00	35	184,754	18.94	10.09	10.93
新竹市		0	227,538	0.00	0.00	0.00	23	227,538	10.11	6.35	7.00
嘉義市		0	137,896	0.00	0.00	0.00	10	137,896	7.25	4.68	4.83
新竹縣		0	276,096	0.00	0.00	0.00	36	276,096	13.04	8.43	9.26
宜蘭縣		0	224,956	0.00	0.00	0.00	20	224,956	8.89	4.94	5.38
苗栗縣		0	264,169	0.00	0.00	0.00	33	264,169	12.49	6.69	7.67
彰化縣		0	625,353	0.00	0.00	0.00	64	625,353	10.23	6.04	6.66
南投縣		0	241,407	0.00	0.00	0.00	40	241,407	16.57	10.20	10.85
雲林縣		1	328,485	0.30	0.04	0.08	43	328,485	13.09	6.04	6.74
嘉義縣		1	241,875	0.41	0.21	0.24	29	241,875	11.99	6.54	7.34
屏東縣		0	401,369	0.00	0.00	0.00	62	401,369	15.45	8.96	9.97
澎湖縣		0	50,924	0.00	0.00	0.00	5	50,924	9.82	5.05	5.94
花蓮縣		0	161,174	0.00	0.00	0.00	27	161,174	16.75	11.12	12.54
台東縣		0	105,211	0.00	0.00	0.00	10	105,211	9.50	5.35	5.98
金門縣		0	70,175	0.00	0.00	0.00	8	70,175	11.40	5.73	6.21
連江縣		0	5,588	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		3	5,750,469	0.05	0.03	0.03	666	5,750,469	11.58	6.95	7.74
中部		5	2,626,342	0.19	0.08	0.10	319	2,626,342	12.15	7.17	7.92
南部		6	3,178,976	0.19	0.12	0.13	362	3,178,976	11.39	6.42	7.21
東部		0	266,385	0.00	0.00	0.00	37	266,385	13.89	8.87	9.99
金馬地區		0	75,763	0.00	0.00	0.00	8	75,763	10.56	5.31	5.76
直轄市		12	8,350,965	0.14	0.08	0.09	947	8,350,965	11.34	6.73	7.54
中央政府 管轄市		0	550,188	0.00	0.00	0.00	68	550,188	12.36	7.29	7.88
縣轄市		0	805,316	0.00	0.00	0.00	57	805,316	7.08	4.32	4.84
鎮		0	827,785	0.00	0.00	0.00	69	827,785	8.34	4.57	4.94
鄉		2	1,363,681	0.15	0.05	0.06	251	1,363,681	18.41	10.45	11.61
山地鄉 ⁴		0	96,738	0.00	0.00	0.00	23	96,738	23.78	16.45	18.38
總計		14	11,897,935	0.12	0.07	0.07	1,393	11,897,935	11.71	6.88	7.67

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

地區	性別	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		427	1,384,992	30.83	17.43	18.74	204	1,384,992	14.73	9.34	9.94
新北市		582	2,055,038	28.32	16.30	17.56	356	2,055,038	17.32	10.85	11.83
桃園市		281	1,132,926	24.80	16.18	17.33	122	1,132,926	10.77	7.31	7.89
台中市		357	1,431,097	24.95	15.75	16.90	191	1,431,097	13.35	8.88	9.61
台南市		257	943,564	27.24	16.59	17.83	138	943,564	14.63	9.51	10.17
高雄市		355	1,403,348	25.30	14.88	16.15	227	1,403,348	16.18	10.58	11.30
基隆市		54	184,754	29.23	16.17	17.35	32	184,754	17.32	10.82	11.94
新竹市		65	227,538	28.57	18.88	20.36	29	227,538	12.75	9.30	10.28
嘉義市		32	137,896	23.21	13.67	14.62	13	137,896	9.43	6.14	6.58
新竹縣		69	276,096	24.99	17.31	18.43	27	276,096	9.78	6.65	7.15
宜蘭縣		50	224,956	22.23	13.24	14.39	28	224,956	12.45	7.82	8.36
苗栗縣		82	264,169	31.04	19.73	20.93	37	264,169	14.01	9.29	10.11
彰化縣		150	625,353	23.99	15.04	16.14	66	625,353	10.55	7.15	7.74
南投縣		61	241,407	25.27	14.98	16.12	36	241,407	14.91	8.59	9.23
雲林縣		70	328,485	21.31	13.78	14.73	33	328,485	10.05	7.15	7.65
嘉義縣		59	241,875	24.39	14.50	15.60	32	241,875	13.23	8.71	9.25
屏東縣		80	401,369	19.93	11.87	13.02	53	401,369	13.20	8.35	9.01
澎湖縣		7	50,924	13.75	8.47	8.69	6	50,924	11.78	9.34	9.43
花蓮縣		48	161,174	29.78	17.48	18.86	18	161,174	11.17	6.17	6.79
台東縣		29	105,211	27.56	17.06	18.12	23	105,211	21.86	16.56	16.34
金門縣		9	70,175	12.83	7.02	7.52	5	70,175	7.13	3.56	4.09
連江縣		0	5,588	0.00	0.00	0.00	1	5,588	17.90	13.51	14.86
北部		1,610	5,750,469	28.00	16.71	17.96	835	5,750,469	14.52	9.34	10.09
中部		638	2,626,342	24.29	15.26	16.37	326	2,626,342	12.41	8.21	8.87
南部		790	3,178,976	24.85	14.79	15.99	469	3,178,976	14.75	9.64	10.29
東部		77	266,385	28.91	17.33	18.58	41	266,385	15.39	10.22	10.51
金馬地區		9	75,763	11.88	6.54	7.01	6	75,763	7.92	4.36	4.96
直轄市		2,259	8,350,965	27.05	16.19	17.43	1,238	8,350,965	14.82	9.58	10.32
中央政府 管轄市		151	550,188	27.45	16.53	17.77	74	550,188	13.45	9.14	10.04
縣轄市		132	805,316	16.39	10.13	11.02	74	805,316	9.19	5.93	6.41
鎮		176	827,785	21.26	12.78	13.62	115	827,785	13.89	9.17	9.70
鄉		406	1,363,681	29.77	18.42	19.77	176	1,363,681	12.91	8.50	9.14
山地鄉 ⁴		17	96,738	17.57	11.83	12.36	7	96,738	7.24	4.71	5.10
總計		3,124	11,897,935	26.26	15.81	17.00	1,677	11,897,935	14.09	9.16	9.86

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52，C57.7 - C57.9；攝護腺 C61

地區	性別	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		24	1,384,992	1.73	0.71	0.84	1,007	1,260,049	79.92	34.42	40.38
新北市		27	2,055,038	1.31	0.65	0.76	1,192	1,963,658	60.70	32.15	37.99
桃園市		16	1,132,926	1.41	0.82	0.90	473	1,116,111	42.38	26.10	30.99
台中市		24	1,431,097	1.68	0.84	1.04	770	1,384,164	55.63	32.66	38.59
台南市		9	943,564	0.95	0.30	0.38	601	937,342	64.12	31.03	36.44
高雄市		25	1,403,348	1.78	0.88	0.94	826	1,369,850	60.30	29.37	34.79
基隆市		3	184,754	1.62	0.70	0.70	111	184,139	60.28	28.06	33.05
新竹市		8	227,538	3.52	2.32	2.48	104	221,265	47.00	29.87	34.16
嘉義市		2	137,896	1.45	0.34	0.50	95	129,794	73.19	36.78	43.58
新竹縣		8	276,096	2.90	1.75	1.94	168	287,837	58.37	32.58	39.44
宜蘭縣		4	224,956	1.78	0.95	0.98	173	229,222	75.47	33.79	39.99
苗栗縣		5	264,169	1.89	1.02	1.15	188	281,290	66.83	29.00	34.89
彰化縣		10	625,353	1.60	0.87	0.95	384	647,449	59.31	27.58	33.49
南投縣		5	241,407	2.07	1.20	1.25	171	252,705	67.67	28.22	34.07
雲林縣		3	328,485	0.91	0.17	0.25	248	352,821	70.29	28.61	34.77
嘉義縣		4	241,875	1.65	1.03	1.23	159	261,238	60.86	23.60	27.96
屏東縣		6	401,369	1.49	0.58	0.66	254	417,815	60.79	26.04	31.18
澎湖縣		1	50,924	1.96	0.67	1.00	21	54,283	38.69	18.48	21.63
花蓮縣		1	161,174	0.62	0.13	0.23	93	165,073	56.34	25.20	30.04
台東縣		3	105,211	2.85	1.40	1.62	57	111,570	51.09	23.17	28.04
金門縣		0	70,175	0.00	0.00	0.00	17	70,010	24.28	13.14	15.76
連江縣		0	5,588	0.00	0.00	0.00	0	7,501	0.00	0.00	0.00
北部		95	5,750,469	1.65	0.83	0.95	3,416	5,543,571	61.62	31.42	37.14
中部		42	2,626,342	1.60	0.77	0.89	1,573	2,637,139	59.65	30.37	36.34
南部		47	3,178,976	1.48	0.66	0.75	1,956	3,170,322	61.70	28.99	34.28
東部		4	266,385	1.50	0.63	0.78	150	276,643	54.22	24.37	29.23
金馬地區		0	75,763	0.00	0.00	0.00	17	77,511	21.93	12.00	14.43
直轄市		125	8,350,965	1.50	0.71	0.83	4,869	8,031,174	60.63	31.30	36.93
中央政府 管轄市		13	550,188	2.36	1.29	1.40	310	535,198	57.92	30.89	36.10
縣轄市		8	805,316	0.99	0.54	0.62	305	792,262	38.50	19.38	23.61
鎮		11	827,785	1.33	0.60	0.64	443	855,169	51.80	21.83	27.16
鄉		31	1,363,681	2.27	1.11	1.26	1,185	1,491,383	79.46	33.86	40.12
山地鄉 ⁴		3	96,738	3.10	2.00	2.41	39	105,407	37.00	24.10	27.76
總計		188	11,897,935	1.58	0.76	0.87	7,115	11,705,186	60.79	30.22	35.83

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

地區	性別	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		29	1,260,049	2.30	2.04	2.33	12	1,260,049	0.95	0.46	0.48
新北市		58	1,963,658	2.95	2.79	3.01	16	1,963,658	0.81	0.49	0.51
桃園市		27	1,116,111	2.42	2.23	2.42	12	1,116,111	1.08	0.64	0.70
台中市		38	1,384,164	2.75	2.52	2.70	10	1,384,164	0.72	0.43	0.46
台南市		16	937,342	1.71	1.88	1.94	6	937,342	0.64	0.33	0.37
高雄市		29	1,369,850	2.12	1.88	2.14	13	1,369,850	0.95	0.46	0.59
基隆市		4	184,139	2.17	2.35	2.35	3	184,139	1.63	0.93	0.99
新竹市		3	221,265	1.36	1.03	1.26	1	221,265	0.45	0.20	0.35
嘉義市		3	129,794	2.31	2.32	2.42	1	129,794	0.77	0.51	0.55
新竹縣		14	287,837	4.86	4.95	5.14	3	287,837	1.04	0.61	0.70
宜蘭縣		11	229,222	4.80	5.59	5.61	1	229,222	0.44	0.28	0.31
苗栗縣		12	281,290	4.27	4.22	4.53	2	281,290	0.71	0.17	0.30
彰化縣		8	647,449	1.24	1.34	1.37	4	647,449	0.62	0.25	0.31
南投縣		4	252,705	1.58	1.48	1.49	2	252,705	0.79	0.23	0.37
雲林縣		5	352,821	1.42	1.35	1.51	5	352,821	1.42	0.62	0.72
嘉義縣		3	261,238	1.15	1.43	1.48	2	261,238	0.77	0.34	0.42
屏東縣		11	417,815	2.63	3.58	3.41	6	417,815	1.44	0.82	0.83
澎湖縣		2	54,283	3.68	3.23	3.49	1	54,283	1.84	1.06	0.98
花蓮縣		5	165,073	3.03	3.24	3.53	2	165,073	1.21	0.98	0.97
台東縣		1	111,570	0.90	0.84	1.07	0	111,570	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,010	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	7,501	0.00	0.00	0.00
北部		158	5,543,571	2.85	2.74	2.96	50	5,543,571	0.90	0.50	0.54
中部		55	2,637,139	2.09	2.00	2.13	21	2,637,139	0.80	0.40	0.47
南部		64	3,170,322	2.02	2.10	2.22	29	3,170,322	0.91	0.47	0.54
東部		6	276,643	2.17	2.28	2.54	2	276,643	0.72	0.60	0.59
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	77,511	0.00	0.00	0.00
直轄市		197	8,031,174	2.45	2.29	2.50	69	8,031,174	0.86	0.47	0.52
中央政府 管轄市		10	535,198	1.87	1.87	1.99	5	535,198	0.93	0.55	0.63
縣轄市		12	792,262	1.51	1.49	1.59	3	792,262	0.38	0.23	0.22
鎮		21	855,169	2.46	2.59	2.63	8	855,169	0.94	0.39	0.50
鄉		43	1,491,383	2.88	3.40	3.47	17	1,491,383	1.14	0.56	0.63
山地鄉 ⁴		3	105,407	2.85	2.69	2.87	2	105,407	1.90	1.02	1.35
總計		283	11,705,186	2.42	2.37	2.54	102	11,705,186	0.87	0.47	0.53

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		172	1,260,049	13.65	5.92	6.92	81	1,384,992	5.85	2.17	2.66
新北市		257	1,963,658	13.09	7.14	8.31	104	2,055,038	5.06	2.33	2.72
桃園市		144	1,116,111	12.90	7.84	9.10	46	1,132,926	4.06	2.12	2.55
台中市		187	1,384,164	13.51	7.83	9.24	75	1,431,097	5.24	2.63	3.03
台南市		155	937,342	16.54	8.17	9.47	85	943,564	9.01	3.38	4.07
高雄市		241	1,369,850	17.59	8.79	10.24	105	1,403,348	7.48	3.39	3.90
基隆市		32	184,139	17.38	8.25	9.44	16	184,754	8.66	3.10	3.71
新竹市		19	221,265	8.59	5.68	6.18	10	227,538	4.39	1.70	2.36
嘉義市		18	129,794	13.87	7.09	8.03	9	137,896	6.53	2.85	3.21
新竹縣		36	287,837	12.51	7.38	8.58	9	276,096	3.26	1.45	1.92
宜蘭縣		45	229,222	19.63	9.04	10.69	11	224,956	4.89	2.14	2.51
苗栗縣		29	281,290	10.31	4.79	5.71	17	264,169	6.44	2.07	2.73
彰化縣		91	647,449	14.06	6.84	7.89	33	625,353	5.28	1.85	2.24
南投縣		45	252,705	17.81	7.96	9.20	17	241,407	7.04	3.97	3.84
雲林縣		65	352,821	18.42	8.23	9.67	18	328,485	5.48	2.21	2.49
嘉義縣		47	261,238	17.99	7.35	8.50	29	241,875	11.99	3.44	4.21
屏東縣		72	417,815	17.23	7.59	9.06	32	401,369	7.97	3.13	3.75
澎湖縣		5	54,283	9.21	4.55	4.93	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		9	165,073	5.45	2.36	2.71	12	161,174	7.45	2.73	3.15
台東縣		16	111,570	14.34	7.24	8.04	10	105,211	9.50	3.20	4.18
金門縣		4	70,010	5.71	2.36	3.41	1	70,175	1.43	0.40	0.72
連江縣		1	7,501	13.33	7.67	7.67	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		734	5,543,571	13.24	6.92	8.04	294	5,750,469	5.11	2.21	2.67
中部		388	2,637,139	14.71	7.63	8.93	143	2,626,342	5.44	2.45	2.77
南部		538	3,170,322	16.97	8.17	9.51	260	3,178,976	8.18	3.30	3.90
東部		25	276,643	9.04	4.30	4.84	22	266,385	8.26	2.93	3.58
金馬地區		5	77,511	6.45	2.88	3.86	1	75,763	1.32	0.38	0.68
直轄市		1,156	8,031,174	14.39	7.55	8.80	496	8,350,965	5.94	2.64	3.11
中央政府 管轄市		69	535,198	12.89	7.05	7.92	35	550,188	6.36	2.54	3.10
縣轄市		60	792,262	7.57	4.05	4.71	31	805,316	3.85	1.65	1.97
鎮		116	855,169	13.56	6.09	7.27	43	827,785	5.19	2.14	2.49
鄉		289	1,491,383	19.38	8.66	10.04	115	1,363,681	8.43	2.97	3.53
山地鄉 ⁴		8	105,407	7.59	5.35	6.14	2	96,738	2.07	1.12	1.27
總計		1,690	11,705,186	14.44	7.34	8.55	720	11,897,935	6.05	2.57	3.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

腎 C64

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		148	1,260,049	11.75	7.02	7.49	65	1,384,992	4.69	2.11	2.35
新北市		250	1,963,658	12.73	7.81	8.39	108	2,055,038	5.26	2.96	3.29
桃園市		90	1,116,111	8.06	5.37	5.90	43	1,132,926	3.80	2.41	2.61
台中市		105	1,384,164	7.59	4.82	5.40	50	1,431,097	3.49	2.23	2.41
台南市		88	937,342	9.39	5.38	6.01	46	943,564	4.88	2.60	2.91
高雄市		129	1,369,850	9.42	5.70	6.25	44	1,403,348	3.14	1.90	1.99
基隆市		16	184,139	8.69	6.31	6.39	20	184,754	10.83	6.53	6.97
新竹市		19	221,265	8.59	7.64	7.62	10	227,538	4.39	2.42	2.78
嘉義市		12	129,794	9.25	5.29	5.84	7	137,896	5.08	3.34	3.24
新竹縣		16	287,837	5.56	4.31	4.52	9	276,096	3.26	2.13	2.19
宜蘭縣		31	229,222	13.52	7.16	7.97	9	224,956	4.00	2.37	2.80
苗栗縣		21	281,290	7.47	4.47	4.84	9	264,169	3.41	1.97	2.16
彰化縣		44	647,449	6.80	4.03	4.41	20	625,353	3.20	2.13	2.23
南投縣		16	252,705	6.33	3.59	4.18	9	241,407	3.73	1.72	1.93
雲林縣		26	352,821	7.37	4.17	4.39	10	328,485	3.04	1.38	1.55
嘉義縣		15	261,238	5.74	2.72	3.08	13	241,875	5.37	1.75	2.14
屏東縣		41	417,815	9.81	5.51	6.18	12	401,369	2.99	1.77	1.90
澎湖縣		9	54,283	16.58	8.31	9.30	3	50,924	5.89	2.72	3.16
花蓮縣		19	165,073	11.51	6.63	7.35	10	161,174	6.20	2.98	3.24
台東縣		8	111,570	7.17	3.39	3.77	5	105,211	4.75	2.96	3.58
金門縣		7	70,010	10.00	5.56	5.92	2	70,175	2.85	1.43	1.76
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		591	5,543,571	10.66	6.74	7.22	273	5,750,469	4.75	2.62	2.89
中部		191	2,637,139	7.24	4.37	4.84	89	2,626,342	3.39	2.08	2.24
南部		294	3,170,322	9.27	5.36	5.95	125	3,178,976	3.93	2.16	2.35
東部		27	276,643	9.76	5.34	5.92	15	266,385	5.63	2.97	3.38
金馬地區		7	77,511	9.03	5.04	5.36	2	75,763	2.64	1.36	1.66
直轄市		810	8,031,174	10.09	6.20	6.76	356	8,350,965	4.26	2.40	2.63
中央政府 管轄市		47	535,198	8.78	6.56	6.72	37	550,188	6.72	3.96	4.23
縣轄市		48	792,262	6.06	3.45	3.89	21	805,316	2.61	1.26	1.47
鎮		76	855,169	8.89	5.71	6.08	32	827,785	3.87	2.30	2.43
鄉		129	1,491,383	8.65	4.68	5.19	58	1,363,681	4.25	2.30	2.56
山地鄉 ⁴		7	105,407	6.64	4.01	4.16	2	96,738	2.07	1.55	1.69
總計		1,111	11,705,186	9.49	5.80	6.31	504	11,897,935	4.24	2.37	2.60

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

腎孟 C65

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		41	1,260,049	3.25	1.55	1.70	60	1,384,992	4.33	1.68	1.97
新北市		68	1,963,658	3.46	1.90	2.16	73	2,055,038	3.55	1.55	1.85
桃園市		25	1,116,111	2.24	1.31	1.53	27	1,132,926	2.38	1.26	1.53
台中市		49	1,384,164	3.54	2.08	2.39	74	1,431,097	5.17	2.64	3.08
台南市		39	937,342	4.16	1.96	2.35	70	943,564	7.42	3.27	3.71
高雄市		69	1,369,850	5.04	2.64	2.99	84	1,403,348	5.99	2.57	3.05
基隆市		6	184,139	3.26	1.65	1.68	10	184,754	5.41	2.13	2.50
新竹市		6	221,265	2.71	1.71	2.18	7	227,538	3.08	1.50	1.92
嘉義市		8	129,794	6.16	2.96	3.30	8	137,896	5.80	2.49	2.77
新竹縣		2	287,837	0.69	0.37	0.46	11	276,096	3.98	1.76	2.24
宜蘭縣		4	229,222	1.75	0.58	0.78	7	224,956	3.11	1.42	1.60
苗栗縣		7	281,290	2.49	1.38	1.52	15	264,169	5.68	2.49	2.73
彰化縣		19	647,449	2.93	1.49	1.69	23	625,353	3.68	1.45	1.75
南投縣		11	252,705	4.35	2.02	2.25	15	241,407	6.21	2.53	2.86
雲林縣		11	352,821	3.12	1.33	1.58	11	328,485	3.35	1.40	1.57
嘉義縣		14	261,238	5.36	2.33	2.66	20	241,875	8.27	2.60	3.15
屏東縣		22	417,815	5.27	2.48	2.89	29	401,369	7.23	3.16	3.49
澎湖縣		2	54,283	3.68	1.61	2.09	2	50,924	3.93	1.03	1.65
花蓮縣		6	165,073	3.63	1.58	1.92	6	161,174	3.72	1.73	1.81
台東縣		3	111,570	2.69	1.53	1.74	3	105,211	2.85	1.36	1.40
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		159	5,543,571	2.87	1.53	1.74	210	5,750,469	3.65	1.59	1.88
中部		90	2,637,139	3.41	1.81	2.08	123	2,626,342	4.68	2.11	2.44
南部		154	3,170,322	4.86	2.39	2.75	213	3,178,976	6.70	2.83	3.29
東部		9	276,643	3.25	1.59	1.88	9	266,385	3.38	1.59	1.65
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		291	8,031,174	3.62	1.94	2.21	388	8,350,965	4.65	2.09	2.45
中央政府 管轄市		20	535,198	3.74	2.01	2.28	25	550,188	4.54	1.98	2.34
縣轄市		16	792,262	2.02	1.15	1.36	23	805,316	2.86	1.20	1.45
鎮		25	855,169	2.92	1.47	1.68	26	827,785	3.14	1.31	1.49
鄉		60	1,491,383	4.02	1.79	2.07	93	1,363,681	6.82	2.78	3.15
山地鄉 ⁴		3	105,407	2.85	1.65	1.98	3	96,738	3.10	1.74	2.06
總計		412	11,705,186	3.52	1.83	2.10	555	11,897,935	4.66	2.04	2.38

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

輸尿管 C66

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		26	1,260,049	2.06	0.92	1.09	45	1,384,992	3.25	1.16	1.40
新北市		40	1,963,658	2.04	1.07	1.29	61	2,055,038	2.97	1.27	1.61
桃園市		23	1,116,111	2.06	1.33	1.48	27	1,132,926	2.38	1.32	1.58
台中市		41	1,384,164	2.96	1.76	1.94	46	1,431,097	3.21	1.52	1.87
台南市		33	937,342	3.52	1.68	1.95	66	943,564	6.99	3.02	3.60
高雄市		49	1,369,850	3.58	1.79	2.13	55	1,403,348	3.92	1.72	1.99
基隆市		4	184,139	2.17	0.91	0.96	6	184,754	3.25	1.10	1.37
新竹市		6	221,265	2.71	1.85	1.93	2	227,538	0.88	0.59	0.65
嘉義市		2	129,794	1.54	0.76	0.92	6	137,896	4.35	2.51	2.49
新竹縣		2	287,837	0.69	0.44	0.55	4	276,096	1.45	1.05	1.09
宜蘭縣		5	229,222	2.18	0.89	1.02	10	224,956	4.45	2.00	2.34
苗栗縣		6	281,290	2.13	0.89	1.16	8	264,169	3.03	1.07	1.34
彰化縣		14	647,449	2.16	1.07	1.21	28	625,353	4.48	1.68	2.01
南投縣		8	252,705	3.17	1.35	1.58	14	241,407	5.80	2.20	2.47
雲林縣		6	352,821	1.70	0.68	0.83	12	328,485	3.65	1.15	1.40
嘉義縣		13	261,238	4.98	1.90	2.35	20	241,875	8.27	2.86	3.11
屏東縣		25	417,815	5.98	3.02	3.24	13	401,369	3.24	1.18	1.40
澎湖縣		2	54,283	3.68	1.83	2.14	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	165,073	2.42	1.11	1.28	2	161,174	1.24	0.63	0.71
台東縣		2	111,570	1.79	1.09	1.20	2	105,211	1.90	0.73	0.92
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		112	5,543,571	2.02	1.05	1.22	163	5,750,469	2.83	1.21	1.47
中部		69	2,637,139	2.62	1.38	1.55	100	2,626,342	3.81	1.58	1.89
南部		124	3,170,322	3.91	1.90	2.20	160	3,178,976	5.03	2.10	2.44
東部		6	276,643	2.17	1.10	1.25	4	266,385	1.50	0.68	0.80
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		212	8,031,174	2.64	1.39	1.61	300	8,350,965	3.59	1.57	1.89
中央政府 管轄市		12	535,198	2.24	1.24	1.33	14	550,188	2.54	1.27	1.38
縣轄市		7	792,262	0.88	0.50	0.59	14	805,316	1.74	0.71	0.87
鎮		22	855,169	2.57	1.24	1.41	21	827,785	2.54	0.85	1.02
鄉		58	1,491,383	3.89	1.73	1.99	78	1,363,681	5.72	2.21	2.52
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	1	96,738	1.03	0.89	0.89
總計		311	11,705,186	2.66	1.36	1.56	427	11,897,935	3.59	1.52	1.81

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		4	1,260,049	0.32	0.14	0.15	0	1,384,992	0.00	0.00	0.00
新北市		1	1,963,658	0.05	0.03	0.03	1	2,055,038	0.05	0.02	0.03
桃園市		0	1,116,111	0.00	0.00	0.00	1	1,132,926	0.09	0.06	0.05
台中市		0	1,384,164	0.00	0.00	0.00	1	1,431,097	0.07	0.05	0.05
台南市		3	937,342	0.32	0.13	0.18	0	943,564	0.00	0.00	0.00
高雄市		2	1,369,850	0.15	0.09	0.10	0	1,403,348	0.00	0.00	0.00
基隆市		1	184,139	0.54	0.27	0.25	1	184,754	0.54	0.29	0.32
新竹市		0	221,265	0.00	0.00	0.00	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	2	137,896	1.45	0.54	0.72
新竹縣		0	287,837	0.00	0.00	0.00	1	276,096	0.36	0.25	0.25
宜蘭縣		2	229,222	0.87	0.32	0.44	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	281,290	0.00	0.00	0.00	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	647,449	0.00	0.00	0.00	0	625,353	0.00	0.00	0.00
南投縣		1	252,705	0.40	0.11	0.13	0	241,407	0.00	0.00	0.00
雲林縣		3	352,821	0.85	0.44	0.53	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		2	417,815	0.48	0.15	0.24	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	1	161,174	0.62	0.19	0.28
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		8	5,543,571	0.14	0.08	0.09	4	5,750,469	0.07	0.03	0.04
中部		4	2,637,139	0.15	0.08	0.10	1	2,626,342	0.04	0.02	0.02
南部		7	3,170,322	0.22	0.10	0.13	2	3,178,976	0.06	0.02	0.03
東部		0	276,643	0.00	0.00	0.00	1	266,385	0.38	0.11	0.17
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		10	8,031,174	0.12	0.07	0.08	3	8,350,965	0.04	0.02	0.02
中央政府 管轄市		1	535,198	0.19	0.11	0.11	3	550,188	0.55	0.25	0.31
縣轄市		1	792,262	0.13	0.09	0.10	1	805,316	0.12	0.04	0.07
鎮		0	855,169	0.00	0.00	0.00	0	827,785	0.00	0.00	0.00
鄉		7	1,491,383	0.47	0.16	0.22	1	1,363,681	0.07	0.04	0.04
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		19	11,705,186	0.16	0.08	0.10	8	11,897,935	0.07	0.03	0.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		0	1,260,049	0.00	0.00	0.00	0	1,384,992	0.00	0.00	0.00
新北市		0	1,963,658	0.00	0.00	0.00	0	2,055,038	0.00	0.00	0.00
桃園市		0	1,116,111	0.00	0.00	0.00	0	1,132,926	0.00	0.00	0.00
台中市		0	1,384,164	0.00	0.00	0.00	0	1,431,097	0.00	0.00	0.00
台南市		0	937,342	0.00	0.00	0.00	0	943,564	0.00	0.00	0.00
高雄市		0	1,369,850	0.00	0.00	0.00	1	1,403,348	0.07	0.04	0.04
基隆市		0	184,139	0.00	0.00	0.00	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		0	221,265	0.00	0.00	0.00	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	287,837	0.00	0.00	0.00	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	281,290	0.00	0.00	0.00	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	647,449	0.00	0.00	0.00	0	625,353	0.00	0.00	0.00
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	0	241,407	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	352,821	0.00	0.00	0.00	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		1	417,815	0.24	0.08	0.13	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		0	5,543,571	0.00	0.00	0.00	0	5,750,469	0.00	0.00	0.00
中部		0	2,637,139	0.00	0.00	0.00	0	2,626,342	0.00	0.00	0.00
南部		1	3,170,322	0.03	0.01	0.02	1	3,178,976	0.03	0.02	0.02
東部		0	276,643	0.00	0.00	0.00	0	266,385	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		0	8,031,174	0.00	0.00	0.00	1	8,350,965	0.01	0.01	0.01
中央政府 管轄市		0	535,198	0.00	0.00	0.00	0	550,188	0.00	0.00	0.00
縣轄市		0	792,262	0.00	0.00	0.00	0	805,316	0.00	0.00	0.00
鎮		0	855,169	0.00	0.00	0.00	0	827,785	0.00	0.00	0.00
鄉		1	1,491,383	0.07	0.02	0.03	0	1,363,681	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		1	11,705,186	0.01	0.00	0.01	1	11,897,935	0.01	0.00	0.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位 C68.9

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		1	1,260,049	0.08	0.02	0.02	2	1,384,992	0.14	0.05	0.06
新北市		1	1,963,658	0.05	0.02	0.04	1	2,055,038	0.05	0.06	0.06
桃園市		1	1,116,111	0.09	0.06	0.06	0	1,132,926	0.00	0.00	0.00
台中市		0	1,384,164	0.00	0.00	0.00	2	1,431,097	0.14	0.08	0.10
台南市		0	937,342	0.00	0.00	0.00	0	943,564	0.00	0.00	0.00
高雄市		1	1,369,850	0.07	0.06	0.06	0	1,403,348	0.00	0.00	0.00
基隆市		0	184,139	0.00	0.00	0.00	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		1	221,265	0.45	0.25	0.38	1	227,538	0.44	0.29	0.32
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	287,837	0.00	0.00	0.00	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	281,290	0.00	0.00	0.00	0	264,169	0.00	0.00	0.00
彰化縣		0	647,449	0.00	0.00	0.00	0	625,353	0.00	0.00	0.00
南投縣		2	252,705	0.79	0.30	0.35	0	241,407	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	352,821	0.00	0.00	0.00	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		3	417,815	0.72	0.33	0.33	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	1	161,174	0.62	0.32	0.30
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		1	70,010	1.43	0.45	0.81	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		4	5,543,571	0.07	0.03	0.04	4	5,750,469	0.07	0.05	0.05
中部		2	2,637,139	0.08	0.03	0.04	2	2,626,342	0.08	0.04	0.04
南部		4	3,170,322	0.13	0.07	0.07	0	3,178,976	0.00	0.00	0.00
東部		0	276,643	0.00	0.00	0.00	1	266,385	0.38	0.20	0.18
金馬地區		1	77,511	1.29	0.41	0.75	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		4	8,031,174	0.05	0.03	0.03	5	8,350,965	0.06	0.04	0.04
中央政府 管轄市		1	535,198	0.19	0.09	0.13	1	550,188	0.18	0.11	0.12
縣轄市		1	792,262	0.13	0.04	0.05	0	805,316	0.00	0.00	0.00
鎮		3	855,169	0.35	0.19	0.19	1	827,785	0.12	0.07	0.06
鄉		2	1,491,383	0.13	0.03	0.05	0	1,363,681	0.00	0.00	0.00
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		11	11,705,186	0.09	0.04	0.05	7	11,897,935	0.06	0.03	0.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		6	1,260,049	0.48	0.54	0.46	1	1,384,992	0.07	0.02	0.03
新北市		6	1,963,658	0.31	0.31	0.30	8	2,055,038	0.39	0.66	0.55
桃園市		2	1,116,111	0.18	0.37	0.30	1	1,132,926	0.09	0.22	0.16
台中市		5	1,384,164	0.36	0.39	0.35	3	1,431,097	0.21	0.09	0.12
台南市		2	937,342	0.21	0.09	0.11	3	943,564	0.32	0.11	0.14
高雄市		4	1,369,850	0.29	0.19	0.21	1	1,403,348	0.07	0.24	0.17
基隆市		0	184,139	0.00	0.00	0.00	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		1	221,265	0.45	0.27	0.32	1	227,538	0.44	0.41	0.52
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	287,837	0.00	0.00	0.00	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		1	281,290	0.36	0.18	0.21	2	264,169	0.76	1.61	1.26
彰化縣		1	647,449	0.15	0.09	0.08	1	625,353	0.16	0.03	0.04
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	2	241,407	0.83	1.94	1.51
雲林縣		1	352,821	0.28	0.23	0.23	2	328,485	0.61	0.23	0.25
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		0	417,815	0.00	0.00	0.00	2	401,369	0.50	0.29	0.29
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		1	165,073	0.61	0.30	0.35	3	161,174	1.86	0.58	0.75
台東縣		1	111,570	0.90	0.26	0.31	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		16	5,543,571	0.29	0.34	0.31	13	5,750,469	0.23	0.35	0.30
中部		7	2,637,139	0.27	0.27	0.24	8	2,626,342	0.30	0.22	0.21
南部		6	3,170,322	0.19	0.11	0.13	6	3,178,976	0.19	0.18	0.16
東部		2	276,643	0.72	0.28	0.33	3	266,385	1.13	0.35	0.44
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		25	8,031,174	0.31	0.34	0.31	17	8,350,965	0.20	0.25	0.22
中央政府 管轄市		1	535,198	0.19	0.10	0.11	1	550,188	0.18	0.18	0.22
縣轄市		1	792,262	0.13	0.04	0.05	0	805,316	0.00	0.00	0.00
鎮		2	855,169	0.23	0.16	0.16	4	827,785	0.48	0.95	0.73
鄉		2	1,491,383	0.13	0.07	0.07	8	1,363,681	0.59	0.27	0.29
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	1	96,738	1.03	0.31	0.56
總計		31	11,705,186	0.26	0.27	0.25	30	11,897,935	0.25	0.28	0.25

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

腦 C71

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		51	1,260,049	4.05	3.34	3.33	44	1,384,992	3.18	2.77	2.79
新北市		59	1,963,658	3.00	2.30	2.38	58	2,055,038	2.82	2.22	2.37
桃園市		41	1,116,111	3.67	2.84	2.97	25	1,132,926	2.21	1.99	1.97
台中市		52	1,384,164	3.76	3.24	3.36	31	1,431,097	2.17	2.06	2.01
台南市		24	937,342	2.56	2.28	2.33	34	943,564	3.60	3.12	3.14
高雄市		47	1,369,850	3.43	2.45	2.67	38	1,403,348	2.71	1.91	1.96
基隆市		9	184,139	4.89	3.78	3.72	8	184,754	4.33	2.45	3.06
新竹市		13	221,265	5.88	4.16	4.63	4	227,538	1.76	1.15	1.30
嘉義市		8	129,794	6.16	5.92	5.34	5	137,896	3.63	2.23	2.32
新竹縣		10	287,837	3.47	3.01	3.15	6	276,096	2.17	1.57	1.78
宜蘭縣		9	229,222	3.93	3.62	3.74	9	224,956	4.00	3.53	3.74
苗栗縣		14	281,290	4.98	4.19	4.19	5	264,169	1.89	2.43	2.13
彰化縣		24	647,449	3.71	3.44	3.43	12	625,353	1.92	1.46	1.57
南投縣		6	252,705	2.37	2.23	2.16	7	241,407	2.90	1.90	2.14
雲林縣		9	352,821	2.55	1.76	1.88	3	328,485	0.91	0.45	0.50
嘉義縣		9	261,238	3.45	1.98	2.15	3	241,875	1.24	0.75	0.79
屏東縣		12	417,815	2.87	1.67	2.00	7	401,369	1.74	1.70	1.69
澎湖縣		2	54,283	3.68	2.55	2.55	1	50,924	1.96	1.07	1.23
花蓮縣		5	165,073	3.03	2.88	2.76	2	161,174	1.24	0.45	0.53
台東縣		3	111,570	2.69	2.40	2.53	6	105,211	5.70	2.30	2.77
金門縣		3	70,010	4.29	3.23	3.78	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		206	5,543,571	3.72	2.95	3.03	159	5,750,469	2.76	2.29	2.37
中部		91	2,637,139	3.45	2.98	3.03	53	2,626,342	2.02	1.71	1.73
南部		102	3,170,322	3.22	2.44	2.57	88	3,178,976	2.77	2.17	2.21
東部		8	276,643	2.89	2.71	2.69	8	266,385	3.00	1.18	1.42
金馬地區		3	77,511	3.87	2.92	3.43	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		274	8,031,174	3.41	2.74	2.84	230	8,350,965	2.75	2.31	2.35
中央政府 管轄市		30	535,198	5.61	4.19	4.22	17	550,188	3.09	1.87	2.17
縣轄市		11	792,262	1.39	1.18	1.23	9	805,316	1.12	0.80	0.87
鎮		33	855,169	3.86	3.50	3.48	16	827,785	1.93	1.58	1.62
鄉		62	1,491,383	4.16	3.22	3.39	36	1,363,681	2.64	1.96	2.07
山地鄉 ⁴		1	105,407	0.95	0.63	0.63	4	96,738	4.13	3.22	3.53
總計		410	11,705,186	3.50	2.81	2.90	308	11,897,935	2.59	2.09	2.15

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 C70，C72

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		3	1,260,049	0.24	0.18	0.19	4	1,384,992	0.29	0.39	0.38
新北市		5	1,963,658	0.25	0.18	0.18	7	2,055,038	0.34	0.31	0.29
桃園市		1	1,116,111	0.09	0.06	0.07	1	1,132,926	0.09	0.06	0.07
台中市		8	1,384,164	0.58	0.42	0.45	8	1,431,097	0.56	0.35	0.37
台南市		3	937,342	0.32	0.19	0.19	6	943,564	0.64	0.58	0.66
高雄市		7	1,369,850	0.51	0.28	0.29	6	1,403,348	0.43	0.51	0.50
基隆市		1	184,139	0.54	0.32	0.35	1	184,754	0.54	0.46	0.55
新竹市		1	221,265	0.45	0.35	0.35	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		1	287,837	0.35	0.41	0.42	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		1	229,222	0.44	0.27	0.29	1	224,956	0.44	0.26	0.28
苗栗縣		1	281,290	0.36	0.26	0.31	1	264,169	0.38	0.28	0.34
彰化縣		3	647,449	0.46	0.31	0.36	2	625,353	0.32	0.23	0.26
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	1	241,407	0.41	1.58	1.16
雲林縣		0	352,821	0.00	0.00	0.00	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	0	241,875	0.00	0.00	0.00
屏東縣		1	417,815	0.24	0.19	0.22	3	401,369	0.75	0.48	0.49
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		0	111,570	0.00	0.00	0.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	1	5,588	17.90	9.22	10.60
北部		14	5,543,571	0.25	0.19	0.20	15	5,750,469	0.26	0.23	0.23
中部		11	2,637,139	0.42	0.29	0.32	11	2,626,342	0.42	0.36	0.34
南部		11	3,170,322	0.35	0.20	0.21	15	3,178,976	0.47	0.46	0.48
東部		0	276,643	0.00	0.00	0.00	0	266,385	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	1	75,763	1.32	0.56	0.65
直轄市		27	8,031,174	0.34	0.23	0.24	32	8,350,965	0.38	0.35	0.35
中央政府 管轄市		2	535,198	0.37	0.27	0.28	1	550,188	0.18	0.13	0.16
縣轄市		2	792,262	0.25	0.17	0.18	1	805,316	0.12	0.07	0.07
鎮		1	855,169	0.12	0.09	0.11	3	827,785	0.36	0.57	0.49
鄉		4	1,491,383	0.27	0.22	0.24	5	1,363,681	0.37	0.26	0.28
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		36	11,705,186	0.31	0.21	0.23	42	11,897,935	0.35	0.32	0.32

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		129	1,260,049	10.24	7.07	7.71	408	1,384,992	29.46	20.25	22.10
新北市		238	1,963,658	12.12	8.10	8.74	606	2,055,038	29.49	19.86	21.66
桃園市		80	1,116,111	7.17	5.04	5.39	256	1,132,926	22.60	16.89	18.16
台中市		138	1,384,164	9.97	6.98	7.64	436	1,431,097	30.47	21.35	23.14
台南市		119	937,342	12.70	8.72	9.43	301	943,564	31.90	22.08	23.92
高雄市		195	1,369,850	14.24	9.68	10.45	567	1,403,348	40.40	27.30	29.52
基隆市		13	184,139	7.06	3.72	4.18	61	184,754	33.02	22.31	24.26
新竹市		38	221,265	17.17	12.98	13.85	104	227,538	45.71	31.80	35.16
嘉義市		13	129,794	10.02	7.60	8.60	29	137,896	21.03	15.01	15.70
新竹縣		45	287,837	15.63	11.43	12.57	70	276,096	25.35	19.05	20.90
宜蘭縣		21	229,222	9.16	5.77	6.42	59	224,956	26.23	19.80	20.80
苗栗縣		20	281,290	7.11	5.30	5.87	77	264,169	29.15	21.72	23.84
彰化縣		68	647,449	10.50	6.99	7.57	201	625,353	32.14	22.91	24.74
南投縣		17	252,705	6.73	4.27	4.66	71	241,407	29.41	20.24	21.88
雲林縣		30	352,821	8.50	6.20	6.78	94	328,485	28.62	19.26	20.98
嘉義縣		19	261,238	7.27	4.40	4.91	54	241,875	22.33	15.26	16.40
屏東縣		44	417,815	10.53	7.13	7.67	108	401,369	26.91	18.71	20.00
澎湖縣		9	54,283	16.58	16.36	17.01	11	50,924	21.60	14.57	15.30
花蓮縣		14	165,073	8.48	5.93	6.58	29	161,174	17.99	12.55	13.41
台東縣		12	111,570	10.76	6.36	6.75	29	105,211	27.56	19.24	21.53
金門縣		3	70,010	4.29	2.50	3.10	10	70,175	14.25	9.81	10.37
連江縣		2	7,501	26.66	15.35	15.35	1	5,588	17.90	12.32	13.30
北部		584	5,543,571	10.53	7.25	7.86	1,641	5,750,469	28.54	19.97	21.73
中部		253	2,637,139	9.59	6.58	7.19	802	2,626,342	30.54	21.41	23.20
南部		399	3,170,322	12.59	8.64	9.35	1,070	3,178,976	33.66	23.07	24.89
東部		26	276,643	9.40	6.11	6.66	58	266,385	21.77	15.19	16.61
金馬地區		5	77,511	6.45	3.70	4.25	11	75,763	14.52	9.89	10.47
直轄市		899	8,031,174	11.19	7.66	8.30	2,574	8,350,965	30.82	21.30	23.11
中央政府 管轄市		64	535,198	11.96	8.68	9.46	194	550,188	35.26	24.32	26.55
縣轄市		42	792,262	5.30	3.89	4.21	124	805,316	15.40	10.54	11.38
鎮		75	855,169	8.77	6.10	6.66	233	827,785	28.15	19.86	21.41
鄉		187	1,491,383	12.54	8.29	9.09	457	1,363,681	33.51	24.23	26.25
山地鄉 ⁴		10	105,407	9.49	6.47	7.12	20	96,738	20.67	15.08	16.56
總計		1,268	11,705,186	10.83	7.43	8.07	3,582	11,897,935	30.11	20.94	22.70

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		7	1,260,049	0.56	0.47	0.45	9	1,384,992	0.65	0.51	0.54
新北市		22	1,963,658	1.12	1.67	1.42	20	2,055,038	0.97	1.01	0.95
桃園市		9	1,116,111	0.81	0.60	0.65	7	1,132,926	0.62	0.55	0.55
台中市		5	1,384,164	0.36	0.37	0.38	8	1,431,097	0.56	0.42	0.45
台南市		12	937,342	1.28	1.15	1.18	7	943,564	0.74	0.78	0.72
高雄市		8	1,369,850	0.58	0.49	0.50	18	1,403,348	1.28	1.06	1.09
基隆市		0	184,139	0.00	0.00	0.00	2	184,754	1.08	0.68	0.66
新竹市		2	221,265	0.90	1.64	1.34	3	227,538	1.32	0.88	0.97
嘉義市		0	129,794	0.00	0.00	0.00	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		3	287,837	1.04	1.34	1.25	1	276,096	0.36	0.14	0.21
宜蘭縣		1	229,222	0.44	0.22	0.25	1	224,956	0.44	0.36	0.43
苗栗縣		1	281,290	0.36	0.55	0.52	2	264,169	0.76	0.43	0.44
彰化縣		3	647,449	0.46	0.33	0.38	6	625,353	0.96	0.68	0.70
南投縣		1	252,705	0.40	0.32	0.35	1	241,407	0.41	0.27	0.29
雲林縣		4	352,821	1.13	1.51	1.39	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		1	261,238	0.38	0.22	0.24	1	241,875	0.41	0.21	0.24
屏東縣		1	417,815	0.24	0.21	0.27	0	401,369	0.00	0.00	0.00
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		4	165,073	2.42	3.92	3.41	1	161,174	0.62	0.76	0.78
台東縣		2	111,570	1.79	1.32	1.32	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		45	5,543,571	0.81	0.97	0.88	45	5,750,469	0.78	0.66	0.67
中部		13	2,637,139	0.49	0.49	0.50	15	2,626,342	0.57	0.41	0.43
南部		22	3,170,322	0.69	0.60	0.62	26	3,178,976	0.82	0.72	0.72
東部		6	276,643	2.17	2.94	2.62	1	266,385	0.38	0.45	0.47
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		63	8,031,174	0.78	0.82	0.78	69	8,350,965	0.83	0.72	0.72
中央政府 管轄市		2	535,198	0.37	0.79	0.64	5	550,188	0.91	0.57	0.60
縣轄市		3	792,262	0.38	0.32	0.35	7	805,316	0.87	0.67	0.69
鎮		7	855,169	0.82	1.31	1.23	2	827,785	0.24	0.17	0.17
鄉		11	1,491,383	0.74	0.72	0.69	4	1,363,681	0.29	0.15	0.18
山地鄉 ⁴		1	105,407	0.95	2.06	1.51	0	96,738	0.00	0.00	0.00
總計		86	11,705,186	0.73	0.82	0.77	87	11,897,935	0.73	0.61	0.62

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		4	1,260,049	0.32	0.13	0.15	1	1,384,992	0.07	0.02	0.03
新北市		12	1,963,658	0.61	0.36	0.36	1	2,055,038	0.05	0.03	0.03
桃園市		4	1,116,111	0.36	0.24	0.27	1	1,132,926	0.09	0.05	0.05
台中市		7	1,384,164	0.51	0.30	0.35	2	1,431,097	0.14	0.06	0.07
台南市		5	937,342	0.53	0.30	0.32	1	943,564	0.11	0.05	0.06
高雄市		1	1,369,850	0.07	0.03	0.03	2	1,403,348	0.14	0.06	0.08
基隆市		3	184,139	1.63	0.80	0.80	0	184,754	0.00	0.00	0.00
新竹市		1	221,265	0.45	0.30	0.30	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		3	129,794	2.31	1.20	1.19	0	137,896	0.00	0.00	0.00
新竹縣		0	287,837	0.00	0.00	0.00	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		0	229,222	0.00	0.00	0.00	0	224,956	0.00	0.00	0.00
苗栗縣		0	281,290	0.00	0.00	0.00	1	264,169	0.38	0.22	0.21
彰化縣		3	647,449	0.46	0.27	0.26	2	625,353	0.32	0.21	0.21
南投縣		2	252,705	0.79	0.64	0.73	0	241,407	0.00	0.00	0.00
雲林縣		0	352,821	0.00	0.00	0.00	0	328,485	0.00	0.00	0.00
嘉義縣		3	261,238	1.15	1.80	1.63	1	241,875	0.41	0.19	0.21
屏東縣		3	417,815	0.72	0.35	0.37	1	401,369	0.25	0.30	0.31
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣		0	165,073	0.00	0.00	0.00	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		1	111,570	0.90	0.42	0.49	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		2	70,010	2.86	1.38	1.47	0	70,175	0.00	0.00	0.00
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		24	5,543,571	0.43	0.25	0.26	4	5,750,469	0.07	0.04	0.04
中部		12	2,637,139	0.46	0.26	0.29	4	2,626,342	0.15	0.08	0.08
南部		15	3,170,322	0.47	0.31	0.31	5	3,178,976	0.16	0.10	0.11
東部		1	276,643	0.36	0.18	0.20	0	266,385	0.00	0.00	0.00
金馬地區		2	77,511	2.58	1.25	1.33	0	75,763	0.00	0.00	0.00
直轄市		33	8,031,174	0.41	0.23	0.25	8	8,350,965	0.10	0.04	0.05
中央政府 管轄市		7	535,198	1.31	0.73	0.72	0	550,188	0.00	0.00	0.00
縣轄市		2	792,262	0.25	0.20	0.21	0	805,316	0.00	0.00	0.00
鎮		2	855,169	0.23	0.13	0.13	1	827,785	0.12	0.07	0.06
鄉		10	1,491,383	0.67	0.52	0.52	4	1,363,681	0.29	0.21	0.22
山地鄉 ⁴		0	105,407	0.00	0.00	0.00	1	96,738	1.03	0.76	0.84
總計		54	11,705,186	0.46	0.27	0.29	13	11,897,935	0.11	0.06	0.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

不明原發部位 C80

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		34	1,260,049	2.70	1.25	1.39	39	1,384,992	2.82	1.03	1.22
新北市		65	1,963,658	3.31	1.73	2.10	43	2,055,038	2.09	0.96	1.19
桃園市		28	1,116,111	2.51	1.48	1.70	13	1,132,926	1.15	0.54	0.70
台中市		33	1,384,164	2.38	1.35	1.58	36	1,431,097	2.52	1.31	1.53
台南市		19	937,342	2.03	1.16	1.31	18	943,564	1.91	0.83	1.04
高雄市		61	1,369,850	4.45	2.35	2.71	54	1,403,348	3.85	1.74	2.00
基隆市		3	184,139	1.63	0.72	0.74	4	184,754	2.17	0.84	1.09
新竹市		2	221,265	0.90	0.51	0.69	6	227,538	2.64	1.40	1.62
嘉義市		5	129,794	3.85	2.06	2.39	2	137,896	1.45	0.72	0.84
新竹縣		11	287,837	3.82	2.07	2.47	9	276,096	3.26	1.62	1.96
宜蘭縣		8	229,222	3.49	1.65	1.98	3	224,956	1.33	0.69	0.73
苗栗縣		12	281,290	4.27	2.09	2.39	10	264,169	3.79	1.19	1.43
彰化縣		17	647,449	2.63	1.33	1.49	14	625,353	2.24	0.80	1.00
南投縣		8	252,705	3.17	1.46	1.50	3	241,407	1.24	0.78	0.86
雲林縣		12	352,821	3.40	1.55	1.70	6	328,485	1.83	0.51	0.67
嘉義縣		9	261,238	3.45	1.48	1.71	11	241,875	4.55	1.87	2.05
屏東縣		23	417,815	5.50	2.94	3.38	18	401,369	4.48	1.60	1.92
澎湖縣		1	54,283	1.84	1.06	0.98	2	50,924	3.93	1.37	1.54
花蓮縣		8	165,073	4.85	2.46	2.61	2	161,174	1.24	0.79	0.84
台東縣		4	111,570	3.59	1.95	2.22	4	105,211	3.80	2.19	2.56
金門縣		3	70,010	4.29	2.41	2.54	1	70,175	1.43	0.34	0.41
連江縣		1	7,501	13.33	9.32	9.32	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		163	5,543,571	2.94	1.51	1.76	127	5,750,469	2.21	0.93	1.13
中部		70	2,637,139	2.65	1.38	1.55	59	2,626,342	2.25	1.01	1.20
南部		118	3,170,322	3.72	1.96	2.25	105	3,178,976	3.30	1.41	1.64
東部		12	276,643	4.34	2.24	2.45	6	266,385	2.25	1.34	1.52
金馬地區		4	77,511	5.16	3.19	3.31	1	75,763	1.32	0.31	0.38
直轄市		240	8,031,174	2.99	1.58	1.84	203	8,350,965	2.43	1.09	1.31
中央政府 管轄市		10	535,198	1.87	0.98	1.13	12	550,188	2.18	1.01	1.22
縣轄市		20	792,262	2.52	1.40	1.54	14	805,316	1.74	0.79	0.94
鎮		37	855,169	4.33	2.15	2.49	18	827,785	2.17	0.81	0.98
鄉		60	1,491,383	4.02	1.97	2.19	51	1,363,681	3.74	1.41	1.63
山地鄉 ⁴		2	105,407	1.90	1.06	1.18	6	96,738	6.20	4.30	4.83
總計		368	11,705,186	3.14	1.64	1.88	298	11,897,935	2.50	1.08	1.29

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		260	1,260,049	20.63	11.14	12.54	248	1,384,992	17.91	8.36	9.36
新北市		379	1,963,658	19.30	11.93	13.29	329	2,055,038	16.01	8.82	9.87
桃園市		190	1,116,111	17.02	11.10	12.55	134	1,132,926	11.83	7.51	8.31
台中市		252	1,384,164	18.21	12.49	13.83	217	1,431,097	15.16	8.97	9.94
台南市		168	937,342	17.92	10.62	11.43	125	943,564	13.25	7.13	7.93
高雄市		253	1,369,850	18.47	10.94	12.20	225	1,403,348	16.03	8.98	9.99
基隆市		37	184,139	20.09	10.77	11.89	38	184,754	20.57	11.32	12.49
新竹市		37	221,265	16.72	11.04	12.42	31	227,538	13.62	8.40	9.53
嘉義市		31	129,794	23.88	14.89	16.48	20	137,896	14.50	8.50	9.07
新竹縣		43	287,837	14.94	10.68	11.48	51	276,096	18.47	12.45	13.27
宜蘭縣		49	229,222	21.38	10.90	12.33	34	224,956	15.11	7.84	8.74
苗栗縣		51	281,290	18.13	9.98	11.41	39	264,169	14.76	7.35	8.18
彰化縣		119	647,449	18.38	10.69	12.18	94	625,353	15.03	7.00	8.07
南投縣		47	252,705	18.60	8.70	10.04	48	241,407	19.88	11.38	12.23
雲林縣		55	352,821	15.59	8.49	9.46	46	328,485	14.00	6.34	7.05
嘉義縣		52	261,238	19.91	9.99	11.33	40	241,875	16.54	9.28	9.84
屏東縣		68	417,815	16.28	9.84	10.66	66	401,369	16.44	8.63	9.43
澎湖縣		7	54,283	12.90	6.40	8.00	8	50,924	15.71	9.02	9.88
花蓮縣		32	165,073	19.39	10.49	11.69	22	161,174	13.65	7.16	7.92
台東縣		22	111,570	19.72	12.75	13.02	6	105,211	5.70	4.90	4.46
金門縣		6	70,010	8.57	4.44	5.28	7	70,175	9.98	7.89	8.56
連江縣		2	7,501	26.66	13.88	15.41	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		1,046	5,543,571	18.87	11.27	12.64	904	5,750,469	15.72	8.63	9.60
中部		473	2,637,139	17.94	11.14	12.46	405	2,626,342	15.42	8.38	9.32
南部		579	3,170,322	18.26	10.70	11.79	484	3,178,976	15.23	8.40	9.25
東部		54	276,643	19.52	11.32	12.16	28	266,385	10.51	6.22	6.52
金馬地區		8	77,511	10.32	5.30	6.22	7	75,763	9.24	7.34	7.97
直轄市		1,502	8,031,174	18.70	11.42	12.72	1,278	8,350,965	15.30	8.43	9.39
中央政府 管轄市		105	535,198	19.62	11.90	13.21	89	550,188	16.18	9.42	10.42
縣轄市		91	792,262	11.49	6.78	7.71	70	805,316	8.69	5.07	5.57
鎮		121	855,169	14.15	7.53	8.68	114	827,785	13.77	7.09	7.69
鄉		341	1,491,383	22.86	12.82	14.10	277	1,363,681	20.31	10.68	11.68
山地鄉 ⁴		17	105,407	16.13	13.51	14.12	13	96,738	13.44	10.18	10.03
總計		2,161	11,705,186	18.46	11.04	12.31	1,828	11,897,935	15.36	8.43	9.34

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		11	1,260,049	0.87	0.87	0.87	8	1,384,992	0.58	0.49	0.51
新北市		21	1,963,658	1.07	0.87	0.94	22	2,055,038	1.07	0.90	0.96
桃園市		9	1,116,111	0.81	0.62	0.72	7	1,132,926	0.62	0.61	0.62
台中市		13	1,384,164	0.94	0.88	0.94	12	1,431,097	0.84	0.84	0.86
台南市		4	937,342	0.43	0.33	0.37	7	943,564	0.74	0.79	0.84
高雄市		11	1,369,850	0.80	0.73	0.80	17	1,403,348	1.21	1.11	1.20
基隆市		1	184,139	0.54	0.19	0.22	2	184,754	1.08	0.38	0.45
新竹市		0	221,265	0.00	0.00	0.00	0	227,538	0.00	0.00	0.00
嘉義市		1	129,794	0.77	0.85	0.84	1	137,896	0.73	0.52	0.57
新竹縣		5	287,837	1.74	1.85	1.95	0	276,096	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣		3	229,222	1.31	0.87	0.93	3	224,956	1.33	1.33	1.38
苗栗縣		3	281,290	1.07	0.83	0.82	2	264,169	0.76	0.91	0.92
彰化縣		9	647,449	1.39	1.29	1.43	2	625,353	0.32	0.39	0.39
南投縣		0	252,705	0.00	0.00	0.00	3	241,407	1.24	1.39	1.51
雲林縣		0	352,821	0.00	0.00	0.00	1	328,485	0.30	0.38	0.38
嘉義縣		0	261,238	0.00	0.00	0.00	3	241,875	1.24	0.89	0.92
屏東縣		3	417,815	0.72	1.06	1.02	4	401,369	1.00	1.02	1.01
澎湖縣		0	54,283	0.00	0.00	0.00	2	50,924	3.93	2.69	2.75
花蓮縣		1	165,073	0.61	0.98	0.93	0	161,174	0.00	0.00	0.00
台東縣		2	111,570	1.79	1.00	1.00	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣		0	70,010	0.00	0.00	0.00	1	70,175	1.43	2.83	2.67
連江縣		0	7,501	0.00	0.00	0.00	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		53	5,543,571	0.96	0.81	0.86	44	5,750,469	0.77	0.68	0.71
中部		22	2,637,139	0.83	0.79	0.86	18	2,626,342	0.69	0.72	0.75
南部		19	3,170,322	0.60	0.57	0.61	34	3,178,976	1.07	1.00	1.06
東部		3	276,643	1.08	0.97	0.93	0	266,385	0.00	0.00	0.00
金馬地區		0	77,511	0.00	0.00	0.00	1	75,763	1.32	2.62	2.47
直轄市		69	8,031,174	0.86	0.75	0.81	73	8,350,965	0.87	0.81	0.86
中央政府 管轄市		2	535,198	0.37	0.28	0.29	3	550,188	0.55	0.27	0.31
縣轄市		1	792,262	0.13	0.21	0.20	5	805,316	0.62	0.63	0.65
鎮		8	855,169	0.94	0.85	0.88	1	827,785	0.12	0.20	0.19
鄉		17	1,491,383	1.14	1.08	1.13	15	1,363,681	1.10	1.08	1.11
山地鄉 ⁴		1	105,407	0.95	1.46	1.37	1	96,738	1.03	1.05	1.03
總計		97	11,705,186	0.83	0.74	0.79	97	11,897,935	0.82	0.77	0.81

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市		191	1,260,049	15.16	8.04	9.10	195	1,384,992	14.08	6.48	7.32
新北市		284	1,963,658	14.46	8.70	9.85	237	2,055,038	11.53	6.21	7.00
桃園市		140	1,116,111	12.54	8.18	9.17	103	1,132,926	9.09	5.73	6.37
台中市		187	1,384,164	13.51	9.12	10.15	169	1,431,097	11.81	6.75	7.53
台南市		130	937,342	13.87	7.92	8.66	90	943,564	9.54	4.93	5.50
高雄市		185	1,369,850	13.51	7.97	8.83	175	1,403,348	12.47	6.71	7.53
基隆市		25	184,139	13.58	7.59	8.23	27	184,754	14.61	8.75	9.61
新竹市		28	221,265	12.65	8.32	9.39	27	227,538	11.87	7.65	8.59
嘉義市		27	129,794	20.80	12.97	14.19	16	137,896	11.60	6.82	7.25
新竹縣		30	287,837	10.42	7.25	7.62	38	276,096	13.76	8.39	9.26
宜蘭縣		32	229,222	13.96	7.09	8.01	23	224,956	10.22	4.90	5.51
苗栗縣		41	281,290	14.58	7.87	9.12	26	264,169	9.84	4.99	5.48
彰化縣		89	647,449	13.75	7.73	8.87	73	625,353	11.67	5.37	6.16
南投縣		31	252,705	12.27	5.82	6.75	37	241,407	15.33	8.47	9.00
雲林縣		42	352,821	11.90	6.59	7.45	29	328,485	8.83	4.33	4.70
嘉義縣		40	261,238	15.31	7.89	8.91	30	241,875	12.40	7.06	7.46
屏東縣		49	417,815	11.73	6.89	7.48	41	401,369	10.22	5.19	5.79
澎湖縣		5	54,283	9.21	5.00	6.10	5	50,924	9.82	5.97	6.48
花蓮縣		22	165,073	13.33	7.08	7.81	15	161,174	9.31	5.22	5.78
台東縣		16	111,570	14.34	9.97	9.95	4	105,211	3.80	1.10	1.57
金門縣		6	70,010	8.57	4.44	5.28	5	70,175	7.13	4.42	4.91
連江縣		1	7,501	13.33	6.04	6.95	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部		771	5,543,571	13.91	8.20	9.25	676	5,750,469	11.76	6.34	7.11
中部		349	2,637,139	13.23	8.09	9.10	308	2,626,342	11.73	6.23	6.91
南部		436	3,170,322	13.75	7.96	8.79	357	3,178,976	11.23	6.00	6.65
東部		38	276,643	13.74	8.16	8.61	19	266,385	7.13	3.61	4.14
金馬地區		7	77,511	9.03	4.56	5.43	5	75,763	6.60	4.11	4.58
直轄市		1,117	8,031,174	13.91	8.37	9.36	969	8,350,965	11.60	6.22	6.98
中央政府 管轄市		80	535,198	14.95	9.21	10.14	70	550,188	12.72	7.77	8.55
縣轄市		63	792,262	7.95	4.69	5.36	44	805,316	5.46	3.13	3.46
鎮		85	855,169	9.94	5.14	5.98	87	827,785	10.51	5.25	5.76
鄉		256	1,491,383	17.17	9.57	10.53	195	1,363,681	14.30	7.22	7.99
山地鄉 ⁴		8	105,407	7.59	6.82	6.81	7	96,738	7.24	4.68	4.87
總計		1,602	11,705,186	13.69	8.09	9.05	1,365	11,897,935	11.47	6.13	6.84

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

漿細胞瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ²	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 ³
台北市	45	1,260,049	3.57	1.61	1.86	35	1,384,992	2.53	1.09	1.21
新北市	64	1,963,658	3.26	1.81	2.01	62	2,055,038	3.02	1.39	1.59
桃園市	36	1,116,111	3.23	2.08	2.39	22	1,132,926	1.94	1.07	1.20
台中市	44	1,384,164	3.18	2.00	2.22	34	1,431,097	2.38	1.31	1.47
台南市	27	937,342	2.88	1.45	1.63	24	943,564	2.54	1.18	1.33
高雄市	49	1,369,850	3.58	1.79	2.11	28	1,403,348	2.00	0.96	1.04
基隆市	10	184,139	5.43	2.67	3.09	8	184,754	4.33	1.78	1.97
新竹市	9	221,265	4.07	2.72	3.03	4	227,538	1.76	0.74	0.94
嘉義市	3	129,794	2.31	1.06	1.45	3	137,896	2.18	1.15	1.25
新竹縣	6	287,837	2.08	1.30	1.52	10	276,096	3.62	2.45	2.61
宜蘭縣	14	229,222	6.11	2.94	3.39	8	224,956	3.56	1.61	1.85
苗栗縣	7	281,290	2.49	1.28	1.47	9	264,169	3.41	1.17	1.47
彰化縣	19	647,449	2.93	1.49	1.71	17	625,353	2.72	1.08	1.33
南投縣	15	252,705	5.94	2.77	3.16	6	241,407	2.49	1.21	1.32
雲林縣	13	352,821	3.68	1.90	2.01	16	328,485	4.87	1.64	1.96
嘉義縣	11	261,238	4.21	1.89	2.20	6	241,875	2.48	0.99	1.11
屏東縣	16	417,815	3.83	1.89	2.17	16	401,369	3.99	1.93	2.13
澎湖縣	2	54,283	3.68	1.40	1.91	0	50,924	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	9	165,073	5.45	2.43	2.95	7	161,174	4.34	1.94	2.14
台東縣	3	111,570	2.69	1.36	1.58	0	105,211	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	70,010	0.00	0.00	0.00	1	70,175	1.43	0.65	0.97
連江縣	1	7,501	13.33	7.84	8.46	0	5,588	0.00	0.00	0.00
北部	191	5,543,571	3.45	1.87	2.12	158	5,750,469	2.75	1.29	1.46
中部	91	2,637,139	3.45	1.95	2.18	73	2,626,342	2.78	1.32	1.53
南部	108	3,170,322	3.41	1.67	1.95	77	3,178,976	2.42	1.15	1.27
東部	12	276,643	4.34	2.02	2.41	7	266,385	2.63	1.17	1.29
金馬地區	1	77,511	1.29	0.74	0.79	1	75,763	1.32	0.62	0.92
直轄市	265	8,031,174	3.30	1.79	2.04	205	8,350,965	2.45	1.18	1.32
中央政府 管轄市	22	535,198	4.11	2.28	2.65	15	550,188	2.73	1.25	1.42
縣轄市	26	792,262	3.28	1.84	2.10	18	805,316	2.24	1.15	1.27
鎮	25	855,169	2.92	1.37	1.63	20	827,785	2.42	0.98	1.15
鄉	65	1,491,383	4.36	2.07	2.34	58	1,363,681	4.25	1.79	2.07
山地鄉 ⁴	7	105,407	6.64	4.68	5.27	4	96,738	4.13	2.28	2.54
總計	403	11,705,186	3.44	1.83	2.09	316	11,897,935	2.66	1.25	1.41

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3 年齡標準化率²係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉⁴：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 108 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2019 (CONTINUED)

註：

2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率²：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 每 10 萬人口年齡標準化發生率³：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 北部地區：包含新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
5. 中部地區：包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣。
6. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。
7. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
8. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
9. 直轄市：舊稱「院轄市」，人口聚集達 125 萬人以上得設直轄市，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。
10. 中央政府管轄市：隸屬中央政府管轄，舊稱「省轄市」，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設中央政府管轄市，包含基隆市、新竹市、嘉義市。
11. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
12. 鎮：隸屬於縣。
13. 鄉：隸屬於縣。
14. 山地鄉⁴：包含：
 - 新北市－烏來區；
 - 桃園市－復興區；
 - 台中市－和平區；
 - 高雄市－茂林區、桃源區、那瑪夏區；
 - 宜蘭縣－大同鄉、南澳鄉；
 - 新竹縣－尖石鄉、五峰鄉；
 - 苗栗縣－泰安鄉；
 - 南投縣－信義鄉、仁愛鄉；
 - 嘉義縣－阿里山鄉；
 - 屏東縣－三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
 - 花蓮縣－秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；
 - 台東縣－海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉。

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 108 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	121,254
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,094
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,204
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	295
C01-C02	舌 TONGUE	2,314
C03	齒齦 GUM	798
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	221
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,414
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	941
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,206
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	330
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,560
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	40,120
C15	食道 ESOPHAGUS	2,833
C16	胃 STOMACH	3,938
C17	小腸 SMALL INTESTINE	478

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
111,739	1,585	9	93.47	203	43	7,324	345	6	C00-C80
10,015	13	0	99.35	0	5	46	15	0	C00-C14
8,139	9	0	99.32	0	5	38	13	0	C00-C14 ³
295	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C00
2,303	1	0	99.57	0	1	8	1	0	C01-C02
795	0	0	99.62	0	0	1	2	0	C03
220	0	0	99.55	0	0	0	1	0	C04
2,400	1	0	99.46	0	1	10	2	0	C05-C06
925	3	0	98.62	0	0	10	3	0	C09-C10
1,186	4	0	98.67	0	3	9	4	0	C12-C13
15	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C14
324	4	0	99.39	0	0	1	1	0	C07-C08
1,552	0	0	99.49	0	0	7	1	0	C11
33,250	371	4	83.81	51	25	6,263	152	4	C15-C26, C48
2,816	0	0	99.40	0	1	13	3	0	C15
3,870	9	0	98.50	1	5	42	11	0	C16
471	1	0	98.74	0	0	5	1	0	C17

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 108 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	17,302
C18	結腸 COLON	11,031
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	6,271
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,272
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,173
C25	胰 PANCREAS	2,803
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	300
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	21
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	18,012
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	262
C32	喉 LARYNX	846
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	16,233
C38.4	胸膜 PLEURA	82
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	589
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	2,612
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	176

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
16,995	10	0	98.28	9	8	245	33	2	C18-C21
10,782	10	0	97.83	8	7	195	27	2	C18
6,213	0	0	99.08	1	1	50	6	0	C19-C21
5,704	198	1	52.37	22	4	5,273	69	1	C22
975	24	0	85.17	0	3	163	8	0	C23-C24
2,133	109	1	80.02	19	4	511	25	1	C25
268	18	2	96.00	0	0	10	2	0	C48
18	2	0	95.24	0	0	1	0	0	C26
16,628	864	1	97.12	4	1	468	45	1	C30-C39
262	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C30-C31
837	0	0	98.94	1	0	7	1	0	C32
14,867	859	1	96.88	3	1	458	43	1	C33-C34
78	4	0	100.00	0	0	0	0	0	C38.4
584	1	0	99.32	0	0	3	1	0	C37-C38.3, C38.8
2,498	2	0	95.71	87	0	2	23	0	C42⁴
170	0	0	96.59	0	0	5	1	0	C40-C41

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 108 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	609
C44	皮膚 SKIN	4,442
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	288
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	4,154
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	14,856
C50	男性乳房 MALE BREAST	53
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,396
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,393
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,124
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,677
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	188
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	7,500
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	7,115
C62	睪丸 TESTIS	283
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	102
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	5,777

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 0 M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
601	0	0	98.69	0	0	6	2	0	C47, C49
4,434	3	0	99.89	0	0	1	4	0	C44
284	2	0	99.31	0	0	1	1	0	C44 ⁵
4,150	1	0	99.93	0	0	0	3	0	C44
14,808	6	0	99.72	0	0	25	17	0	C50
53	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C50
6,291	46	0	99.08	1	2	45	11	0	C51-C58
11	0	0	78.57	0	0	2	1	0	C55
1,377	5	0	99.21	0	2	7	2	0	C53
3,110	4	0	99.68	0	0	9	1	0	C54
1,608	36	0	98.03	1	0	27	5	0	C56, C57.0-C57.4
185	1	0	98.94	0	0	0	2	0	C51-C52, C57.7-C57.9
7,396	2	0	98.64	24	0	66	12	0	C60-C63
7,012	1	0	98.57	24	0	66	12	0	C61
283	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C62
101	1	0	100.00	0	0	0	0	0	C60, C63
5,513	82	1	96.87	2	1	157	21	0	C64-C68

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 108 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,410
C64	腎 KIDNEY	1,615
C65	腎盂 RENAL PELVIS	967
C66	輸尿管 URETER	738
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	27
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	2
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	18
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	61
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	796
C71	腦 BRAIN	718
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	78
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	4,850
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	173
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	67
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	666
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (M-CODE 範圍請見附錄五)	3,989

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
2,357	24	0	98.80	0	0	22	7	0	C67
1,513	3	1	93.93	1	1	85	11	0	C64
908	25	0	96.48	0	0	32	2	0	C65
702	16	0	97.29	1	0	18	1	0	C66
24	3	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.0-C68.1
1	1	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.8
8	10	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.9
45	0	0	73.77	0	8	7	1	0	C69
700	2	2	88.44	3	1	77	11	0	C70-C72
631	1	2	88.30	3	1	72	8	0	C71
69	1	0	89.74	0	0	5	3	0	C70, C72
4,750	91	0	99.81	0	0	5	4	0	C73
160	0	0	92.49	2	0	9	1	1	C74-C75
60	4	0	95.52	0	0	1	2	0	C76
443	75	1	77.93	1	0	131	15	0	C80
3,922	23	0	98.90	28	0	9	7	0	

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 108 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,612
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	841
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	302
慢性骨髓性白血病 ⁶ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	274
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	237
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	21
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	559
骨髓分化不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES	371
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	1
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	6

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
2,498	2	0	95.71	87	0	2	23	0
837	0	0	99.52	4	0	0	0	0
302	0	0	100.00	0	0	0	0	0
269	0	0	98.18	5	0	0	0	0
226	0	0	95.36	9	0	0	2	0
20	0	0	95.24	0	0	0	1	0
490	1	0	87.84	60	0	0	8	0
351	1	0	94.88	7	0	2	10	0
0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
0	0	0	0.00	1	0	0	0	0
3	0	0	50.00	1	0	0	2	0

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 108 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019
(CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	3,989
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	194
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	2,967
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,596
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	371
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	719
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	35
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	74

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
3,922	23	0	98.90	28	0	9	7	0
192	1	0	99.48	0	0	0	1	0
2,938	19	0	99.66	8	0	2	0	0
2,571	18	0	99.73	5	0	2	0	0
367	1	0	99.19	3	0	0	0	0
698	0	0	97.08	18	0	0	3	0
34	0	0	97.14	1	0	0	0	0
60	3	0	85.14	1	0	7	3	0

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 108 年

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	121,254	71,714 (59.14)
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,094	5,659 (56.06)
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,204	5,382 (65.60)
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	295	262 (88.81)
C01-C02	舌 TONGUE	2,314	1,818 (78.57)
C03	齒齦 GUM	798	630 (78.95)
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	221	169 (76.47)
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,414	1,899 (78.67)
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	941	300 (31.88)
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,206	298 (24.71)
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15	6 (40.00)
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	330	272 (82.42)
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,560	5 (0.32)
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	40,120	21,534 (53.67)
C15	食道 ESOPHAGUS	2,833	855 (30.18)
C16	胃 STOMACH	3,938	2,332 (59.22)
C17	小腸 SMALL INTESTINE	478	346 (72.38)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																
放射治療	化學治療 ⁸	內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄		
Radiotherapy	Chemotherapy	Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record		
31,636 (26.09)	47,342 (39.04)	21,225 (17.50)	2,134 (1.76)	449 (0.37)	14,864 (12.26)	16,584 (13.68)	443 (0.37)	12,035 (9.93)								
5,491 (54.40)	5,241 (51.92)	-	-	82 (0.81)	-	-	377 (3.73)	618 (6.12)	2 (0.02)	754 (7.47)						
3,900 (47.54)	3,811 (46.45)	-	-	56 (0.68)	-	-	345 (4.21)	504 (6.14)	1 (0.01)	645 (7.86)						
49 (16.61)	45 (15.25)	-	-	-	-	-	-	5 (1.69)	-	-	25 (8.47)					
916 (39.59)	906 (39.15)	-	-	11 (0.48)	-	-	62 (2.68)	110 (4.75)	-	-	148 (6.40)					
422 (52.88)	363 (45.49)	-	-	9 (1.13)	-	-	26 (3.26)	45 (5.64)	-	-	63 (7.89)					
83 (37.56)	73 (33.03)	-	-	1 (0.45)	-	-	9 (4.07)	8 (3.62)	-	-	26 (11.76)					
941 (38.98)	870 (36.04)	-	-	18 (0.75)	-	-	66 (2.73)	100 (4.14)	-	-	181 (7.50)					
630 (66.95)	656 (69.71)	-	-	8 (0.85)	-	-	70 (7.44)	84 (8.93)	1 (0.11)	101 (10.73)						
851 (70.56)	888 (73.63)	-	-	9 (0.75)	-	-	112 (9.29)	152 (12.60)	-	-	100 (8.29)					
8 (53.33)	10 (66.67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (6.67)					
199 (60.30)	90 (27.27)	-	-	3 (0.91)	-	-	8 (2.42)	19 (5.76)	-	-	23 (6.97)					
1,392 (89.23)	1,340 (85.90)	-	-	23 (1.47)	-	-	24 (1.54)	95 (6.09)	1 (0.06)	86 (5.51)						
5,391 (13.44)	17,399 (43.37)	4 (0.01)	470 (1.17)	2 (0.00)	3,943 (9.83)	7,608 (18.96)	17 (0.04)	5,415 (13.50)								
1,765 (62.30)	1,902 (67.14)	-	-	65 (2.29)	-	-	26 (0.92)	641 (22.63)	-	-	344 (12.14)					
280 (7.11)	1,853 (47.05)	-	-	55 (1.40)	-	-	213 (5.41)	957 (24.30)	10 (0.25)	579 (14.70)						
11 (2.30)	90 (18.83)	-	-	-	-	-	112 (23.43)	64 (13.39)	-	-	72 (15.06)					

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 108 年 (續)

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	17,302	13,331 (77.05)
C18	結腸 COLON	11,031	8,646 (78.38)
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	6,271	4,685 (74.71)
C22 ⁴	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,272	3,091 (27.42)
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,173	586 (49.96)
C25	胰 PANCREAS	2,803	785 (28.01)
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	300	206 (68.67)
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	21	2 (9.52)
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	18,012	7,243 (40.21)
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	262	132 (50.38)
C32	喉 LARYNX	846	329 (38.89)
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	16,233	6,327 (38.98)
C38.4	胸膜 PLEURA	82	24 (29.27)
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	589	431 (73.17)
C42 ⁵	白血病 LEUKEMIA	2,612	2 (0.08)
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	176	129 (73.30)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，() 內為該治療方式佔該個案數之百分比。

4. 肝及肝內膽管的詳細治療方法分類，請見本年報第 39 頁首次療程的內文說明。

5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
2,067	(11.95)	8,846	(51.13)	-	-	18	(0.10)	-	-	2,133	(12.33)	2,261	(13.07)	1	(0.01)	1,789	(10.34)
267	(2.42)	5,452	(49.42)	-	-	12	(0.11)	-	-	1,411	(12.79)	1,498	(13.58)	1	(0.01)	1,230	(11.15)
1,800	(28.70)	3,394	(54.12)	-	-	6	(0.10)	-	-	722	(11.51)	763	(12.17)	-	-	559	(8.91)
856	(7.59)	2,744	(24.34)	-	-	306	(2.71)	-	-	1,361	(12.07)	2,158	(19.14)	2	(0.02)	1,864	(16.54)
134	(11.42)	405	(34.53)	-	-	7	(0.60)	-	-	5	(0.43)	318	(27.11)	1	(0.09)	232	(19.78)
228	(8.13)	1,425	(50.84)	-	-	16	(0.57)	-	-	45	(1.61)	1,156	(41.24)	3	(0.11)	492	(17.55)
48	(16.00)	127	(42.33)	4	(1.33)	2	(0.67)	2	(0.67)	47	(15.67)	47	(15.67)	-	-	33	(11.00)
2	(9.52)	7	(33.33)	-	-	1	(4.76)	-	-	1	(4.76)	6	(28.57)	-	-	10	(47.62)
4,190	(23.26)	5,961	(33.09)	-	-	656	(3.64)	1	(0.01)	4,152	(23.05)	4,950	(27.48)	30	(0.17)	1,911	(10.61)
150	(57.25)	115	(43.89)	-	-	5	(1.91)	-	-	3	(1.15)	19	(7.25)	-	-	49	(18.70)
501	(59.22)	274	(32.39)	-	-	1	(0.12)	-	-	39	(4.61)	29	(3.43)	-	-	75	(8.87)
3,322	(20.46)	5,360	(33.02)	-	-	640	(3.94)	-	-	4,095	(25.23)	4,817	(29.67)	29	(0.18)	1,724	(10.62)
8	(9.76)	52	(63.41)	-	-	4	(4.88)	-	-	9	(10.98)	28	(34.15)	1	(1.22)	18	(21.95)
209	(35.48)	160	(27.16)	-	-	6	(1.02)	1	(0.17)	6	(1.02)	57	(9.68)	-	-	45	(7.64)
65	(2.49)	1,700	(65.08)	311	(11.91)	5	(0.19)	197	(7.54)	533	(20.41)	334	(12.79)	276	(10.57)	444	(17.00)
44	(25.00)	84	(47.73)	-	-	2	(1.14)	1	(0.57)	6	(3.41)	15	(8.52)	-	-	20	(11.36)

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 108 年（續）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	609	468 (76.85)
C44	皮膚 SKIN	4,442	3,976 (89.51)
C44 ⁶	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	288	226 (78.47)
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	4,154	3,750 (90.27)
C50⁷	女性乳房 FEMALE BREAST	14,856	13,086 (88.09)
C50⁷	男性乳房 MALE BREAST	53	46 (86.79)
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,396	4,996 (78.11)
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14	2 (14.29)
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,393	617 (44.29)
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,124	2,782 (89.05)
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,677	1,495 (89.15)
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	188	100 (53.19)
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	7,500	4,173 (55.64)
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	7,115	3,812 (53.58)
C62	睪丸 TESTIS	283	272 (96.11)
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	102	89 (87.25)
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	5,777	4,693 (81.24)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

7. 乳房「荷爾蒙/類固醇治療」項目即為「內分泌治療」。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
237	(38.92)	129	(21.18)	-	-	-	-	-	-	22	(3.61)	44	(7.22)	-	-	57	(9.36)
241	(5.43)	80	(1.80)	-	-	27	(0.61)	-	-	18	(0.41)	80	(1.80)	1	(0.02)	315	(7.09)
36	(12.50)	25	(8.68)	-	-	22	(7.64)	-	-	13	(4.51)	25	(8.68)	-	-	36	(12.50)
205	(4.94)	55	(1.32)	-	-	5	(0.12)	-	-	5	(0.12)	55	(1.32)	1	(0.02)	279	(6.72)
8,292	(55.82)	8,096	(54.50)	10,514	(70.77)	-	-	17	(0.11)	2,883	(19.41)	663	(4.46)	7	(0.05)	468	(3.15)
14	(26.42)	23	(43.40)	41	(77.36)	-	-	-	-	5	(9.43)	5	(9.43)	-	-	2	(3.77)
1,805	(28.22)	2,833	(44.29)	278	(4.35)	-	-	-	-	350	(5.47)	321	(5.02)	9	(0.14)	384	(6.00)
3	(21.43)	5	(35.71)	-	-	-	-	-	-	1	(7.14)	3	(21.43)	-	-	5	(35.71)
834	(59.87)	726	(52.12)	-	-	-	-	-	-	27	(1.94)	121	(8.69)	2	(0.14)	141	(10.12)
881	(28.20)	754	(24.14)	261	(8.35)	-	-	-	-	39	(1.25)	90	(2.88)	6	(0.19)	153	(4.90)
14	(0.83)	1,289	(76.86)	17	(1.01)	-	-	-	-	283	(16.88)	94	(5.61)	1	(0.06)	61	(3.64)
73	(38.83)	59	(31.38)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	(6.91)	-	-	24	(12.77)
1,862	(24.83)	305	(4.07)	4,008	(53.44)	7	(0.09)	48	(0.64)	1	(0.01)	680	(9.07)	3	(0.04)	664	(8.85)
1,843	(25.90)	195	(2.74)	4,007	(56.32)	5	(0.07)	47	(0.66)	1	(0.01)	668	(9.39)	3	(0.04)	652	(9.16)
11	(3.89)	95	(33.57)	1	(0.35)	1	(0.35)	1	(0.35)	-	-	7	(2.47)	-	-	3	(1.06)
8	(7.84)	15	(14.71)	-	-	1	(0.98)	-	-	-	-	5	(4.90)	-	-	9	(8.82)
432	(7.48)	2,173	(37.61)	1	(0.02)	358	(6.20)	-	-	211	(3.65)	504	(8.72)	1	(0.02)	507	(8.78)

表五之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 108 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019 (CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療
			Surgery
C67	膀胱 BLADDER	2,410	2,154 (89.38)
C64	腎 KIDNEY	1,615	1,304 (80.74)
C65	腎盂 RENAL PELVIS	967	694 (71.77)
C66	輸尿管 URETER	738	524 (71.00)
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	27	14 (51.85)
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	2	1 (50.00)
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	18	2 (11.11)
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	61	41 (67.21)
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	796	621 (78.02)
C71	腦 BRAIN	718	554 (77.16)
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	78	67 (85.90)
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	4,850	4,629 (95.44)
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	173	141 (81.50)
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	67	3 (4.48)
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	666	18 (2.70)
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	3,989	255 (6.39)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療		化學治療 ⁸		內分泌藥物/ 類固醇治療		免疫治療 ⁸		骨髓/幹細胞 移植或 內分泌手術治療		標靶治療		緩和照護		其他治療		未有首次治 療申報紀錄	
Radiotherapy		Chemotherapy		Hormone/ Steroid therapy		Immunotherapy		Hematologic transplant/ Endocrine procedure		Targeted therapy		Palliative care		Other treatment		No therapy record	
225	(9.34)	1,563	(64.85)	-	-	224	(9.29)	-	-	-	-	186	(7.72)	-	-	145	(6.02)
55	(3.41)	40	(2.48)	1	(0.06)	40	(2.48)	-	-	203	(12.57)	115	(7.12)	-	-	131	(8.11)
75	(7.76)	308	(31.85)	-	-	48	(4.96)	-	-	7	(0.72)	112	(11.58)	-	-	120	(12.41)
70	(9.49)	245	(33.20)	-	-	44	(5.96)	-	-	1	(0.14)	88	(11.92)	1	(0.14)	90	(12.20)
6	(22.22)	11	(40.74)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(3.70)	-	-	8	(29.63)
-	-	1	(50.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(50.00)
1	(5.56)	5	(27.78)	-	-	2	(11.11)	-	-	-	-	2	(11.11)	-	-	12	(66.67)
21	(34.43)	15	(24.59)	-	-	-	-	-	-	1	(1.64)	-	-	-	-	6	(9.84)
484	(60.80)	393	(49.37)	1	(0.13)	1	(0.13)	2	(0.25)	18	(2.26)	64	(8.04)	-	-	65	(8.17)
451	(62.81)	385	(53.62)	1	(0.14)	1	(0.14)	2	(0.28)	16	(2.23)	60	(8.36)	-	-	59	(8.22)
33	(42.31)	8	(10.26)	-	-	-	-	-	-	2	(2.56)	4	(5.13)	-	-	6	(7.69)
2,312	(47.67)	18	(0.37)	3,549	(73.18)	1	(0.02)	-	-	18	(0.37)	35	(0.72)	1	(0.02)	141	(2.91)
35	(20.23)	44	(25.43)	-	-	2	(1.16)	-	-	2	(1.16)	13	(7.51)	-	-	7	(4.05)
41	(61.19)	45	(67.16)	-	-	1	(1.49)	-	-	2	(2.99)	11	(16.42)	-	-	10	(14.93)
118	(17.72)	166	(24.92)	5	(0.75)	13	(1.95)	1	(0.15)	21	(3.15)	232	(34.83)	-	-	308	(46.25)
561	(14.06)	2,636	(66.08)	2,513	(63.00)	509	(12.76)	180	(4.51)	2,301	(57.68)	406	(10.18)	96	(2.41)	555	(13.91)

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 108 年

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery	
白血病與骨髓增生性腫瘤 LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL	2,612	2	(0.08)
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	841	1	(0.12)
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	302	-	-
慢性骨髓性白血病 ⁹ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	274	-	-
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	237	1	(0.42)
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	21	-	-
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	559	-	-
骨髓分化不良症候群 MYELOYDYSPLASTIC SYNDROMES	371	-	-
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0	-	-
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	1	-	-
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	6	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

9. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT										
放射治療	化學治療	類固醇治療	免疫治療	骨髓/幹細胞移植	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次治療申報紀錄		
Radiotherapy	Chemotherapy	Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record		
65 (2.49)	1,700 (65.08)	311 (11.91)	5 (0.19)	197 (7.54)	533 (20.41)	334 (12.79)	276 (10.57)	444 (17.00)		
22 (2.62)	691 (82.16)	11 (1.31)	1 (0.12)	121 (14.39)	108 (12.84)	124 (14.74)	53 (6.30)	90 (10.70)		
32 (10.60)	282 (93.38)	239 (79.14)	- -	53 (17.55)	67 (22.19)	24 (7.95)	- -	13 (4.30)		
- -	124 (45.26)	2 (0.73)	2 (0.73)	2 (0.73)	270 (98.54)	9 (3.28)	- -	3 (1.09)		
5 (2.11)	103 (43.46)	47 (19.83)	- -	- -	33 (13.92)	18 (7.59)	- -	121 (51.05)		
2 (9.52)	10 (47.62)	5 (23.81)	- -	6 (28.57)	6 (28.57)	3 (14.29)	- -	9 (42.86)		
1 (0.18)	327 (58.50)	5 (0.89)	2 (0.36)	1 (0.18)	41 (7.33)	31 (5.55)	221 (39.53)	101 (18.07)		
3 (0.81)	162 (43.67)	2 (0.54)	- -	14 (3.77)	7 (1.89)	122 (32.88)	2 (0.54)	103 (27.76)		
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
- -	- -	- -	- -	- -	1 (100.00)	1 (100.00)	- -	- -		
- -	1 (16.67)	- -	- -	- -	- -	2 (33.33)	- -	4 (66.67)		

表五之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 108 年（續完）

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2019 (CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療	
		Surgery	
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA	3,989	255	(6.39)
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	194	6	(3.09)
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	2,967	223	(7.52)
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,596	196	(7.55)
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	371	27	(7.28)
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	719	7	(0.97)
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	35	14	(40.00)
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	74	5	(6.76)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

申 報 治 療 方 法 ² METHODS OF CANCER TREATMENT													
放射治療	化學治療	類固醇治療	免疫治療	骨髓/幹細胞移植	標靶治療	緩和照護	其他治療	未有首次治療申報紀錄					
Radiotherapy	Chemotherapy	Steroid therapy	Immunotherapy	Hematologic transplant/ Endocrine procedure	Targeted therapy	Palliative care	Other treatment	No therapy record					
561 (14.06)	2,636 (66.08)	2,513 (63.00)	509 (12.76)	180 (4.51)	2,301 (57.68)	406 (10.18)	96 (2.41)	555 (13.91)					
55 (28.35)	178 (91.75)	64 (32.99)	1 (0.52)	3 (1.55)	9 (4.64)	7 (3.61)	-	-	10 (5.15)				
416 (14.02)	2,101 (70.81)	1,897 (63.94)	28 (0.94)	53 (1.79)	1,748 (58.91)	265 (8.93)	96 (3.24)	430 (14.49)					
359 (13.83)	1,862 (71.73)	1,706 (65.72)	19 (0.73)	36 (1.39)	1,741 (67.06)	234 (9.01)	63 (2.43)	362 (13.94)					
57 (15.36)	239 (64.42)	191 (51.48)	9 (2.43)	17 (4.58)	7 (1.89)	31 (8.36)	33 (8.89)	68 (18.33)					
85 (11.82)	312 (43.39)	520 (72.32)	478 (66.48)	123 (17.11)	526 (73.16)	128 (17.80)	-	-	76 (10.57)				
1 (2.86)	12 (34.29)	8 (22.86)	2 (5.71)	-	-	2 (5.71)	1 (2.86)	-	-	6 (17.14)			
4 (5.41)	33 (44.59)	24 (32.43)	-	-	1 (1.35)	16 (21.62)	5 (6.76)	-	-	33 (44.59)			

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 108 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2019

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C73) 甲狀腺	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	65	41	46	44	95	212
發生率	6.29	4.27	3.88	4.06	5.86	14.12
百分比	40.63%	40.20%	24.73%	26.83%	17.40%	28.92%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C73) 甲狀腺	(C50) 女性乳房
發生數	21	20	23	26	66	94
發生率	2.03	2.08	1.94	2.40	4.07	6.26
百分比	13.13%	19.61%	12.37%	15.85%	12.09%	12.82%
3	(C22) , (C74-C75) 肝及肝內膽管， 其他內分泌腺 並列	(C69) 眼及淚腺	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(C70-C72) 中樞神經系統	(C18-C21) , (M-980-999) ⁴ 結腸、直腸、 乙狀結腸連結部 及肛門，白血病 並列	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶
發生數	14	7	19	18	52	69
發生率	1.35	0.73	1.60	1.66	3.21	4.60
百分比	8.75%	6.86%	10.22%	10.98%	9.52%	9.41%
4	(C22) , (C74-C75) 肝及肝內膽管， 其他內分泌腺 並列	(C40-C41) , (C64.9) , (C74-C75) 骨、關節及關節 軟骨，腎， 其他內分泌腺 並列	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及 寬韌帶	(C18-C21) , (M-980-999) ⁴ 結腸、直腸、 乙狀結腸連結部 及肛門，白血病 並列	(M-980-999) ⁴ 白血病
發生數	14	5	18	14	52	47
發生率	1.35	0.52	1.52	1.29	3.21	3.13
百分比	8.75%	4.90%	9.68%	8.54%	9.52%	6.41%
5	(C47, C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C40-C41) , (C64.9) , (C74-C75) 骨、關節及關節 軟骨，腎， 其他內分泌腺 並列	(C62) 睪丸	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤
發生數	10	5	16	12	50	40
發生率	0.97	0.52	1.35	1.11	3.08	2.66
百分比	6.25%	4.90%	8.60%	7.32%	9.16%	5.46%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C50) 女性乳房	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C50) 女性乳房	(C61) 攝護腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門
244 13.67 13.83%	1,050 59.20 33.48%	1,454 78.91 25.06%	3,655 191.67 44.21%	2,618 146.41 19.79%	4,074 219.78 32.51%	3,074 211.08 15.95%	3,734 236.23 25.56%	4,324 436.07 18.72%	3,192 258.25 18.19%
(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C73) 甲狀腺	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管
237 13.27 13.44%	622 35.07 19.83%	877 47.59 15.12%	878 46.04 10.62%	1,999 111.80 15.11%	1,644 88.69 13.12%	2,925 200.85 15.18%	2,304 145.76 15.77%	3,723 375.46 16.12%	2,634 213.10 15.01%
(C73) 甲狀腺	(C54) 子宮體	(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C50) 女性乳房
197 11.03 11.17%	210 11.84 6.70%	605 32.83 10.43%	750 39.33 9.07%	1,817 101.62 13.74%	1,389 74.93 11.08%	2,595 178.19 13.46%	1,862 117.80 12.74%	3,650 368.10 15.80%	2,249 181.95 12.82%
(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C54) 子宮體	(C61) 攝護腺	(C22) 肝及肝內 膽管	(C22) 肝及肝內 膽管	(C22) 肝及肝內 膽管
165 9.24 9.35%	185 10.43 5.90%	470 25.51 8.10%	636 33.35 7.69%	1,612 90.15 12.19%	1,129 60.91 9.01%	2,326 159.71 12.07%	1,010 63.90 6.91%	2,598 262.01 11.25%	1,998 161.65 11.39%
(C22) 肝及肝內 膽管	(C18-C21) 結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	(C15) 食道	(C54) 子宮體	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C00-C14) ⁵ 口腔、口 咽及下咽	(C54) 子宮體	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚
117 6.55 6.63%	184 10.37 5.87%	367 19.92 6.33%	572 30.00 6.92%	936 52.35 7.08%	963 51.95 7.68%	2,161 148.39 11.21%	830 52.51 5.68%	1,391 140.28 6.02%	1,361 110.11 7.76%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 108 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2019 (CONTINUED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C40-C41), (C64.9), (C69) 骨、關節及關節軟骨，腎，眼及淚腺並列	(C40-C41), (C64.9), (C74-C75) 骨、關節及關節軟骨，腎，其他內分泌腺並列	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(C47,C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤
發生數	6	5	14	10	33	35
發生率	0.58	0.52	1.18	0.92	2.03	2.33
百分比	3.75%	4.90%	7.53%	6.10%	6.04%	4.77%
7	(C40-C41), (C64.9), (C69) 骨、關節及關節軟骨，腎，眼及淚腺並列	(C22), (C56, C57.0-C57.4) 肝及肝內膽管，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C00-C14) ⁵ 口腔、口咽及下咽	(C54) 子宮體
發生數	6	4	9	9	22	34
發生率	0.58	0.42	0.76	0.83	1.36	2.26
百分比	3.75%	3.92%	4.84%	5.49%	4.03%	4.64%
8	(C40-C41), (C64.9), (C69) 骨、關節及關節軟骨，腎，眼及淚腺並列	(C22), (C56, C57.0-C57.4) 肝及肝內膽管，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C73) 甲狀腺	(C07-C08) 主唾液腺	(C11) 鼻咽	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
發生數	6	4	8	5	21	28
發生率	0.58	0.42	0.68	0.46	1.29	1.87
百分比	3.75%	3.92%	4.30%	3.05%	3.85%	3.82%
9	(C48), (C62) 後腹膜腔及腹膜，睪丸並列	(C37-C38, C38.4 除外) 胸腺、心臟及縱膈	(C37-C38, C38.4 除外), (C47,C49) 胸腺、心臟及縱膈，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C18-C21), (M-965-966) ⁴ 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，何杰金氏淋巴瘤並列	(M-965-966) ⁴ 何杰金氏淋巴瘤	(C70-C72) 中樞神經系統
發生數	5	3	7	4	19	27
發生率	0.48	0.31	0.59	0.37	1.17	1.80
百分比	3.13%	2.94%	3.76%	2.44%	3.48%	3.68%
10	(C48), (C62) 後腹膜腔及腹膜，睪丸並列	(C25), (C48), (C47,C49) 胰，後腹膜及腹膜，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C37-C38, C38.4 除外), (C47,C49) 胸腺、心臟及縱膈，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C18-C21), (M-965-966) ⁴ 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，何杰金氏淋巴瘤並列	(C33-C34), (C37-C38, C38.4 除外), (C47,C49) 肺、支氣管及氣管，胸腺、心臟及縱膈，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C53) 子宮頸
發生數	5	2	7	4	14	22
發生率	0.48	0.21	0.59	0.37	0.86	1.47
百分比	3.13%	1.96%	3.76%	2.44%	2.56%	3.00%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C62) 睪丸	(C33-34) 肺、支氣管及氣管	(C11) 鼻咽	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C61) 攝護腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C16) 胃	(C16) 胃
114 6.39 6.46%	156 8.80 4.97%	327 17.75 5.64%	382 20.03 4.62%	432 24.16 3.27%	499 26.92 3.98%	868 59.60 4.50%	613 38.78 4.20%	1,127 113.66 4.88%	749 60.60 4.27%
(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C73) 甲狀腺	(C53) 子宮頸	(C16) 胃	(C22) 肝及肝內膽管	(C16) 胃	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C00-C14) ⁵ 口腔、口咽及下咽	(C65-C66, C68) 腎盂及其他泌尿器官
102 5.71 5.78%	144 8.12 4.59%	308 16.71 5.31%	238 12.48 2.88%	395 22.09 2.99%	351 18.94 2.80%	700 48.07 3.63%	401 25.37 2.74%	969 97.72 4.20%	621 50.24 3.54%
(M-980-999) ⁴ 白血病	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C64.9) 腎	(C16) 胃	(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚	(C67) 膀胱	(C25) 胰
91 5.10 5.16%	85 4.79 2.71%	161 8.74 2.78%	130 6.82 1.57%	356 19.91 2.69%	333 17.96 2.66%	510 35.02 2.65%	386 24.42 2.64%	885 89.25 3.83%	619 50.08 3.53%
(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C22) , (M-959-976) ⁴ 肝及肝內膽管，非何杰金氏淋巴瘤並列	(C73) 甲狀腺	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C16) 胃	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤
86 4.82 4.88%	72 4.06 2.30%	153 8.30 2.64%	111 5.82 1.34%	348 19.46 2.63%	251 13.54 2.00%	496 34.06 2.57%	376 23.79 2.57%	611 61.62 2.65%	507 41.02 2.89%
(C64.9) 腎	(C11) 鼻咽	(M-980-999) ⁴ 白血病	(C22) , (M-959-976) ⁴ 肝及肝內膽管，非何杰金氏淋巴瘤並列	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C25) 胰	(C25) 胰	(M-959-976) ⁴ 非何杰金氏淋巴瘤	(C67) 膀胱
60 3.36 3.40%	52 2.93 1.66%	151 8.19 2.60%	111 5.82 1.34%	312 17.45 2.36%	226 12.19 1.80%	461 31.65 2.39%	375 23.72 2.57%	575 57.99 2.49%	433 35.03 2.47%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019

口腔、口咽及下咽

ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX

C00 - C06, C09 - C10, C12 - C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80453	鱗狀細胞癌	男 Male	7,328	0	0	0	0
80513 80523	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	664	0	0	0	0
80703 80713							
80723 80743							
80753 80763							
80823 80833							
80843 80853							
80863 80903							
81233 85603							
88013							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	39	0	0	0	0
83103 84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	51	0	0	1	1
85003 85023							
85253 85503							
85623 85743							
89413 89823							
80413	神經內分泌癌	男 Male	1	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80203 80233	其他特定上皮癌	男 Male	12	0	0	0	0
80323 80413	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
82463 89803							
80103	非特定上皮癌	男 Male	25	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	5	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	4	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	18	0	0	0	0
88023 88043	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
88403 88903							
91403							
80003 87143	其他惡性腫瘤	男 Male	40	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	11	0	0	0	0
	總計	男 Male	7,468	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	736	0	0	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4 2	10 6	45 7	195 15	535 27	895 41	1,196 71	1,388 72	1,224 97	901 99	406 83	292 62	145 34	92 48
2 0	1 3	2 0	2 1	5 6	5 4	3 3	6 5	3 8	2 7	3 4	2 6	2 0	1 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	1 0	0 0	0 0	3 0	1 1	2 0	3 0	0 0	1 0	1 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	1 0	7 0	4 0	3 0	2 0	3 1	2 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2	2 0	0 1	0 0	0 1	0 0	1 0	1 0
1 0	3 0	0 0	0 0	1 0	2 0	1 0	2 0	5 1	1 0	0 0	1 1	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	3 2	5 0	7 1	8 0	5 2	4 0	2 0	2 1	3 3
7 2	15 9	47 7	197 17	545 34	909 48	1,209 76	1,409 78	1,247 107	914 108	417 88	299 70	154 36	99 54

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外）

LIP (Excludes Skin of Lip C44.0) C00

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	265	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	29	0	0	0	0
80713 80743							
80763 80843							
80903							
84303	唾液腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	266	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	29	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	1 0	6 0	20 0	39 0	39 2	43 0	44 3	33 7	22 5	6 3	7 3	5 6
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	6 0	20 0	39 0	39 2	44 0	44 3	33 7	22 5	6 3	7 3	5 6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

舌

TONGUE C01 - C02

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80453	鱗狀細胞癌	男 Male	1,960	0	0	0	0
80513 80523	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	319	0	0	0	0
80703 80713							
80723 80743							
80763 80823							
80833 80853							
80863 85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	6	0	0	0	0
84303 85253	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	7	0	0	0	0
80323 89803	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
88023 88903	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	9	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,987	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	327	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4 2	6 4	25 5	61 10	159 16	251 24	323 33	359 35	298 38	244 49	95 39	73 30	42 18	20 16
0 0	0 0	1 0	0 1	0 1	1 0	0 0	0 0	0 1	0 1	2 1	1 2	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	2 0	3 0	0 1	2 0	0 0	0 0	0 0
4 2	6 4	26 5	61 11	160 17	254 24	325 33	363 35	303 39	245 51	101 40	75 32	43 18	21 16

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

		齒齦					
		GUM C03					
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	698	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	79	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80763							
80823 88013							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
83103 85623	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	2	0	0	0	0
80203 80233	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
80323 82463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88003 88023	軟組織肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	714	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	84	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	1 0	12 0	33 2	96 0	96 8	112 7	121 11	100 11	55 16	37 12	19 4	16 8
0 0	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0
0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0
1 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0
1 0	3 1	1 0	12 0	33 3	97 1	97 9	114 7	123 11	100 11	56 16	38 13	21 4	18 8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

□底

FLOOR OF MOUTH C04

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	188	0	0	0	0
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	14	0	0	0	0
80743 80833							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	4	0	0	0	0
84303 85003	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	10	0	0	0	0
85623							
80103	非特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
88013 88403	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	196	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	25	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 1	0 0	3 1	12 1	26 1	25 2	36 4	37 0	28 2	11 0	5 1	2 1	3 0
0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 1	0 2	1 1	0 0	0 2	0 1	0 3	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	4 1	14 1	27 2	25 4	38 5	38 0	29 4	11 1	5 5	2 1	3 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH C05 - C06

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80513	鱗狀細胞癌	男 Male	2,212	0	0	0	0
80523 80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	116	0	0	0	0
80713 80723							
80743 80753							
80763 80833							
80853 80863							
85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	21	0	0	0	0
83103 84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	30	0	0	1	1
85003 85023							
85503 89413							
89823							
80323 80413	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	2	0	0	0	0
88003 88013	軟組織肉瘤	男 Male	7	0	0	0	0
88023 88903	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
91403							
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	10	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,261	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	153	0	0	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	4 0	15 0	84 3	189 3	267 8	376 11	406 11	364 19	248 16	116 13	95 11	27 5	21 16
2 0	1 2	1 0	1 0	4 4	2 3	1 1	3 4	2 6	2 3	1 2	0 1	1 0	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	3 0	1 0	0 0	1 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	0 0	0 1	0 0	1 0	0 0
0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	1 0	2 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	2 1	1 0	2 0	0 0	0 0	1 0	2 1
2 0	6 2	16 0	85 3	194 7	273 12	379 12	414 16	372 27	253 19	117 16	96 12	31 6	23 19

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

□咽

OROPHARYNX C09 - C10

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	843	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	73	0	0	0	0
80723 80743							
80753 80763							
80823 80833							
80853 80863							
85603							
82003 85743	唾液腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
80323 80413	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
88023	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	9	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
	總計	男 Male	862	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	79	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 1	2 1	20 0	56 4	92 6	142 11	164 10	161 19	101 11	53 6	27 3	15 0	10 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 0	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	3 0	1 1	1 0	1 0	0 1	0 2
0 0	0 1	2 1	20 0	57 4	94 6	148 11	164 10	165 19	102 13	55 6	29 3	16 1	10 4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

下咽

HYPOPHARYNX C12 - C13

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80333 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	1,149	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	33	0	0	0	0
80723 80743							
80823 80833							
80853 81233							
85603							
81403 82003	唾液腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
80413	神經內分泌癌	男 Male	1	0	0	0	0
	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	0	0	0	0	0
80203	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
87203	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003 87143	其他惡性腫瘤	男 Male	8	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,168	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	38	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	9	66	119	193	267	198	146	53	48	33	16
0	0	1	1	1	2	4	5	7	2	4	2	3	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	9	67	120	194	271	200	151	54	49	34	18
0	0	1	2	2	3	5	5	8	2	4	2	3	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX C14

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
80703 80713	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
88043	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	14	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 0	2 0	1 0	1 0	1 1	1 0	1 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 0	2 0	1 0	2 0	1 1	1 0	1 0	0 0	1 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

主唾液腺

MAJOR SALIVARY GLANDS C07 - C08

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
84303	黏液表皮樣癌 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	男 Male	35	0	0	0	1
		女 Female	32	0	0	0	3
80333 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	21	0	0	0	0
80713 80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	9	0	0	0	0
81403	腺癌，非特定 ADENOCARCINOMA	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
82003	腺樣囊狀癌 ADENOID CYSTIC CARCINOMA	男 Male	28	0	0	0	1
		女 Female	30	0	0	0	0
85503	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	14	0	0	0	1
		女 Female	14	0	0	0	2
85253 89403	惡性混合性腫瘤	男 Male	27	0	0	0	0
89413	MALIGNANT MIXED TUMOR	女 Female	17	0	0	0	0
80823	淋巴上皮癌 LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	10	0	0	0	0
81473 82903	其他特定上皮癌	男 Male	40	0	0	0	0
83103 85003	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	19	0	0	0	0
85023 85623							
89803 89823							
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0
89203 93643	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	190	0	0	0	3
	TOTAL	女 Female	140	0	0	0	5

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 1	3 3	2 1	5 2	1 1	0 6	3 6	5 4	4 2	5 1	1 0	1 2	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	2 1	4 0	4 0	1 1	5 0	1 1	1 0	2 5
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 1	0 0	1 0	1 0	0 0
0 1	0 1	0 1	2 1	1 0	4 2	3 5	4 8	2 6	6 3	3 0	1 1	0 1	1 0
0 0	0 2	0 1	2 2	2 0	1 1	0 2	2 1	2 1	1 0	2 1	1 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	2 1	0 2	3 1	2 1	3 3	5 2	4 2	3 0	3 2	1 1	1 2
0 1	0 0	0 1	1 1	2 0	1 0	0 2	0 1	0 3	1 1	0 0	1 0	0 0	1 0
0 0	0 0	1 0	2 1	2 1	1 1	5 2	7 3	8 4	6 4	3 1	1 0	2 1	2 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 3	2 1	2 0	3 0	0 1	1 0	1 0	1 0
0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 1	0 0
3 3	4 6	3 4	14 8	9 4	10 13	16 22	28 22	28 18	29 13	17 3	11 7	7 4	8 8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

鼻咽

NASOPHARYNX C11

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80413 80703	非角化鱗狀細胞癌	男 Male	1,162	0	0	1	0
80723 80733	NONKERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	331	0	0	0	0
80823 80833							
80713 80853	角化鱗狀細胞癌	男 Male	24	0	0	0	0
	KERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
82003 85603	唾液腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
80233 89203	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	1
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	18	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
80003 88003	其他惡性腫瘤	男 Male	6	0	0	0	0
88013	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,216	0	0	1	1
	TOTAL	女 Female	344	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
7 1	13 6	52 18	109 34	161 49	157 42	170 42	168 31	110 32	98 33	57 10	26 20	24 8	9 5
0 0	0 0	1 0	1 0	3 0	2 1	3 0	4 0	2 0	3 2	2 0	2 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	1 0	2 3	5 0	3 2	4 2	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	0 0	1 0	0 0	1 1	0 0	1 0
8 1	13 6	53 18	112 34	167 49	160 43	176 45	180 32	115 34	106 37	59 10	30 22	24 8	11 5

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

		食道					
		ESOPHAGUS		C15			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	2,432	0	0	0	0
80723 80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	160	0	0	0	0
80743 80763							
80833							
80453 81403	腺癌	男 Male	93	0	0	0	0
84903	ADENOCARCINOMA	女 Female	15	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	12	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	34	0	0	0	0
82443 82463	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	5	0	0	0	0
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	14	0	0	0	0
81543 82003	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
84303 85753							
80103	非特定上皮癌	男 Male	25	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	3	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	6	0	0	0	0
	GIST	女 Female	1	0	0	0	0
87203 87213	其他惡性肉瘤	男 Male	7	0	0	0	0
88003 88513	OTHER SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003 85743	其他惡性腫瘤	男 Male	16	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,639	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	194	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 0	1 1	12 4	114 3	237 14	368 19	517 21	474 25	334 18	137 9	109 17	65 13	63 16
0 0	1 0	2 0	4 0	0 1	5 0	6 0	16 0	11 0	13 2	10 3	7 2	8 4	10 3
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 0	1 1	3 0	4 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	7 0	7 0	4 2	4 1	5 1	3 1	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	2 0	5 0	1 1	2 0	2 0	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	2 0	2 0	3 0	4 0	3 2	4 0	3 1	1 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	0 0	0 0	3 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	0 0	0 0	3 0	1 0	1 0	0 0	1 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	3 0	3 1	1 1	1 0	2 0	2 1	2 2
1 0	1 0	3 1	17 5	119 4	248 14	385 19	551 23	507 28	361 25	163 13	127 21	80 19	76 22

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

		胃 STOMACH C16					
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81423	腺癌	男 Male	2,074	0	0	0	0
81443 81453	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,319	0	0	0	0
81483 82103							
82113 82553							
84803 84813							
84903 85103							
85763							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	10	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	26	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	74	0	0	0	0
82403 82443	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	53	0	0	0	0
82463 82493							
80143 80203	其他特定上皮癌	男 Male	13	0	0	0	0
80823 82143	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
85123 85743							
89803							
80103	非特定上皮癌	男 Male	44	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	28	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	124	0	0	0	0
	GIST	女 Female	109	0	0	0	0
88003 88013	其他惡性肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
88903 90443	OTHER SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
91403							
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	21	1	0	0	0
87203 90803	OTHER MALIGNANCY	女 Female	24	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,389	1	0	0	0
	TOTAL	女 Female	1,549	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
7 0	3 1	9 11	18 23	45 45	56 67	121 84	211 124	294 153	319 158	237 128	243 186	214 155	297 184
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	0 0	0 0	2 1	2 0	2 1	1 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	2 0	4 0	1 2	7 1	2 0	3 0	1 0	3 1
0 1	0 0	0 1	1 2	2 6	5 5	9 8	10 6	7 3	12 9	7 2	10 5	6 4	5 1
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	2 1	1 1	1 0	2 1	4 1
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 3	2 2	2 2	2 3	4 0	2 0	5 5	10 5	16 8
0 0	1 0	0 3	1 1	4 2	5 2	11 7	20 17	24 23	22 15	14 9	7 13	9 8	6 9
0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	2 1	0 0	0 0	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 1	0 2	1 1	2 4	3 5	13 10
7 1	5 1	10 15	21 26	54 53	69 77	147 101	248 150	330 189	370 187	266 142	272 213	245 179	344 215

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

小腸

SMALL INTESTINE C17

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82103	腺癌	男 Male	87	0	0	0	0
84803 84903	ADENOCARCINOMA	女 Female	64	0	0	0	1
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	26	0	0	0	0
82403 82463 82493	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	21	0	0	0	0
80333 85603	其他特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	8	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	123	0	0	0	0
	GIST	女 Female	128	0	0	0	0
88003 88023	其他惡性肉瘤	男 Male	9	0	0	0	0
88513 88583 88903 91403	OTHER SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	256	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	222	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 0	0 2	4 1	5 1	2 1	8 0	8 6	14 10	16 10	7 12	7 7	7 5	8 8
0 0	0 0	1 1	0 0	1 0	1 1	3 1	2 3	5 5	5 6	1 1	3 0	2 1	2 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	0 1	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 0	0 0	0 1	0 1	3 0
0 0	2 1	5 2	3 3	5 6	10 5	14 11	14 11	19 20	22 20	8 16	9 12	6 12	6 9
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	2 1	3 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1 1
1 0	2 1	7 5	8 4	11 7	14 8	25 12	26 21	42 36	49 36	16 30	20 21	15 20	20 20

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門

COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C18 - C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80453 81403	腺癌	男 Male	9,222	0	0	0	2
82013 82103	ADENOCARCINOMA	女 Female	6,754	0	0	0	0
82113 82133							
82203 82213							
82553 82613							
82633 82653							
84803 84813							
84903							
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	422	0	0	1	1
82403 82433	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	308	0	0	1	2
82443 82463							
82493 86933							
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	52	0	0	0	0
80703 80713	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	109	0	0	0	0
80723 81233							
81243 81543							
85103 85423							
85603 85743							
87203 87213							
87303 87723							
93643							
80103	非特定上皮癌	男 Male	61	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	79	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	18	0	0	0	0
	GIST	女 Female	17	0	0	0	0
88003 88583	其他惡性肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
88903 91403	OTHER SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
93643							
80003 87143	其他惡性腫瘤	男 Male	114	0	0	0	0
87463 90503	OTHER MALIGNANCY	女 Female	139	0	0	0	1
	總計	男 Male	9,893	0	0	1	3
	TOTAL	女 Female	7,409	0	0	1	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
10 3	20 15	34 33	129 108	298 227	461 425	781 605	1,060 668	1,426 825	1,516 911	1,017 703	941 712	809 756	718 763
6 4	11 6	20 12	52 28	56 43	42 34	62 50	52 28	43 31	38 39	16 16	7 9	9 3	6 2
0 0	4 0	0 1	1 0	2 4	4 4	8 10	7 14	6 15	4 15	2 11	6 11	1 12	7 12
0 0	0 0	0 0	0 1	2 3	3 4	6 1	6 2	5 2	10 6	7 7	8 16	8 11	6 26
1 0	0 0	0 0	0 0	0 2	1 0	2 2	3 4	5 4	2 1	1 2	3 2	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	3 1	4 2	6 3	6 2	9 8	9 4	12 3	13 13	15 21	37 80
17 7	35 21	55 46	182 138	362 280	515 470	865 671	1,134 718	1,495 886	1,579 976	1,055 742	979 764	842 803	774 883

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

結腸

COLON C18

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80453 81403	腺癌	男 Male	5,833	0	0	0	2
82013 82103	ADENOCARCINOMA	女 Female	4,723	0	0	0	0
82113 82133							
82203 82213							
82613 82633							
82653 84803							
84813 84903							
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	66	0	0	1	1
82403 82433	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	69	0	0	1	2
82443 82463							
82493 86933							
80203 80703	其他特定上皮癌	男 Male	9	0	0	0	0
81543 85103	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	19	0	0	0	0
85603 85743							
93643							
80103	非特定上皮癌	男 Male	37	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	63	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	GIST	女 Female	5	0	0	0	0
88583 88903	其他惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003 87143	其他惡性腫瘤	男 Male	89	0	0	0	0
90503	OTHER MALIGNANCY	女 Female	113	0	0	0	1
	總計	男 Male	6,038	0	0	1	3
	TOTAL	女 Female	4,993	0	0	1	3

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5 3	14 11	26 22	80 77	195 161	274 287	451 396	636 453	859 567	965 647	654 472	615 521	548 552	509 554
1 1	0 1	2 4	8 3	2 7	4 4	10 13	11 5	10 4	4 12	2 4	3 4	5 3	2 1
0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 1	0 1	1 2	0 1	0 1	2 3	0 4	4 5
0 0	0 0	0 0	0 1	1 2	2 4	4 1	3 1	4 2	7 5	5 5	4 12	3 7	4 23
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	0 1	0 1	1 1	1 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	3 1	4 2	5 3	3 2	7 5	5 2	9 3	12 12	12 16	29 66
6 4	15 12	28 26	88 81	202 172	284 298	471 414	653 463	882 582	982 668	671 485	636 553	568 582	548 649

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門

RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS C19 - C21

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 82103	腺癌	男 Male	3,389	0	0	0	0
82113 82203	ADENOCARCINOMA	女 Female	2,031	0	0	0	0
82553 82613							
82633 82653							
84803 84813							
84903							
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	356	0	0	0	0
82403 82443	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	239	0	0	0	0
82463 82493							
80323 80703	其他特定上皮癌	男 Male	43	0	0	0	0
80713 80723	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	90	0	0	0	0
81233 81243							
81543 85423							
85603 85743							
87203 87213							
87303 87723							
80103	非特定上皮癌	男 Male	24	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	16	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤	男 Male	15	0	0	0	0
	GIST	女 Female	12	0	0	0	0
88003 88903	其他惡性肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
91403 93643	OTHER SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003 87463	其他惡性腫瘤	男 Male	25	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	26	0	0	0	0
	總計	男 Male	3,855	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	2,416	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5 0	6 4	8 11	49 31	103 66	187 138	330 209	424 215	567 258	551 264	363 231	326 191	261 204	209 209
5 3	11 5	18 8	44 25	54 36	38 30	52 37	41 23	33 27	34 27	14 12	4 5	4 0	4 1
0 0	3 0	0 1	1 0	1 4	4 3	8 9	7 13	5 13	4 14	2 10	4 8	1 8	3 7
0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1 0	2 0	3 1	1 0	3 1	2 2	4 4	5 4	2 3
1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 2	3 3	5 3	1 0	0 2	3 1	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1 0	3 0	2 3	4 2	3 0	1 1	3 5	8 14
11 3	20 9	27 20	94 57	160 108	231 172	394 257	481 255	613 304	597 308	384 257	343 211	274 221	226 234

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

肝及肝內膽管

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS C22

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81703 81713 81723 81733 81743	肝細胞癌 HEPATOCELLULAR CARCINOMA	男 Male 女 Female	6,851 2,905	0 0	1 0	0 1	0 1
81403 81603 81613 81623 83103 84703 85603 85743	膽管癌 CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	673 497	0 0	0 0	0 0	0 0
81803	合併肝細胞癌和膽管癌 COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	131 48	0 0	0 0	0 0	0 0
89703	肝母細胞瘤 HEPATOBLASTOMA	男 Male 女 Female	14 5	11 4	2 0	1 1	0 0
80133 80203 80333 80413 80453 80703 80823 82403 82443 82463 82493 85033	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	16 20	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 80353 81543 89803	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	21 9	0 0	0 0	0 0	0 0
91203	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male 女 Female	29 17	0 0	0 0	0 0	0 0
88003 88053 88153 90403 91333	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	6 5	0 0	0 0	0 0	0 0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	16 9	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	7,757 3,515	11 4	3 0	1 2	0 1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	5 5	23 7	81 19	198 39	338 44	614 99	973 179	1,142 331	1,173 497	814 444	677 485	448 409	363 345
0 0	1 1	0 1	6 3	12 8	30 7	71 23	102 39	96 66	119 87	80 83	61 67	43 60	52 52
0 0	2 2	2 0	4 0	7 4	12 5	15 5	20 3	21 8	21 8	13 2	9 5	4 3	1 3
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	2 1	3 1	3 1	2 1	1 1	1 7	1 7	1 0
1 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1 0	4 0	4 0	1 1	0 0	3 4	2 2	1 1	3 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	5 1	4 3	6 1	3 3	5 5	1 3	2 1
0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0	0 0	1 0	1 1	1 3	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 0	1 0	2 1	3 1	1 0	0 3	2 2	5 1
2 0	8 8	25 8	92 22	220 54	385 57	708 128	1,109 223	1,270 412	1,325 598	916 537	755 574	500 485	427 402

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

膽囊及肝外膽管

GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS C23 - C24

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81443	腺癌	男 Male	506	0	0	0	0
81603 81623	ADENOCARCINOMA	女 Female	441	0	0	0	0
81633 82553							
82633 83103							
84803 84813							
84903 85043							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	12	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	13	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	15	0	0	0	0
82403 82443	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	12	0	0	0	0
82463 82493							
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	22	0	0	0	0
80703 81803	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	21	0	0	0	0
85003 85033							
85743							
80103 82433	非特定上皮癌	男 Male	28	0	0	0	0
88033	CARCINOMA, NOS	女 Female	24	0	0	0	0
89803	其他惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	38	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	39	0	0	0	0
	總計	男 Male	622	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	551	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	3 2	4 2	5 3	12 5	33 20	50 39	58 54	95 76	90 63	67 65	55 59	34 53
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 1	1 1	1 2	4 3	1 1	2 3	1 2	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1 1	1 1	2 1	2 2	3 3	1 2	2 0	1 0	1 1
0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 0	1 2	3 1	3 1	3 2	3 4	4 6	0 1	2 4
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2 0	1 1	1 0	2 2	5 1	1 3	5 3	2 6	8 8
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 1	0 0	1 2	4 2	3 3	2 0	5 4	4 10	17 17
0 0	0 0	4 2	6 2	8 4	17 7	37 25	58 44	70 63	113 89	98 73	85 81	64 78	62 83

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

		胰					
		PANCREAS		C25			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80353	腺癌	男 Male	1,037	0	0	0	0
81403 81603	ADENOCARCINOMA	女 Female	853	0	0	0	0
82553 83103							
84403 84533							
84703 84803							
84813 84903							
85003 85033							
85603							
85503	腺泡細胞癌	男 Male	7	0	0	0	0
	ACINAR CELL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌	男 Male	119	0	0	0	1
81503 81513	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	101	0	1	0	0
81523 81553							
82403 82413							
82443 82463							
82493							
84523	實性偽乳突瘤	男 Male	8	0	0	1	1
	SOLID PAPILLARY NEOPLASM	女 Female	29	0	1	0	2
80213 80463	其他特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
80703 81543	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
85703 85743							
85763							
80103 82533	非特定上皮癌	男 Male	100	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	81	0	0	0	0
88003 88053	惡性肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
89363 91203	SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	231	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	216	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,510	0	0	1	2
	TOTAL	女 Female	1,293	0	2	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 0	0 1	4 1	8 6	24 13	37 29	100 55	145 91	162 133	199 161	140 117	114 117	64 80	39 49
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	1 1	1 0	0 2	2 0	0 1	0 0	1 1
0 0	3 3	4 2	4 6	7 3	15 13	14 9	16 12	14 22	18 8	8 6	7 9	6 6	2 1
0 0	0 5	1 7	0 3	0 2	2 2	0 4	2 2	0 0	1 0	0 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 2	1 1	1 1	0 1	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3 1	5 3	9 5	13 6	11 12	15 17	21 7	8 15	14 15
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	1 1	3 0	3 1	6 4	12 9	22 13	17 15	25 20	42 23	30 46	70 84
1 0	3 10	9 10	13 16	35 18	62 46	125 75	187 120	214 174	247 201	191 162	185 158	108 149	127 150

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM C48

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
88503 88513	脂肪肉瘤	男 Male	48	0	0	0	1
88523 88543	LIPOSARCOMA	女 Female	31	0	0	0	0
88583							
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	25	0	0	0	0
93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	1	0	0	0	1
	EWING SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
90713 90853	生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	男 Male	2	0	0	1	0
	GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT TERATOMA	女 Female	1	1	0	0	0
90503 90513	惡性間皮瘤	男 Male	7	0	0	0	0
90523 90533	MALIGNANT MESOTHELIOMA	女 Female	10	0	0	0	1
87143 88003	其他惡性肉瘤	男 Male	21	2	0	0	0
88013 88023	OTHER SARCOMA	女 Female	22	1	0	0	0
88033 88043							
88053 88063							
88103 88113							
88153 88303							
89003 89103							
89363 89803							
90403 90433							
95003 95403							
84413 84603	漿液性腺癌	男 Male	0	0	0	0	0
84613	SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	56	0	0	0	0
80103 80333	其他上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
81403 83103	OTHER CARCINOMA	女 Female	43	0	0	0	0
83803 84803							
85503							
80003 82403	其他惡性腫瘤	男 Male	11	2	1	0	0
86803 86933	OTHER MALIGNANCY	女 Female	15	0	0	0	0
87003 94903							
	總計	男 Male	97	4	1	1	2
	TOTAL	女 Female	203	2	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	1 2	3 0	4 0	3 2	4 2	3 3	8 9	8 6	6 4	5 1	2 0	0 2
0 0	0 0	0 1	0 0	0 2	0 3	0 4	0 4	1 4	0 0	0 4	0 2	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 2	0 0	0 1	2 1	2 0	1 1	0 3	0 1
0 0	3 1	1 2	0 0	1 0	2 2	2 1	2 2	2 2	1 2	2 3	0 1	2 4	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 4	0 4	0 1	0 6	0 14	0 9	0 7	0 8	0 2	0 1
0 1	1 0	0 2	0 0	0 3	0 1	0 0	0 7	1 8	1 3	1 5	1 6	0 5	1 2
0 1	0 0	1 0	0 1	0 1	0 1	0 1	2 2	2 0	1 1	0 2	1 0	0 2	1 3
0 2	5 1	3 7	3 1	6 10	6 13	6 11	7 24	14 38	13 22	11 25	8 19	4 17	3 10

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）
AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM C26

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
82443 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80333	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
89363	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	16	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0	1 0	1 1	3 0	3 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 1	0 0	1 1	1 0	2 1	3 1	4 0	2 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳				C30 - C31				
NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR				C30 - C31				
ICD-O-3		組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80233	80523	鱗狀細胞癌	男 Male	84	0	0	0	0
80703	80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	37	0	0	0	0
80723	80743							
80833	85603							
81403	81443	腺癌	男 Male	7	0	0	0	0
82633		ADENOCARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
81473	82003	唾液腺癌	男 Male	15	0	0	0	0
85623	89413	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	11	0	0	0	0
89823								
80133	80413	神經內分泌癌	男 Male	9	0	0	0	0
82403	82463	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	3	0	0	0	0
85743								
80203		鼻與鼻竇未分化上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
		SINONASAL UNDIFFERENTIATED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80823	81213	其他特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
93023		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80103	80333	非特定上皮癌	男 Male	24	0	0	0	0
90453		CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
88003	88013	軟組織肉瘤	男 Male	5	1	0	0	0
88023	89103	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
91203								

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	4 2	1 1	5 2	7 6	13 4	14 2	12 4	12 4	4 7	5 1	5 2	2 2
1 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	3 2	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0
0 0	1 1	1 2	0 0	0 1	0 0	0 2	6 3	2 0	0 1	0 0	3 1	2 0	0 0
0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	3 1	1 0	1 2	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	1 0	0 1	2 0	2 0	2 1	0 0	0 0	1 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	2 0	0 0	1 1	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	1 0	0 0	4 1	2 0	1 1	4 2	3 0	2 2	3 1	0 0	3 1	1 0
0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳				C30 - C31			
NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR							
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
87203 87303	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
90813 93643 95223	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	181	1	0	0	0
		女 Female	81	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	3
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	2	10	2	13	14	18	32	25	21	10	11	13	8
0	2	5	2	7	7	9	11	8	12	8	4	3	3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

喉

LARYNX C32

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80523	鱗狀細胞癌	男 Male	777	0	0	0	0
80703 80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	44	0	0	0	0
80723 80743							
80753 80763							
80833 85603							
80413 82463	神經內分泌癌	男 Male	3	0	0	0	0
82493	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	1	0	0	0	0
80133 80203	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
84303	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
88903	軟組織肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003 86803	其他惡性腫瘤	男 Male	10	0	0	0	0
88023	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	798	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	48	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 1	2 0	23 2	35 1	101 1	131 7	143 9	127 12	75 3	79 3	36 1	25 4
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	0 1	0 0	1 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 0	2 0	1 0	2 0	1 0	1 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 1	2 0	24 3	36 1	105 1	134 7	145 9	129 13	77 4	82 4	38 1	26 4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	1,671	0	0	0	0
80723 80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	262	0	0	0	0
80743 80833							
81403 81443	腺癌	男 Male	5,146	0	0	0	0
82013 82303	ADENOCARCINOMA	女 Female	6,448	0	0	0	0
82503 82523							
82533 82543							
82553 82563							
82573 82603							
82653 83333							
84803 84813							
84903 85513							
85603	腺性鱗狀癌	男 Male	120	0	0	0	0
	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	81	0	0	0	0
80123 80133	大細胞癌	男 Male	118	0	0	0	1
80203 80823	LARGE CELL CARCINOMA	女 Female	56	0	0	0	0
80413 80453	小細胞癌	男 Male	962	0	0	0	0
	SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	122	0	0	0	0
80223 80313	肉瘤樣癌	男 Male	81	0	0	0	0
80323 80333	SARCOMATOID CARCINOMA	女 Female	32	0	0	0	0
89723 89803							
82403 82463	類癌腫瘤	男 Male	37	0	0	0	0
82493	CARCINOID TUMORS	女 Female	52	0	0	0	0
82003 84303	唾液腺樣癌	男 Male	16	0	0	0	0
85623 89823	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	11	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	1 0	1 0	5 0	12 8	26 5	91 20	139 21	198 41	333 32	213 41	280 40	211 32	161 22
1 2	12 8	16 36	59 109	133 221	221 356	389 626	660 884	846 1,021	931 1,037	645 704	551 659	363 463	319 322
0 0	0 0	0 0	0 0	3 9	5 6	9 5	14 6	13 17	23 15	18 9	23 9	4 3	8 2
0 0	0 0	0 0	1 1	1 3	4 6	10 8	18 10	19 9	27 10	13 2	10 5	8 1	6 1
0 0	0 0	1 1	4 2	12 1	16 6	52 8	112 14	164 19	182 27	126 12	131 14	92 11	70 7
0 0	0 0	0 0	1 1	3 1	5 0	3 3	7 0	10 2	17 4	7 6	14 5	8 5	6 5
0 0	0 0	1 0	2 2	0 2	1 5	2 4	6 6	8 7	3 12	6 7	4 5	2 2	2 0
0 1	0 0	0 0	1 0	2 2	1 2	2 0	1 2	2 0	5 4	0 0	1 0	0 0	1 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

肺、支氣管及氣管（續）

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG C33 - C34 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80233 85743 85763	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	9 6	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 80463	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	407 134	0 0	0 0	0 0	0 0
88003 88013 88033 88153 88903 90403 90413 91203 91333	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	17 4	0 0	0 0	0 0	0 0
80003 87143 87203 90503 90523 90533	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	263 178	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	8,847 7,386	0 0	0 0	0 0	1 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 1	0 1	0 0	2 2	1 1	1 0	1 0	1 0	2 0
0 0	0 0	1 0	7 1	7 2	12 0	38 6	39 10	46 10	55 14	52 11	53 25	45 22	52 33
0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	2 0	3 0	2 0	1 0	4 1	1 2	1 1	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	1 3	0 0	2 0	7 2	8 8	17 6	18 13	20 10	31 18	58 35	101 83
1 3	13 9	21 37	81 119	174 249	296 387	606 683	1,006 961	1,326 1,134	1,599 1,170	1,102 804	1,100 781	792 574	729 475

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

胸膜

PLEURA C38.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
90503 90513	惡性間皮瘤	男 Male	57	0	0	0	0
90523 90533	MESOTHELIAL TUMORS	女 Female	15	0	0	0	0
88053 88153	惡性肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
88503 88583	SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
90403 91333							
80013 81403	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
90643	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
	總計	男 Male	61	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	21	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	3 1	4 1	12 2	11 3	8 4	7 2	8 0	4 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 2	1 0	0 1	0 0	1 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	1 0
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	4 1	4 1	12 4	12 3	8 5	7 4	9 1	5 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈

THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM C37 - C38.3, C38.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85803 85813	惡性胸腺瘤	男 Male	197	0	0	2	1
85823 85833	MALIGNANT THYMOMA	女 Female	179	0	0	0	0
85843 85853							
80133 80203	胸腺癌	男 Male	95	0	0	0	0
80233 80333	THYMIC CARCINOMA	女 Female	61	0	0	0	0
80413 80703							
80723 81403							
82003 82403							
82463 82493							
84803 85603							
85863							
90613 90643	生殖細胞瘤	男 Male	18	0	0	0	3
90713 90853	GERM CELL TUMORS (GCT)	女 Female	0	0	0	0	0
91003							
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
88003 88023	惡性肉瘤	男 Male	11	0	1	0	1
88043 88503	SARCOMA	女 Female	11	1	0	0	0
88513 88903							
91203 91333							
91373 93643							
94903 95403							
80003 86933	其他惡性腫瘤	男 Male	3	0	0	0	0
90503 90523	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	2	0	0	0
95003							
	總計	男 Male	330	0	1	2	5
	TOTAL	女 Female	259	3	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
3 1	3 3	2 5	15 11	21 10	20 14	21 21	24 31	33 34	25 16	15 19	8 6	2 4	2 4
0 0	1 0	1 0	4 1	6 6	10 5	10 5	14 6	16 11	15 13	9 5	4 3	2 4	3 2
4 0	2 0	1 0	5 0	1 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 1	0 1	1 1	0 1	2 0	1 0	0 0	0 0
1 0	0 1	1 0	0 1	0 2	0 1	1 2	1 1	2 0	1 1	0 0	1 0	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1
8 1	6 4	5 5	24 13	29 18	33 20	35 29	39 39	52 47	41 31	26 24	14 9	5 8	5 8

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE C40 - C41

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
91803 91813	骨肉瘤	男 Male	40	1	4	7	6
91823 91863	OSTEOSARCOMA	女 Female	33	0	3	6	1
91873 91923							
91933							
92203 92223	軟骨肉瘤	男 Male	21	0	0	0	2
92403	CHONDROSARCOMA	女 Female	17	0	0	0	0
92503	惡性骨巨大細胞瘤	男 Male	4	0	0	0	0
	MALIGNANT GIANT CELL TUMOR	女 Female	3	0	0	0	0
92603 93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	5	0	0	0	1
	EWING SARCOMA	女 Female	6	1	1	1	0
93703 93713	脊索瘤	男 Male	11	0	1	0	0
	CHORDOMA	女 Female	4	0	0	0	0
92613 92703	惡性成釉細胞瘤	男 Male	4	0	0	1	0
	MALIGNANT AMELOBLASTOMA	女 Female	0	0	0	0	0
91203	血管肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	ANGIOSARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
88113 88153	纖維肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	FIBROSARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88903	平滑肌肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	LEIOMYOSARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88003 88013	其他惡性肉瘤	男 Male	5	0	0	1	1
88023 88303	OTHER SARCOMA	女 Female	7	0	0	0	1
90403 95403							
80003 80223	其他惡性腫瘤	男 Male	6	0	0	0	0
80333 80703	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
93023							
	總計	男 Male	99	1	5	9	10
	TOTAL	女 Female	77	1	4	7	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4 6	0 0	0 0	4 1	1 2	1 3	4 1	1 2	2 0	0 2	3 4	2 2	0 0	0 0
3 0	2 1	2 1	2 0	1 3	0 0	0 1	2 5	3 0	2 2	0 1	1 2	0 1	1 0
0 1	0 1	0 0	0 0	3 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 0	1 1	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	2 0	0 0	3 0	3 1	0 1	0 0	0 1	0 1	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0
0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	1 1	0 0	1 0	0 2	0 0	1 0	0 0
0 1	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	2 0	1 0	1 0	0 1	0 0
8 9	3 3	4 3	9 2	6 5	3 5	4 4	7 8	9 2	7 6	6 8	6 5	1 3	1 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
88103 88113	纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤 FIBROBLASTIC / MYOFIBROBLASTIC TUMOURS	男 Male	59	0	0	0	0
88153 88253		女 Female	42	0	0	1	1
88323 88403							
88503 88513	脂肪肉瘤 LIPOSARCOMA	男 Male	68	0	0	0	0
88523 88533		女 Female	49	0	0	0	0
88543 88553							
88583							
88903 88913	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	男 Male	18	0	0	0	0
88963		女 Female	25	0	0	0	0
89003 89013	橫紋肌肉瘤 RHABDOMYOSARCOMA	男 Male	10	0	4	0	0
89023 89103		女 Female	6	0	0	0	1
89123 89203							
91203 91333	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male	39	0	0	0	0
91403		女 Female	15	0	0	0	0
90403 90413	滑膜肉瘤 SYNOVIAL SARCOMA	男 Male	16	0	0	2	1
90433		女 Female	14	0	0	2	1
95403 95613	惡性周邊神經鞘瘤 MALIGNANT NERVE SHEATH TUMOR	男 Male	15	0	0	0	2
95713 95803		女 Female	24	0	0	0	0
93643 95003	周邊原始神經外胚層腫瘤 PERIPHERAL PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	男 Male	5	1	1	1	0
		女 Female	1	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
88013 88023	未分化肉瘤 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	男 Male	47	0	1	0	0
88033 88043		女 Female	51	0	0	0	2
88053 88303							
91373							

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1 2	3 1	3 1	5 5	9 1	6 1	2 1	3 3	8 7	6 6	6 3	3 5	3 2	1 2
0 1	1 2	4 0	3 0	4 1	8 5	3 4	9 7	8 7	11 7	6 7	3 4	6 3	2 1
0 0	0 0	2 1	1 1	1 2	0 2	1 1	2 4	4 3	2 4	1 4	2 1	1 0	1 2
0 0	0 1	1 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 1	2 0	0 0	2 0	1 1	0 0	0 0
0 1	0 0	1 0	2 0	1 0	0 3	1 0	1 1	7 1	4 3	5 3	6 0	3 1	8 2
0 2	2 0	1 2	1 1	2 0	4 0	0 0	1 3	0 0	0 1	0 1	1 1	1 0	0 0
1 0	1 2	0 1	0 1	1 4	1 2	2 1	2 3	2 3	2 2	0 2	0 0	0 2	1 1
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	0 1	0 1	0 0	3 1	1 0
1 2	0 2	2 3	2 0	5 4	2 1	4 2	5 7	8 5	1 7	5 2	3 8	4 4	4 2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織（續）

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES C47, C49 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
86803 87143	其他惡性肉瘤	男 Male	38	2	0	0	0
88003 88363	OTHER SARCOMA	女 Female	35	0	0	2	0
88423 88603							
88943 89633							
89823 90443							
91803 92313							
92403 92523							
93673 95813							
80003 80043	其他惡性腫瘤	男 Male	13	1	0	0	1
80103 80323	OTHER MALIGNANCY	女 Female	9	2	0	0	0
80333 80413							
80703 80713							
80743 83103							
85513 85743							
85803 89733							
90503 90713							
	總計	男 Male	333	4	6	3	4
	TOTAL	女 Female	276	2	0	5	5

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	2	3	1	2	3	7	3	2	5	3	2	1	0
2	1	2	2	4	3	2	2	3	4	1	3	0	4

0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	1	1	2
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1

5	9	18	15	25	25	20	28	43	33	30	22	23	20
10	10	10	12	17	18	11	32	31	35	24	24	15	15

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

皮膚

SKIN C44

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80833 80903 80913 80923 80933 80943 80973 80983 81003	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	1,082 1,180	0 0	0 0	0 0	0 0
80513 80523 80703 80713 80723 80743 80753 80763 80813 80843 85603	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	917 657	0 0	0 0	0 0	0 0
81023 81033 81103 82003 82013 84003 84013 84023 84073 84093 84103 84803 85093 85423 89403	皮膚附件癌 CARCINOMA OF SKIN APPENDAGES	男 Male 女 Female	77 52	0 0	0 0	0 0	0 0
87203 87213 87233 87303 87423 87433 87443 87453 87713 87723	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male 女 Female	154 134	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 81403 81473 83903 84203 84303	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	14 14	0 0	0 0	0 0	0 0
88323	纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤 FIBROSARCOMATOUS DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS	男 Male 女 Female	15 11	0 0	0 0	0 0	0 2

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 1	0 2	4 2	7 11	25 17	24 31	65 53	94 93	137 107	152 162	128 142	137 181	149 177	160 201
0 0	1 0	2 3	7 7	10 5	13 7	38 11	44 15	69 28	83 37	92 41	125 100	175 114	258 289
0 0	0 0	2 2	0 2	1 0	3 1	4 2	7 4	9 4	13 7	9 6	8 8	6 5	15 11
0 1	0 0	4 6	1 5	8 9	12 9	13 12	18 11	9 13	18 20	17 13	15 12	15 8	24 15
0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	1 0	0 3	5 0	0 1	0 1	3 0	1 1	2 2	1 5
4 0	1 1	1 2	2 2	2 2	1 0	1 0	1 0	0 1	1 0	0 0	1 0	0 1	0 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

皮膚（續）

SKIN C44 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
91203 91333	血管肉瘤	男 Male	84	0	0	0	0
91383 91403	ANGIOSARCOMA	女 Female	26	0	0	0	0
82473	惡性神經瘤	男 Male	8	0	0	0	0
	MALIGNANT NEURAL TUMORS	女 Female	9	0	0	0	0
88003 88303	其他惡性肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
88333 88503	OTHER SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
88903 90443							
80003 84903	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	2,356	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	2,086	0	0	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	2 0	3 0	3 0	6 1	1 0	3 1	6 1	6 2	11 1	9 6	8 5	12 4	14 5
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	2 2	1 3	3 3
0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
4 2	4 3	16 16	21 28	53 34	56 48	125 82	176 124	231 157	279 229	258 209	297 309	361 314	475 529

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

女性乳房

FEMALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82903 83153 85003 85103 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	女 Female	12,823	0	0	0	0
84803 84813	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	女 Female	464	0	0	0	0
85203 85243	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	女 Female	672	0	0	0	0
90203	惡性葉狀腫瘤 MALIGNANT PHYLLODES TUMOR	女 Female	76	0	0	0	0
85403 85433	乳房 Paget 氏病 PAGET DISEASE, MAMMARY	女 Female	38	0	0	0	0
80503 85033 85043 85073 85093	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	251	0	0	0	0
80323 80703 85703 85713 85723 85753	化生性癌 METAPLASTIC CARCINOMA	女 Female	91	0	0	0	0
80203 80333 80413 82003 82013 82113 82463 84013 85023 85303 85503 85743 89833	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	102	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
10	69	257	692	1,327	1,867	1,749	1,829	1,817	1,381	667	593	360	205
0	9	12	40	56	51	38	29	49	59	46	32	22	21
0	2	3	9	52	121	113	97	105	71	33	31	23	12
1	0	2	3	10	12	17	15	7	3	3	2	1	0
0	0	0	0	1	1	2	11	7	9	3	1	3	0
0	0	3	8	19	22	13	23	40	48	32	20	20	3
0	0	0	3	9	13	9	12	16	8	3	9	3	6
0	1	0	4	4	19	17	11	12	12	8	8	6	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

女性乳房（續）

FEMALE BREAST C50 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103 81403 82553 85013 85213 85223 85233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	283	0	0	0	0
88003 88013 88503 88903 91203	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	13	0	0	0	0
80003 80043 82403	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	43	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	14,856	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	2	0	12	26	39	33	40	44	29	23	14	10	11
0	0	0	2	3	1	2	1	3	0	1	0	0	0
0	0	0	0	2	0	9	4	7	7	4	4	2	4
11	83	277	773	1,509	2,146	2,002	2,072	2,107	1,627	823	714	450	262

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

男性乳房

MALE BREAST C50

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
85003	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	男 Male	44	0	0	0	0
85033 85043 85073	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	男 Male	6	0	0	0	0
84303 85743	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	2	0	0	0	0
81403	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	53	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	3	2	0	1	2	4	7	6	6	3	3	6
0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	3	2	1	1	2	6	9	7	8	4	3	6

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

子宮，非特定部位

UTERUS, NOS C55

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
84413	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88003 88903 89123 89303 89803	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	9	0	0	0	0
80003 87143 91053	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	14	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	3	1	4	1	0	0	0	1	2

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

子宮頸

CERVIX UTERI C53

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703 80713 80723 80763 80823 80833	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	962	0	0	0	0
81403 81443 82633 83103 83233 83803 83843 84413 84613 84803 84823 84833 84903 85743	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	318	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	33	0	0	0	0
80133 80413 82403 82463 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	30	0	0	0	0
80203 80453 80983 82003	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	23	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	2	0	0	0	0
89333 89803	混合性上皮與間質腫瘤 MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA	女 Female	6	0	0	0	0
88053 88903 89103	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	4	0	0	1	1
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	10	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,393	0	0	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	14	42	71	64	87	99	122	125	96	57	57	76	51
2	3	19	34	34	31	54	39	37	21	16	10	11	7
0	0	3	8	3	7	2	2	5	1	1	0	1	0
0	1	0	6	3	0	4	3	3	5	4	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2
0	1	2	0	2	2	3	1	0	3	2	4	0	3
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	2
3	19	66	119	106	132	163	170	173	126	82	76	91	65

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

子宮體

CORPUS UTERI C54

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	子宮內膜癌 ENDOMETRIAL CARCINOMA	女 Female	2,718	0	0	0	1
82633 83803 83823 85703	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	2,303	0	0	0	1
84413 84603 84613	漿液性腺癌 SEROUS CARCINOMA, NOS	女 Female	149	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	57	0	0	0	0
89503 89803	癌肉瘤 CARCINOSARCOMA	女 Female	166	0	0	0	0
80133 80203 80413 80453 80703 80723 81403 82463 83233 84803 85603 85743	其他 OTHERS	女 Female	209	0	0	0	0
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80143 80323 84903	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	19	0	0	0	0
88903 88913 88963 88973	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	女 Female	102	0	0	0	0
88053 89303 89313	子宮內膜基質肉瘤 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	女 Female	72	0	0	0	0
87143 88003 89013 89333	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	女 Female	30	0	0	0	0
80003 89003 89103 93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	13	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	3,124	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
6	25	58	135	194	294	478	518	428	292	151	69	48	21
6	23	57	126	186	269	424	458	333	213	116	46	29	16
0	0	0	0	1	2	17	18	38	43	12	9	8	1
0	0	0	0	0	1	5	8	11	10	11	5	6	0
0	0	1	0	3	13	22	31	29	25	16	13	7	6
0	2	1	9	7	22	32	34	46	26	12	9	5	4
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	2	3	0	1	7	2	0	1	1
0	0	1	4	15	17	24	14	15	8	2	1	0	1
0	1	2	5	11	12	17	11	7	2	1	1	1	1
0	1	2	1	0	7	4	4	3	4	3	0	0	1
0	0	0	0	0	3	0	2	2	5	0	0	1	0
6	28	64	146	224	348	548	581	486	344	175	84	58	31

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	漿液性腺癌 SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	582	0	0	0	0
84613	高級別漿液性腺癌 HIGH-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	453	0	0	0	0
84603	低級別漿液性腺癌 LOW-GRADE SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	42	0	0	0	0
84413 84423	其他 OTHERS	女 Female	87	0	0	0	0
84703 84723 84803 90153	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	女 Female	151	0	0	0	3
83803 89503 89803	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID CARCINOMA	女 Female	237	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL CARCINOMA	女 Female	333	0	0	0	0
83233 84743	混合細胞腺癌 MIXED CELL ADENOCARCINOMA	女 Female	59	0	0	0	0
81403	非特定腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	63	0	0	0	0
82403 90603 90713 90803 90853 90903	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	女 Female	59	3	1	2	7
85913 86203 86223 86313 86323 86403 88103	性索間質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	女 Female	77	0	0	0	2
80133 80203 80213 80323 80333 80443 80703 80713 83703 84403 84903 85603 90003	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	39	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2	5	5	18	41	75	96	83	82	86	36	29	19	5
0	2	1	12	28	59	84	68	67	67	25	23	14	3
1	2	4	5	4	2	5	3	1	7	5	0	3	0
1	1	0	1	9	14	7	12	14	12	6	6	2	2
3	8	9	14	20	16	16	16	16	15	5	4	5	1
1	7	12	16	39	39	45	31	23	7	5	4	7	1
0	2	14	28	37	60	76	50	27	24	9	5	0	1
0	0	1	2	8	8	17	9	7	2	4	0	1	0
1	1	3	0	3	2	6	4	13	7	6	8	6	3
14	13	6	2	1	3	2	1	1	2	0	0	0	1
4	3	3	6	11	5	7	9	6	8	6	3	2	2
0	1	1	1	2	4	5	4	5	6	4	1	2	3

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶（續）

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT C56, C57.0 - C57.4 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	36	0	0	0	0
88003 88053 88153 88903 89203 89333	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	12	0	0	0	0
80003 94403	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	29	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,677	3	1	2	12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
1	1	0	0	3	1	5	4	8	3	1	2	5	2
0	1	1	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0	0
0	1	2	0	3	1	3	2	4	3	0	3	3	4
26	43	57	87	168	214	282	217	192	164	77	59	50	23

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS C51 - C52, C57.7 - C57.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80523 80703 80713 80723 80763 80833 80903 80943 80973	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	109	0	0	0	0
81403 83103 84413 84823 85003 85423	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	36	0	0	0	0
80133 80413	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	4	0	0	0	0
89803	混合性上皮與間質腫瘤 MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
91003 91053	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	9	0	0	0	0
80203 84093 84613	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	6	0	0	0	0
87203 87213 87463	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	14	0	0	0	0
88003 88043	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
95403	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	188	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	1	2	7	5	9	13	20	11	15	13	12
0	0	0	1	0	2	2	6	5	3	4	5	7	1
0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	3	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2
0	0	0	0	2	0	0	1	2	4	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	6	6	12	10	19	22	31	17	24	23	17

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

攝護腺

PROSTATE GLAND C61

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81403 82553 84903 85003 85513 85523 85723	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	6,981	0	0	0	0
80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
80413 80453 82443 85743	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	22	0	0	0	0
80823 80903	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	2	0	0	0	0
80103 82303	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	29	0	0	0	0
88003 88903	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	2	0	0	0	0
80003 80013	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	78	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	7,115	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	1	5	24	104	327	828	1,477	1,373	1,301	887	653
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	6	9
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	8	13	15	35
0	0	1	1	6	25	104	328	838	1,488	1,386	1,325	912	701

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

睪丸

TESTIS C62

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
90613 90633	精細胞瘤 SEMINOMA	男 Male	145	0	0	0	1
90713	卵黃囊瘤 YOLK SAC TUMOR	男 Male	7	4	0	0	0
90703	胚胎性癌 EMBRYONAL CARCINOMA	男 Male	13	0	0	0	0
90813 90853	混合性生殖細胞瘤 MIXED GERM CELL TUMORS	男 Male	93	0	0	1	13
90803	惡性畸胎瘤 MALIGNANT TERATOMA	男 Male	11	1	0	0	0
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	男 Male	2	0	0	0	0
90643 90653	非特定生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS, NOS	男 Male	4	0	0	0	1
86313 86503	性索基質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	男 Male	2	0	0	0	0
80103 88513 88583 88903	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	6	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	283	5	0	1	15

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
5	28	41	30	18	10	2	4	0	4	2	0	0	0
0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	32	20	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1
26	69	73	41	21	13	2	6	2	4	2	2	0	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

陰莖及其他男性生殖器官

PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS C60，C63

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80513 80543 80703 80713 85093	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	53	0	0	0	0
80903 80973	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male	9	0	0	0	0
85423	Paget 氏病 PAGET DISEASE	男 Male	28	0	0	0	0
80833 81403 84013	其他上皮癌 OTHER EPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	4	0	0	0	0
88503 88513 88583 88903 91403	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	5	0	0	0	0
80003 90503 90853	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	102	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	1	1	0	0	2	7	10	7	5	3	4	5	8
0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	1	0	0	2
0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	2	5	1	6
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	2	1	1	0	4	13	12	16	13	7	10	7	16

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

膀胱

BLADDER C67

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80303 80313 80323 80333 81203 81223 81303 81313	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male 女 Female	1,601 668	0 0	0 0	0 0	0 0
81403 81443 83103 84703 84803 85743	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	37 14	0 0	0 0	0 0	0 0
80503 80523 80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	11 10	0 0	0 0	0 0	0 0
80133 80413 80453 82403 86933	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male 女 Female	25 8	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 89803	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	9 6	0 0	0 0	0 0	0 0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male 女 Female	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0
88903 89103	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	0 2	0 1	0 0	0 0	0 0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	7 10	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	1,690 719	0 1	0 0	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 0	2 0	2 1	9 0	17 6	30 6	83 19	140 46	208 92	267 98	227 74	221 120	188 111	205 95
1 0	1 0	1 0	1 1	2 1	2 0	3 3	6 1	4 1	4 2	2 0	5 1	2 3	3 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	2 0	1 2	2 1	2 2	0 3	2 0	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	2 0	0 0	5 1	3 2	4 2	3 2	3 0	4 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	2 0	1 0	0 0	0 0	6 5
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	0 0
0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	0 2	0 4	5 3
3 0	3 1	3 1	10 1	20 7	34 6	88 23	148 47	218 96	278 103	238 79	229 130	195 118	223 106

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

腎

KIDNEY C64

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
	腎細胞癌 RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	1,063	0	1	0	1
		女 Female	467	0	0	0	1
83103	亮細胞腺癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA	男 Male	682	0	0	0	0
		女 Female	280	0	0	0	0
82603	乳突狀腎細胞癌 PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	114	0	0	0	1
		女 Female	24	0	0	0	0
83173	嫌色性腎細胞癌 CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA	男 Male	57	0	0	0	0
		女 Female	59	0	0	0	0
82553 83113	其他與非特定腎細胞癌	男 Male	210	0	1	0	0
83123 83163	RENAL CELL CARCINOMA, NOS AND OTHERS	女 Female	104	0	0	0	1
83183							
89603	腎母細胞瘤 NEPHROBLASTOMA	男 Male	5	3	1	1	0
		女 Female	3	2	1	0	0
80203 80323	其他特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
80333 82403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	9	0	0	0	0
83233 89593							
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	10	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	0
88003 88023	惡性肉瘤	男 Male	9	1	0	0	0
88543 88583	SARCOMA	女 Female	4	2	0	0	0
88903 89633							
89643 90403							
90413 92603							
80003 86933	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	17	0	0	0	0
		女 Female	12	0	0	1	0
	總計 TOTAL	男 Male	1,111	4	2	1	1
		女 Female	504	4	1	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
4	7	25	33	65	93	136	155	159	158	96	53	50	27
5	1	6	20	19	24	49	63	72	66	45	49	30	17
1	4	17	25	40	69	94	101	103	93	62	32	31	10
2	1	1	9	11	12	30	38	49	36	30	32	21	8
0	1	0	2	6	6	15	21	24	20	7	4	5	2
1	0	0	0	0	3	1	3	5	4	4	1	2	0
0	1	1	3	4	4	8	7	9	6	8	2	3	1
0	0	2	4	4	5	9	8	6	12	2	5	1	1
3	1	7	3	15	14	19	26	23	39	19	15	11	14
2	0	3	7	4	4	9	14	12	14	9	11	6	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	0	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	3
1	0	2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3
5	8	27	33	65	96	138	158	164	163	100	58	53	35
5	1	6	20	19	26	51	65	74	69	49	53	36	23

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

		腎盂					
		RENAL PELVIS		C65			
ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80823	泌尿上皮癌	男 Male	388	0	0	0	0
81203 81223	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	527	0	0	0	0
81303							
80513 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	6	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
81403 82603	腺癌	男 Male	6	0	0	0	0
83103 84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80413	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	3	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	7	0	0	0	0
	總計	男 Male	412	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	555	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	3 1	4 3	12 4	21 11	41 36	57 74	76 82	54 98	48 84	39 77	33 57
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1 2	2 2	1 1	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	1 1	0 0	3 0	1 1	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 2	0 0	1 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	1 1	2 1	0 2	1 1	1 1	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	2 2	1 4
0 0	0 0	0 0	3 1	4 4	13 4	21 11	43 37	60 77	82 86	55 103	52 86	44 81	35 65

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

輸尿管

URETER C66

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80203 80333	泌尿上皮癌	男 Male	300	0	0	0	0
80823 81203	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	413	0	0	0	0
81223 81303							
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	1	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
81403	腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80133 80413	其他特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
80453 80463	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
88003	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	4	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
	總計	男 Male	311	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	427	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	1 0	3 3	2 4	14 7	24 19	56 43	56 71	41 71	48 81	31 65	24 49
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 1	0 2	0 1	0 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0	1 0	0 0	1 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	3 3
0 0	0 0	0 0	1 0	3 3	2 4	15 7	25 20	57 44	58 72	41 74	49 83	32 66	28 54

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

尿道及其周邊腺體

URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND C68.0 - C68.1

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81203 81223	泌尿上皮癌	男 Male	16	0	0	0	0
81303	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	0	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
81403 81443	腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
83103	ADENOCARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80413	其他特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	19	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	8	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	4	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	2	3	1	2	4	3	2
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變

OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS C68.8

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位

URINARY SYSTEM, NOS C68.9

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
81203 81303	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	6	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	2	3
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

眼及淚腺

EYE AND LACRIMAL GLAND C69

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
95103	視網膜母細胞瘤 RETINOBLASTOMA	男 Male	5	5	0	0	0
		女 Female	7	7	0	0	0
87203 87703	惡性黑色素瘤	男 Male	14	0	0	0	0
87723	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	10	0	0	0	0
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	6	0	0	0	0
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
81403 82003	淚腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
	LACRIMAL GLAND CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80523 80973	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
84103	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
89103	惡性肉瘤	男 Male	1	0	1	0	0
	SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
95223	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	31	5	1	0	0
	TOTAL	女 Female	30	7	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	3	1	2	2	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	2	0	1	1	2	1	0	1
0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	2	6	1	3	4	1	2	0	4	1
0	1	1	1	0	2	2	1	2	1	2	4	2	4

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

		腦					
		BRAIN		C71			
ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94003 94113	瀰漫性星形細胞瘤 DIFFUSE ASTROCYTOMA	男 Male	40	0	2	2	1
		女 Female	27	2	1	0	1
94013	退行性星形細胞瘤 ANAPLASTIC ASTROCYTOMA	男 Male	40	1	1	1	1
		女 Female	49	0	0	0	2
94403 94413	神經膠母細胞瘤	男 Male	209	0	1	1	1
94423 94453	GLIOBLASTOMA	女 Female	140	0	0	1	2
93853 94203	其他特定之星形細胞瘤	男 Male	10	2	1	2	3
94213 94243	OTHER SPECIFIED ASTROCYTOMA	女 Female	9	0	5	1	1
93823 94503	寡樹突膠質細胞瘤	男 Male	35	0	0	0	1
94513	OLIGODENDROGLIOMA	女 Female	21	0	0	0	1
93913 93923	室管膜瘤	男 Male	9	2	1	0	0
	EPENDYMOMA	女 Female	9	1	0	0	0
93803	非特定之神經膠質瘤	男 Male	17	1	3	0	0
	GLIOMA,NOS	女 Female	19	0	1	1	0
94703 94713	胚胎性瘤	男 Male	10	3	3	2	0
94733 94763	EMBRYONAL TUMORS	女 Female	10	3	2	2	0
94773 95003 95083							
95053 95063	神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	NEURONAL AND MIXED NEURONAL GLIAL TUMORS	女 Female	0	0	0	0	0
90643 90813	生殖細胞瘤	男 Male	13	0	0	2	6
90853	GERM CELL TUMORS	女 Female	8	0	2	2	1
93903	脈絡叢癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CHOROID PLEXUS CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88013 88153	惡性肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
92203	SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
2 1	4 2	2 3	3 5	3 4	5 2	2 2	3 0	3 0	4 3	2 1	0 0	2 0	0 0
4 0	2 3	4 3	6 7	3 5	3 3	0 2	4 4	4 4	2 11	2 3	1 2	1 0	0 0
2 1	4 4	6 4	7 7	7 10	17 3	18 9	23 18	33 14	35 32	25 13	18 9	6 8	5 5
1 0	0 0	0 1	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 0	1 2	2 1	3 2	10 4	2 1	3 1	4 4	5 2	1 2	1 1	1 0	0 0	0 0
2 2	0 1	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	0 2	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 2	1 1	0 0	1 1	1 1	3 2	0 0	1 1	2 3	0 1	1 3	1 2	2 0
0 0	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 2	2 1	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 1	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

腦（續）

BRAIN C71 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0	5	10	15
				 4	 9	 14	 19
90413 95403	其他特定之惡性瘤 OTHER SPECIFIED MALIGNANT TUMORS	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003 93953	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	19	0	0	0	0
		女 Female	12	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	410	9	12	10	13
		女 Female	308	6	11	7	8

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	4	0	9
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	3	2
15	14	16	21	28	30	26	36	48	48	33	25	10	16
7	18	14	23	24	12	18	28	24	53	20	15	13	7

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位

MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM C70, C72

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94003 94013	星形細胞瘤	男 Male	5	0	0	0	0
94253 94403	ASTROCYTOMA	女 Female	3	0	0	0	0
93913 93943	室管膜瘤	男 Male	8	0	0	0	0
	EPENDYMOMA	女 Female	10	0	1	1	0
95303 95383	惡性腦膜瘤	男 Male	15	0	0	0	0
95393	MALIGNANT MENINGIOMA	女 Female	20	0	0	0	0
95603	惡性神經鞘瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	MALIGNANT SCHWANNOMA	女 Female	0	0	0	0	0
90643	生殖細胞瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	GERM CELL TUMORS	女 Female	0	0	0	0	0
88153	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
95003 95053	神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	NEURONAL AND MIXED NEURONAL GLIAL TUMORS	女 Female	2	1	0	1	0
80003 87283	其他惡性腫瘤	男 Male	5	0	0	0	0
90853 93703	OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	1	0	0	1
93803							
	總計	男 Male	36	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	42	2	1	2	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	2	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	2	1	2	5	2	1	0	0
0	0	0	5	1	1	2	2	3	3	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
2	2	1	3	4	3	3	3	4	7	3	1	0	0
1	1	2	6	2	2	5	4	4	4	2	1	2	0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

甲狀腺

THYROID GLAND C73

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
82603 83403	乳頭狀癌	男 Male	1,154	0	0	3	5
83413 83423	PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	3,317	0	0	6	28
83433 83443							
83503							
82903 83303	濾泡性癌	男 Male	69	0	0	0	0
83353 83393	FOLLICULAR CARCINOMA	女 Female	160	0	0	1	6
83453 85103	髓質癌	男 Male	12	0	0	0	0
	MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	34	0	0	0	2
80203 80213	未分化癌	男 Male	15	0	0	0	0
	UNDIFFERENTIATED (ANAPLASTIC) CARCINOMA	女 Female	20	0	0	0	0
80703 80723	其他特定上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
83373 84303	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	27	0	0	0	1
85803 85893							
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	15	0	0	0	0
80003 82303	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	9	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,268	0	0	3	5
	TOTAL	女 Female	3,582	0	0	7	37

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
23 61	37 132	74 208	113 377	143 401	148 425	162 465	156 454	127 330	98 232	32 118	20 46	9 24	4 10
4 7	2 8	5 17	5 13	6 15	3 22	8 16	10 12	7 10	8 15	4 8	2 3	5 5	0 2
0 0	0 0	0 1	0 4	1 3	1 3	1 4	3 4	2 5	4 1	0 3	0 2	0 1	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1 1	2 0	1 3	3 4	0 1	1 6	1 2	2 3
0 0	0 3	0 0	0 0	0 1	1 5	1 1	3 2	2 2	1 4	2 1	0 1	0 2	0 4
0 0	0 1	0 0	0 2	0 0	0 2	0 1	1 1	1 2	1 2	0 0	2 1	1 1	0 2
0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 1	0 0	0 2	1 3	0 0	0 2	0 0	0 1	0 0
27 68	39 144	79 226	118 396	151 420	157 458	173 488	175 475	141 355	115 258	38 133	25 59	16 36	6 22

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

其他內分泌腺

OTHER ENDOCRINE GLANDS C74 - C75

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
94903 95003	神經母細胞瘤 NEUROBLASTOMA	男 Male	11	10	1	0	0
		女 Female	4	4	0	0	0
83703	腎上腺皮質癌 ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	男 Male	12	0	0	0	0
		女 Female	12	0	0	0	0
86803 86903	惡性嗜鉻細胞瘤	男 Male	40	0	0	1	0
86923 86933	MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA	女 Female	51	0	0	1	0
87003							
80703 81403	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
84903	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
88153 88583	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
88903	SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
90643 90713	生殖細胞瘤	男 Male	13	0	2	3	5
90803 90853	GERM CELL TUMORS	女 Female	4	0	1	0	1
80003 93503	其他惡性腫瘤	男 Male	5	0	1	0	0
93513 93623	OTHER MALIGNANCY	女 Female	6	0	0	0	0
93703 94403							
	總計	男 Male	86	10	4	4	5
	TOTAL	女 Female	87	4	1	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 1	0 0	0 0	1 2	2 1	1 1	1 0	2 2	2 2	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0
0 1	1 3	2 3	6 5	7 5	4 8	3 4	5 8	3 4	2 5	5 2	1 2	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 4	0 1	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 1	1 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 1	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 1	1 1	1 0	0 1	0 0	0 0	0 2	0 0
2 4	2 4	2 3	9 7	9 6	6 11	4 9	8 12	8 8	6 9	5 2	1 3	1 2	0 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

其他分界不明的部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES C76

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
80703 80713	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	43	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0
81403	非特定之腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80413 80823	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
85743	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80003 90503	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	1	0	0
90803	OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	54	0	1	0	0
		女 Female	13	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 0	2 0	4 0	2 0	3 2	6 1	13 2	7 0	1 1	1 1	1 0	3 1
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1 0	2 0	1 0	1 0	0 0	1 0
0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	1 0
0 1	0 0	0 0	2 0	4 0	2 0	3 2	8 3	15 2	9 1	2 1	2 2	1 0	5 1

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

不明原發部位

UNKNOWN PRIMARY SITES C80

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
81403 81443 84803	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	74 89	0 0	0 0	0 0	0 0
80703 80713 80723	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	60 27	0 0	0 0	0 0	0 0
80203	未分化癌 CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	男 Male 女 Female	3 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80413	小細胞癌 SMALL CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	11 2	0 0	0 0	0 0	0 0
80223 80333 80453 80463 81203 81603 82003 82403 82463 82493 83103 84303 85423 85513 85743 89823	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	45 17	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	104 80	0 0	0 0	0 0	0 0
87143 88003 88013 88043 89363 91203 91403 93643	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	6 9	0 0	0 0	0 0	0 0

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0 0	0 0	0 1	0 1	5 3	2 3	3 9	9 12	8 8	11 9	7 7	3 7	12 12	14 17
0 0	0 0	0 0	1 0	5 2	5 1	4 1	5 4	12 3	8 4	4 1	8 3	4 6	4 2
0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 0	0 0	3 0	2 0	2 0	2 0	0 1
0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 3	7 1	2 2	8 0	10 1	4 1	6 2	4 3	3 3
0 0	0 0	0 2	1 2	5 1	9 3	5 5	11 7	15 6	8 9	11 8	14 14	10 10	15 13
0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	1 3	0 1	1 0	1 2	0 2	1 0	1 0

表七 台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 108 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

不明原發部位（續）

UNKNOWN PRIMARY SITES C80 (CONTINUED)

ICD-O-3	組 織 形 態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 4	5 9	10 14	15 19
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80003 88063 90643 90853	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	65	0	0	0	0
		女 Female	71	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	368	0	0	0	0
		女 Female	298	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	5	3	5	7	9	7	6	20
0	0	0	1	1	2	1	4	3	2	2	9	13	33
0	1	0	4	17	17	24	32	49	48	40	40	39	57
0	0	3	5	9	13	17	32	21	25	22	37	44	70

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 108 年

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（不含白血病與惡性淋巴瘤） ALL SITES (excludes leukemia and lymphoma)	114,653
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	10,094
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,204
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	295
C01-C02	舌 TONGUE	2,314
C03	齒齦 GUM	798
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	221
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,414
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	941
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,206
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	330
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,560
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	40,120
C15	食道 ESOPHAGUS	2,833
C16	胃 STOMACH	3,938
C17	小腸 SMALL INTESTINE	478

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
12,357	39,664	17,677	2,972	1,793	668	4,099	35,421	C00-C80
1,493	4,706	1,195	1,213	-	1	-	1,486	C00-C14
1,481	4,624	906	20	-	1	-	1,172	C00-C14 ²
121	143	10	-	-	-	-	21	C00
404	1,473	237	2	-	-	-	198	C01-C02
200	457	65	1	-	-	-	75	C03
25	145	26	-	-	-	-	25	C04
648	1,370	143	3	-	1	-	249	C05-C06
48	403	200	9	-	-	-	281	C09-C10
35	625	223	4	-	-	-	319	C12-C13
-	8	2	1	-	-	-	4	C14
11	77	31	23	-	-	-	188	C07-C08
1	5	258	1,170	-	-	-	126	C11
2,803	17,555	5,687	110	-	216	260	13,489	C15-C26, C48
50	1,464	627	1	-	1	-	690	C15
200	884	2,022	-	-	43	143	646	C16
39	82	52	2	-	153	65	85	C17

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 108 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	17,302
C18	結腸 COLON	11,031
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	6,271
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,272
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,173
C25	胰 PANCREAS	2,803
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	300
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	21
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	18,012
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	262
C32	喉 LARYNX	846
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	16,233
C38.4	胸膜 PLEURA	82
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	589
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	176
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	609

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

3. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
1,804	11,476	1,284	50	-	12	11	2,665	C18-C21
930	7,600	962	39	-	4	3	1,493	C18
874	3,876	322	11	-	8	8	1,172	C19-C21
410	2,570	1,258	54	-	-	-	6,980	C22
88	442	161	1	-	-	1	480	C23-C24
191	584	242	-	-	1	-	1,785	C25
21	52	40	2	-	6	40	139	C48
-	1	1	-	-	-	-	19	C26
1,677	5,068	3,672	50	-	1	-	7,544	C30-C39
12	48	71	5	-	1	-	125	C30-C31
64	467	94	1	-	-	-	220	C32
1,592	4,535	3,446	39	-	-	-	6,621	C33-C34
-	2	7	1	-	-	-	72	C38.4
9	16	54	4	-	-	-	506	C37-C38.3, C38.8
15	30	39	-	-	-	9	83	C40-C41
94	111	143	28	-	1	2	230	C47, C49

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 108 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C44	皮膚 SKIN	4,442
C44 ⁴	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	288
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	4,154
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	14,856
C50	男性乳房 MALE BREAST	53
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	6,396
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	14
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,393
C54	子宮體 CORPUS UTERI	3,124
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,677
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	188
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	7,500
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	7,115
C62	睪丸 TESTIS	283
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	102
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	5,777

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
630	567	104	21	-	-	-	3,120	C44
1	1	3	-	-	-	-	283	C44 ⁴
629	566	101	21	-	-	-	2,837	C44
2,210	7,702	3,732	18	-	27	77	1,090	C50
10	34	5	-	-	-	-	4	C50
1,330	1,708	1,376	8	-	89	530	1,353	C51-C58
-	-	1	-	-	-	2	11	C55
69	548	278	3	-	-	-	495	C53
1,135	919	682	-	-	44	68	274	C54
117	189	388	2	-	45	460	476	C56, C57.0-C57.4
9	52	27	3	-	-	-	97	C51-C52, C57.7-C57.9
1,465	1,339	1,244	1,063	1,793	-	-	596	C60-C63
1,453	1,310	1,225	1,062	1,793	-	-	272	C61
3	3	5	1	-	-	-	271	C62
9	26	14	-	-	-	-	53	C60, C63
236	659	270	85	-	320	3,202	1,005	C64-C68

表八 台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 108 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原 發 部 位 別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,410
C64	腎 KIDNEY	1,615
C65	腎盂 RENAL PELVIS	967
C66	輸尿管 URETER	738
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	27
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	2
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	18
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	61
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	796
C71	腦 BRAIN	718
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	78
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	4,850
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	173
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	67
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	666

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好	中度分化	分化不良	未分化		低級別	高級別	未詳述	
Well differentiated	Moderately differentiated	Poorly differentiated	Anaplastic		Low grade	High grade	Not determined	
Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5				
6	27	25	1	-	229	1,886	236	C67
226	620	230	81	-	-	-	458	C64
2	10	12	2	-	30	749	162	C65
2	-	2	-	-	58	551	125	C66
-	2	1	-	-	3	14	7	C68.0-C68.1
-	-	-	1	-	-	-	1	C68.8
-	-	-	-	-	-	2	16	C68.9
1	10	5	1	-	-	1	43	C69
15	114	138	343	-	5	12	169	C70-C72
13	90	114	340	-	5	11	145	C71
2	24	24	3	-	-	1	24	C70, C72
374	56	41	28	-	-	-	4,351	C73
1	2	12	2	-	8	6	142	C74-C75
1	2	5	2	-	-	-	57	C76
2	1	9	-	-	-	-	654	C80

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界 不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0101 國立臺灣大學醫學院附設醫院	107	10,147	22	223	81	18	221	58	75	0	35
	108	10,554	25	177	85	16	230	71	78	0	45
	增減數	407	3	-46	4	-2	9	13	3	0	10
0102 臺北榮民總醫院	107	8,526	14	119	60	14	139	46	65	0	20
	108	8,553	12	96	54	14	137	59	58	1	20
	增減數	27	-2	-23	-6	0	-2	13	-7	1	0
0103 三軍總醫院附設民眾診療服務處	107	3,203	12	36	22	4	50	21	14	1	7
	108	3,581	1	48	18	3	52	15	25	0	9
	增減數	378	-11	12	-4	-1	2	-6	11	-1	2
0104 臺北市立聯合醫院中興院區	107	351	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	108	390	0	0	0	0	2	0	1	0	0
	增減數	39	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0105 臺北市立聯合醫院仁愛院區	107	1,072	0	5	1	1	3	6	3	0	0
	108	1,060	0	9	2	0	2	5	6	0	1
	增減數	-12	0	4	1	-1	-1	-1	3	0	1
0106 臺北市立聯合醫院和平院區	107	288	0	5	0	0	2	0	0	0	0
	108	274	0	1	0	1	3	0	1	0	1
	增減數	-14	0	-4	0	1	1	0	1	0	1
0107 國立臺灣大學醫學院附設醫院 北護分院	107	41	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	108	46	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	5	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
0108 基督復臨安息日會醫療財團法人 臺安醫院	107	458	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	108	461	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	0
0109 台灣基督長老教會馬偕醫療財團 法人馬偕紀念醫院	107	4,654	9	69	38	11	77	30	34	2	19
	108	4,750	8	66	37	8	68	22	38	1	9
	增減數	96	-1	-3	-1	-3	-9	-8	4	-1	-10
0110 臺北醫學大學附設醫院	107	1,770	4	21	11	2	26	3	8	1	4
	108	1,652	3	22	9	3	31	10	6	0	4
	增減數	-118	-1	1	-2	1	5	7	-2	-1	0
0111 長庚醫療財團法人林口長庚紀念 醫院	107	10,987	37	291	168	31	345	90	159	0	34
	108	11,608	31	305	165	24	334	75	138	0	28
	增減數	621	-6	14	-3	-7	-11	-15	-21	0	-6
0113 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	107	1,642	0	25	5	4	19	4	6	0	5
	108	1,572	3	12	8	0	16	7	8	0	5
	增減數	-70	3	-13	3	-4	-3	3	2	0	0
0114 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院	107	59	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	108	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-19	0	-1	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
166	213	278	24	482	253	749	102	360	30	0	26	58	1,780	0101
148	220	300	25	485	293	745	107	342	38	3	32	60	2,033	
-18	7	22	1	3	40	-4	5	-18	8	3	6	2	253	
82	155	313	31	664	376	646	89	258	39	2	17	73	1,234	0102
77	177	312	23	636	391	616	74	254	28	2	16	72	1,363	
-5	22	-1	-8	-28	15	-30	-15	-4	-11	0	-1	-1	129	
41	55	122	12	236	123	221	30	71	18	1	6	16	493	0103
34	68	132	13	301	193	213	38	72	12	3	4	22	562	
-7	13	10	1	65	70	-8	8	1	-6	2	-2	6	69	
1	7	19	3	45	24	20	4	6	1	0	0	0	28	0104
1	6	22	0	57	33	16	3	8	1	0	0	1	43	
0	-1	3	-3	12	9	-4	-1	2	0	0	0	1	15	
10	23	60	2	138	63	88	5	32	1	0	1	5	102	0105
13	14	57	3	127	52	79	6	17	2	0	0	3	98	
3	-9	-3	1	-11	-11	-9	1	-15	1	0	-1	-2	-4	
7	6	22	1	50	29	13	3	3	0	0	2	3	24	0106
5	8	20	1	58	13	16	2	5	0	0	1	2	14	
-2	2	-2	0	8	-16	3	-1	2	0	0	-1	-1	-10	
0	0	6	0	10	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0107
1	2	9	0	9	3	1	0	0	0	0	0	0	7	
1	2	3	0	-1	1	1	0	0	-1	0	0	0	6	
1	3	8	0	29	19	8	2	1	1	0	1	0	14	0108
2	2	12	2	32	25	13	1	3	1	0	0	0	18	
1	-1	4	2	3	6	5	-1	2	0	0	-1	0	4	
49	91	159	11	488	249	274	31	73	22	0	6	24	474	0109
35	105	162	12	642	294	253	37	78	10	0	11	31	469	
-14	14	3	1	154	45	-21	6	5	-12	0	5	7	-5	
15	24	52	4	165	101	83	9	34	2	0	4	1	167	0110
15	15	63	3	143	97	38	3	20	5	0	3	13	143	
0	-9	11	-1	-22	-4	-45	-6	-14	3	0	-1	12	-24	
184	266	313	30	822	453	942	100	232	37	7	30	78	1,300	0111
214	293	371	47	928	468	1,045	98	238	34	4	32	109	1,280	
30	27	58	17	106	15	103	-2	6	-3	-3	2	31	-20	
15	27	66	2	121	78	85	7	23	7	0	1	6	326	0113
14	24	52	4	119	80	106	9	22	4	0	3	12	294	
-1	-3	-14	2	-2	2	21	2	-1	-3	0	2	6	-32	
0	0	4	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	7	0114
0	1	2	0	5	4	2	0	0	0	0	0	0	6	
0	1	-2	0	4	-2	-4	0	0	0	0	0	0	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0101	107	13	86	423	11	79	191	1,412	2	1	232	227	134	26
	108	13	80	404	29	82	200	1,354	4	0	217	243	137	22
	增減數	0	-6	-19	18	3	9	-58	2	-1	-15	16	3	-4
0102	107	8	57	190	59	79	108	1,046	2	0	211	201	105	20
	108	4	54	177	53	79	122	1,047	1	0	230	188	118	15
	增減數	-4	-3	-13	-6	0	14	1	-1	0	19	-13	13	-5
0103	107	3	14	50	0	16	59	563	1	0	70	76	47	10
	108	3	12	46	3	12	74	666	3	0	89	89	49	2
	增減數	0	-2	-4	3	-4	15	103	2	0	19	13	2	-8
0104	107	0	3	2	0	0	8	115	2	0	10	8	1	2
	108	0	0	1	0	0	17	93	0	0	9	7	2	1
	增減數	0	-3	-1	0	0	9	-22	-2	0	-1	-1	1	-1
0105	107	0	2	9	0	3	10	241	1	0	23	13	4	0
	108	0	2	17	0	2	13	235	1	0	36	19	4	2
	增減數	0	0	8	0	-1	3	-6	0	0	13	6	0	2
0106	107	0	0	0	0	1	16	49	0	0	8	2	0	0
	108	1	0	0	0	0	20	34	1	0	9	1	0	1
	增減數	1	0	0	0	-1	4	-15	1	0	1	-1	0	1
0107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	7	0	0
	108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
	增減數	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-8	-2	0	0
0108	107	0	0	0	0	1	8	216	1	0	40	23	2	1
	108	0	0	0	0	2	5	202	0	0	45	17	3	1
	增減數	0	0	0	0	1	-3	-14	-1	0	5	-6	1	0
0109	107	4	16	88	5	29	151	820	2	0	361	157	67	13
	108	0	19	90	4	26	168	700	3	0	328	162	107	18
	增減數	-4	3	2	-1	-3	17	-120	1	0	-33	5	40	5
0110	107	0	7	21	3	5	26	490	1	0	48	75	40	2
	108	0	6	20	2	4	7	449	2	0	60	78	48	3
	增減數	0	-1	-1	-1	-1	-19	-41	1	0	12	3	8	1
0111	107	3	54	320	19	62	341	1,285	1	0	392	400	144	29
	108	4	46	328	21	66	366	1,457	3	0	397	495	167	23
	增減數	1	-8	8	2	4	25	172	2	0	5	95	23	-6
0113	107	0	7	20	0	1	36	256	3	0	74	52	42	3
	108	0	3	14	0	3	38	225	0	0	96	60	21	6
	增減數	0	-4	-6	0	2	2	-31	-3	0	22	8	-21	3
0114	107	0	1	1	0	0	1	9	0	0	1	1	3	1
	108	0	0	1	0	0	0	7	0	0	1	2	0	1
	增減數	0	-1	0	0	0	-1	-2	0	0	0	1	-3	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
507	19	4	187	111	145	9	58	7	447	28	3	38	493	0101
632	23	7	190	143	163	9	67	11	396	32	3	43	491	
125	4	3	3	32	18	0	9	4	-51	4	0	5	-2	
526	11	3	207	178	176	5	144	14	312	25	1	41	341	0102
494	18	6	216	204	191	4	145	11	299	15	3	55	312	
-32	7	3	9	26	15	-1	1	-3	-13	-10	2	14	-29	
182	14	6	85	53	49	1	13	1	137	9	2	19	111	0103
173	9	0	91	55	78	1	12	2	141	4	2	21	106	
-9	-5	-6	6	2	29	0	-1	1	4	-5	0	2	-5	
16	0	1	9	0	1	0	3	0	1	0	0	3	6	0104
33	0	0	17	3	2	0	2	0	1	0	0	2	6	
17	0	-1	8	3	1	0	-1	0	0	0	0	-1	0	
71	3	1	31	12	16	0	0	0	41	1	0	5	36	0105
78	4	0	26	18	22	0	6	0	44	0	0	6	29	
7	1	-1	-5	6	6	0	6	0	3	-1	0	1	-7	
20	0	0	6	0	0	0	1	0	5	0	0	6	4	0106
20	2	0	15	0	0	0	2	0	4	0	0	5	7	
0	2	0	9	0	0	0	1	0	-1	0	0	-1	3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
35	1	0	18	2	13	0	0	0	3	0	0	2	1	0108
41	1	0	9	6	8	0	0	0	5	0	0	2	2	
6	0	0	-9	4	-5	0	0	0	2	0	0	0	1	
188	5	2	93	38	35	1	10	1	163	4	1	49	111	0109
209	7	3	88	49	58	1	12	1	156	6	1	24	114	
21	2	1	-5	11	23	0	2	0	-7	2	0	-25	3	
116	3	0	36	16	15	0	10	0	49	5	0	7	54	0110
126	0	0	39	19	17	0	6	2	63	2	0	5	45	
10	-3	0	3	3	2	0	-4	2	14	-3	0	-2	-9	
454	28	11	237	164	154	27	138	7	322	21	7	32	385	0111
461	30	18	215	161	177	25	141	0	313	18	10	33	372	
7	2	7	-22	-3	23	-2	3	-7	-9	-3	3	1	-13	
116	5	1	36	9	11	0	3	1	78	2	1	10	43	0113
96	0	0	38	16	20	0	2	1	70	4	0	10	47	
-20	-5	-1	2	7	9	0	-1	0	-8	2	-1	0	4	
7	0	0	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0114
2	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
-5	0	0	-2	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0115 中山醫療社團法人中山醫院	107	137	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	180	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	增減數	43	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	
0119 三軍總醫院松山分院附設民眾 診療服務處	107	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	102	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	38	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0122 中心診所醫療財團法人中心綜合 醫院	107	86	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	
	108	65	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	
	增減數	-21	-1	-3	-1	0	3	0	0	0	0	0	
0124 財團法人台灣省私立台北仁濟院 附設仁濟醫院	107	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0125 博仁綜合醫院	107	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	108	56	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	1	0	-1		
0127 臺北市立聯合醫院婦幼院區	107	193	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	108	208	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	增減數	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0128 臺北市立聯合醫院陽明院區	107	102	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	108	89	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	增減數	-13	0	-1	-1	0	0	1	0	0	0	1	
0130 西園醫療社團法人西園醫院	107	161	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
	108	178	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	增減數	17	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	
0140 臺北市立聯合醫院忠孝院區	107	311	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
	108	321	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	
	增減數	10	-1	1	0	0	-1	2	0	0	0	1	
0141 醫療財團法人辜公亮基金會和信 治癌中心醫院	107	3,573	3	64	31	6	55	27	34	0	16		
	108	3,351	6	53	29	2	54	25	34	0	8		
	增減數	-222	3	-11	-2	-4	-1	-2	0	0	-8		
0142 新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院	107	1,535	4	32	10	3	41	7	12	0	3		
	108	1,386	2	28	6	1	29	5	14	0	2		
	增減數	-149	-2	-4	-4	-2	-12	-2	2	0	-1		
0143 振興醫療財團法人振興醫院	107	1,614	1	13	7	1	18	9	5	0	1		
	108	1,570	4	15	4	1	18	4	12	1	2		
	增減數	-44	3	2	-3	0	0	-5	7	1	1		
0145 臺北市立萬芳醫院－委託財團法人 臺北醫學大學辦理	107	1,313	3	14	11	3	21	9	12	0	3		
	108	1,348	1	9	4	0	19	12	7	1	1		
	增減數	35	-2	-5	-7	-3	-2	3	-5	1	-2		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C18	C17	C16	C15	C11
0115	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	-1	4	0	1	1	1
0119	1	0	0	0	0	6	1	5	9	0	3	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	4	13	1	2	2	0
	3	0	0	0	0	-6	-1	-1	9	1	-1	2	0
0122	1	0	0	0	0	1	0	0	12	0	1	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	3	1	0
	-1	0	0	0	1	-1	0	0	-7	1	2	1	0
0124	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0
0125	8	0	0	0	0	1	0	7	9	0	6	1	2
	2	0	1	0	1	1	1	0	8	0	2	0	0
	-6	0	1	0	1	0	0	-7	-1	0	-4	-1	-2
0127	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	0	-1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
0128	6	1	0	0	0	4	2	2	9	0	7	1	2
	10	1	0	0	0	2	1	3	11	0	2	0	0
	4	0	0	0	0	-2	-1	1	2	0	-5	-1	0
0130	1	0	0	0	0	0	0	3	13	1	7	0	0
	1	3	0	0	0	1	0	7	17	1	9	2	0
	0	3	0	0	0	1	0	4	4	0	2	2	0
0140	33	2	2	0	0	3	2	31	42	1	15	4	3
	25	1	0	0	1	9	3	20	66	1	19	3	4
	-8	0	-2	0	1	6	1	-11	24	0	4	-1	1
0141	383	16	8	0	5	64	27	176	202	5	113	75	74
	320	11	5	1	5	69	15	188	184	6	102	89	86
	-63	-5	-3	1	0	5	-12	12	-18	1	-11	14	12
0142	198	11	2	0	1	25	11	125	136	6	47	35	16
	209	16	1	0	2	22	7	94	139	3	48	37	11
	11	5	-1	0	1	-3	-4	-31	3	-3	1	2	-5
0143	222	17	5	0	3	39	12	124	138	5	54	26	31
	223	19	5	0	4	32	12	97	142	5	62	25	22
	1	2	0	0	1	-7	0	-27	4	0	8	-1	-9
0145	149	11	3	0	4	30	9	73	138	2	72	19	12
	157	4	2	0	10	29	10	83	120	8	76	25	18
	8	-7	-1	0	6	-1	1	10	-18	6	4	6	6

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0115	107	0	0	0	0	0	0	55	0	0	41	23	2	0
	108	0	0	0	0	2	3	70	0	0	55	18	4	0
	增減數	0	0	0	0	2	3	15	0	0	14	-5	2	0
0119	107	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0
	108	0	0	0	0	1	3	7	0	0	6	8	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	3	4	0	0	4	7	0	0
0122	107	0	0	0	0	1	1	12	0	0	8	13	6	2
	108	0	0	0	0	2	0	9	0	0	9	7	3	1
	增減數	0	0	0	0	1	-1	-3	0	0	1	-6	-3	-1
0124	107	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	-2	0	1	0	1	0	0	1
0125	107	0	0	0	0	1	2	6	0	0	1	0	1	0
	108	0	0	0	0	0	9	6	0	0	3	4	0	1
	增減數	0	0	0	0	-1	7	0	0	0	2	4	-1	1
0127	107	0	0	0	0	0	0	147	0	0	28	10	1	0
	108	0	0	0	0	0	0	150	0	0	33	12	1	2
	增減數	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	2	0	2
0128	107	0	0	0	0	0	1	25	0	0	4	5	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	23	0	0	5	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-2	0	0	1	-2	0	0
0130	107	0	0	0	0	1	5	13	0	0	2	2	0	0
	108	0	0	0	0	0	8	14	0	0	2	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	3	1	0	0	0	0	0	0
0140	107	0	1	2	0	2	21	36	0	0	7	2	0	0
	108	0	0	3	0	0	22	36	0	0	8	3	0	0
	增減數	0	-1	1	0	-2	1	0	0	0	1	1	0	0
0141	107	1	11	40	5	28	20	1,065	2	0	82	102	45	8
	108	2	6	22	3	13	26	998	0	3	86	100	58	6
	增減數	1	-5	-18	-2	-15	6	-67	-2	3	4	-2	13	-2
0142	107	0	14	12	1	7	28	274	0	0	29	43	14	0
	108	1	14	15	1	4	25	196	0	0	31	48	20	2
	增減數	1	0	3	0	-3	-3	-78	0	0	2	5	6	2
0143	107	1	8	18	0	6	29	295	2	0	38	45	17	6
	108	1	4	29	0	9	26	314	1	0	38	31	18	2
	增減數	0	-4	11	0	3	-3	19	-1	0	0	-14	1	-4
0145	107	0	9	28	2	6	62	181	1	0	41	28	17	1
	108	1	8	26	0	4	66	192	0	0	61	31	22	1
	增減數	1	-1	-2	-2	-2	4	11	-1	0	20	3	5	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
1	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0115
2	3	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-2	
15	1	0	5	1	2	0	0	0	3	1	0	1	0	0119
18	0	0	8	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	
3	-1	0	3	0	0	0	1	0	-3	-1	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	13	0	0	0	1	0122
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	
0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	2	0	0	0	-1	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0125
9	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	
3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	-1	0	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	
9	0	0	10	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0128
12	0	0	6	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	
3	0	0	-4	-1	-3	0	1	0	1	0	1	0	1	
23	1	0	7	1	5	0	0	0	63	0	0	0	1	0130
17	0	0	7	0	4	0	0	0	64	0	0	0	1	
-6	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	
40	1	1	17	2	10	0	0	0	6	0	0	2	5	0140
28	2	1	14	2	5	0	1	0	5	0	0	4	9	
-12	1	0	-3	0	-5	0	1	0	-1	0	0	2	4	
193	12	1	63	47	49	2	8	2	107	4	1	37	117	0141
180	8	3	59	43	37	1	2	0	114	1	1	36	116	
-13	-4	2	-4	-4	-12	-1	-6	-2	7	-3	0	-1	-1	
122	5	0	46	21	24	0	0	0	34	2	0	6	41	0142
94	1	0	62	15	21	0	5	0	30	0	0	3	49	
-28	-4	0	16	-6	-3	0	5	0	-4	-2	0	-3	8	
105	2	3	53	19	24	0	8	2	63	2	0	19	42	0143
94	2	1	45	9	18	0	4	1	71	1	0	12	48	
-11	0	-2	-8	-10	-6	0	-4	-1	8	-1	0	-7	6	
89	3	3	37	13	22	1	4	0	33	2	0	6	37	0145
106	4	2	39	16	19	0	7	0	42	0	1	9	41	
17	1	-1	2	3	-3	-1	3	0	9	-2	1	3	4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0146 衛生福利部胸腔病院	107	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147 康寧醫療財團法人康寧醫院	107	125	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	108	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	4	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0148 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營	107	50	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	108	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	51	0	-2	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0
0150 中國醫藥大學附設醫院臺北分院	107	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151 國立臺灣大學醫學院附設醫院 癌醫中心分院	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	363	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	363	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0201 衛生福利部基隆醫院	107	183	2	3	0	2	5	1	7	0	0	0	0
	108	199	1	5	0	2	4	1	4	0	0	0	0
	增減數	16	-1	2	0	0	-1	0	-3	0	0	0	0
0203 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會 台灣礦工醫院	107	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 三軍總醫院附設基隆民眾診療 服務處	107	80	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	111	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	31	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
0207 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念 醫院	107	1,791	5	36	18	7	28	8	25	0	5	5	5
	108	1,954	3	32	11	4	31	14	20	0	6	6	6
	增減數	163	-2	-4	-7	-3	3	6	-5	0	1	1	1
0301 衛生福利部臺北醫院	107	329	0	6	0	0	5	5	5	0	0	0	0
	108	136	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-193	2	-3	0	0	-4	-5	-5	0	0	0	0
0302 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	107	1,336	2	11	5	3	13	6	3	1	2	2	2
	108	1,380	0	12	5	2	12	7	6	0	1	1	1
	增減數	44	-2	1	0	-1	-1	1	3	-1	-1	-1	-1
0303 板橋中興醫院	107	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 新北市立聯合醫院	107	247	0	4	1	0	7	3	1	0	0	0	0
	108	281	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1
	增減數	34	0	-3	-1	0	-6	-3	0	0	1	1	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0146	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	1	3	3	0
	3	0	0	0	0	1	0	1	3	4	0	4	1	0
	3	0	0	0	0	1	0	1	1	-3	-1	1	-2	0
0148	2	0	0	0	0	1	0	1	2	6	0	13	2	0
	1	0	0	0	1	0	1	2	6	15	0	18	5	0
	-1	0	0	0	1	-1	1	1	4	9	0	5	3	0
0150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
0151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51	0	1	1	0	2	1	9	8	12	0	21	5	1
	51	0	1	1	0	0	1	9	8	12	0	21	5	1
0201	2	6	1	0	0	1	0	3	12	18	1	23	8	1
	6	1	2	0	0	1	0	2	14	22	0	20	11	5
	4	-5	1	0	0	0	0	-1	2	4	-1	-3	3	4
0203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0204	4	0	0	0	0	0	0	3	14	19	0	7	6	1
	17	0	0	0	0	1	1	0	14	28	0	7	2	1
	13	0	0	0	0	1	1	-3	0	9	0	0	-4	0
0207	174	19	3	0	2	40	16	156	93	186	0	64	59	20
	187	12	4	0	2	44	18	167	90	195	4	79	48	15
	13	-7	1	0	0	4	2	11	-3	9	4	15	-11	-5
0301	40	0	0	0	0	7	1	10	18	75	1	30	15	7
	33	0	0	0	0	0	1	11	5	44	1	4	1	0
	-7	0	0	0	0	-7	0	1	-13	-31	0	-26	-14	-7
0302	108	7	5	0	1	30	10	67	73	289	8	48	13	13
	116	3	2	0	1	27	5	66	74	277	3	35	14	17
	8	-4	-3	0	0	-3	-5	-1	1	-12	-5	-13	1	4
0303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0
0304	1	0	2	0	2	0	1	8	30	34	0	8	9	6
	16	0	0	0	0	5	5	18	41	52	1	12	13	0
	15	0	-2	0	0	5	4	10	11	18	1	4	4	-6

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	結締組織、軟組織及其他	皮下組織	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49		C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0146	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147	107	0	0	0	0	0	0	86	0	0	8	10	1	1	1
	108	0	0	0	0	0	1	88	0	0	7	9	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-1	-1	0	-1	-1
0148	107	0	0	1	0	0	4	8	0	0	2	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	2	25	0	0	4	0	0	0	0
	增減數	0	0	-1	0	0	-2	17	0	0	2	0	0	0	0
0150	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	1	2	29	0	2	1	179	0	0	0	1	1	1	0
	增減數	1	2	29	0	2	1	179	0	0	0	1	1	1	0
0201	107	0	0	0	0	0	5	9	0	0	5	2	0	0	0
	108	0	0	0	0	1	3	9	0	0	3	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	-2	0	0	0	-2	-2	0	0	0
0203	107	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0204	107	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	108	1	0	0	0	1	4	2	0	0	2	0	0	0	0
	增減數	1	0	-1	0	1	3	1	0	0	2	0	0	0	0
0207	107	4	1	37	1	4	42	205	0	0	53	31	14	6	6
	108	3	1	40	1	7	51	264	0	0	85	39	21	4	4
	增減數	-1	0	3	0	3	9	59	0	0	32	8	7	-2	-2
0301	107	2	0	0	1	4	17	25	0	0	0	6	2	0	0
	108	0	0	0	0	0	3	7	1	0	1	0	0	0	0
	增減數	-2	0	0	-1	-4	-14	-18	1	0	1	-6	-2	0	0
0302	107	0	1	7	0	5	36	258	0	1	40	17	3	0	0
	108	0	1	6	2	7	32	263	0	0	45	29	10	3	3
	增減數	0	0	-1	2	2	-4	5	0	-1	5	12	7	3	3
0303	107	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	107	0	0	0	0	1	6	42	0	0	6	8	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	5	29	0	0	5	7	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-1	-13	0	0	-1	-1	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	腎盂及其他泌尿器官	腎	膀胱	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C65-C66, C68	C64	C67	C60, C63	C62	C61	
0146	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	0	2	0	1	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	
0148	1	0	0	3	0	5	0	0	0	4	0	0	0	
	0	1	0	10	7	5	0	0	0	4	0	0	0	
	-1	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	
0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	
0151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23	0	1	2	0	0	0	2	1	1	0	1	0	
	23	0	1	2	0	0	0	2	1	1	0	1	0	
0201	3	9	0	2	0	0	0	8	0	16	0	1	0	
	8	11	0	10	0	0	0	8	0	17	0	0	0	
	5	2	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0203	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0204	2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	
	1	0	0	5	0	0	0	0	1	7	0	0	0	
	-1	0	0	5	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	
0207	43	4	1	144	1	6	2	25	32	61	1	2	0	
	60	3	2	173	1	12	0	26	31	37	3	3	0	
	17	-1	1	29	0	6	-2	1	-1	-24	2	1	0	
0301	0	0	0	7	0	0	0	4	4	14	0	0	0	
	1	0	0	3	0	0	0	3	0	4	1	0	0	
	1	0	0	-4	0	0	0	-1	-4	-10	-1	0	0	
0302	17	12	1	88	0	5	0	10	22	23	0	1	0	
	21	15	0	102	2	4	0	17	13	30	1	1	0	
	4	3	-1	14	2	-1	0	7	-9	7	0	1	0	
0303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	
0304	5	5	0	0	1	0	0	2	1	16	3	0	0	
	1	3	0	0	0	0	0	9	2	15	0	0	0	
	-4	-2	0	0	-1	0	0	7	1	-1	-3	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0305 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	107	2,865	10	55	37	6	70	28	19	1	8		
	108	3,043	7	65	24	4	63	34	30	1	6		
	增減數	178	-3	10	-13	-2	-7	6	11	0	-2		
0306 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	107	289	0	5	0	1	2	0	3	0	0		
	108	314	0	1	0	0	1	1	2	0	0		
	增減數	25	0	-4	0	-1	-1	1	-1	0	0		
0311 祐民醫院	107	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0312 宏仁醫院	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0314 板橋國泰醫院	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0315 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	107	632	0	5	3	1	9	0	4	0	1		
	108	711	0	11	3	1	6	2	1	0	1		
	增減數	79	0	6	0	0	-3	2	-3	0	0		
0317 新泰綜合醫院	107	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0318 仁愛醫院	107	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	31	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
0319 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	107	1,593	4	15	13	5	27	12	6	0	7		
	108	1,497	5	23	13	3	29	6	8	0	3		
	增減數	-96	1	8	0	-2	2	-6	2	0	-4		
0320 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	107	814	3	11	6	3	14	7	15	0	0		
	108	823	1	10	9	0	19	6	5	0	2		
	增減數	9	-2	-1	3	-3	5	-1	-10	0	2		
0321 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	107	1,913	3	29	11	2	45	15	19	1	8		
	108	1,994	5	34	17	1	45	14	20	2	5		
	增減數	81	2	5	6	-1	0	-1	1	1	-3		
0322 天主教輔仁大學附設醫院	107	153	0	0	1	1	0	1	0	0	0		
	108	925	1	12	8	0	20	7	5	0	1		
	增減數	772	1	12	7	-1	20	6	5	0	1		
0401 國立陽明交通大學附設醫院	107	728	2	10	5	1	16	4	8	0	1		
	108	721	0	10	6	1	8	5	8	0	2		
	增減數	-7	-2	0	1	0	-8	1	0	0	1		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
52	78	94	6	306	168	254	24	64	8	0	5	27	303	0305
55	68	97	7	362	238	214	26	53	9	0	6	28	296	
3	-10	3	1	56	70	-40	2	-11	1	0	1	1	-7	
5	9	13	0	75	19	5	1	3	0	0	1	2	12	0306
4	3	17	0	91	23	10	1	1	0	0	0	6	13	
-1	-6	4	0	16	4	5	0	-2	0	0	-1	4	1	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0314
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	23	32	3	81	53	37	5	4	2	1	1	4	83	0315
2	20	36	3	82	44	63	9	7	1	0	2	3	83	
1	-3	4	0	1	-9	26	4	3	-1	-1	1	-1	0	
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0317
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	
0	4	4	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0318
0	4	5	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	-2	
19	26	59	6	155	79	112	10	46	7	0	3	13	211	0319
18	23	50	2	148	74	105	16	44	2	0	4	7	218	
-1	-3	-9	-4	-7	-5	-7	6	-2	-5	0	1	-6	7	
12	31	39	0	74	54	50	12	21	3	0	1	9	116	0320
14	21	28	3	71	59	65	13	15	0	1	0	7	105	
2	-10	-11	3	-3	5	15	1	-6	-3	1	-1	-2	-11	
30	42	63	8	248	100	132	16	29	6	0	3	5	241	0321
30	55	49	7	171	126	117	23	40	2	0	5	12	247	
0	13	-14	-1	-77	26	-15	7	11	-4	0	2	7	6	
0	0	2	0	3	2	2	2	10	0	0	1	0	2	0322
10	27	34	10	85	67	43	9	17	2	0	2	5	88	
10	27	32	10	82	65	41	7	7	2	0	1	5	86	
3	24	39	1	80	35	82	10	20	2	0	0	3	96	0401
6	24	47	2	85	44	84	2	11	0	0	1	3	88	
3	0	8	1	5	9	2	-8	-9	-2	0	1	0	-8	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	結締組織、軟組織及其他	皮下組織	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0305	107	0	8	38	1	9	74	374	0	0	115	65	39	4	
	108	1	11	39	0	7	90	403	3	0	127	62	33	9	
	增減數	1	3	1	-1	-2	16	29	3	0	12	-3	-6	5	
0306	107	0	0	3	0	1	19	52	1	0	16	12	1	0	
	108	0	0	3	0	0	18	56	0	0	12	19	2	0	
	增減數	0	0	0	0	-1	-1	4	-1	0	-4	7	1	0	
0311	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
0312	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0314	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	
0315	107	2	2	1	1	3	32	79	1	0	39	11	2	1	
	108	0	0	0	0	3	41	108	0	0	31	18	2	0	
	增減數	-2	-2	-1	-1	0	9	29	-1	0	-8	7	0	-1	
0317	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
0318	107	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
0319	107	1	4	40	4	9	31	207	0	0	36	39	30	2	
	108	0	6	24	1	0	39	207	2	0	46	42	19	2	
	增減數	-1	2	-16	-3	-9	8	0	2	0	10	3	-11	0	
0320	107	0	3	15	0	2	26	103	0	0	29	13	9	0	
	108	0	3	10	0	4	27	109	1	0	42	15	12	2	
	增減數	0	0	-5	0	2	1	6	1	0	13	2	3	2	
0321	107	1	14	19	3	7	53	275	2	1	65	52	20	3	
	108	0	3	31	3	10	67	329	2	1	50	47	22	1	
	增減數	-1	-11	12	0	3	14	54	0	0	-15	-5	2	-2	
0322	107	0	4	0	0	1	4	82	1	0	0	1	3	0	
	108	1	9	8	1	3	21	140	0	0	23	14	12	3	
	增減數	1	5	8	1	2	17	58	-1	0	23	13	9	3	
0401	107	0	2	14	0	2	11	127	0	0	15	8	0	0	
	108	0	2	9	0	2	24	104	0	0	13	7	5	0	
	增減數	0	0	-5	0	0	13	-23	0	0	-2	-1	5	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
117	8	2	72	31	43	0	14	0	119	4	9	18	78	0305
124	10	7	88	31	51	3	13	0	119	5	2	22	90	
7	2	5	16	0	8	3	-1	0	0	1	-7	4	12	
12	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	2	6	0306
15	1	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	6	
3	1	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	-2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0314
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	0	0	22	5	12	0	1	0	2	0	0	5	8	0315
52	0	2	25	8	8	0	1	0	9	2	0	6	15	
2	0	2	3	3	-4	0	0	0	7	2	0	1	7	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0317
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0318
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	3	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	
96	0	0	41	33	24	0	10	0	59	1	1	18	72	0319
84	3	1	47	21	22	0	5	0	55	2	0	12	56	
-12	3	1	6	-12	-2	0	-5	0	-4	1	-1	-6	-16	
34	1	2	19	9	7	1	4	0	34	0	1	4	17	0320
37	1	1	10	5	13	0	2	0	38	1	1	5	30	
3	0	-1	-9	-4	6	-1	-2	0	4	1	0	1	13	
119	2	2	59	24	27	0	14	1	39	2	0	5	48	0321
145	2	1	54	35	19	0	15	1	57	6	0	4	62	
26	0	-1	-5	11	-8	0	1	0	18	4	0	-1	14	
1	1	0	2	8	7	0	3	0	7	1	0	0	0	0322
91	6	1	39	6	20	0	3	1	36	0	2	4	27	
90	5	1	37	-2	13	0	0	1	29	-1	2	4	27	
39	1	0	16	8	14	0	1	0	10	0	0	5	13	0401
57	3	0	14	9	2	0	3	0	10	0	0	4	16	
18	2	0	-2	1	-12	0	2	0	0	0	0	-1	3	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0402 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	107	1,007	6	12	3	4	18	5	18	0	3		
	108	1,008	1	14	6	1	22	10	13	0	4		
	增減數	1	-5	2	3	-3	4	5	-5	0	1		
0403 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院	107	430	0	1	0	1	4	2	2	0	0		
	108	538	0	3	1	0	9	1	4	0	1		
	增減數	108	0	2	1	-1	5	-1	2	0	1		
0404 臺北榮民總醫院蘇澳分院	107	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	108	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-4	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
0406 財團法人蘭陽仁愛醫院	107	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0407 臺北榮民總醫院員山分院	107	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0501 國立臺灣大學醫學院附設醫院 新竹臺大分院新竹醫院	107	2,261	2	25	12	6	38	10	21	1	5		
	108	2,222	3	34	16	1	34	12	23	1	7		
	增減數	-39	1	9	4	-5	-4	2	2	0	2		
0503 臺北榮民總醫院新竹分院	107	66	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
	108	87	0	0	1	0	1	0	0	0	0		
	增減數	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
0504 南門綜合醫院	107	91	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
	108	73	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	增減數	-18	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
0505 國軍新竹地區醫院附設民眾 診療服務處	107	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0507 東元醫療社團法人東元綜合醫院	107	187	1	7	4	0	6	2	0	0	0		
	108	209	1	4	3	3	9	0	0	0	1		
	增減數	22	0	-3	-1	3	3	-2	0	0	1		
0509 國立臺灣大學醫學院附設醫院 竹東分院	107	79	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
	108	73	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-6	1	0	0	0	-1	-1	0	0	0		
0511 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院	107	41	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	108	43	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
	增減數	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
0513 新仁醫院	107	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
12	44	50	4	80	43	138	5	22	2	0	2	4	98	0402
17	37	50	4	90	37	121	6	23	1	0	5	8	93	
5	-7	0	0	10	-6	-17	1	1	-1	0	3	4	-5	
3	12	15	1	47	15	74	4	15	1	0	1	3	62	0403
2	11	28	1	66	33	73	4	12	1	0	0	3	65	
-1	-1	13	0	19	18	-1	0	-3	0	0	-1	0	3	
0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0404
0	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-2	
0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0407
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	-2	-1	1	1	0	0	0	0	-2	
17	57	63	12	214	104	166	21	66	5	0	2	10	340	0501
35	49	65	7	154	80	151	13	43	4	0	5	12	396	
18	-8	2	-5	-60	-24	-15	-8	-23	-1	0	3	2	56	
0	2	7	0	5	2	8	0	3	0	0	0	1	8	0503
0	3	4	0	8	2	10	0	3	0	0	0	0	10	
0	1	-3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	-1	2	
0	3	8	0	32	19	3	0	0	0	0	0	0	2	0504
0	4	9	0	19	11	3	1	0	0	0	0	0	7	
0	1	1	0	-13	-8	0	1	0	0	0	0	0	5	
1	2	4	0	8	3	3	0	1	0	0	0	1	8	0505
0	2	6	0	9	6	3	0	0	0	0	0	0	2	
-1	0	2	0	1	3	0	0	-1	0	0	0	-1	-6	
3	5	10	0	27	13	18	0	6	0	0	0	0	16	0507
2	3	8	2	25	14	10	1	0	0	0	0	0	13	
-1	-2	-2	2	-2	1	-8	1	-6	0	0	0	0	-3	
1	4	4	0	7	8	3	0	2	0	0	0	0	4	0509
0	3	1	0	4	4	3	1	1	0	0	0	0	8	
-1	-1	-3	0	-3	-4	0	1	-1	0	0	0	0	4	
0	0	4	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	5	0511
2	0	4	0	5	0	4	1	0	0	0	0	0	8	
2	0	0	0	4	-1	1	1	0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0513
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮、非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0402	107	1	3	17	1	3	46	128	1	0	32	21	9	6
	108	1	5	19	1	3	41	137	0	0	28	19	6	1
	增減數	0	2	2	0	0	-5	9	-1	0	-4	-2	-3	-5
0403	107	0	1	10	0	3	11	34	0	0	16	14	2	1
	108	1	0	9	1	1	19	45	0	0	21	10	5	1
	增減數	1	-1	-1	1	-2	8	11	0	0	5	-4	3	0
0404	107	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
0406	107	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	1	0	0
0407	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	107	3	9	54	0	16	43	335	4	0	66	52	22	4
	108	3	11	53	3	9	41	358	0	0	63	58	26	9
	增減數	0	2	-1	3	-7	-2	23	-4	0	-3	6	4	5
0503	107	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	6	0	0
	108	0	0	1	0	0	2	5	0	0	2	2	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	-2	1	0	0	0	-4	0	0
0504	107	0	0	0	0	1	7	1	0	0	1	1	0	0
	108	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	1	2	0	0
0505	107	0	0	0	0	1	3	2	0	0	5	3	0	0
	108	0	0	1	0	0	3	4	1	0	1	2	2	0
	增減數	0	0	1	0	-1	0	2	1	0	-4	-1	2	0
0507	107	0	0	1	1	0	7	5	0	0	13	5	0	1
	108	0	1	1	0	1	11	19	0	0	26	11	2	0
	增減數	0	1	0	-1	1	4	14	0	0	13	6	2	-1
0509	107	0	1	0	0	1	0	3	0	0	1	1	0	0
	108	0	0	0	0	0	2	3	0	0	3	4	0	0
	增減數	0	-1	0	0	-1	2	0	0	0	2	3	0	0
0511	107	1	0	1	1	0	4	5	0	0	4	1	0	0
	108	1	0	0	0	0	1	1	0	0	7	3	1	0
	增減數	0	0	-1	-1	0	-3	-4	0	0	3	2	1	0
0513	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
53	3	1	30	16	12	0	0	0	31	0	0	2	18	0402
50	3	1	28	12	16	0	3	0	36	0	0	8	27	
-3	0	0	-2	-4	4	0	3	0	5	0	0	6	9	
16	1	0	17	7	13	0	3	0	10	0	0	4	4	0403
36	1	0	21	7	11	0	2	1	13	0	0	3	12	
20	0	0	4	0	-2	0	-1	1	3	0	0	-1	8	
2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0404
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	
9	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0407
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	
122	5	1	54	21	21	1	12	0	123	5	1	15	75	0501
118	5	2	49	11	19	0	12	1	139	2	1	10	74	
-4	0	1	-5	-10	-2	-1	0	1	16	-3	0	-5	-1	
7	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0503
18	1	0	3	2	2	0	3	0	0	0	0	4	0	
11	1	0	2	2	-1	0	3	0	-1	0	0	4	-1	
7	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0504
4	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
-3	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	7	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0505
4	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	
-5	0	0	-5	-2	-3	0	0	0	3	0	0	0	0	
12	0	0	12	0	1	0	0	0	3	0	0	0	8	0507
13	4	0	9	2	1	0	0	0	5	0	0	2	2	
1	4	0	-3	2	0	0	0	0	2	0	0	2	-6	
28	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0509
25	0	0	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
-3	-1	0	3	0	-2	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0511
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
-1	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0513
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院		原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
			Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
0515 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	107	1,581	1	26	8	3	25	27	18	0	4		
	108	1,553	0	27	8	3	26	7	21	0	5		
	增減數	-28	-1	1	0	0	1	-20	3	0	1		
0516 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院	107	318	0	7	3	1	13	5	5	0	0		
	108	355	0	7	1	3	10	1	3	0	1		
	增減數	37	0	0	-2	2	-3	-4	-2	0	1		
0517 中國醫藥大學新竹附設醫院	107	98	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	108	603	0	3	0	0	2	5	2	0	1		
	增減數	505	0	2	0	0	2	5	2	0	0		
0518 國立臺灣大學醫學院附設醫院 新竹臺大分院生醫醫院	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0602 新國民醫療社團法人新國民醫院	107	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0603 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人 聖保祿醫院	107	628	1	6	6	2	15	5	0	1	0		
	108	778	0	6	3	2	11	1	0	0	0		
	增減數	150	-1	0	-3	0	-4	-4	0	-1	0		
0604 衛生福利部桃園醫院	107	1,553	3	20	7	1	22	15	14	0	5		
	108	1,729	5	39	11	3	24	14	22	0	6		
	增減數	176	2	19	4	2	2	-1	8	0	1		
0605 國軍桃園總醫院附設民眾診療 服務處	107	289	0	4	2	0	7	1	2	0	1		
	108	330	0	2	2	2	5	0	0	0	0		
	增減數	41	0	-2	0	2	-2	-1	-2	0	-1		
0606 敏盛綜合醫院	107	648	0	6	0	1	1	0	1	0	0		
	108	631	0	2	1	0	6	0	2	0	0		
	增減數	-17	0	-4	1	-1	5	0	1	0	0		
0608 龍潭敏盛醫院	107	47	0	2	0	0	3	0	1	0	0		
	108	58	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
	增減數	11	0	-2	1	0	-3	1	-1	0	0		
0610 天成醫院	107	78	0	2	1	0	0	0	1	0	0		
	108	69	0	2	0	0	2	0	0	0	0		
	增減數	-9	0	0	-1	0	2	0	-1	0	0		
0612 臺北榮民總醫院桃園分院	107	123	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	108	116	0	2	0	0	1	1	0	0	1		
	增減數	-7	0	2	0	0	1	0	0	0	1		
0614 聯新國際醫院	107	834	4	15	6	0	17	6	5	0	0		
	108	949	0	7	3	2	12	4	10	0	0		
	增減數	115	-4	-8	-3	2	-5	-2	5	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
35	38	39	5	134	90	99	6	30	6	0	2	14	152	0515
36	26	33	3	112	69	86	12	22	2	0	6	10	161	
1	-12	-6	-2	-22	-21	-13	6	-8	-4	0	4	-4	9	
3	10	12	1	42	14	23	1	2	0	0	2	6	38	0516
13	4	20	3	45	22	14	1	5	0	0	0	3	31	
10	-6	8	2	3	8	-9	0	3	0	0	-2	-3	-7	
1	4	2	0	37	26	2	0	2	0	0	0	0	8	0517
7	14	21	4	132	109	22	2	6	1	1	1	2	53	
6	10	19	4	95	83	20	2	4	1	1	1	2	45	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0518
2	1	0	2	7	1	3	0	0	1	0	0	0	13	
2	1	0	2	7	1	3	0	0	1	0	0	0	13	
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0602
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	12	25	3	211	30	27	2	8	0	0	0	1	23	0603
7	17	20	0	372	48	19	5	7	0	0	0	4	24	
0	5	-5	-3	161	18	-8	3	-1	0	0	0	3	1	
29	51	55	9	190	90	149	22	37	2	0	4	9	184	0604
34	46	48	10	229	118	148	9	47	4	0	2	7	229	
5	-5	-7	1	39	28	-1	-13	10	2	0	-2	-2	45	
1	3	15	2	43	26	25	6	5	1	0	0	0	40	0605
2	8	10	4	47	29	21	4	8	0	0	0	0	36	
1	5	-5	2	4	3	-4	-2	3	-1	0	0	0	-4	
4	13	25	1	63	41	55	2	20	0	0	0	1	60	0606
2	12	11	2	60	43	31	7	16	2	0	0	1	58	
-2	-1	-14	1	-3	2	-24	5	-4	2	0	0	0	-2	
0	1	2	0	1	8	0	0	1	0	0	0	0	7	0608
0	1	0	0	2	12	3	0	0	0	0	0	0	8	
0	0	-2	0	1	4	3	0	-1	0	0	0	0	1	
0	3	4	0	19	9	3	0	0	0	0	0	0	3	0610
0	1	1	0	20	2	1	0	1	0	0	2	0	2	
0	-2	-3	0	1	-7	-2	0	1	0	0	2	0	-1	
0	4	13	0	16	8	12	1	3	0	0	0	0	27	0612
3	2	9	0	8	5	9	0	7	3	0	1	0	18	
3	-2	-4	0	-8	-3	-3	-1	4	3	0	1	0	-9	
8	24	23	4	110	63	65	7	18	0	0	1	2	88	0614
14	24	27	1	131	74	69	12	12	1	0	2	1	89	
6	0	4	-3	21	11	4	5	-6	1	0	1	-1	1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0515	107	2	6	18	2	5	35	297	1	0	93	77	32	3
	108	1	9	25	0	5	42	329	0	0	101	87	27	4
	增減數	-1	3	7	-2	0	7	32	-1	0	8	10	-5	1
0516	107	0	0	2	0	1	1	55	0	0	26	7	2	0
	108	0	1	1	0	1	9	55	0	0	26	21	6	1
	增減數	0	1	-1	0	0	8	0	0	0	0	14	4	1
0517	107	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0
	108	0	1	3	0	0	5	51	0	0	12	6	2	1
	增減數	0	1	3	0	-1	5	46	0	0	11	6	2	1
0518	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	2	0	1	1	13	0	0	1	3	0	1
	增減數	0	0	2	0	1	1	13	0	0	1	3	0	1
0602	107	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0
0603	107	1	0	0	1	1	11	164	1	0	13	4	0	0
	108	0	0	0	0	1	12	144	0	0	14	6	0	0
	增減數	-1	0	0	-1	0	1	-20	-1	0	1	2	0	0
0604	107	1	5	10	0	13	35	209	2	0	56	34	29	2
	108	2	8	10	2	11	39	242	0	0	73	37	15	2
	增減數	1	3	0	2	-2	4	33	-2	0	17	3	-14	0
0605	107	0	1	6	0	1	8	13	0	0	21	10	1	0
	108	0	0	9	0	2	9	44	1	0	11	5	2	0
	增減數	0	-1	3	0	1	1	31	1	0	-10	-5	1	0
0606	107	0	1	0	1	3	6	198	0	0	29	17	4	2
	108	0	1	0	1	3	12	226	0	0	22	19	3	2
	增減數	0	0	0	0	0	6	28	0	0	-7	2	-1	0
0608	107	0	0	0	0	2	3	6	0	0	1	0	1	1
	108	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	-2	1	5	0	0	-1	2	-1	-1
0610	107	0	0	0	0	0	6	11	0	0	1	0	0	0
	108	0	0	0	0	1	5	10	0	0	2	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	-1	-1	0	0	1	1	0	0
0612	107	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	1	0	0
	108	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	0	-3	0	0	1	0	0	0
0614	107	0	1	3	1	0	27	182	0	0	17	18	7	1
	108	0	2	2	0	7	16	236	0	0	25	18	4	0
	增減數	0	1	-1	-1	7	-11	54	0	0	8	0	-3	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
50	3	1	13	5	7	0	1	0	98	2	1	13	54	0515
48	6	2	26	2	7	0	3	0	85	1	0	17	51	
-2	3	1	13	-3	0	0	2	0	-13	-1	-1	4	-3	
13	0	1	7	0	0	0	0	0	6	0	0	1	8	0516
21	0	0	11	0	2	0	0	0	7	0	0	2	4	
8	0	-1	4	0	2	0	0	0	1	0	0	1	-4	
5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0517
60	4	0	18	6	12	0	1	0	15	0	0	2	16	
55	4	0	18	6	11	0	1	0	14	0	0	2	16	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0518
5	0	0	2	1	0	0	0	0	7	0	0	0	2	
5	0	0	2	1	0	0	0	0	7	0	0	0	2	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0602
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
21	0	0	10	0	3	0	1	0	10	0	0	0	2	0603
23	0	0	16	2	2	0	0	0	10	0	0	1	1	
2	0	0	6	2	-1	0	-1	0	0	0	0	1	-1	
63	4	1	37	20	18	0	12	0	26	1	0	17	40	0604
62	3	2	43	11	16	0	3	0	26	0	0	15	52	
-1	-1	1	6	-9	-2	0	-9	0	0	-1	0	-2	12	
12	0	1	12	2	1	0	2	0	2	0	0	2	10	0605
15	1	1	18	6	4	0	1	0	0	0	0	4	17	
3	1	0	6	4	3	0	-1	0	-2	0	0	2	7	
37	4	2	13	5	7	0	0	0	12	0	0	3	10	0606
31	1	1	22	4	5	0	1	0	7	0	0	5	9	
-6	-3	-1	9	-1	-2	0	1	0	-5	0	0	2	-1	
3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0608
5	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	
2	0	0	0	0	3	0	-1	0	1	0	0	0	1	
8	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0610
12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
4	1	0	-1	0	-3	0	0	0	1	0	0	-1	0	
13	0	0	8	1	2	0	3	0	0	0	0	1	2	0612
17	0	0	13	4	0	0	2	0	1	0	0	1	0	
4	0	0	5	3	-2	0	-1	0	1	0	0	0	-2	
25	2	1	16	4	4	0	6	0	26	0	0	11	16	0614
40	1	1	15	3	2	0	1	0	51	1	0	10	19	
15	-1	0	-1	-1	-2	0	-5	0	25	1	0	-1	3	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0615 怡仁綜合醫院	107	145	1	3	0	0	4	1	1	0	1		
	108	185	0	5	0	0	3	2	2	0	0		
	增減數	40	-1	2	0	0	-1	1	1	0	-1		
0618 天成醫療社團法人天晟醫院	107	121	0	1	0	0	2	1	0	0	0		
	108	106	0	1	0	0	0	0	2	0	1		
	增減數	-15	0	0	0	0	-2	-1	2	0	1		
0619 衛生福利部桃園醫院新屋分院	107	80	0	1	0	0	2	0	0	0	0		
	108	113	1	1	0	0	1	0	0	0	1		
	增減數	33	1	0	0	0	-1	0	0	0	1		
0701 重光醫院	107	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0702 衛生福利部苗栗醫院	107	245	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
	108	240	0	1	1	0	1	0	1	0	0		
	增減數	-5	0	1	1	0	1	-1	1	-1	0		
0704 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	107	34	0	4	0	1	1	0	1	0	0		
	108	27	0	1	0	0	1	0	1	0	0		
	增減數	-7	0	-3	0	-1	0	0	0	0	0		
0705 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	107	327	0	7	2	1	10	6	6	0	0		
	108	287	0	8	2	0	6	3	8	0	2		
	增減數	-40	0	1	0	-1	-4	-3	2	0	2		
0709 大千綜合醫院	107	591	0	12	4	2	13	1	3	0	1		
	108	567	2	10	6	0	15	4	12	0	0		
	增減數	-24	2	-2	2	-2	2	3	9	0	-1		
0710 協和醫院	107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0712 梓榮醫療社團法人弘大醫院	107	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0801 衛生福利部臺中醫院	107	685	0	5	0	0	1	0	1	0	0		
	108	670	1	5	1	0	2	4	2	0	0		
	增減數	-15	1	0	1	0	1	4	1	0	0		
0802 中山醫學大學附設醫院	107	2,578	11	73	23	3	110	13	21	0	3		
	108	2,900	15	73	29	7	97	22	21	0	9		
	增減數	322	4	0	6	4	-13	9	0	0	6		
0804 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	107	284	2	4	1	0	7	4	1	0	2		
	108	301	1	5	0	1	6	5	4	1	0		
	增減數	17	-1	1	-1	1	-1	1	3	1	-2		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
0615	26	1	0	0	2	1	7	15	12	0	7	7	5
	26	1	0	0	3	1	7	17	21	0	7	6	0
	0	0	0	0	1	0	0	2	9	0	0	-1	-5
0618	12	0	0	0	1	1	10	12	22	0	5	0	3
	8	0	1	0	3	0	7	8	19	0	10	6	0
	-4	0	1	0	2	-1	-3	-4	-3	0	5	6	-3
0619	8	0	0	0	0	1	2	4	28	0	4	3	0
	11	0	0	0	2	1	5	23	26	0	7	4	2
	3	0	0	0	2	0	3	19	-2	0	3	1	2
0701	4	0	0	0	1	0	2	9	14	1	9	7	0
	5	0	0	0	1	1	5	2	21	1	10	1	0
	1	0	0	0	0	1	3	-7	7	0	1	-6	0
0702	32	1	0	0	2	1	19	22	50	0	5	11	1
	36	0	0	0	4	2	21	29	42	0	13	7	1
	4	-1	0	0	2	1	2	7	-8	0	8	-4	0
0704	2	1	0	0	1	1	0	2	4	0	3	3	2
	2	0	1	0	1	0	1	1	1	0	3	1	0
	0	-1	1	0	0	-1	1	-1	-3	0	0	-2	-2
0705	49	3	0	0	4	1	40	13	19	1	20	24	7
	31	0	0	0	11	7	24	16	24	2	18	14	2
	-18	-3	0	0	-1	6	-16	3	5	1	-2	-10	-5
0709	51	5	0	0	13	3	58	31	56	3	18	21	11
	51	6	2	0	14	5	56	34	58	1	17	13	6
	0	1	2	0	1	2	-2	3	2	-2	-1	-8	-5
0710	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0
0712	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0801	82	1	0	0	13	2	42	44	217	2	16	8	6
	69	1	1	0	15	1	48	48	184	1	19	8	11
	-13	0	1	0	2	-1	6	4	-33	-1	3	0	5
0802	492	12	3	1	83	30	178	97	358	7	73	56	28
	713	18	9	1	85	28	166	92	310	10	65	76	31
	221	6	6	0	-1	-2	-12	-5	-48	3	-8	20	3
0804	27	6	1	1	10	2	26	23	42	0	3	14	6
	41	2	0	0	7	2	26	30	65	0	6	13	4
	14	-4	-1	-1	0	0	0	7	23	0	3	-1	-2

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0615	107	1	0	0	0	1	5	24	0	0	7	2	1	0
	108	0	0	0	0	2	5	31	0	0	14	9	3	0
	增減數	-1	0	0	0	1	0	7	0	0	7	7	2	0
0618	107	0	1	0	0	1	16	18	0	0	1	0	1	0
	108	0	0	0	0	1	8	15	0	0	2	2	0	0
	增減數	0	-1	0	0	0	-8	-3	0	0	1	2	-1	0
0619	107	0	0	0	0	1	5	7	0	0	0	0	1	0
	108	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	2	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	1	0
0701	107	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0
	108	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-3	1	0	0	1	0	-1	0
0702	107	0	0	1	0	1	11	30	1	0	8	3	1	0
	108	0	1	0	1	0	17	20	0	0	10	3	1	0
	增減數	0	1	-1	1	-1	6	-10	-1	0	2	0	0	0
0704	107	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0
	108	0	0	0	0	0	4	3	1	0	2	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	-1	0
0705	107	0	1	1	0	6	2	35	0	0	3	4	2	0
	108	1	0	2	0	1	2	40	0	0	8	3	5	0
	增減數	1	-1	1	0	-5	0	5	0	0	5	-1	3	0
0709	107	0	0	4	0	4	21	78	0	0	19	17	5	0
	108	0	0	10	0	6	12	71	0	0	17	18	5	1
	增減數	0	0	6	0	2	-9	-7	0	0	-2	1	0	1
0710	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
0712	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801	107	0	1	4	0	8	15	122	0	0	8	9	2	1
	108	0	1	4	0	2	8	148	0	0	11	7	2	0
	增減數	0	0	0	0	-6	-7	26	0	0	3	-2	0	-1
0802	107	1	11	21	4	9	51	276	1	0	95	64	42	3
	108	1	9	38	7	9	72	266	1	0	102	82	32	7
	增減數	0	-2	17	3	0	21	-10	0	0	7	18	-10	4
0804	107	1	0	0	0	1	3	29	1	0	9	3	4	0
	108	1	1	1	1	2	6	26	0	1	7	3	1	0
	增減數	0	1	1	1	1	3	-3	-1	1	-2	0	-3	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
3	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0615
7	0	0	1	2	0	0	2	0	2	0	0	2	3	
4	0	0	-3	2	0	0	1	0	1	0	0	2	2	
5	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0618
1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	3	2	
-4	-1	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0	2	2	
4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0619
3	1	0	3	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	
-1	1	0	0	1	-1	0	1	0	1	0	0	-2	0	
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0701
3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	1	10	1	4	0	3	0	3	0	0	2	8	0702
12	0	0	6	1	0	0	2	0	0	0	0	3	4	
2	0	-1	-4	0	-4	0	-1	0	-3	0	0	1	-4	
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0704
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
30	0	0	11	0	4	0	3	0	0	0	0	5	5	0705
23	0	0	8	0	1	0	3	0	2	0	0	5	4	
-7	0	0	-3	0	-3	0	0	0	2	0	0	0	-1	
63	0	2	22	3	10	0	4	0	12	0	0	4	15	0709
43	5	1	13	3	10	0	2	0	12	0	0	13	12	
-20	5	-1	-9	0	0	0	-2	0	0	0	0	9	-3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0710
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0712
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	1	0	16	3	8	0	0	0	4	0	0	1	8	0801
16	0	0	17	5	3	0	0	0	7	0	0	3	15	
-18	-1	0	1	2	-5	0	0	0	3	0	0	2	7	
58	2	1	51	17	43	1	17	1	61	1	2	8	57	0802
76	3	2	51	21	38	2	18	3	105	4	3	9	58	
18	1	1	0	4	-5	1	1	2	44	3	1	1	1	
22	2	0	7	1	2	0	1	0	1	0	0	8	7	0804
12	0	0	4	0	1	0	2	1	0	1	0	6	5	
-10	-2	0	-3	-1	-1	0	1	1	-1	1	0	-2	-2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0805 澄清綜合醫院	107	338	0	1	0	0	2	0	3	0	0		
	108	292	1	2	0	0	3	1	0	1	1		
	增減數	-46	1	1	0	0	1	1	-3	1	1		
0806 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院	107	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0		
	108	19	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
	增減數	6	0	1	0	0	0	-3	1	0	0		
0808 臺中榮民總醫院	107	4,992	24	115	72	13	164	51	68	2	14		
	108	5,034	15	137	46	10	131	49	50	0	12		
	增減數	42	-9	22	-26	-3	-33	-2	-18	-2	-2		
0810 中國醫藥大學附設醫院	107	7,068	23	180	64	9	201	61	110	0	25		
	108	6,946	16	151	76	18	199	74	106	0	23		
	增減數	-122	-7	-29	12	9	-2	13	-4	0	-2		
0811 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院	107	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	30	0	0	0	0	1	0	2	0	0		
	增減數	10	0	0	0	0	1	0	2	0	0		
0813 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	107	662	3	13	2	0	6	15	12	1	2		
	108	712	1	8	6	1	7	8	8	0	1		
	增減數	50	-2	-5	4	1	1	-7	-4	-1	-1		
0814 澄清綜合醫院中港分院	107	1,070	1	8	2	0	9	6	10	0	1		
	108	1,046	0	15	3	0	8	3	4	1	2		
	增減數	-24	-1	7	1	0	-1	-3	-6	1	1		
0815 林新醫療社團法人林新醫院	107	836	0	7	0	0	3	2	4	0	0		
	108	744	0	10	0	1	4	1	2	0	0		
	增減數	-92	0	3	0	1	1	-1	-2	0	0		
0817 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院	107	81	0	2	1	0	1	0	2	0	1		
	108	57	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
	增減數	-24	0	-2	-1	0	0	1	-2	0	-1		
0901 光田醫療社團法人光田綜合醫院	107	1,030	5	22	3	5	24	7	20	0	5		
	108	1,039	4	17	4	2	26	15	14	0	6		
	增減數	9	-1	-5	1	-3	2	8	-6	0	1		
0903 董綜合醫療社團法人董綜合醫院	107	1,785	12	47	16	7	45	7	18	0	2		
	108	1,856	6	38	19	2	52	9	23	0	3		
	增減數	71	-6	-9	3	-5	7	2	5	0	1		
0906 衛生福利部豐原醫院	107	452	0	6	1	0	1	0	0	0	0		
	108	653	0	6	3	0	1	2	1	0	0		
	增減數	201	0	0	2	0	0	2	1	0	0		
0910 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	107	46	1	0	0	0	1	0	1	0	0		
	108	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-8	-1	0	0	0	-1	0	-1	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	6	10	1	38	32	40	5	5	1	0	0	1	37	0805
3	2	12	0	30	25	36	2	7	1	0	0	1	26	
1	-4	2	-1	-8	-7	-4	-3	2	0	0	0	0	-11	
1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0806
1	0	2	0	5	2	1	0	1	0	0	0	0	3	
0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
73	157	139	11	392	253	394	41	102	9	4	8	32	734	0808
73	126	156	19	451	232	360	42	118	16	0	14	35	700	
0	-31	17	8	59	-21	-34	1	16	7	-4	6	3	-34	
110	194	197	24	555	313	698	69	138	11	4	13	37	763	0810
102	192	193	22	547	333	667	66	180	12	2	8	37	726	
-8	-2	-4	-2	-8	20	-31	-3	42	1	-2	-5	0	-37	
0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	0	6	0811
0	2	0	0	6	2	2	0	0	0	0	0	1	4	
0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-2	
11	18	17	4	81	29	57	4	19	0	0	0	4	47	0813
9	29	22	1	81	34	62	9	7	0	0	2	9	55	
-2	11	5	-3	0	5	5	5	-12	0	0	2	5	8	
12	32	29	4	80	59	102	8	14	1	0	2	2	133	0814
9	24	26	3	91	68	83	5	22	2	0	0	6	110	
-3	-8	-3	-1	11	9	-19	-3	8	1	0	-2	4	-23	
2	10	16	3	349	64	28	3	5	1	0	1	2	24	0815
8	15	6	3	231	49	20	5	5	2	0	0	0	31	
6	5	-10	0	-118	-15	-8	2	0	1	0	-1	-2	7	
0	3	4	0	9	6	18	0	0	0	0	0	0	8	0817
1	0	4	0	13	3	7	0	0	0	0	0	0	7	
1	-3	0	0	4	-3	-11	0	0	0	0	0	0	-1	
19	41	30	2	140	67	100	3	16	1	1	4	2	114	0901
11	42	42	3	147	66	96	8	22	2	0	2	5	87	
-8	1	12	1	7	-1	-4	5	6	1	-1	-2	3	-27	
15	49	48	4	133	89	185	11	38	6	0	4	8	175	0903
21	65	45	12	159	91	190	12	39	5	0	3	7	194	
6	16	-3	8	26	2	5	1	1	-1	0	-1	-1	19	
2	16	19	2	45	32	49	2	9	0	0	0	0	32	0906
3	14	27	0	83	33	63	5	15	0	0	0	0	49	
1	-2	8	-2	38	1	14	3	6	0	0	0	0	17	
0	2	3	0	2	3	3	0	0	0	0	0	1	4	0910
0	3	4	0	6	1	3	0	0	0	0	0	1	0	
0	1	1	0	4	-2	0	0	0	0	0	0	0	-4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
0805	107	1	0	0	0	5	15	69	0	0	13	11	7	2	
	108	0	0	0	0	0	11	64	0	0	18	8	4	0	
	增減數	-1	0	0	0	-5	-4	-5	0	0	5	-3	-3	-2	
0806	107	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
0808	107	1	23	136	16	25	136	430	0	0	107	89	64	12	
	108	4	21	131	7	35	104	497	1	1	99	131	89	13	
	增減數	3	-2	-5	-9	10	-32	67	1	1	-8	42	25	1	
0810	107	5	28	205	14	32	116	940	3	2	226	153	114	10	
	108	0	32	197	11	29	96	936	0	2	218	131	88	13	
	增減數	-5	4	-8	-3	-3	-20	-4	-3	0	-8	-22	-26	3	
0811	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
0813	107	0	1	4	1	5	27	115	0	0	16	5	1	1	
	108	0	1	2	1	6	38	121	0	3	11	10	5	0	
	增減數	0	0	-2	0	1	11	6	0	3	-5	5	4	-1	
0814	107	2	1	8	1	1	25	339	0	0	37	24	8	2	
	108	0	3	7	0	1	18	368	0	0	33	19	7	2	
	增減數	-2	2	-1	-1	0	-7	29	0	0	-4	-5	-1	0	
0815	107	0	3	3	0	3	6	143	0	0	69	31	7	0	
	108	0	0	1	0	2	9	207	0	0	55	33	4	3	
	增減數	0	-3	-2	0	-1	3	64	0	0	-14	2	-3	3	
0817	107	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	1	3	0	
	108	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	-1	-1	-3	0	
0901	107	0	5	15	1	5	54	97	1	0	37	16	14	1	
	108	1	2	11	0	7	72	113	1	0	33	22	9	3	
	增減數	1	-3	-4	-1	2	18	16	0	0	-4	6	-5	2	
0903	107	0	2	30	1	8	32	169	1	0	58	28	12	2	
	108	1	2	24	2	4	37	177	1	0	46	26	12	3	
	增減數	1	0	-6	1	-4	5	8	0	0	-12	-2	0	1	
0906	107	0	2	9	0	1	24	76	0	0	25	9	1	2	
	108	0	1	20	0	3	35	110	1	0	32	17	3	2	
	增減數	0	-1	11	0	2	11	34	1	0	7	8	2	0	
0910	107	0	0	0	0	1	2	4	0	0	3	1	0	0	
	108	0	0	0	0	0	1	7	0	0	1	2	0	0	
	增減數	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	-2	1	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
4	0	2	7	0	4	0	0	1	6	0	0	2	5	0805
4	0	0	12	0	1	0	0	0	5	0	0	5	6	
0	0	-2	5	0	-3	0	0	-1	-1	0	0	3	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0806
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-1	
279	12	2	124	98	157	3	55	7	115	4	4	33	188	0808
280	14	5	122	88	158	4	53	7	172	3	3	27	173	
1	2	3	-2	-10	1	1	-2	0	57	-1	-1	-6	-15	
342	30	7	189	87	165	6	56	3	233	11	9	29	254	0810
388	20	4	185	81	155	3	53	5	236	10	3	37	263	
46	-10	-3	-4	-6	-10	-3	-3	2	3	-1	-6	8	9	
2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0811
2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
0	0	-1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
59	1	1	24	3	19	0	2	1	19	0	0	1	11	0813
45	0	0	23	9	27	0	1	2	26	0	0	4	17	
-14	-1	-1	-1	6	8	0	-1	1	7	0	0	3	6	
45	1	0	10	3	9	0	2	0	13	0	0	4	20	0814
33	2	1	11	2	8	0	4	1	7	0	0	6	28	
-12	1	1	1	-1	-1	0	2	1	-6	0	0	2	8	
11	2	1	12	1	3	0	1	0	6	0	0	3	7	0815
11	1	0	9	2	2	0	2	0	5	0	0	1	4	
0	-1	-1	-3	1	-1	0	1	0	-1	0	0	-2	-3	
5	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	2	0	0817
3	0	0	1	2	1	0	1	2	4	0	0	0	0	
-2	0	0	0	2	-2	0	-1	2	2	0	0	-2	0	
31	4	3	25	4	18	1	2	0	39	0	1	5	20	0901
31	1	3	22	4	17	1	3	0	40	0	0	2	20	
0	-3	0	-3	0	-1	0	1	0	1	0	-1	-3	0	
255	4	2	79	23	45	0	12	0	39	0	0	22	42	0903
256	7	0	79	25	48	0	11	1	38	0	2	12	47	
1	3	-2	0	2	3	0	-1	1	-1	0	2	-10	5	
32	0	0	21	1	17	0	2	1	3	0	0	4	6	0906
44	0	0	38	1	16	0	3	0	5	0	1	3	13	
12	0	0	17	0	-1	0	1	-1	2	0	1	-1	7	
8	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0910
5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
-3	0	0	1	-1	1	0	-1	0	0	0	0	-1	-1	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
0913 清泉醫院	107	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-19	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
0914 賢德醫院	107	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0915 中國醫藥大學附設醫院豐原分院	107	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	68	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0916 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	107	1,386	1	15	14	1	40	8	16	0	2	2	2
	108	1,419	3	17	11	2	34	13	13	0	4	4	4
	增減數	33	2	2	-3	1	-6	5	-3	0	2	2	2
0917 亞洲大學附屬醫院	107	1,244	4	21	11	2	26	6	19	0	3	3	3
	108	1,360	1	20	9	1	23	6	13	0	4	4	4
	增減數	116	-3	-1	-2	-1	-3	0	-6	0	1	1	1
0918 林新醫療社團法人烏日林新醫院	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	103	0	1	0	0	2	3	2	0	0	0	0
	增減數	103	0	1	0	0	2	3	2	0	0	0	0
1001 衛生福利部彰化醫院	107	302	1	6	2	1	15	6	7	0	0	0	0
	108	276	1	8	1	0	8	3	3	0	0	0	0
	增減數	-26	0	2	-1	-1	-7	-3	-4	0	0	0	0
1002 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	107	5,131	35	141	91	20	218	63	72	1	18	18	18
	108	5,346	38	187	85	8	210	51	95	2	28	28	28
	增減數	215	3	46	-6	-12	-8	-12	23	1	10	10	10
1006 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	107	926	4	31	16	0	37	9	18	0	2	2	2
	108	1,031	6	23	13	1	30	2	11	0	6	6	6
	增減數	105	2	-8	-3	1	-7	-7	-7	0	4	4	4
1007 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院	107	219	3	2	3	1	9	2	7	0	0	0	0
	108	251	3	7	6	1	10	2	3	0	0	0	0
	增減數	32	0	5	3	0	1	0	-4	0	0	0	0
1008 員榮醫療社團法人員榮醫院	107	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院	107	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	115	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	增減數	72	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
1014 員林何醫院	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	3	4	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	6	0913
0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	-2	-3	0	1	-4	-2	0	0	0	0	0	0	-5	
0	1	2	0	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-2	0	-6	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	9	4	2	0	1	0	0	0	0	3	0915
0	2	0	0	6	5	12	0	0	0	0	0	0	8	
0	2	0	0	-3	1	10	0	-1	0	0	0	0	5	
16	40	38	6	137	87	108	11	22	3	0	2	15	104	0916
18	55	58	2	136	89	112	18	34	4	0	2	13	127	
2	15	20	-4	-1	2	4	7	12	1	0	0	-2	23	
11	43	25	5	119	60	132	10	21	0	0	1	13	119	0917
27	48	33	6	105	66	130	10	37	3	0	5	10	120	
16	5	8	1	-14	6	-2	0	16	3	0	4	-3	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0918
2	2	6	0	15	6	2	2	2	2	0	0	1	13	
2	2	6	0	15	6	2	2	2	2	0	0	1	13	
5	9	8	1	25	11	58	2	9	0	0	0	1	46	1001
3	9	11	5	47	12	36	6	3	1	0	0	1	30	
-2	0	3	4	22	1	-22	4	-6	1	0	0	0	-16	
75	126	110	14	462	205	467	40	103	5	1	8	44	533	1002
86	125	129	18	434	214	488	42	85	11	1	8	55	707	
11	-1	19	4	-28	9	21	2	-18	6	0	0	11	174	
11	33	21	5	71	47	71	6	17	5	1	0	8	116	1006
6	35	35	5	108	54	92	5	12	3	0	2	10	149	
-5	2	14	0	37	7	21	-1	-5	-2	-1	2	2	33	
1	4	8	0	14	9	8	1	3	0	0	0	2	45	1007
3	5	3	1	25	6	8	0	2	0	0	0	2	52	
2	1	-5	1	11	-3	0	-1	-1	0	0	0	0	7	
0	2	3	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1008
0	2	1	0	12	1	4	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	-2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	14	1013
0	2	1	0	5	9	0	1	2	0	0	0	0	42	
0	0	1	0	4	7	-1	1	2	0	0	0	0	28	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41 C47, C49		C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0913	107	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	-1	1	0	0
0914	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0915	107	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	-1	0	0	-1	11	0	0	0	0	0	0
0916	107	0	2	26	1	5	38	244	0	0	32	19	9	4
	108	1	4	33	2	3	40	207	0	0	32	34	10	3
	增減數	1	2	7	1	-2	2	-37	0	0	0	15	1	-1
0917	107	1	2	32	3	8	27	117	0	0	21	34	12	2
	108	0	2	25	1	3	24	194	0	0	28	28	12	4
	增減數	-1	0	-7	-2	-5	-3	77	0	0	7	-6	0	2
0918	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	3	16	0	0	5	1	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	3	16	0	0	5	1	0	1
1001	107	0	0	4	0	0	14	14	0	0	2	0	2	0
	108	0	0	2	1	1	21	20	0	0	4	3	0	0
	增減數	0	0	-2	1	1	7	6	0	0	2	3	-2	0
1002	107	3	18	109	7	30	199	756	2	0	133	105	60	17
	108	3	20	137	2	17	184	728	4	0	115	115	46	16
	增減數	0	2	28	-5	-13	-15	-28	2	0	-18	10	-14	-1
1006	107	0	3	5	0	7	48	124	1	0	16	29	16	2
	108	0	9	10	0	2	59	128	0	0	19	40	16	2
	增減數	0	6	5	0	-5	11	4	-1	0	3	11	0	0
1007	107	0	1	1	0	2	16	34	0	0	10	3	0	2
	108	1	0	1	0	0	22	36	0	0	8	3	0	0
	增減數	1	-1	0	0	-2	6	2	0	0	-2	0	0	-2
1008	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	-1	0	0	0
1013	107	0	0	0	0	0	0	14	0	0	6	2	0	0
	108	1	1	0	0	0	2	25	0	0	8	4	1	0
	增減數	1	1	0	0	0	2	11	0	0	2	2	1	0
1014	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-1	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0913
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0915
17	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	
58	3	2	29	12	31	0	2	0	121	2	0	11	49	0916
66	4	1	33	5	26	0	0	1	97	0	0	11	41	
8	1	-1	4	-7	-5	0	-2	1	-24	-2	0	0	-8	
62	4	1	41	12	35	0	8	1	123	0	0	11	36	0917
71	2	0	41	14	30	0	11	2	131	0	0	8	52	
9	-2	-1	0	2	-5	0	3	1	8	0	0	-3	16	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0918
3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	9	
3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	9	
25	0	0	6	1	6	0	0	0	2	0	0	1	12	1001
17	0	0	8	2	2	0	1	0	0	0	0	1	5	
-8	0	0	2	1	-4	0	1	0	-2	0	0	0	-7	
191	8	5	90	44	58	6	15	3	251	5	9	15	139	1002
217	3	5	92	37	46	3	14	3	259	7	7	16	143	
26	-5	0	2	-7	-12	-3	-1	0	8	2	-2	1	4	
58	2	0	26	4	12	0	1	0	19	0	0	5	19	1006
48	0	0	22	4	12	0	0	0	22	1	1	5	23	
-10	-2	0	-4	0	0	0	-1	0	3	1	1	0	4	
11	0	0	5	1	0	0	2	0	7	0	0	1	1	1007
18	0	1	9	0	3	0	0	0	3	0	0	2	5	
7	0	1	4	-1	3	0	-2	0	-4	0	0	1	4	
16	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1008
9	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
-7	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1013
1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1018 員生醫院	107	112	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	108	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-28	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
1020 惠來醫療社團法人宏仁醫院	107	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1021 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	107	524	1	12	11	2	16	0	7	0	3		
	108	542	0	8	8	1	15	1	5	0	1		
	增減數	18	-1	-4	-3	-1	-1	1	-2	0	-2		
1022 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	107	369	0	6	3	0	13	6	7	0	0		
	108	351	2	10	3	0	12	2	4	0	2		
	增減數	-18	2	4	0	0	-1	-4	-3	0	2		
1023 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	107	1,222	5	33	6	1	40	12	9	0	2		
	108	1,295	6	37	14	3	49	11	16	0	0		
	增減數	73	1	4	8	2	9	-1	7	0	-2		
1102 衛生福利部南投醫院	107	79	0	2	1	0	0	0	0	0	0		
	108	233	1	5	2	0	2	1	5	0	0		
	增減數	154	1	3	1	0	2	1	5	0	0		
1103 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	107	144	2	4	1	0	4	2	1	0	0		
	108	134	0	3	1	0	3	1	3	0	0		
	增減數	-10	-2	-1	0	0	-1	-1	2	0	0		
1104 臺中榮民總醫院埔里分院	107	68	1	5	0	0	3	3	4	0	1		
	108	84	1	2	1	1	7	4	1	0	1		
	增減數	16	0	-3	1	1	4	1	-3	0	0		
1106 佑民醫療社團法人佑民醫院	107	222	2	8	5	2	8	1	1	0	0		
	108	228	2	6	11	0	8	1	0	0	1		
	增減數	6	0	-2	6	-2	0	0	-1	0	1		
1107 竹山秀傳醫院	107	169	0	2	0	0	1	1	4	0	0		
	108	171	2	3	0	1	4	0	6	0	0		
	增減數	2	2	1	0	1	3	-1	2	0	0		
1108 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院	107	134	1	3	5	0	6	0	0	0	2		
	108	165	2	14	3	0	8	1	3	0	0		
	增減數	31	1	11	-2	0	2	1	3	0	-2		
1201 衛生福利部嘉義醫院	107	70	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	108	87	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1202 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	107	949	7	24	24	7	43	9	8	0	3		
	108	949	14	19	21	4	55	7	11	0	3		
	增減數	0	7	-5	-3	-3	12	-2	3	0	0		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	6	6	0	19	10	19	3	4	0	0	0	0	6	1018
1	5	7	0	11	6	18	3	4	0	0	0	1	2	
1	-1	1	0	-8	-4	-1	0	0	0	0	0	1	-4	
0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	4	1020
0	0	1	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	2	1	-4	0	0	0	0	0	0	-1	
9	14	22	1	32	39	53	5	16	0	0	0	1	72	1021
3	16	26	2	59	44	54	4	9	0	0	0	5	53	
-6	2	4	1	27	5	1	-1	-7	0	0	0	4	-19	
6	4	6	0	43	24	13	1	5	0	0	0	4	26	1022
6	2	8	0	45	18	12	1	4	0	0	0	6	35	
0	-2	2	0	2	-6	-1	0	-1	0	0	0	2	9	
13	33	25	1	139	60	117	8	18	0	0	1	4	152	1023
19	36	37	2	130	66	98	8	10	0	0	3	6	201	
6	3	12	1	-9	6	-19	0	-8	0	0	2	2	49	
0	6	0	2	3	4	10	1	5	0	0	0	0	6	1102
1	10	10	1	33	17	21	2	7	0	0	0	1	25	
1	4	10	-1	30	13	11	1	2	0	0	0	1	19	
1	4	11	1	15	7	6	0	0	0	0	0	0	11	1103
1	6	6	0	20	5	8	0	1	0	0	0	0	7	
0	2	-5	-1	5	-2	2	0	1	0	0	0	0	-4	
0	1	5	1	3	8	5	1	2	0	0	0	2	4	1104
1	2	2	0	9	2	5	2	5	0	0	0	2	6	
1	1	-3	-1	6	-6	0	1	3	0	0	0	0	2	
10	5	5	0	16	20	6	0	2	0	0	1	2	13	1106
2	2	5	3	19	14	7	0	1	0	0	0	2	6	
-8	-3	0	3	3	-6	1	0	-1	0	0	-1	0	-7	
0	4	6	0	14	13	3	0	0	0	0	0	0	8	1107
1	5	9	2	15	3	2	0	1	0	0	1	1	5	
1	1	3	2	1	-10	-1	0	1	0	0	1	1	-3	
6	3	2	1	10	11	13	3	3	0	0	0	2	14	1108
2	7	9	0	16	16	14	2	1	0	0	0	1	12	
-4	4	7	-1	6	5	1	-1	-2	0	0	0	-1	-2	
0	0	4	0	13	4	5	0	0	0	0	0	0	14	1201
0	2	4	0	10	7	21	1	0	0	0	1	0	12	
0	2	0	0	-3	3	16	1	0	0	0	1	0	-2	
11	21	30	5	111	58	121	2	28	1	0	4	10	92	1202
8	13	21	4	107	55	105	7	21	1	0	0	10	104	
-3	-8	-9	-1	-4	-3	-16	5	-7	0	0	-4	0	12	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
1018	107	0	0	0	0	2	10	1	0	0	1	2	1	0
	108	0	0	0	0	1	5	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-5	-1	0	0	1	-2	-1	0
1020	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021	107	0	2	3	0	2	18	50	1	0	29	8	7	0
	108	0	5	10	1	1	12	57	0	0	23	12	4	1
	增減數	0	3	7	1	-1	-6	7	-1	0	-6	4	-3	1
1022	107	0	0	1	1	0	14	62	0	0	17	7	5	0
	108	0	0	5	0	1	11	45	0	0	9	12	2	1
	增減數	0	0	4	-1	1	-3	-17	0	0	-8	5	-3	1
1023	107	0	3	15	0	7	25	224	0	0	42	23	4	4
	108	0	3	17	0	4	31	230	0	0	40	20	7	1
	增減數	0	0	2	0	-3	6	6	0	0	-2	-3	3	-3
1102	107	1	0	1	0	0	8	2	0	0	1	2	1	0
	108	0	0	3	0	0	6	12	0	0	15	1	2	1
	增減數	-1	0	2	0	0	-2	10	0	0	14	-1	1	1
1103	107	0	0	1	0	1	12	29	1	0	9	11	0	0
	108	0	0	1	0	0	12	15	0	0	8	10	0	3
	增減數	0	0	0	0	-1	0	-14	-1	0	-1	-1	0	3
1104	107	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	9	0	0	6	1	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	5	1	1	0
1106	107	0	0	2	0	0	13	40	0	0	12	6	0	0
	108	0	0	0	0	0	18	42	1	0	17	7	0	1
	增減數	0	0	-2	0	0	5	2	1	0	5	1	0	1
1107	107	0	0	0	0	0	12	20	1	0	5	2	1	1
	108	0	0	0	0	0	9	20	0	0	5	4	0	2
	增減數	0	0	0	0	0	-3	0	-1	0	0	2	-1	1
1108	107	1	0	0	0	1	8	19	0	0	2	0	0	0
	108	0	0	0	0	1	9	16	0	0	4	1	0	1
	增減數	-1	0	0	0	0	1	-3	0	0	2	1	0	1
1201	107	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	0
	108	0	0	0	0	0	1	14	0	0	5	0	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	-1	1
1202	107	0	8	13	0	0	18	140	0	0	29	17	19	2
	108	0	2	10	2	1	23	165	0	0	35	15	11	0
	增減數	0	-6	-3	2	1	5	25	0	0	6	-2	-8	-2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
9	1	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1018
9	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	2	2	9	4	3	0	1	0	23	0	0	5	8	1021
25	0	0	5	6	5	0	3	0	37	0	0	5	16	
-6	-2	-2	-4	2	2	0	2	0	14	0	0	0	8	
24	2	0	14	1	6	0	0	0	38	0	0	2	8	1022
17	0	0	14	0	6	0	0	0	43	1	0	0	12	
-7	-2	0	0	-1	0	0	0	0	5	1	0	-2	4	
58	1	1	33	2	18	0	2	0	41	0	0	7	33	1023
51	0	0	35	9	25	0	0	0	21	0	0	8	41	
-7	-1	-1	2	7	7	0	-2	0	-20	0	0	1	8	
3	0	0	6	2	6	0	2	0	1	0	0	0	3	1102
21	0	0	6	1	7	0	1	0	3	0	0	2	8	
18	0	0	0	-1	1	0	-1	0	2	0	0	2	5	
2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1103
9	1	0	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	
7	1	0	3	0	2	0	0	0	-2	0	0	0	-1	
3	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1104
7	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	
4	0	0	1	-1	-1	0	1	0	0	0	0	-1	0	
11	0	1	14	1	5	0	2	0	4	0	0	2	2	1106
17	0	0	17	0	7	0	0	0	4	0	0	2	5	
6	0	-1	3	-1	2	0	-2	0	0	0	0	0	3	
40	0	0	21	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1107
43	0	1	14	2	5	0	0	0	0	0	0	1	4	
3	0	1	-7	2	-4	0	0	0	0	0	0	1	3	
7	0	0	4	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	1108
6	0	0	6	1	2	0	0	0	3	0	0	0	4	
-1	0	0	2	1	-1	0	0	0	1	0	0	0	2	
8	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1201
3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
-5	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-2	
13	0	2	10	8	14	0	1	0	15	1	0	0	20	1202
20	0	2	16	6	9	0	2	0	17	0	2	5	16	
7	0	0	6	-2	-5	0	1	0	2	-1	2	5	-4	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院		原發部位別	部位									
			總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位
			Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
1203 臺中榮民總醫院嘉義分院	107	191	0	3	2	0	5	1	1	0	1	
	108	180	0	3	0	0	1	3	0	0	0	
	增減數	-11	0	0	-2	0	-4	2	-1	0	-1	
1206 衛生福利部朴子醫院	107	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1207 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	107	2,130	10	54	31	6	84	12	27	0	5	
	108	2,189	16	44	32	12	92	21	18	0	1	
	增減數	59	6	-10	1	6	8	9	-9	0	-4	
1210 臺中榮民總醫院灣橋分院	107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1214 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	107	1,238	4	24	11	3	28	8	14	0	3	
	108	1,152	4	21	11	4	34	8	7	0	1	
	增減數	-86	0	-3	0	1	6	0	-7	0	-2	
1215 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	107	3,105	12	50	15	3	81	17	28	0	6	
	108	2,889	10	34	27	3	76	20	27	0	3	
	增減數	-216	-2	-16	12	0	-5	3	-1	0	-3	
1216 陽明醫院	107	168	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
	108	186	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	增減數	18	0	-1	0	0	1	0	-1	0	0	
1301 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	107	106	0	2	0	1	5	1	1	1	0	
	108	82	0	4	0	0	1	1	0	0	0	
	增減數	-24	0	2	0	-1	-4	0	-1	-1	0	
1302 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	107	1,170	5	28	10	1	38	15	14	0	3	
	108	1,158	8	31	11	2	39	8	15	0	0	
	增減數	-12	3	3	1	1	1	-7	1	0	-3	
1304 中國醫藥大學北港附設醫院	107	339	1	1	0	0	4	0	2	0	0	
	108	334	1	4	3	0	4	2	0	0	0	
	增減數	-5	0	3	3	0	0	2	-2	0	0	
1305 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院	107	234	0	3	0	1	4	1	4	0	1	
	108	256	0	4	0	0	2	0	4	0	1	
	增減數	22	0	1	0	-1	-2	-1	0	0	0	
1308 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	107	415	3	13	8	0	24	6	7	0	0	
	108	381	6	11	9	1	15	7	9	0	4	
	增減數	-34	3	-2	1	1	-9	1	2	0	4	
1310 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院	107	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
1203	31	2	0	0	3	2	28	11	27	2	14	6	2
	18	2	0	0	5	4	24	13	19	0	9	7	3
	-13	0	0	0	2	2	-4	2	-8	-2	-5	1	1
1206	1	0	0	0	1	0	5	2	1	0	5	2	0
	1	0	0	0	0	0	2	4	6	0	1	3	0
	0	0	0	0	-1	0	-3	2	5	0	-4	1	0
1207	240	8	1	0	35	14	238	145	234	4	55	46	29
	275	6	2	0	41	11	231	148	221	6	48	52	24
	35	-2	1	0	6	-3	-7	3	-13	2	-7	6	-5
1210	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1	0	1
1214	179	8	2	0	19	20	173	86	82	5	26	24	9
	140	9	0	0	16	13	181	68	87	3	38	18	10
	-39	1	-2	0	-3	-7	8	-18	5	-2	12	-6	1
1215	336	20	9	0	37	25	350	198	649	14	80	60	22
	305	16	8	0	50	35	355	151	477	10	68	68	22
	-31	-4	-1	0	13	10	5	-47	-172	-4	-12	8	0
1216	10	0	0	0	1	1	14	10	34	0	5	8	1
	10	0	0	0	1	0	20	15	26	0	6	7	0
	0	0	0	0	0	-1	6	5	-8	0	1	-1	-1
1301	1	0	0	0	2	0	5	13	14	0	2	1	2
	1	0	1	0	4	2	8	10	12	0	5	0	1
	0	0	1	0	2	2	3	-3	-2	0	3	-1	-1
1302	159	8	0	0	22	14	140	58	90	5	28	42	12
	179	3	1	1	13	10	143	69	97	2	32	27	11
	20	-5	1	1	-3	-4	3	11	7	-3	4	-15	-1
1304	41	0	1	0	2	7	53	17	52	1	10	11	1
	46	0	0	0	1	5	57	15	34	1	7	10	2
	5	0	-1	0	-1	-2	4	-2	-18	0	-3	-1	1
1305	27	3	0	0	2	5	24	18	20	1	7	1	2
	27	1	0	0	4	3	20	7	31	0	5	3	1
	0	-2	0	0	2	-2	-4	-11	11	-1	-2	2	-1
1308	37	2	0	0	3	1	27	6	40	1	6	13	7
	41	4	0	0	3	1	32	12	29	0	8	8	6
	4	2	0	0	0	0	5	6	-11	-1	2	-5	-1
1310	9	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	2
	13	0	0	0	1	0	11	6	1	0	1	0	0
	4	0	0	0	1	0	6	6	-1	0	1	0	-2

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼		原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
			C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
1203	107	0	0	0	1	0	13	9	0	0	0	0	2	0	
	108	0	0	1	0	1	5	18	0	0	2	7	0	0	
	增減數	0	0	1	-1	1	-8	9	0	0	2	7	-2	0	
1206	107	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-1	2	0	0	0	0	0	0	
1207	107	1	6	16	4	6	78	260	1	0	59	27	14	3	
	108	1	5	24	1	6	69	281	3	0	92	38	17	2	
	增減數	0	-1	8	-3	0	-9	21	2	0	33	11	3	-1	
1210	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1214	107	0	5	31	0	2	51	142	1	0	37	30	17	3	
	108	2	6	15	1	3	56	111	1	0	31	30	12	1	
	增減數	2	1	-16	1	1	5	-31	0	0	-6	0	-5	-2	
1215	107	0	5	71	2	7	88	192	1	0	58	40	27	4	
	108	1	6	69	2	10	104	202	0	1	45	51	27	4	
	增減數	1	1	-2	0	3	16	10	-1	1	-13	11	0	0	
1216	107	0	0	1	1	0	13	32	1	0	4	0	1	0	
	108	0	0	0	0	1	6	43	0	0	3	0	0	0	
	增減數	0	0	-1	-1	1	-7	11	-1	0	-1	0	-1	0	
1301	107	0	0	0	0	0	5	5	0	0	6	1	1	1	
	108	0	0	0	0	0	4	8	0	0	1	1	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-1	3	0	0	-5	0	-1	-1	
1302	107	1	5	13	0	3	64	89	0	0	28	22	15	3	
	108	1	6	10	0	3	71	81	1	0	31	30	7	1	
	增減數	0	1	-3	0	0	7	-8	1	0	3	8	-8	-2	
1304	107	0	1	0	0	2	32	19	0	0	6	3	1	0	
	108	0	0	0	1	0	26	9	0	0	6	1	1	0	
	增減數	0	-1	0	1	-2	-6	-10	0	0	0	-2	0	0	
1305	107	0	0	2	0	0	4	20	1	0	3	2	0	0	
	108	0	0	1	0	2	8	73	0	0	2	1	0	0	
	增減數	0	0	-1	0	2	4	53	-1	0	-1	-1	0	0	
1308	107	0	1	0	1	1	19	62	0	0	13	0	0	1	
	108	0	0	0	0	2	20	55	0	0	7	0	1	0	
	增減數	0	-1	0	-1	1	1	-7	0	0	-6	0	1	-1	
1310	107	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
2	0	0	7	1	2	0	0	0	5	0	0	4	4	1203
10	0	0	8	1	5	0	4	0	2	0	0	2	2	
8	0	0	1	0	3	0	4	0	-3	0	0	-2	-2	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1206
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
86	1	1	74	17	46	1	17	1	60	0	1	15	53	1207
77	2	2	69	21	38	1	9	0	55	0	2	15	57	
-9	1	1	-5	4	-8	0	-8	-1	-5	0	1	0	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	1	2	32	4	19	0	9	2	30	2	0	7	30	1214
55	1	1	31	11	24	0	6	3	36	0	0	6	35	
9	0	-1	-1	7	5	0	-3	1	6	-2	0	-1	5	
147	2	1	80	25	67	4	15	2	169	2	2	19	60	1215
163	4	0	82	24	74	0	9	0	152	1	3	9	75	
16	2	-1	2	-1	7	-4	-6	-2	-17	-1	1	-10	15	
7	0	0	7	0	5	0	0	0	2	1	0	3	4	1216
22	0	1	8	2	1	0	2	0	4	0	0	2	5	
15	0	1	1	2	-4	0	2	0	2	-1	0	-1	1	
18	0	1	9	1	4	0	0	0	3	0	0	0	0	1301
7	0	0	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	
-11	0	-1	-4	1	-2	0	0	0	-2	0	0	0	1	
90	1	0	36	5	24	0	3	0	39	0	0	9	25	1302
92	2	1	27	10	19	0	1	0	23	0	0	10	29	
2	1	1	-9	5	-5	0	-2	0	-16	0	0	1	4	
38	1	1	10	3	9	0	0	0	2	0	0	2	4	1304
53	0	0	25	2	13	0	1	0	1	0	0	2	1	
15	-1	-1	15	-1	4	0	1	0	-1	0	0	0	-3	
13	0	0	6	2	6	0	0	0	36	0	0	9	6	1305
15	0	0	13	1	3	0	0	0	14	0	0	0	8	
2	0	0	7	-1	-3	0	0	0	-22	0	0	-9	2	
23	0	0	14	2	4	0	2	0	51	0	0	7	10	1308
12	0	2	11	0	6	1	0	0	47	0	0	3	8	
-11	0	2	-3	-2	2	1	-2	0	-4	0	0	-4	-2	
14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1310
5	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
-9	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1401 衛生福利部臺南醫院	107	271	0	1	1	0	1	2	1	0	1		
	108	328	0	3	0	0	3	1	0	0	0		
	增減數	57	0	2	-1	0	2	-1	-1	0	-1		
1402 奇美醫療財團法人奇美醫院	107	3,244	17	66	41	7	90	16	28	0	12		
	108	3,541	10	73	47	5	100	21	21	0	7		
	增減數	297	-7	7	6	-2	10	5	-7	0	-5		
1404 郭綜合醫院	107	237	0	1	1	0	0	2	2	0	0		
	108	257	0	2	0	0	0	1	0	0	0		
	增減數	20	0	1	-1	0	0	-1	-2	0	0		
1408 國立成功大學醫學院附設醫院	107	4,848	18	103	37	17	103	32	46	0	20		
	108	5,132	13	96	43	11	129	46	46	0	15		
	增減數	284	-5	-7	6	-6	26	14	0	0	-5		
1409 台南市立醫院 (委託秀傳醫療 社團法人經營)	107	924	1	4	0	1	6	6	5	0	0		
	108	947	0	7	0	0	4	4	1	1	1		
	增減數	23	-1	3	0	-1	-2	-2	-4	1	1		
1410 台灣基督長老教會新樓醫療財團 法人台南新樓醫院	107	738	2	10	5	1	11	4	3	0	2		
	108	723	3	12	7	3	11	3	2	0	0		
	增減數	-15	1	2	2	2	0	-1	-1	0	-2		
1412 臺南市立安南醫院－委託中國醫 大學興建經營	107	880	1	8	2	0	10	8	6	0	1		
	108	892	0	15	4	3	10	10	8	0	2		
	增減數	12	-1	7	2	3	0	2	2	0	1		
1501 衛生福利部新營醫院	107	31	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
	108	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0		
1502 高雄榮民總醫院臺南分院	107	78	0	1	0	0	1	0	1	0	0		
	108	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-12	0	-1	0	0	-1	0	-1	0	0		
1503 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	107	502	3	5	4	3	7	1	0	0	2		
	108	537	1	3	2	0	10	3	2	0	1		
	增減數	35	-2	-2	-2	-3	3	2	2	0	-1		
1508 台灣基督長老教會新樓醫療財團 法人麻豆新樓醫院	107	271	0	3	0	0	3	1	2	0	1		
	108	290	3	7	5	0	9	2	2	0	0		
	增減數	19	3	4	5	0	6	1	0	0	-1		
1509 衛生福利部臺南醫院新化分院	107	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	40	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-5	-1	1	0	0	0	0	0	0	0		
1510 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	107	2,031	6	30	14	7	38	12	24	1	4		
	108	2,037	4	51	14	2	43	14	27	1	8		
	增減數	6	-2	21	0	-5	5	2	3	0	4		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
1	6	10	0	45	23	6	2	1	0	0	0	0	17	1401
0	7	14	0	46	31	8	0	7	1	0	0	1	20	
-1	1	4	0	1	8	2	-2	6	1	0	0	1	3	
37	68	76	11	375	201	304	19	54	1	0	1	16	332	1402
47	62	74	15	475	172	294	33	69	10	0	7	23	378	
10	-6	-2	4	100	-29	-10	14	15	9	0	6	7	46	
1	11	12	0	23	16	16	0	3	0	0	0	0	17	1404
4	5	1	0	15	19	16	1	5	1	0	1	1	20	
3	-6	-11	0	-8	3	0	1	2	1	0	1	1	3	
59	74	133	18	291	178	479	62	173	4	0	9	35	711	1408
66	89	131	10	314	222	485	70	204	11	0	10	40	766	
7	15	-2	-8	23	44	6	8	31	7	0	1	5	55	
6	21	38	5	145	75	151	13	19	1	0	1	1	109	1409
5	23	26	1	143	92	150	12	18	3	0	2	2	124	
-1	2	-12	-4	-2	17	-1	-1	-1	2	0	1	1	15	
8	12	24	1	130	70	77	7	10	1	0	1	0	64	1410
7	13	17	1	117	69	57	10	9	1	0	4	2	66	
-1	1	-7	0	-13	-1	-20	3	-1	0	0	3	2	2	
11	20	25	5	121	46	93	8	25	0	0	0	4	91	1412
11	28	23	3	123	43	81	7	14	0	0	0	4	105	
0	8	-2	-2	2	-3	-12	-1	-11	0	0	0	0	14	
0	2	0	0	4	3	2	0	1	0	0	0	0	1	1501
0	1	4	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	4	
0	-1	4	0	1	1	-1	0	-1	0	0	0	0	3	
0	1	6	0	5	8	5	2	3	0	0	0	0	14	1502
0	1	9	0	7	3	3	1	2	0	0	0	0	12	
0	0	3	0	2	-5	-2	-1	-1	0	0	0	0	-2	
5	13	17	2	89	36	31	7	4	0	0	0	2	66	1503
3	7	25	2	99	50	42	2	7	0	0	0	0	57	
-2	-6	8	0	10	14	11	-5	3	0	0	0	-2	-9	
3	6	9	0	45	32	35	7	3	0	0	0	1	23	1508
4	0	6	1	18	29	44	7	4	0	0	0	0	30	
1	-6	-3	1	-27	-3	9	0	1	0	0	0	-1	7	
0	1	4	0	11	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1509
0	2	0	1	11	6	3	0	0	0	0	0	0	1	
0	1	-4	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	
27	49	36	7	158	120	257	16	58	5	0	2	16	247	1510
25	42	31	7	170	110	259	17	54	6	0	7	9	252	
-2	-7	-5	0	12	-10	2	1	-4	1	0	5	-7	5	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1401	107	0	0	5	0	1	13	74	0	0	8	2	0	0
	108	0	0	1	0	0	11	69	0	0	6	2	0	0
	增減數	0	0	-4	0	-1	-2	-5	0	0	-2	0	0	0
1402	107	1	16	50	2	16	134	356	1	0	79	58	26	6
	108	1	19	58	1	18	147	368	1	0	85	78	40	3
	增減數	0	3	8	-1	2	13	12	0	0	6	20	14	-3
1404	107	0	2	0	1	1	13	31	1	0	14	11	3	1
	108	0	3	0	0	3	16	43	0	0	10	17	3	0
	增減數	0	1	0	-1	2	3	12	-1	0	-4	6	0	-1
1408	107	4	31	104	3	22	164	572	2	0	127	137	61	11
	108	3	30	131	7	23	205	573	4	0	108	136	70	13
	增減數	-1	-1	27	4	1	41	1	2	0	-19	-1	9	2
1409	107	0	7	7	1	2	33	95	0	0	4	7	3	1
	108	1	5	7	0	7	41	78	0	0	10	11	9	0
	增減數	1	-2	0	-1	5	8	-17	0	0	6	4	6	-1
1410	107	0	5	2	0	1	33	104	1	0	25	41	16	3
	108	1	1	1	0	3	22	107	1	0	36	52	16	0
	增減數	1	-4	-1	0	2	-11	3	0	0	11	11	0	-3
1412	107	1	2	9	1	4	20	162	0	0	8	11	7	0
	108	0	5	14	1	3	22	157	0	0	11	5	5	2
	增減數	-1	3	5	0	-1	2	-5	0	0	3	-6	-2	2
1501	107	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
1502	107	0	0	0	0	2	4	4	0	0	2	0	0	0
	108	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0	1
	增減數	0	0	0	0	-1	-4	0	0	0	-1	0	0	1
1503	107	0	1	1	0	1	68	32	0	0	9	2	1	0
	108	0	1	2	0	1	72	57	0	0	8	2	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	4	25	0	0	-1	0	-1	0
1508	107	0	0	1	0	1	25	18	1	0	4	7	1	0
	108	0	0	1	0	3	40	18	0	0	7	4	0	0
	增減數	0	0	0	0	2	15	0	-1	0	3	-3	-1	0
1509	107	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	2	0	0
	108	0	0	0	0	0	5	3	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	-4	0	0	1	-2	0	0
1510	107	3	7	49	0	8	142	178	1	0	68	41	18	4
	108	2	11	63	2	3	131	200	2	0	50	40	18	2
	增減數	-1	4	14	2	-5	-11	22	1	0	-18	-1	0	-2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
12	0	0	14	2	8	0	4	0	5	0	0	1	4	1401
16	0	0	13	0	3	0	1	0	53	0	0	2	9	
4	0	0	-1	-2	-5	0	-3	0	48	0	0	1	5	
206	9	10	117	52	108	1	17	0	108	5	0	12	82	1402
186	6	1	125	63	134	2	17	0	139	8	4	11	83	
-20	-3	-9	8	11	26	1	0	0	31	3	4	-1	1	
18	0	0	11	3	15	0	3	0	0	0	0	2	2	1404
26	2	0	21	4	8	0	2	0	2	0	0	0	5	
8	2	0	10	1	-7	0	-1	0	2	0	0	-2	3	
183	13	7	157	54	144	2	29	4	232	7	6	20	150	1408
218	7	2	142	51	139	1	33	5	211	11	3	11	178	
35	-6	-5	-15	-3	-5	-1	4	1	-21	4	-3	-9	28	
55	1	1	45	3	14	0	1	0	11	1	0	1	23	1409
61	0	2	23	5	24	0	1	0	19	0	0	1	23	
6	-1	1	-22	2	10	0	0	0	8	-1	0	0	0	
24	0	0	10	0	5	0	1	0	5	0	0	9	10	1410
31	0	0	10	3	8	0	4	0	2	0	0	3	8	
7	0	0	0	3	3	0	3	0	-3	0	0	-6	-2	
35	1	0	36	3	30	1	3	0	37	1	1	9	13	1412
45	2	1	39	8	15	0	4	1	27	0	0	10	21	
10	1	1	3	5	-15	-1	1	1	-10	-1	-1	1	8	
6	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1501
2	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4	0	0	-2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1502
9	0	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	2	-1	2	0	0	0	0	0	0	-2	-1	
15	0	0	27	1	16	0	1	0	21	0	0	0	9	1503
23	0	0	23	5	11	0	1	0	12	0	0	2	1	
8	0	0	-4	4	-5	0	0	0	-9	0	0	2	-8	
19	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	0	2	4	1508
24	0	0	11	2	3	0	0	0	2	0	0	2	2	
5	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	-2	
0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1509
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
2	0	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	
64	3	2	46	11	43	0	22	0	96	2	0	19	70	1510
59	0	2	80	16	43	0	4	1	93	4	0	5	53	
-5	-3	0	34	5	0	0	-18	1	-3	2	0	-14	-17	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1601 高雄市立民生醫院	107	98	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	73	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1603 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	107	4,289	20	129	82	8	154	40	51	0	13		
	108	4,660	38	118	85	21	157	51	59	0	9		
	增減數	371	18	-11	3	13	3	11	8	0	-4		
1604 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	107	687	2	10	7	3	10	5	9	1	0		
	108	658	1	3	4	3	18	6	11	1	0		
	增減數	-29	-1	-7	-3	0	8	1	2	0	0		
1605 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	107	1,372	9	25	14	1	41	10	5	0	3		
	108	1,449	13	33	9	5	50	4	4	1	1		
	增減數	77	4	8	-5	4	9	-6	-1	1	-2		
1609 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	107	159	0	1	1	0	2	0	2	0	0		
	108	158	0	2	1	1	1	0	1	0	0		
	增減數	-1	0	1	0	1	-1	0	-1	0	0		
1610 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	107	360	0	2	0	0	2	1	2	0	2		
	108	383	0	3	0	1	3	0	8	0	0		
	增減數	23	0	1	0	1	1	-1	6	0	-2		
1613 高雄市立聯合醫院	107	365	0	7	0	0	1	0	1	0	0		
	108	384	0	2	0	0	6	2	0	0	0		
	增減數	19	0	-5	0	0	5	2	-1	0	0		
1615 高雄榮民總醫院	107	2,734	25	73	19	5	99	39	32	0	7		
	108	3,667	14	99	32	11	111	27	33	0	9		
	增減數	933	-11	26	13	6	12	-12	1	0	2		
1616 祐生醫院	107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
1619 健仁醫院	107	229	0	5	0	1	6	3	0	1	0		
	108	267	0	3	4	0	9	1	6	0	0		
	增減數	38	0	-2	4	-1	3	-2	6	-1	0		
1622 健新醫院	107	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1624 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	107	920	3	15	7	1	21	4	11	0	0		
	108	1,009	6	23	13	3	24	8	8	0	1		
	增減數	89	3	8	6	2	3	4	-3	0	1		
1627 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)	107	1,177	2	26	6	3	17	10	7	0	2		
	108	1,265	7	26	8	3	22	10	12	0	3		
	增減數	88	5	0	2	0	5	0	5	0	1		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	1	12	0	10	6	9	0	1	0	0	0	0	5	1601
0	1	9	0	22	8	5	1	2	0	0	0	0	15	
0	0	-3	0	12	2	-4	1	1	0	0	0	0	10	
53	114	78	10	328	231	426	39	109	6	1	9	37	408	1603
48	134	92	11	360	198	391	32	98	6	1	5	36	431	
-5	20	14	1	32	-33	-35	-7	-11	0	0	-4	-1	23	
3	16	27	3	141	47	50	9	19	0	0	3	3	68	1604
12	19	11	2	90	54	56	6	15	0	0	1	1	66	
9	3	-16	-1	-51	7	6	-3	-4	0	0	-2	-2	-2	
13	29	45	4	168	109	132	18	33	2	0	0	3	94	1605
16	35	37	3	182	97	177	12	36	3	0	2	6	108	
3	6	-8	-1	14	-12	45	-6	3	1	0	2	3	14	
0	2	8	1	32	8	14	2	6	0	0	1	0	16	1609
1	4	6	0	35	10	11	1	8	0	0	1	0	12	
1	2	-2	-1	3	2	-3	-1	2	0	0	0	0	-4	
4	10	12	0	30	23	24	3	10	4	0	0	1	33	1610
9	10	6	0	32	20	34	2	8	0	0	0	3	46	
5	0	-6	0	2	-3	10	-1	-2	-4	0	0	2	13	
2	2	6	0	38	19	4	0	0	0	0	0	0	29	1613
0	5	10	0	35	21	2	2	0	1	0	0	1	16	
-2	3	4	0	-3	2	-2	2	0	1	0	0	1	-13	
38	66	72	8	284	124	313	31	57	7	0	4	20	283	1615
62	104	103	15	335	205	268	30	87	9	0	6	24	467	
24	38	31	7	51	81	-45	-1	30	2	0	2	4	184	
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1616
0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	2	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	
7	5	5	0	22	21	35	0	4	0	0	0	3	22	1619
8	4	11	0	29	15	41	2	6	2	0	0	1	25	
1	-1	6	0	7	-6	6	2	2	2	0	0	-2	3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	31	24	4	148	91	92	8	17	0	0	1	4	73	1624
13	28	28	9	167	77	73	7	9	0	1	1	4	86	
-2	-3	4	5	19	-14	-19	-1	-8	0	1	0	0	13	
14	13	27	0	104	61	87	2	18	1	0	0	3	133	1627
22	21	18	7	127	48	86	6	19	3	0	1	10	141	
8	8	-9	7	23	-13	-1	4	1	2	0	1	7	8	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸腺	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1601	107	0	0	0	0	0	12	22	0	0	2	1	0	0
	108	0	0	0	0	1	18	36	0	0	0	1	1	0
	增減數	0	0	0	0	1	6	14	0	0	-2	0	1	0
1603	107	4	23	94	9	22	174	606	3	2	107	60	31	4
	108	2	24	116	12	21	209	662	1	4	113	93	52	8
	增減數	-2	1	22	3	-1	35	56	-2	2	6	33	21	4
1604	107	0	0	9	0	3	36	61	0	0	9	5	7	0
	108	1	0	14	0	4	31	75	0	0	16	8	5	1
	增減數	1	0	5	0	1	-5	14	0	0	7	3	-2	1
1605	107	1	1	0	0	1	28	302	2	0	51	34	30	5
	108	4	1	2	0	9	48	285	2	0	65	36	25	5
	增減數	3	0	2	0	8	20	-17	0	0	14	2	-5	0
1609	107	0	0	0	0	0	1	27	0	0	12	8	0	0
	108	1	0	0	0	0	0	21	0	0	4	4	4	1
	增減數	1	0	0	0	0	-1	-6	0	0	-8	-4	4	1
1610	107	1	0	5	0	3	15	106	3	0	5	4	2	0
	108	0	2	3	1	5	16	109	0	0	2	3	2	0
	增減數	-1	2	-2	1	2	1	3	-3	0	-3	-1	0	0
1613	107	1	0	0	0	1	10	198	2	0	18	4	0	0
	108	0	0	2	0	0	12	219	0	0	20	5	0	0
	增減數	-1	0	2	0	-1	2	21	-2	0	2	1	0	0
1615	107	1	17	42	3	9	131	269	2	0	90	71	34	9
	108	4	13	66	6	20	168	367	1	0	88	88	61	5
	增減數	3	-4	24	3	11	37	98	-1	0	-2	17	27	-4
1616	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1619	107	0	2	1	0	1	8	38	0	0	3	2	1	0
	108	1	1	2	0	1	6	41	0	0	7	2	3	0
	增減數	1	-1	1	0	0	-2	3	0	0	4	0	2	0
1622	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0	0
1624	107	4	4	0	0	4	40	117	2	0	35	19	3	1
	108	3	3	0	0	5	66	133	0	1	40	16	8	1
	增減數	-1	-1	0	0	1	26	16	-2	1	5	-3	5	0
1627	107	5	3	3	1	2	33	294	1	0	22	16	4	1
	108	4	6	15	1	8	38	286	0	0	27	17	5	1
	增減數	-1	3	12	0	6	5	-8	-1	0	5	1	1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
6	0	0	5	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	1601
22	0	0	17	0	7	0	1	0	2	0	0	1	1	
16	0	0	12	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	
188	6	7	87	39	108	5	20	2	207	6	0	19	109	1603
261	6	4	123	48	82	0	21	2	257	5	1	27	125	
73	0	-3	36	9	-26	-5	1	0	50	-1	1	8	16	
45	0	0	20	1	16	0	4	2	11	1	0	10	11	1604
36	0	0	22	7	6	0	2	2	25	3	0	8	12	
-9	0	0	2	6	-10	0	-2	0	14	2	0	-2	1	
45	0	1	43	4	18	0	2	2	19	0	0	6	19	1605
29	1	1	38	2	26	0	0	0	9	0	0	6	21	
-16	1	0	-5	-2	8	0	-2	-2	-10	0	0	0	2	
6	0	1	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1609
6	0	0	9	0	0	0	3	0	2	0	2	2	4	
0	0	-1	5	0	0	0	3	0	-1	0	2	2	3	
21	0	1	8	1	6	0	1	0	3	0	0	5	7	1610
14	0	0	11	4	3	0	4	1	3	0	0	4	11	
-7	0	-1	3	3	-3	0	3	1	0	0	0	-1	4	
9	1	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	1613
7	4	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	2	5	
-2	3	0	-2	0	1	0	0	0	-1	0	0	1	1	
110	1	3	58	35	46	6	14	0	77	2	0	14	84	1615
142	6	7	106	46	114	2	17	0	109	4	0	49	127	
32	5	4	48	11	68	-4	3	0	32	2	0	35	43	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
12	0	0	6	6	2	0	0	1	3	0	0	0	3	1619
11	1	0	8	3	1	1	1	0	6	1	0	0	2	
-1	1	0	2	-3	-1	1	1	-1	3	1	0	0	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	1	1	30	3	14	0	1	0	14	1	0	4	15	1624
54	3	2	34	1	14	0	0	0	19	0	0	3	14	
17	2	1	4	-2	0	0	-1	0	5	-1	0	-1	-1	
95	3	1	52	7	45	1	3	0	14	0	0	8	27	1627
86	3	1	49	11	30	0	4	1	18	1	0	12	41	
-9	0	0	-3	4	-15	-1	1	1	4	1	0	4	14	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
1628 義大醫療財團法人義大大昌醫院	107	95	1	1	1	1	4	1	1	0	2		
	108	367	0	7	4	0	10	1	3	0	0		
	增減數	272	-1	6	3	-1	6	0	2	0	-2		
1629 謝外科醫院	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1701 衛生福利部旗山醫院	107	98	0	1	0	0	1	1	1	0	0		
	108	181	0	2	0	0	3	4	0	0	0		
	增減數	83	0	1	0	0	2	3	-1	0	0		
1702 高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）	107	43	0	1	0	0	2	0	0	0	0		
	108	52	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	增減數	9	0	-1	0	0	-2	1	0	0	0		
1703 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處	107	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1704 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	107	6,291	22	144	98	15	191	61	66	0	25		
	108	6,885	42	176	93	17	239	54	71	0	21		
	增減數	594	20	32	-5	2	48	-7	5	0	-4		
1705 高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）	107	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1707 建佑醫院	107	107	0	1	0	0	2	1	0	0	0		
	108	119	0	1	1	0	0	0	2	0	0		
	增減數	12	0	0	1	0	-2	-1	2	0	0		
1708 劉光雄醫院	107	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1714 義大醫療財團法人義大醫院	107	2,540	23	75	49	19	92	39	39	0	8		
	108	2,627	7	69	31	9	96	34	47	0	10		
	增減數	87	-16	-6	-18	-10	4	-5	8	0	2		
1716 義大醫療財團法人義大癌治療醫院	107	1,633	1	21	10	6	28	17	19	0	2		
	108	1,796	1	22	5	5	26	21	28	0	4		
	增減數	163	0	1	-5	-1	-2	4	9	0	2		
1801 衛生福利部澎湖醫院	107	80	0	0	0	0	0	2	1	0	0		
	108	63	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	增減數	-17	0	0	0	0	1	-2	-1	0	0		
1802 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	107	75	0	0	0	0	1	1	0	1	0		
	108	92	0	5	1	0	1	0	1	0	1		
	增減數	17	0	5	1	0	0	-1	1	-1	1		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 - 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
1628	2	1	1	0	1	0	14	2	0	1	6	2	6
	29	3	1	0	8	3	48	28	45	1	14	8	5
	27	2	0	0	7	3	34	26	45	0	8	6	-1
1629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	11	1	0	0	0	0	3	9	22	0	1	0	0
	5	0	0	0	1	0	9	17	24	2	7	12	4
	-6	-1	0	0	1	0	6	8	2	2	6	12	4
1702	1	0	0	0	0	0	0	4	7	0	4	0	2
	1	0	1	0	0	0	0	2	13	0	4	6	1
	0	0	1	0	0	0	0	-2	6	0	0	6	-1
1703	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
1704	681	71	16	0	113	55	751	322	495	16	151	139	76
	738	64	12	0	127	79	739	328	551	13	170	157	94
	57	-7	-4	0	14	24	-12	6	56	-3	19	18	18
1705	4	0	0	0	0	0	3	2	10	0	2	0	0
	1	0	0	0	1	0	1	1	8	0	0	0	0
	-3	0	0	0	1	0	-2	-1	-2	0	-2	0	0
1707	12	0	0	0	3	1	13	6	14	0	6	10	1
	10	1	0	0	2	0	13	9	17	0	6	6	1
	-2	1	0	0	-1	0	0	3	3	0	0	-4	0
1708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1714	263	19	12	0	46	13	296	135	160	7	65	105	43
	250	18	5	0	47	20	325	146	205	14	49	102	44
	-13	-1	-7	0	1	7	29	11	45	7	-16	-3	1
1716	191	11	6	0	45	9	217	74	88	5	46	86	32
	179	8	1	0	49	19	232	91	109	10	46	88	34
	-12	-3	-5	0	4	10	15	17	21	5	0	2	2
1801	4	0	0	0	1	0	13	4	11	1	7	1	0
	7	0	0	0	0	0	13	1	7	0	3	4	0
	3	0	0	0	-1	0	0	-3	-4	-1	-4	3	0
1802	7	0	0	0	0	0	7	3	15	0	3	5	2
	15	0	0	0	2	0	2	12	12	0	6	3	0
	8	0	0	0	2	0	-5	9	-3	0	3	-2	-2

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1628	107	0	0	6	0	0	1	14	0	0	4	0	0	0
	108	1	2	7	0	1	1	39	0	0	19	17	5	0
	增減數	1	2	1	0	1	0	25	0	0	15	17	5	0
1629	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1701	107	0	0	0	0	0	2	6	0	0	22	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	17	19	0	0	11	3	2	1
	增減數	0	0	0	0	0	15	13	0	0	-11	3	2	1
1702	107	0	0	0	0	0	15	0	0	0	1	2	0	0
	108	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0	0	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	-2	6	0	0	-1	-2	0	1
1703	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	108	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	-1	0	0
1704	107	7	33	154	5	29	207	537	1	2	223	145	91	15
	108	9	38	149	10	35	267	556	2	0	208	184	107	16
	增減數	2	5	-5	5	6	60	19	1	-2	-15	39	16	1
1705	107	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	0	-2	0	0	0	0	0	0
1707	107	0	0	3	0	1	5	5	0	0	1	0	0	0
	108	0	0	1	0	1	15	3	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	-2	0	0	10	-2	0	0	-1	0	0	0
1708	107	0	0	0	0	0	15	24	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	19	22	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	4	-2	0	0	0	0	0	0
1714	107	1	5	61	3	4	83	158	2	0	60	28	24	3
	108	3	10	56	1	6	74	193	0	0	53	33	24	1
	增減數	2	5	-5	-2	2	-9	35	-2	0	-7	5	0	-2
1716	107	2	3	36	1	3	58	185	1	0	34	24	25	2
	108	0	8	40	0	4	63	218	0	0	31	37	22	2
	增減數	-2	5	4	-1	1	5	33	-1	0	-3	13	-3	0
1801	107	0	0	0	1	0	5	11	0	0	0	1	0	0
	108	0	0	0	0	0	6	18	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	-1	0	1	7	0	0	1	-1	0	0
1802	107	1	0	0	0	0	10	0	0	0	3	1	0	0
	108	0	0	0	0	0	10	0	0	0	4	4	0	1
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

醫院代碼	惡性淋巴瘤	不明原發部位	其他分界不明部位	其他內分泌腺	甲狀腺	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	腦	眼及淚腺	腎盂及其他泌尿器官	腎	膀胱	陰莖及其他男性生殖器官	睪丸	攝護腺
	C80	C76	C74-C75	C73	C70, C72	C71	C69	C65-C66, C68	C64	C67	C60, C63	C62	C61	
1628	3	1	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	10	
	16	0	0	7	0	1	0	5	4	8	0	0	16	
	13	-1	0	2	0	1	0	5	4	5	0	0	6	
1629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	1	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	1	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1701	2	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	6	
	4	1	0	1	0	0	0	0	1	12	0	0	19	
	2	-1	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	13	
1702	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	0	-1	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1705	175	34	2	8	322	2	37	5	196	200	11	14	257	
	213	37	0	8	382	6	38	8	197	71	7	11	318	
	38	3	-2	0	60	4	1	3	1	2	-4	-3	61	
1707	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	3	
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	2	
1708	1	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	8	
	0	2	0	2	0	0	0	12	0	9	0	0	5	
	-1	2	0	2	0	0	0	7	0	1	0	0	-3	
1714	1	0	0	1	0	0	0	4	0	9	0	0	9	
	1	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	7	
	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-5	0	0	-2	
1716	59	14	6	2	131	3	24	0	70	90	2	10	153	
	65	11	1	6	139	5	11	0	88	96	2	7	173	
	6	-3	-5	4	8	2	-13	0	18	6	0	-3	20	
1801	38	11	3	1	57	0	10	0	37	43	1	4	115	
	55	10	0	3	67	1	5	0	46	53	3	5	131	
	17	-1	-3	2	10	1	-5	0	9	10	2	1	16	
1802	4	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	3	
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	-3	0	0	-5	0	0	0	0	0	-4	0	0	-3	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	9	
	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	7	
	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-3	0	0	-2	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口腔底	口腔部位 口腔之其他及未詳細說明	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08	
1901 衛生福利部屏東醫院	107	518	1	26	4	1	26	6	8	0	1	
	108	579	1	14	7	1	15	8	9	0	2	
	增減數	61	0	-12	3	0	-11	2	1	0	1	
1903 輔英科技大學附設醫院	107	211	0	4	0	0	4	0	0	0	0	
	108	275	0	1	0	0	2	2	0	0	0	
	增減數	64	0	-3	0	0	-2	2	0	0	0	
1904 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	107	830	1	16	3	0	17	7	5	0	0	
	108	767	3	10	3	0	13	2	9	0	1	
	增減數	-63	2	-6	0	0	-4	-5	4	0	1	
1905 國軍高雄總醫院附設屏東民眾 診療服務處	107	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1908 民眾醫院	107	85	0	0	0	0	1	3	1	0	0	
	108	80	0	1	0	0	2	1	0	0	0	
	增減數	-5	0	1	0	0	1	-2	-1	0	0	
1909 南門醫療社團法人南門醫院	107	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1910 高雄榮民總醫院屏東分院	107	61	0	2	0	0	1	2	0	0	0	
	108	63	0	2	1	0	2	0	1	0	0	
	增減數	2	0	0	1	0	1	-2	1	0	0	
1913 安泰醫療社團法人安泰醫院	107	540	0	22	12	3	15	12	11	0	3	
	108	566	1	18	1	3	18	8	5	0	2	
	增減數	26	1	-4	-11	0	3	-4	-6	0	-1	
1914 實建醫療社團法人實建醫院	107	381	0	1	1	1	2	1	2	0	0	
	108	368	0	3	1	1	3	1	2	0	1	
	增減數	-13	0	2	0	0	1	0	0	0	1	
1915 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1918 枋寮醫療社團法人枋寮醫院	107	62	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	108	64	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	
2001 衛生福利部臺東醫院	107	31	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	108	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	
2002 東基醫療財團法人台東基督教醫院	107	129	1	5	0	2	6	1	1	0	0	
	108	156	1	3	0	0	11	1	2	0	1	
	增減數	27	0	-2	0	-2	5	0	1	0	1	

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽	
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C48	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
1901	66	3	2	0	2	3	6	30	49	40	0	14	10	13
	68	7	2	0	0	9	5	28	49	34	3	13	22	21
	2	4	0	0	-2	6	-1	-2	0	-6	3	-1	12	8
1903	6	3	1	0	1	2	2	15	9	22	0	4	1	2
	7	2	0	0	0	4	2	23	17	29	0	9	8	3
	1	-1	0	0	-1	2	0	8	8	7	0	5	7	1
1904	96	6	2	0	0	21	5	72	71	82	2	23	36	15
	78	5	0	0	0	22	10	78	70	68	4	33	29	7
	-18	-1	-2	0	0	0	5	6	-1	-14	2	10	-7	-8
1905	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0
	2	0	0	0	0	-1	1	-1	2	-4	0	1	0	0
1908	16	1	0	0	0	2	3	18	4	12	0	5	4	0
	19	1	0	0	0	5	6	12	2	6	1	4	4	1
	3	0	0	0	0	3	3	-6	-2	-6	1	-1	0	1
1909	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
1910	7	0	0	0	1	2	1	5	1	7	0	5	1	0
	9	0	0	0	0	0	0	4	5	6	0	4	2	0
	2	0	0	0	-1	-2	-1	-1	4	-1	0	-1	1	0
1913	74	13	0	0	1	10	8	68	25	39	2	19	27	12
	63	12	1	0	1	22	5	69	32	37	1	18	28	7
	-11	-1	1	0	0	12	-3	1	7	-2	-1	-1	1	-5
1914	39	1	0	0	0	7	6	42	31	41	2	16	11	6
	34	1	0	0	0	9	8	35	33	42	3	17	7	3
	-5	0	0	0	0	2	2	-7	2	1	1	1	-4	-3
1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1918	6	0	0	0	1	0	0	17	6	5	0	6	2	0
	4	0	0	0	0	2	0	8	6	8	0	2	0	0
	-2	0	0	0	-1	2	0	-9	0	3	0	-4	-2	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	0	1	2	1
	2	0	0	0	0	1	0	3	9	5	0	1	1	1
	2	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	-1	0
2002	4	0	0	0	1	1	2	9	6	35	0	4	8	2
	6	1	0	0	0	1	1	6	7	47	0	5	6	9
	2	1	0	0	-1	0	-1	-3	1	12	0	1	-2	7

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織、結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
1901	107	0	1	10	0	3	32	58	1	0	10	7	1	0
	108	0	5	7	0	2	48	90	1	0	11	2	3	0
	增減數	0	4	-3	0	-1	16	32	0	0	1	-5	2	0
1903	107	0	1	0	0	3	51	27	0	0	19	3	1	0
	108	0	0	0	3	4	55	50	0	0	22	1	0	0
	增減數	0	-1	0	3	1	4	23	0	0	3	-2	-1	0
1904	107	2	2	9	2	4	32	134	0	0	43	11	8	2
	108	0	1	3	1	0	25	118	0	0	46	20	10	1
	增減數	-2	-1	-6	-1	-4	-7	-16	0	0	3	9	2	-1
1905	107	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0
1908	107	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	0
	108	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	1	1	1	0	-1	0	0	0	-2	-1	0
1909	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1910	107	0	0	0	0	0	8	4	0	0	3	0	1	0
	108	0	0	0	0	0	9	4	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	0	-1	0
1913	107	0	2	6	1	3	28	37	0	0	6	3	3	0
	108	1	3	13	0	2	29	46	1	0	14	4	4	1
	增減數	1	1	7	-1	-1	1	9	1	0	8	1	1	1
1914	107	1	1	1	0	2	27	62	0	0	20	5	1	2
	108	0	1	3	0	1	18	64	0	0	29	5	1	2
	增減數	-1	0	2	0	-1	-9	2	0	0	9	0	0	0
1915	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
1918	107	0	0	0	0	0	3	8	0	0	5	0	0	0
	108	0	0	0	0	1	4	11	0	0	7	0	0	1
	增減數	0	0	0	0	1	1	3	0	0	2	0	0	1
2001	107	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
2002	107	0	0	0	0	1	1	18	0	0	7	3	0	0
	108	0	1	0	0	1	2	19	0	0	3	3	0	0
	增減數	0	1	0	0	0	1	1	0	0	-4	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
32	0	1	13	1	4	0	3	1	7	0	0	7	15	1901
33	1	1	17	1	4	0	2	0	7	0	0	6	20	
1	1	0	4	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	5	
2	1	0	6	6	11	0	1	0	2	0	0	0	2	1903
5	0	2	10	0	6	0	2	0	4	0	1	0	1	
3	-1	2	4	-6	-5	0	1	0	2	0	1	0	-1	
25	0	0	11	1	8	0	2	1	23	0	0	14	16	1904
26	0	0	11	4	11	0	2	0	12	1	0	10	20	
1	0	0	0	3	3	0	0	-1	-11	1	0	-4	4	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1908
1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	2	1	
1	0	0	-1	0	1	0	-2	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1909
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1910
8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
3	0	1	-3	0	1	0	-1	0	0	0	1	0	0	
30	0	0	14	2	13	0	2	0	3	0	0	3	8	1913
30	0	0	23	3	12	0	1	0	7	0	0	8	12	
0	0	0	9	1	-1	0	-1	0	4	0	0	5	4	
12	1	0	11	0	9	0	3	0	5	0	0	4	4	1914
10	0	0	10	1	2	0	1	0	7	0	0	5	4	
-2	-1	0	-1	1	-7	0	-2	0	2	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1918
1	0	0	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
1	0	-1	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
6	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	2001
4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	
-2	0	0	-1	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2002
6	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	
5	0	0	-2	0	-1	0	0	0	3	0	0	0	3	

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼 / 醫院	原發部位別	總計	唇 (國的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明	部位	咽喉	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界	不明部位	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08		
2003 台灣基督長老教會馬偕醫療財團 法人台東馬偕紀念醫院	107	695	11	22	14	3	44	12	12	0	5		
	108	773	9	21	9	2	30	9	19	0	0		
	增減數	78	-2	-1	-5	-1	-14	-3	7	0	-5		
2004 臺北榮民總醫院臺東分院	107	106	0	1	0	0	3	1	0	1	0		
	108	129	0	4	4	0	7	1	3	0	0		
	增減數	23	0	3	4	0	4	0	3	-1	0		
2101 衛生福利部花蓮醫院	107	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2102 臺北榮民總醫院玉里分院	107	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	108	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2103 臺灣基督教門諾會醫療財團法人 門諾醫院	107	630	2	14	3	2	18	7	10	0	0		
	108	676	1	12	9	1	14	4	3	0	1		
	增減數	46	-1	-2	6	-1	-4	-3	-7	0	1		
2104 國軍花蓮總醫院附設民眾診療 服務處	107	44	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
	108	46	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	2	0	3	0	0	0	-1	-1	0	0		
2105 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟 醫院	107	1,404	15	55	46	7	93	22	23	0	6		
	108	1,491	15	51	36	6	78	15	28	0	4		
	增減數	87	0	-4	-10	-1	-15	-7	5	0	-2		
2201 衛生福利部金門醫院	107	45	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	108	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	增減數	-14	0	0	0	0	-1	0	0	0	0		
總計	107	165,627	533	3,198	1,547	360	3,981	1,244	1,631	21	434		
	108	174,334	516	3,249	1,539	315	4,025	1,232	1,661	18	421		
	增減數	8,707	-17	51	-8	-45	44	-12	30	-3	-13		

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

醫院代碼	肺、支氣管及氣管	喉	鼻腔、副竇、中耳及內耳	與腹膜分界不明部位 消化器官之其他部位及 後腹膜腔及腹膜	胰	膽囊及肝外膽管	肝及肝內膽管	及肛門 直腸、乙狀結腸連結部	結腸	小腸	胃	食道	鼻咽
	C33-C34	C32	C30-C31	C26	C25	C23-C24	C22	C19-C21	C18	C17	C16	C15	C11
2003	82	6	1	0	17	6	67	39	56	2	22	28	10
	79	4	0	0	19	7	95	49	70	3	42	35	20
	-3	-2	-1	0	2	1	28	10	14	1	20	7	10
2004	18	0	0	0	1	2	9	9	6	0	4	7	2
	14	1	0	0	5	0	13	2	13	1	7	6	2
	-4	1	0	0	4	0	4	-7	7	1	3	-1	0
2101	1	0	0	0	0	0	1	3	4	0	2	2	0
	3	0	0	0	0	0	0	7	9	0	7	2	0
	2	0	0	0	0	0	-1	4	5	0	5	0	0
2102	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
	6	0	0	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	1	0	2	-1	3	0	0	-1	0
2103	60	0	0	0	25	4	51	31	92	1	27	17	4
	52	0	0	0	16	0	54	43	92	2	33	28	5
	-8	0	0	0	-9	-4	3	12	0	1	6	11	1
2104	6	0	0	0	1	0	4	2	5	0	4	3	0
	2	0	0	0	1	0	6	3	4	0	5	3	0
	-4	0	0	0	0	0	2	1	-1	0	1	0	0
2105	163	14	2	0	34	19	120	70	87	4	39	50	18
	145	29	3	0	37	15	108	65	106	5	65	62	20
	-18	15	1	0	3	-4	-12	-5	19	1	26	12	2
2201	2	0	0	0	3	0	8	0	5	0	5	6	0
	5	1	0	0	2	0	5	0	2	0	1	1	0
	3	1	0	0	-1	0	-3	0	-3	0	-4	-5	0
總計	19,583	1,047	295	25	3,615	1,400	14,341	8,540	16,219	484	5,127	4,076	2,142
	21,052	1,142	320	23	3,724	1,479	14,233	9,120	17,142	547	5,417	4,267	2,277
	1,469	95	25	-2	109	79	-108	580	923	63	290	191	135

表九 台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 107 年及 108 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE
PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2018 AND 2019 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織 結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官 陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8	C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9	
2003	107	0	1	2	0	3	25	84	1	0	23	12	8	1
	108	1	2	4	0	5	37	76	0	0	20	17	11	1
	增減數	1	1	2	0	2	12	-8	-1	0	-3	5	3	0
2004	107	0	0	0	0	1	10	9	0	0	1	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2	1	0
	增減數	0	0	0	0	-1	-10	3	0	0	-1	2	1	0
2101	107	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
2102	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
	108	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-3	0	0	0
2103	107	1	1	9	0	1	20	87	0	0	36	17	11	3
	108	1	4	17	0	3	23	106	0	0	40	26	11	2
	增減數	0	3	8	0	2	3	19	0	0	4	9	0	-1
2104	107	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	1	0	0
	108	0	0	1	0	0	2	8	0	0	1	2	0	0
	增減數	0	0	1	0	0	-1	1	0	0	1	1	0	0
2105	107	1	3	41	1	4	68	117	0	0	21	18	9	0
	108	0	3	32	1	2	77	163	0	0	31	26	10	1
	增減數	-1	0	-9	0	-2	9	46	0	0	10	8	1	1
2201	107	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
	108	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	0	0
	增減數	0	0	0	-1	0	1	0	0	0	5	1	-1	0
總計	107	115	672	3,033	220	800	5,040	23,250	82	9	5,191	3,762	1,867	322
	108	110	678	3,183	224	791	5,508	24,620	64	17	5,426	4,272	2,010	324
	增減數	-5	6	150	4	-9	468	1,370	-18	8	235	510	143	2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 110 年 5 月 11 日申報之 108 年發生個案數 — 截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位 腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
25	0	0	12	1	4	0	2	0	6	0	0	7	19	2003
28	0	0	12	4	1	0	3	0	10	0	1	7	11	
3	0	0	0	3	-3	0	1	0	4	0	1	0	-8	
13	0	0	3	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2004
12	0	0	8	4	0	1	3	0	3	0	0	0	0	
-1	0	0	5	3	-2	1	3	0	1	0	0	0	0	
8	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2101
8	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2102
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
31	1	0	14	1	4	0	0	0	1	0	0	3	19	2103
21	2	1	9	1	2	0	1	0	10	0	0	6	19	
-10	1	1	-5	0	-2	0	1	0	9	0	0	3	0	
1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2104
1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	
0	0	0	-1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	-3	
64	3	2	32	17	29	1	5	0	33	0	0	7	40	2105
79	2	1	33	24	29	3	6	1	31	5	0	3	35	
15	-1	-1	1	7	0	2	1	1	-2	5	0	-4	-5	
2	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2201
2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8,575	322	153	4,383	1,725	3,006	94	968	79	5,837	192	77	982	4,663	總計
9,258	322	143	4,598	1,865	3,126	77	941	94	6,298	199	71	987	5,034	
683	0	-10	215	140	120	-17	-27	15	461	7	-6	5	371	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 81 至 108 年

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1992 TO 2019

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year											
		性別 Gender	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	男 Male	18,807	19,606	20,392	21,442	24,604	26,673	29,697	32,249	33,754	34,578	36,681
		女 Female	14,398	14,892	15,282	16,081	18,512	20,487	22,250	24,087	25,127	25,613	26,448
		計 Total	33,205	34,498	35,674	37,523	43,116	47,160	51,947	56,336	58,881	60,191	63,129
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	2,290	2,370	2,552	2,674	3,033	3,338	3,687	4,096	4,316	4,404	4,700
		女 Female	588	585	587	587	638	652	699	752	743	812	738
		計 Total	2,878	2,955	3,139	3,261	3,671	3,990	4,386	4,848	5,059	5,216	5,438
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	1,309	1,397	1,586	1,683	2,003	2,261	2,553	2,962	3,158	3,265	3,518
		女 Female	176	173	165	182	238	243	251	295	298	322	333
		計 Total	1,485	1,570	1,751	1,865	2,241	2,504	2,804	3,257	3,456	3,587	3,851
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	54	48	59	71	88	88	101	115	142	148	125
		女 Female	8	5	11	20	14	16	13	14	19	12	14
		計 Total	62	53	70	91	102	104	114	129	161	160	139
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	362	374	435	484	523	586	707	806	824	903	899
		女 Female	69	71	59	65	99	94	84	123	123	133	136
		計 Total	431	445	494	549	622	680	791	929	947	1,036	1,035
C03	齒齦 GUM	男 Male	73	64	79	92	106	141	156	166	209	218	217
		女 Female	11	10	15	12	23	20	17	29	23	31	27
		計 Total	84	74	94	104	129	161	173	195	232	249	244
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	30	31	41	30	37	59	55	83	78	82	78
		女 Female	7	4	11	4	3	14	6	9	10	5	12
		計 Total	37	35	52	34	40	73	61	92	88	87	90
C05-C06	口腔之其他及未詳 細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	481	530	600	656	792	892	947	1,170	1,240	1,192	1,353
		女 Female	55	57	50	53	72	79	87	79	82	88	95
		計 Total	536	587	650	709	864	971	1,034	1,249	1,322	1,280	1,448
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	96	100	127	108	133	171	189	221	237	280	283
		女 Female	15	16	8	20	16	11	25	26	25	26	27
		計 Total	111	116	135	128	149	182	214	247	262	306	310
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	201	237	232	221	294	301	367	375	393	408	510
		女 Female	7	6	9	7	8	7	15	12	12	19	15
		計 Total	208	243	241	228	302	308	382	387	405	427	525
C14	咽和唇、口腔及咽之 分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	12	13	13	21	30	23	31	26	35	34	53
		女 Female	4	4	2	1	3	2	4	3	4	8	7
		計 Total	16	17	15	22	33	25	35	29	39	42	60
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	66	46	68	55	65	75	80	102	86	97	100
		女 Female	45	50	47	46	50	45	49	66	69	96	74
		計 Total	111	96	115	101	115	120	129	168	155	193	174

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ICD-O-3
36,597	40,926	41,143	43,524	45,732	46,747	50,516	52,499	53,301	54,658	56,141	57,252	58,090	58,453	61,150	63,322	64,109	C00-C80
26,776	30,112	30,790	32,461	34,217	35,872	39,388	40,996	41,766	44,046	45,687	48,050	49,696	50,341	53,996	55,635	57,145	
63,373	71,038	71,933	75,985	79,949	82,619	89,904	93,495	95,067	98,704	101,828	105,302	107,786	108,794	115,146	118,957	121,254	
5,207	5,704	5,633	6,175	6,567	6,831	7,394	7,539	7,758	7,954	8,067	8,399	8,401	8,578	8,513	8,843	8,874	C00-C14
759	864	896	918	980	950	1,030	1,034	1,089	1,098	1,078	1,228	1,164	1,174	1,314	1,309	1,220	
5,966	6,568	6,529	7,093	7,547	7,781	8,424	8,573	8,847	9,052	9,145	9,627	9,565	9,752	9,827	10,152	10,094	
3,964	4,459	4,384	4,938	5,247	5,544	6,053	6,189	6,418	6,564	6,719	6,997	7,112	7,257	7,171	7,509	7,468	C00-C14 ²
354	395	415	452	485	445	555	542	593	597	624	696	672	671	757	783	736	
4,318	4,854	4,799	5,390	5,732	5,989	6,608	6,731	7,011	7,161	7,343	7,693	7,784	7,928	7,928	8,292	8,204	
124	146	157	144	164	171	195	217	245	269	255	263	271	266	265	259	266	C00
28	16	24	21	24	25	27	18	29	26	29	40	38	27	38	32	29	
152	162	181	165	188	196	222	235	274	295	284	303	309	293	303	291	295	
1,118	1,212	1,227	1,287	1,468	1,459	1,646	1,639	1,695	1,758	1,810	1,797	1,934	1,981	1,913	1,922	1,987	C01-C02
133	174	165	186	203	176	239	223	280	270	258	299	289	293	326	340	327	
1,251	1,386	1,392	1,473	1,671	1,635	1,885	1,862	1,975	2,028	2,068	2,096	2,223	2,274	2,239	2,262	2,314	
241	270	282	344	343	409	358	395	502	527	565	643	601	625	687	730	714	C03
33	25	25	35	48	42	45	62	60	59	71	80	67	86	91	101	84	
274	295	307	379	391	451	403	457	562	586	636	723	668	711	778	831	798	
80	97	106	113	127	146	127	157	189	155	167	181	222	198	196	234	196	C04
3	10	14	18	6	10	14	13	19	14	12	11	23	15	21	21	25	
83	107	120	131	133	156	141	170	208	169	179	192	245	213	217	255	221	
1,508	1,672	1,630	1,813	1,830	1,994	2,176	2,160	2,167	2,163	2,164	2,254	2,176	2,260	2,182	2,332	2,261	C05-C06
106	93	125	130	137	120	153	149	131	134	140	154	139	141	161	147	153	
1,614	1,765	1,755	1,943	1,967	2,114	2,329	2,309	2,298	2,297	2,304	2,408	2,315	2,401	2,343	2,479	2,414	
331	398	379	477	504	550	637	608	646	689	715	753	778	814	819	839	862	C09-C10
33	46	37	40	45	54	48	49	56	72	77	71	90	77	80	97	79	
364	444	416	517	549	604	685	657	702	761	792	824	868	891	899	936	941	
511	600	560	712	783	769	869	946	956	996	1,023	1,083	1,097	1,081	1,087	1,178	1,168	C12-C13
14	30	23	19	20	16	23	23	17	21	33	39	25	30	39	43	38	
525	630	583	731	803	785	892	969	973	1,017	1,056	1,122	1,122	1,111	1,126	1,221	1,206	
51	64	43	48	28	46	45	67	18	7	20	23	33	32	22	15	14	C14
4	1	2	3	2	2	6	5	1	1	4	2	1	2	1	2	1	
55	65	45	51	30	48	51	72	19	8	24	25	34	34	23	17	15	
102	94	107	117	119	114	157	139	139	167	162	158	152	171	197	202	190	C07-C08
58	93	82	94	78	105	124	109	98	130	117	131	118	127	150	154	140	
160	187	189	211	197	219	281	248	237	297	279	289	270	298	347	356	330	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 81 至 108 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1992 TO 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year											
		性別 Gender	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	915	927	898	936	965	1,002	1,054	1,032	1,072	1,042	1,082
		女 Female	367	362	375	359	350	364	399	391	376	394	331
		計 Total	1,282	1,289	1,273	1,295	1,315	1,366	1,453	1,423	1,448	1,436	1,413
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	8,561	8,859	8,963	9,644	11,037	12,050	13,566	14,458	15,116	15,594	16,592
		女 Female	4,005	4,128	4,357	4,556	5,360	6,147	6,744	7,365	7,763	7,986	8,493
		計 Total	12,566	12,987	13,320	14,200	16,397	18,197	20,310	21,823	22,879	23,580	25,085
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	598	610	635	659	791	819	870	917	999	1,166	1,193
		女 Female	83	63	66	64	90	76	92	92	83	91	117
		計 Total	681	673	701	723	881	895	962	1,009	1,082	1,257	1,310
C16	胃 STOMACH	男 Male	1,915	1,851	1,755	1,948	2,056	2,072	2,212	2,262	2,212	2,365	2,485
		女 Female	870	829	826	901	1,021	1,122	1,079	1,124	1,139	1,137	1,209
		計 Total	2,785	2,680	2,581	2,849	3,077	3,194	3,291	3,386	3,351	3,502	3,694
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	69	81	65	69	89	105	116	127	137	140	162
		女 Female	40	52	51	55	58	74	60	86	91	96	93
		計 Total	109	133	116	124	147	179	176	213	228	236	255
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連 結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	2,253	2,403	2,517	2,555	3,070	3,321	3,790	4,075	4,371	4,320	4,744
		女 Female	1,670	1,817	1,894	1,928	2,276	2,524	2,889	3,049	3,296	3,320	3,507
		計 Total	3,923	4,220	4,411	4,483	5,346	5,845	6,679	7,124	7,667	7,640	8,251
C18	結腸 COLON	男 Male	1,157	1,235	1,325	1,316	1,681	1,722	2,032	2,226	2,397	2,341	2,602
		女 Female	918	1,001	1,012	1,095	1,314	1,384	1,627	1,780	1,865	1,913	1,974
		計 Total	2,075	2,236	2,337	2,411	2,995	3,106	3,659	4,006	4,262	4,254	4,576
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部 及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	1,096	1,168	1,192	1,239	1,389	1,599	1,758	1,849	1,974	1,979	2,142
		女 Female	752	816	882	833	962	1,140	1,262	1,269	1,431	1,407	1,533
		計 Total	1,848	1,984	2,074	2,072	2,351	2,739	3,020	3,118	3,405	3,386	3,675
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	3,172	3,287	3,427	3,786	4,332	4,958	5,701	6,129	6,365	6,564	6,926
		女 Female	961	943	1,079	1,187	1,382	1,752	1,978	2,285	2,385	2,558	2,671
		計 Total	4,133	4,230	4,506	4,973	5,714	6,710	7,679	8,414	8,750	9,122	9,597
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	145	230	193	212	215	236	289	312	326	326	365
		女 Female	149	192	179	185	200	242	244	282	292	304	355
		計 Total	294	422	372	397	415	478	533	594	618	630	720
C25	胰 PANCREAS	男 Male	346	343	313	361	414	459	518	557	635	640	643
		女 Female	179	179	198	184	276	298	330	370	379	390	462
		計 Total	525	522	511	545	690	757	848	927	1,014	1,030	1,105
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	46	36	44	39	57	64	60	70	57	58	65
		女 Female	37	36	42	37	51	50	61	58	76	65	70
		計 Total	83	72	86	76	108	114	121	128	133	123	135

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ICD-O-3
1,141	1,151	1,142	1,120	1,201	1,173	1,184	1,211	1,201	1,223	1,186	1,244	1,137	1,150	1,145	1,132	1,216	C11
347	376	399	372	417	400	351	383	398	371	337	401	374	376	407	372	344	
1,488	1,527	1,541	1,492	1,618	1,573	1,535	1,594	1,599	1,594	1,523	1,645	1,511	1,526	1,552	1,504	1,560	
16,230	18,197	18,186	19,050	19,932	20,172	21,566	22,802	22,872	23,348	23,927	24,033	24,232	23,786	24,885	25,214	25,179	C15-C26, C48
8,543	9,615	9,671	10,202	10,591	11,053	11,995	12,570	12,682	13,324	13,541	14,003	13,999	13,897	14,515	14,735	14,941	
24,773	27,812	27,857	29,252	30,523	31,225	33,561	35,372	35,554	36,672	37,468	38,036	38,231	37,683	39,400	39,949	40,120	
1,246	1,434	1,431	1,652	1,723	1,894	1,926	2,140	2,085	2,206	2,372	2,464	2,424	2,466	2,596	2,621	2,639	C15
110	104	98	115	143	143	151	150	140	180	150	166	174	183	207	204	194	
1,356	1,538	1,529	1,767	1,866	2,037	2,077	2,290	2,225	2,386	2,522	2,630	2,598	2,649	2,803	2,825	2,833	
2,215	2,390	2,259	2,408	2,372	2,360	2,430	2,469	2,453	2,409	2,466	2,357	2,383	2,344	2,359	2,387	2,389	C16
1,145	1,294	1,248	1,277	1,334	1,304	1,466	1,461	1,422	1,432	1,381	1,484	1,521	1,370	1,441	1,494	1,549	
3,360	3,684	3,507	3,685	3,706	3,664	3,896	3,930	3,875	3,841	3,847	3,841	3,904	3,714	3,800	3,881	3,938	
155	159	173	169	201	202	211	202	211	204	224	259	244	244	254	256	256	C17
126	126	94	103	126	134	132	147	137	161	161	177	176	173	224	182	222	
281	285	267	272	327	336	343	349	348	365	385	436	420	417	478	438	478	
4,768	5,634	5,675	5,946	6,385	6,516	7,339	8,363	8,348	8,710	8,876	9,182	9,126	8,884	9,629	9,705	9,893	C18-C21
3,623	4,238	4,261	4,587	4,723	4,932	5,473	6,050	6,101	6,528	6,604	6,875	6,744	6,793	7,142	7,171	7,409	
8,391	9,872	9,936	10,533	11,108	11,448	12,812	14,413	14,449	15,238	15,480	16,057	15,870	15,677	16,771	16,876	17,302	
2,537	3,142	3,163	3,346	3,655	3,687	4,342	5,022	4,889	5,154	5,268	5,467	5,498	5,332	5,707	5,902	6,038	C18
2,099	2,471	2,600	2,721	2,845	3,051	3,467	3,865	3,895	4,330	4,301	4,449	4,529	4,488	4,738	4,878	4,993	
4,636	5,613	5,763	6,067	6,500	6,738	7,809	8,887	8,784	9,484	9,569	9,916	10,027	9,820	10,445	10,780	11,031	
2,231	2,492	2,512	2,600	2,730	2,829	2,997	3,341	3,459	3,556	3,608	3,715	3,628	3,552	3,922	3,803	3,855	C19-C21
1,524	1,767	1,661	1,866	1,878	1,881	2,006	2,185	2,206	2,198	2,303	2,426	2,215	2,305	2,404	2,293	2,416	
3,755	4,259	4,173	4,466	4,608	4,710	5,003	5,526	5,665	5,754	5,911	6,141	5,843	5,857	6,326	6,096	6,271	
6,733	7,390	7,534	7,553	7,842	7,767	8,074	8,071	8,154	8,106	8,201	7,961	8,133	7,978	8,066	8,019	7,757	C22
2,691	2,928	2,955	3,111	3,224	3,372	3,507	3,454	3,510	3,599	3,682	3,653	3,657	3,575	3,604	3,625	3,515	
9,424	10,318	10,489	10,664	11,066	11,139	11,581	11,525	11,664	11,705	11,883	11,614	11,790	11,553	11,670	11,644	11,272	
357	434	376	395	460	449	501	499	426	505	515	562	549	559	561	594	622	C23-C24
293	341	372	373	375	423	460	455	436	447	437	489	549	567	497	561	551	
650	775	748	768	835	872	961	954	862	952	952	1,051	1,098	1,126	1,058	1,155	1,173	
690	678	673	842	846	883	992	956	1,069	1,095	1,175	1,165	1,259	1,216	1,326	1,514	1,510	C25
480	502	543	560	585	643	713	725	807	836	948	989	1,017	1,053	1,221	1,287	1,293	
1,170	1,180	1,216	1,402	1,431	1,526	1,705	1,681	1,876	1,931	2,123	2,154	2,276	2,269	2,547	2,801	2,803	
53	65	55	74	84	77	75	83	107	90	90	79	110	88	82	109	97	C48
63	70	83	64	59	70	67	91	101	101	171	166	156	176	172	197	203	
116	135	138	138	143	147	142	174	208	191	261	245	266	264	254	306	300	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 81 至 108 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1992 TO 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year											
		性別 Gender	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
C26	消化器官之其他部位及 與腹膜間分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	17	18	14	15	13	16	10	9	14	15	9
		女 Female	16	17	22	15	6	9	11	19	22	25	9
		計 Total	33	35	36	30	19	25	21	28	36	40	18
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	3,291	3,337	3,531	3,640	4,241	4,468	4,846	5,252	5,625	5,540	5,664
		女 Female	1,236	1,259	1,336	1,378	1,661	1,768	2,004	2,219	2,289	2,410	2,607
		計 Total	4,527	4,596	4,867	5,018	5,902	6,236	6,850	7,471	7,914	7,950	8,271
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內 耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	99	72	84	84	79	99	73	98	132	99	99
		女 Female	55	51	39	26	41	40	46	48	61	50	56
		計 Total	154	123	123	110	120	139	119	146	193	149	155
C32	喉 LARYNX	男 Male	317	282	345	361	368	395	397	431	485	506	513
		女 Female	19	15	18	19	29	29	16	23	23	23	26
		計 Total	336	297	363	380	397	424	413	454	508	529	539
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	2,792	2,887	3,025	3,104	3,673	3,856	4,280	4,593	4,866	4,799	4,931
		女 Female	1,100	1,137	1,228	1,282	1,524	1,642	1,864	2,085	2,128	2,263	2,440
		計 Total	3,892	4,024	4,253	4,386	5,197	5,498	6,144	6,678	6,994	7,062	7,371
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	12	10	6	14	13	15	16	16	21	14	18
		女 Female	13	6	4	4	7	5	5	3	7	8	9
		計 Total	25	16	10	18	20	20	21	19	28	22	27
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	69	84	71	77	108	103	80	114	121	122	103
		女 Female	49	50	46	47	60	52	73	60	70	66	76
		計 Total	118	134	117	124	168	155	153	174	191	188	179
C39	呼吸系統及胸腔器官之 其他分界不明之部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女 Female	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 Total	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C42 ³	白血病 LEUKEMIA	男 Male	363	428	446	490	487	506	513	562	619	614	828
		女 Female	288	289	319	342	356	368	391	395	449	429	559
		計 Total	651	717	765	832	843	874	904	957	1,068	1,043	1,387
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	89	84	86	86	93	88	93	87	82	95	88
		女 Female	74	69	46	63	64	62	64	56	75	70	74
		計 Total	163	153	132	149	157	150	157	143	157	165	162
C47, C49	結締組織、軟組織及其他 皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	98	110	127	148	155	143	179	188	204	240	236
		女 Female	87	107	96	84	129	137	139	157	162	139	163
		計 Total	185	217	223	232	284	280	318	345	366	379	399

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

3. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ICD-O-3
13	13	10	11	19	24	18	19	19	23	8	4	4	7	12	9	16	C26
12	12	17	12	22	32	26	37	28	40	7	4	5	7	7	14	5	
25	25	27	23	41	56	44	56	47	63	15	8	9	14	19	23	21	
5,696	6,483	6,585	6,788	7,174	7,275	7,912	7,892	8,047	8,228	8,447	8,557	8,964	9,121	9,452	10,036	10,217	C30-C39
2,573	2,870	3,049	3,321	3,583	3,679	4,310	4,269	4,486	4,974	5,058	5,585	5,921	6,413	6,965	7,529	7,795	
8,269	9,353	9,634	10,109	10,757	10,954	12,222	12,161	12,533	13,202	13,505	14,142	14,885	15,534	16,417	17,565	18,012	
91	108	115	132	109	134	135	126	138	145	154	155	150	156	148	164	181	C30-C31
50	52	34	57	47	56	81	56	55	74	74	83	67	78	84	72	81	
141	160	149	189	156	190	216	182	193	219	228	238	217	234	232	236	262	
465	531	530	546	556	555	597	627	588	632	667	638	627	706	718	773	798	C32
27	32	21	37	25	30	35	34	44	40	33	45	40	41	36	39	48	
492	563	551	583	581	585	632	661	632	672	700	683	667	747	754	812	846	
4,998	5,701	5,791	5,938	6,311	6,424	6,950	6,923	7,104	7,229	7,373	7,511	7,884	7,930	8,244	8,684	8,847	C33-C34
2,405	2,692	2,888	3,116	3,399	3,469	4,044	4,039	4,247	4,723	4,807	5,303	5,588	6,045	6,602	7,134	7,386	
7,403	8,393	8,679	9,054	9,710	9,893	10,994	10,962	11,351	11,952	12,180	12,814	13,472	13,975	14,846	15,818	16,233	
21	16	18	34	45	32	31	43	40	48	49	55	59	74	58	72	61	C38.4
6	4	11	17	11	7	15	19	18	16	15	18	24	25	16	25	21	
27	20	29	51	56	39	46	62	58	64	64	73	83	99	74	97	82	
121	127	131	138	153	130	199	172	177	174	204	198	244	255	284	343	330	C37-C38.3,
85	90	95	94	101	116	135	121	121	121	129	136	202	224	227	259	259	C38.8
206	217	226	232	254	246	334	293	298	295	333	334	446	479	511	602	589	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C39
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	878	930	929	1,024	989	1,177	1,191	1,221	1,257	1,293	1,328	1,310	1,361	1,495	1,520	1,529	C42
553	602	658	654	685	746	833	831	827	906	890	965	923	1,010	1,041	1,146	1,083	
1,412	1,480	1,588	1,583	1,709	1,735	2,010	2,022	2,048	2,163	2,183	2,293	2,233	2,371	2,536	2,666	2,612	
69	85	113	79	87	95	100	95	101	110	101	89	83	76	80	101	99	C40-C41
48	69	74	76	78	83	90	77	78	73	59	68	66	69	54	65	77	
117	154	187	155	165	178	190	172	179	183	160	157	149	145	134	166	176	
196	225	226	247	267	265	316	299	298	305	343	346	357	360	363	380	333	C47, C49
187	190	177	175	163	184	213	243	212	233	276	275	297	288	261	286	276	
383	415	403	422	430	449	529	542	510	538	619	621	654	648	624	666	609	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 81 至 108 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1992 TO 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year											
		性別 Gender	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
C44	皮膚 SKIN	男 Male	462	455	532	483	645	714	809	903	890	981	1,126
		女 Female	368	377	421	451	540	624	740	724	760	866	918
		計 Total	830	832	953	934	1,185	1,338	1,549	1,627	1,650	1,847	2,044
C44⁴	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	54	54	51	38	72	60	77	90	78	85	102
		女 Female	47	42	39	43	53	63	69	76	79	75	77
		計 Total	101	96	90	81	125	123	146	166	157	160	179
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	408	401	481	445	573	654	732	813	812	896	1,024
		女 Female	321	335	382	408	487	561	671	648	681	791	841
		計 Total	729	736	863	853	1,060	1,215	1,403	1,461	1,493	1,687	1,865
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	2,264	2,399	2,515	2,847	3,122	3,640	3,810	4,536	4,679	4,888	5,088
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	19	19	24	18	12	23	24	29	25	27	38
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	3,345	3,369	3,278	3,446	3,992	4,100	4,336	4,394	4,472	4,179	3,905
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	33	23	35	17	5	7	11	11	12	6	5
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	2,484	2,471	2,360	2,462	2,943	2,871	2,976	2,967	2,916	2,552	2,193
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	311	325	327	343	399	495	549	553	627	714	786
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	407	462	480	514	546	633	677	732	790	789	817
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	110	88	76	110	99	94	123	131	127	118	104
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	779	929	941	1,136	1,351	1,645	1,897	2,155	2,296	2,355	2,601

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ICD-O-3
956	1,218	1,148	1,313	1,394	1,442	1,640	1,644	1,655	1,860	1,998	2,081	2,080	2,033	2,153	2,204	2,356	C44
810	1,000	1,081	1,135	1,171	1,255	1,386	1,452	1,435	1,479	1,758	1,662	1,786	1,685	1,763	1,939	2,086	
1,766	2,218	2,229	2,448	2,565	2,697	3,026	3,096	3,090	3,339	3,756	3,743	3,866	3,718	3,916	4,143	4,442	
72	99	93	103	117	113	148	140	133	150	160	129	151	141	158	152	154	C44 ⁴
71	91	83	81	95	89	131	92	111	115	108	128	125	123	132	140	134	
143	190	176	184	212	202	279	232	244	265	268	257	276	264	290	292	288	
884	1,119	1,055	1,210	1,277	1,329	1,492	1,504	1,522	1,710	1,838	1,952	1,929	1,892	1,995	2,052	2,202	C44
739	909	998	1,054	1,076	1,166	1,255	1,360	1,324	1,364	1,650	1,534	1,661	1,562	1,631	1,799	1,952	
1,623	2,028	2,053	2,264	2,353	2,495	2,747	2,864	2,846	3,074	3,488	3,486	3,590	3,454	3,626	3,851	4,154	
5,380	6,337	6,740	7,066	7,826	8,389	9,147	9,832	10,223	10,691	11,428	11,917	12,548	12,851	14,224	14,423	14,856	C50
31	48	49	48	39	35	49	41	49	35	53	48	47	51	67	60	53	C50
3,926	4,315	4,143	4,244	4,286	4,534	4,686	4,937	4,889	5,013	5,172	5,441	5,656	5,702	5,971	6,069	6,396	C51-C58
2	8	7	8	16	6	11	9	10	17	14	6	8	8	8	7	14	C55
2,097	2,370	2,026	1,888	1,825	1,786	1,824	1,708	1,700	1,589	1,596	1,474	1,500	1,454	1,449	1,447	1,393	C53
815	921	1,032	1,190	1,196	1,443	1,534	1,764	1,737	1,959	2,035	2,273	2,458	2,510	2,754	2,830	3,124	C54
862	889	940	1,039	1,092	1,135	1,160	1,296	1,277	1,271	1,351	1,505	1,482	1,549	1,568	1,602	1,677	C56, C57.0-C57.4
150	127	138	119	157	164	157	160	165	177	176	183	208	181	192	183	188	C51-C52 C57.7-C57.9
2,524	3,035	3,045	3,429	3,710	3,979	4,377	4,752	5,038	5,142	5,191	5,356	5,564	5,864	6,480	7,207	7,500	C60-C63

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 81 至 108 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1992 TO 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year											
		性別 Gender	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	654	795	807	1,000	1,228	1,520	1,745	1,988	2,113	2,170	2,382
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	66	70	79	82	59	64	81	94	106	102	120
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器 官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	59	64	55	54	64	61	71	73	77	83	99
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	1,173	1,201	1,363	1,334	1,537	1,723	1,863	2,110	2,020	2,196	2,168
		女 Female	540	615	665	646	750	951	992	1,113	1,208	1,221	1,209
		計 Total	1,713	1,816	2,028	1,980	2,287	2,674	2,855	3,223	3,228	3,417	3,377
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	750	752	834	808	950	1,065	1,156	1,294	1,249	1,291	1,287
		女 Female	264	289	308	291	349	434	413	475	491	522	508
		計 Total	1,014	1,041	1,142	1,099	1,299	1,499	1,569	1,769	1,740	1,813	1,795
C64-C66, C68	腎及其他泌尿器官 KIDNEY AND OTHER URINARY TRACT	男 Male	423	449	529	526	587	658	707	816	771	905	881
		女 Female	276	326	357	355	401	517	579	638	717	699	701
		計 Total	699	775	886	881	988	1,175	1,286	1,454	1,488	1,604	1,582
C64	腎 KIDNEY	男 Male	215	205	265	265	294	319	330	378	380	414	404
		女 Female	112	118	133	151	165	198	214	202	217	202	212
		計 Total	327	323	398	416	459	517	544	580	597	616	616
C65-C66, C68	腎盂及其他泌尿器官 (膀胱、腎除外) RENAL PELVIS AND OTHER URINARY TRACT (excludes bladder and kidney)	男 Male	208	244	264	261	293	339	377	438	391	491	477
		女 Female	164	208	224	204	236	319	365	436	500	497	489
		計 Total	372	452	488	465	529	658	742	874	891	988	966
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male	27	24	26	25	24	24	25	30	39	34	35
		女 Female	26	24	22	30	18	21	21	24	29	32	14
		計 Total	53	48	48	55	42	45	46	54	68	66	49
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	290	324	341	289	325	349	328	398	388	385	379
		女 Female	213	200	226	199	229	226	276	263	301	296	261
		計 Total	503	524	567	488	554	575	604	661	689	681	640
C71	腦 BRAIN	男 Male	266	289	313	274	310	323	294	369	358	352	335
		女 Female	193	178	204	174	204	203	250	243	264	270	228
		計 Total	459	467	517	448	514	526	544	612	622	622	563
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系 統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	24	35	28	15	15	26	34	29	30	33	44
		女 Female	20	22	22	25	25	23	26	20	37	26	33
		計 Total	44	57	50	40	40	49	60	49	67	59	77

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ICD-O-3
2,307	2,827	2,819	3,178	3,481	3,700	4,112	4,476	4,733	4,800	4,883	4,997	5,200	5,487	6,096	6,805	7,115	C61
112	121	133	157	145	181	172	182	195	215	212	251	254	270	275	285	283	C62
105	87	93	94	84	98	93	94	110	127	96	108	110	107	109	117	102	C60,C63
2,223	2,396	2,455	2,543	2,657	2,729	2,803	2,877	2,865	2,947	3,072	3,276	3,199	3,274	3,543	3,460	3,555	C64-C68
1,336	1,369	1,418	1,551	1,540	1,628	1,758	1,743	1,735	1,811	1,848	2,045	2,040	2,072	2,234	2,191	2,222	
3,559	3,765	3,873	4,094	4,197	4,357	4,561	4,620	4,600	4,758	4,920	5,321	5,239	5,346	5,777	5,651	5,777	
1,312	1,446	1,406	1,450	1,505	1,527	1,462	1,466	1,438	1,456	1,529	1,664	1,569	1,658	1,773	1,623	1,690	C67
533	544	551	602	609	595	600	558	598	604	597	682	683	685	730	710	720	
1,845	1,990	1,957	2,052	2,114	2,122	2,062	2,024	2,036	2,060	2,126	2,346	2,252	2,343	2,503	2,333	2,410	
911	950	1,049	1,093	1,152	1,202	1,341	1,411	1,427	1,491	1,543	1,612	1,630	1,616	1,770	1,837	1,865	C64-C66
803	825	867	949	931	1,033	1,158	1,185	1,137	1,207	1,251	1,363	1,357	1,387	1,504	1,481	1,502	C68
1,714	1,775	1,916	2,042	2,083	2,235	2,499	2,596	2,564	2,698	2,794	2,975	2,987	3,003	3,274	3,318	3,367	
411	439	514	502	549	629	643	711	725	851	855	949	937	939	1,028	1,067	1,111	C64
232	259	267	286	294	301	372	381	363	415	430	480	467	477	502	487	504	
643	698	781	788	843	930	1,015	1,092	1,088	1,266	1,285	1,429	1,404	1,416	1,530	1,554	1,615	
500	511	535	591	603	573	698	700	702	640	688	663	693	677	742	770	754	C65-C66
571	566	600	663	637	732	786	804	774	792	821	883	890	910	1,002	994	998	C68
1,071	1,077	1,135	1,254	1,240	1,305	1,484	1,504	1,476	1,432	1,509	1,546	1,583	1,587	1,744	1,764	1,752	
20	29	29	30	30	37	26	39	32	22	44	18	21	26	34	22	31	C69
19	16	18	23	24	15	23	27	20	26	26	28	23	42	32	31	30	
39	45	47	53	54	52	49	66	52	48	70	46	44	68	66	53	61	
357	376	368	392	392	423	451	465	444	447	451	467	449	445	482	466	446	C70-C72
246	291	299	321	295	316	296	369	362	354	358	384	412	379	358	360	350	
603	667	667	713	687	739	747	834	806	801	809	851	861	824	840	826	796	
326	350	334	352	347	381	404	432	393	402	404	419	384	386	436	422	410	C71
214	258	255	289	252	268	244	329	319	307	294	322	358	335	320	320	308	
540	608	589	641	599	649	648	761	712	709	698	741	742	721	756	742	718	
31	26	34	40	45	42	47	33	51	45	47	48	65	59	46	44	36	C70, C72
32	33	44	32	43	48	52	40	43	47	64	62	54	44	38	40	42	
63	59	78	72	88	90	99	73	94	92	111	110	119	103	84	84	78	

表十 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 81 至 108 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1992 TO 2019
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year											
		性別 Gender	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male	196	201	185	181	202	196	238	224	291	273	365
		女 Female	597	667	593	630	704	775	902	1,004	978	1,012	1,097
		計 Total	793	868	778	811	906	971	1,140	1,228	1,269	1,285	1,462
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male	32	24	31	33	27	41	34	33	49	33	45
		女 Female	25	16	18	22	28	29	27	28	28	24	25
		計 Total	57	40	49	55	55	70	61	61	77	57	70
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male	60	47	39	26	4	5	2	6	9	3	2
		女 Female	47	41	27	32	9	6	3	5	6	4	5
		計 Total	107	88	66	58	13	11	5	11	15	7	7
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male	368	406	467	463	511	524	636	676	708	613	634
		女 Female	256	288	311	314	370	369	431	433	468	441	426
		計 Total	624	694	778	777	881	893	1,067	1,109	1,176	1,054	1,060
	惡性淋巴瘤¹ MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	628	699	683	719	859	776	881	954	992	1,131	1,168
		女 Female	386	408	419	419	495	566	629	570	662	766	858
		計 Total	1,014	1,107	1,102	1,138	1,354	1,342	1,510	1,524	1,654	1,897	2,026

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

5. 本表之數值與歷年出版之年報略有差異，此因癌症資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或以往尚未入檔之個案，癌症中心會隨時加以更新。

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ICD-O-3
312	355	382	424	443	432	552	591	646	672	771	834	908	944	986	1,165	1,268	C73
1,011	1,200	1,187	1,284	1,462	1,568	1,881	1,895	1,974	2,274	2,395	2,566	2,820	2,883	3,249	3,418	3,582	
1,323	1,555	1,569	1,708	1,905	2,000	2,433	2,486	2,620	2,946	3,166	3,400	3,728	3,827	4,235	4,583	4,850	
27	39	33	30	30	34	34	27	40	44	52	65	52	44	67	88	86	C74-C75
33	26	23	30	32	30	31	27	31	30	33	44	38	36	59	95	87	
60	65	56	60	62	64	65	54	71	74	85	109	90	80	126	183	173	
3	3	2	7	10	4	1	10	9	12	8	2	7	4	10	59	54	C76
1	6	6	4	7	8	8	7	1	6	3	4	7	8	6	16	13	
4	9	8	11	17	12	9	17	10	18	11	6	14	12	16	75	67	
628	584	602	602	518	504	471	539	562	499	489	488	458	497	427	374	368	C80
464	396	405	444	393	359	428	396	414	401	357	333	380	293	297	300	298	
1,092	980	1,007	1,046	911	863	899	935	976	900	846	821	838	790	724	674	666	
1,253	1,256	1,352	1,427	1,457	1,500	1,644	1,692	1,663	1,774	1,830	1,864	1,957	1,984	2,112	2,118	2,161	
880	937	937	1,008	1,098	1,071	1,269	1,283	1,306	1,349	1,404	1,500	1,615	1,535	1,650	1,720	1,828	
2,133	2,193	2,289	2,435	2,555	2,571	2,913	2,975	2,969	3,123	3,234	3,364	3,572	3,519	3,762	3,838	3,989	

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3)

1. 多個原發腫瘤並非依據癌症發生的時間先後順序來認定。
2. 蔓延、復發與轉移部位的癌症都不是原發癌症。復發部位：請推至原發的部位與時間來申報，若原發癌症已申報過復發時則不需再申報；轉移部位：則須找到原發部位來申報。
3. 在 ICD-O-3 中，某些 T-code 碼群組應視為單一部位（請見 Table 1）。當組織形態於 Table 2 為相同組時，不能以多個原發腫瘤來申報。

例如：C00 Lip與C03 Gum

依Table 1可視為單一部位。當組織形態同組時，如果於不同時間診斷出，請申報最早的部位；若相同時間診斷則申報C06.9。

多重焦點腫瘤（Multifocal tumors）：意指同一解剖部位發生多個分離、不相連的原發腫瘤且組織形態同組時，應視為單一原發癌症。例如：膀胱就常有multifocal tumors的情形，但均應視為單一部位。

4. 規則 3 不適用於下列 2 種情形：

4.1 系統性（systemic）或多重中心（multicentric）所報告的癌症可能會在全身多處器官發生，此種癌症應視為一個原發癌症，僅需申報一次。系統性或多重中心癌症包括 Table 2 中 group 15 的 Kaposi sarcoma 和 group 8-14 的造血系統腫瘤（tumours of the haematopoietic system）。

4.2 來自相同的原發部位但組織形態（morphology）不同，若要判定是否為多個原發腫瘤，請依據組織形態在 Table 2 中是否屬於同一組來決定。如果在同一組就必須視為單一原發癌症，組織形態請取高碼。相對地，組織形態在 Table 2 中屬於不同組，就要申報成多個原發腫瘤，即使在相同的部位也要視為多個原發腫瘤。

除此之外，如果有2種不同的組織形態，其中一種在Table 2中屬於group (5)、(14)、(17)的未明確組織形態，但另一種有明確組織形態，請申報有明確組織形態的個案，未明確組織形態的診斷請忽略。

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

1. The recognition of the existence of two or more primary cancers dose not depend on time.
2. A primary cancer is one that originates in a primary site or tissue and is not an extension, nor a recurrence, nor a metastasis.
3. Only one tumour shall be recognised as arising in an organ or pair of organs or tissue.

Some groups of codes are considered to be a single organ for the purposes of defining multiple tumours. These topography code groups are shown in Table 1. Multifocal tumours – that is, discrete masses apparently not in continuity with other primary cancers originating in the *same* primary site or tissue, for example bladder – are counted as a single cancer.

4. Rule 3 dose not apply in two circumstances:

- 4.1. Systemic (or multicentric) cancers potentially involving many different organs are only counted once in any individual. These are Kaposi sarcoma (group 15 in Table 2) and tumours of the haematopoietic system (group 8-14 in Table 2).

- 4.2. Neoplasms of different morphology should be regarded as multiple cancers (even if they are diagnosed simultaneously in the same site).

If the morphological diagnoses fall into one category in Table 2, and arise in the same primary site, they are considered to be the same morphology for the purpose of counting multiple primaries. If the morphological diagnoses fall into two or more of the categories in Table 2, even if they concern the same site, the morphology is considered to be different, and two or more cases should be counted.

Single tumours containing several different histologies which fall into one histological group in Table 2 are registered as a single case, using the numerically highest ICD-O morphology code.

If, however, one morphology is not specific (group (5), (14) and (17)) and a specific morphology is available, the case should be reported with the specific histology and the non-specific diagnosis should be ignored.

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 1. Groups of topography codes considered a single site in the definition of multiple cancers

ICD-O-2/3 site code	Label	If diagnosed at different times, code first diagnosis. If diagnosed at the same time use codes given below.
C01	Base of tongue	
C02	Other and unspecified parts of tongue	C02.9
C00	Lip	
C03	Gum	
C04	Floor of mouth	
C05	Palate	
C06	Other and unspecified parts of mouth	C06.9
C09	Tonsil	
C10	Oropharynx	
C12	Pyriform sinus	
C13	Hypopharynx	
C14	Other and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx	C14.0
C19	Rectosigmoid junction	
C20	Rectum	C20.9
C23	Gallbladder	
C24	Other and unspecified parts of biliary tract	C24.9
C33	Trachea	
C34	Bronchus and lung	C34.9
C40	Bones, joints and articular cartilage of limbs	
C41	Bones, joints and articular cartilage of other and unspecified sites	C41.9
C65	Renal pelvis	
C66	Ureter	
C67	Bladder	
C68	Other and unspecified urinary organs	C68.9

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 2. Groups of malignant neoplasms considered to be histologically ‘different’ for the purpose of defining multiple tumours (adapted from Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Schottenfeld D & Fraumeni JF Jr. *Cancer Epidemiology and Prevention*, 2nd edition, Chapter 3 of Section 1: Basic Concepts. Oxford, New York, Oxford University Press, pp. 28-44, 1994).

Group

Carcinomas

1. Squamous and transitional cell carcinoma	8051-8086, 8120-8131
2. Basal cell carcinomas	8090-8110
3. Adenocarcinomas	8140-8149, 8160-8163, 8190-8221, 8250-8552, 8570-8576, 8940-8941, 9110
4. Other specific carcinomas	8023, 8030-8046, 8150-8158, 8170-8180, 8230-8249, 8560-8562, 8580-8589
(5) Unspecified carcinomas (NOS)	8010-8015, 8020-8022, 8050
6. <i>Sarcomas</i> and soft tissue tumours	8680-8714, 8800-8921, 8930-8936, 8990-8992, 9040-9045, 9120-9125, 9130-9138, 9141-9252, 9367, 9370-9373, 9540-9582
7. <i>Mesothelioma</i>	9050-9055

Tumours of haematopoietic and lymphoid tissues

8. Myeloid	9840, 9860-9931, 9945-9946, 9950, 9960-9964, 9966, 9975, 9980-9989, 9993
9. B-cell neoplasms	9597, 9671-9699, 9712, 9731-9738, 9761-9767, 9769, 9811-9819, 9823, 9826, 9833, 9836, 9940
10. T-cell and NK-cell neoplasms	9700-9709, 9714-9719, 9724-9726, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11. Hodgkin lymphoma	9650-9667
12. Mast-cell Tumours	9740-9742
13. Histiocytes and Accessory Lymphoid cells	9749, 9750-9759
(14) Unspecified types	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805-9809, 9820, 9832, 9835, 9865, 9967-9968, 9970-9971
15. <i>Kaposi sarcoma</i>	9140
16. <i>Other specified</i> types of cancer	8590-8671, 8720-8790, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9105, 9260-9365, 9380- 9539
(17) <i>Unspecified</i> types of cancer	8000-8005

附錄二 衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第一頁】


申報醫院名稱：		4碼代碼	申報醫院代碼 ^{1.1}
患者資料	病歷號碼 ^{1.2}	姓名 ^{1.3}	身分證統一編號 ^{1.4}
	性別 ^{1.5} ☐ 1 男性。 ☐ 2 女性。 ☐ 3 其他(如：雙性人)。 ☐ 4 變性人。 ☐ 9 不詳。	出生日期 ^{1.6}	戶籍地代碼 ^{1.7}
	診斷年齡 ^{2.1}		
癌症確認	癌症發生順序號碼 ^{2.2}		
	個案分類 ^{2.3} ☐ 0 申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程。 ☐ 1 申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 2 他院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 ☐ 3 他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診或是僅於申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性(maintenance)治療。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。(不需申報) ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。(不需申報) ☐ 9 不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。		
	診斷狀態分類 ^{2.3.1} ☐ 1 於申報醫院診斷。 ☐ 2 於他院診斷，因該癌症於首次療程內/未復發/復發狀況不明下，至申報醫院就診。 ☐ 3 於他院診斷，因該癌症復發或惡化後，才至申報醫院就診。 ☐ 5 屍體解剖時才診斷為癌症。 ☐ 7 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。 ☐ 8 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。		
	治療狀態分類 ^{2.3.2} ☐ 0 未於申報醫院接受任何治療即死亡或病危出院。 ☐ 1 僅於申報醫院接受首次療程，未於他院接受任何首次療程；首次療程僅接受其他治療(other treatment)。 ☐ 2 未於申報醫院接受任何首次療程；主要治療計畫由他院規畫，申報醫院接受部分放射治療或僅執行維持性治療。 ☐ 3 於申報醫院接受部分首次療程，也於他院接受部分首次療程；申報醫院委託他院執行部分放射治療。 ☐ 4 首次療程為不予治療或是再密切觀察；首次療程僅給予非腫瘤切除之緩和性手術、疼痛控制、支持療法、轉介安寧照護。 ☐ 5 首次療程僅為另類治療。 ☐ 6 首次療程為個案拒絕治療。 ☐ 7 他院診斷及治療，因癌症或其治療的併發症至申報醫院求診。 ☐ 8 他院診斷個案，為了其他疾病至申報醫院求診。(不需申報) ☐ 9 首次療程不詳，也無法確認個案拒絕治療。		
	首次就診日期 ^{2.4}		
	最初診斷日期 ^{2.5}		
	原發部位 ^{2.6}		
	側性 ^{2.7} ☐ 0 非成對器官。 ☐ 1 右側。 ☐ 2 左側。 ☐ 3 成對器官，只有單側侵犯，左、右側不詳。 ☐ 4 成對器官，雙側侵犯，側位不詳。 ☐ 5 成對器官，位於身體中線。 ☐ 9 成對器官，側位不詳。		
	組織型態 ^{2.8}		
	性態碼 ^{2.9}		
臨床分級/分化 ^{2.10.1} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；首次治療前未分級/分化；術後才診斷為癌症。			
病理分級/分化 ^{2.10.2} (請參考摘錄手冊附錄 D) ☐ 1 Site-specific grade system category ☐ 2 Site-specific grade system category ☐ 3 Site-specific grade system category ☐ 4 Site-specific grade system category ☐ 5 Site-specific grade system category ☐ L Low grade ☐ H High grade ☐ M Site-specific grade system category ☐ S Site-specific grade system category ☐ A Well differentiated ☐ B Moderately differentiated ☐ C Poorly differentiated ☐ D Undifferentiated, Anaplastic ☐ E Site-specific grade system category ☐ X High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma ☐ 8 不適用(For Lymphomas and Leukemias) ☐ 9 分化/分級不明、病歷未記載；原發部位未接受手術；術前已接受前導性治療。			
癌症確診方式 ^{2.11} ☐ 1 組織病理學確診。 ☐ 2 細胞學確診。 ☐ 3 組織病理學確診加上免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性 (適用組織型態 M9590-9993)。 ☐ 4 經顯微鏡證實，但未描述確診方式。 ☐ 5 實驗室試驗/腫瘤標記檢查為陽性，但未經顯微鏡證實或免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性。 ☐ 6 直接察看診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 7 放射線或其他影像學診斷，但未經顯微鏡證實。 ☐ 8 僅臨床診斷 (不包含 5,6,7)。 ☐ 9 不清楚是否有經顯微鏡證實。			
首次顯微鏡檢查日期 ^{2.12}			

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第二頁】

首次療程	首次手術日期 4.1.1 	申報醫院原發部位手術方式 4.1.4 00 無。 90 有。 99 不詳。 80 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療。 81 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療和切除手術。 82 肝癌個案接受 TAE。 83 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT。 84 肝癌個案接受 RFA。 85 肝癌個案接受 TAE 和切除手術。 86 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT 和切除手術。 87 肝癌個案接受 RFA 和切除手術。 88 肝癌個案接受非上述之局部腫瘤破壞治療。 89 攝護腺癌個案僅接受 Transurethral resection (TURP)。			
	放射治療開始日期 4.2.1.3 	放射治療機構 4.2.1.7 0 無。 1 有。 9 不詳。			
	申報醫院化學治療 4.3.3 	申報醫院化學治療開始日期 4.3.4 			
	00 未接受化學治療，化學治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性化學治療 04 個案原發部位僅接受局部動脈栓化治療(TACE)。 05 個案原發部位接受 TACE 及全身性化學治療。 06 個案原發部位接受 TACE 及其他局部性化學治療。 07 個案原發部位接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療。 08 個案僅接受局部性化學治療(不包含 TACE)。 09 個案同時接受全身性及局部性化學治療(不包含 TACE)。 10 轉移性肝癌個案接受 TACE。 11 轉移性肝癌個案接受 TACE 及全身性化學治療。 12 轉移性肝癌個案接受 TACE 及其他局部性化學治療。		13 轉移性肝癌個案接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療。 20 僅接受臨床試驗化學治療。 21 同時接受非臨床試驗化學治療及臨床試驗化學治療。 30 僅接受雙盲試驗化學治療。 31 同時接受非試驗性化學治療及雙盲試驗化學治療。 88 化學治療雖是既定之首次療程計畫，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。		
	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療 4.3.6 	申報醫院荷爾蒙/類固醇治療開始日期 4.3.7 			
	00 無。 01 有。 99 不詳。 20 僅接受臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 21 同時接受非臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療及臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。 30 僅接受雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 31 同時接受非試驗性荷爾蒙/類固醇治療及雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。 88 荷爾蒙/類固醇治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。				
	申報醫院免疫治療 4.3.9 	申報醫院免疫治療開始日期 4.3.10 			
	00 未接受免疫治療，免疫治療非首次療程的一部份。 01 接受全身性免疫治療。 02 接受局部性免疫治療。 03 接受全身性與局部性免疫治療。 20 僅接受臨床試驗免疫治療。 21 同時接受非臨床試驗全身性/與局部性免疫治療及臨床試驗免疫治療。		30 僅接受雙盲試驗免疫治療。 31 同時接受非試驗性全身性/與局部性免疫治療及雙盲試驗免疫治療。 88 免疫治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。 99 不詳。		
	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置 4.3.11 	申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置開始日期 4.3.12 			
	00 無。 99 不詳。 10 骨髓移植。 20 幹細胞治療。 30 手術/放射線之內分泌處置。 40 合併手術/放射線之內分泌處置及骨髓移植/幹細胞治療(即 30 合併 10、20 中任一種治療)。 88 骨髓/幹細胞移植或內分泌處置雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。				
申報醫院標靶治療 4.3.14 	申報醫院標靶治療開始日期 4.3.15 				
00 無。 01 有。 99 不詳。 20 有接受臨床試驗標靶治療。 21 有接受非臨床試驗標靶治療及臨床試驗標靶治療。 30 僅接受雙盲試驗標靶治療。		31 同時接受非試驗性及雙盲試驗標靶治療。 88 標靶治療雖是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。			
申報醫院緩和照護 4.4 	0 無。 7 有或轉介/安寧療護。 9 不詳。				
其他治療 4.5.1 	其他治療開始日期 4.5.2 				
00 無。 99 不詳。 01 個案在申報醫院於首次療程中接受其他治療。 02 個案在他院於首次療程中接受其他治療。 03 個案在申報醫院及他院於首次療程中接受其他治療。					
摘錄者 6.1 					
其他因子	身高 7.1 	體重 7.2 	吸菸行為 7.3 	嚼檳榔行為 7.4 	喝酒行為 7.5
	1-2 碼為每日吸菸量(以支為單位)： 00 無 01-89 吸菸支數 90 ≥90 支 91 偶爾吸 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為吸菸年：以實際吸菸年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒菸年：以實際戒菸年編碼 00 無戒菸或戒菸少於30天 88 無吸菸 98 已戒，年不詳 99 不詳				
	1-2 碼為每日嚼檳榔量(以顆為單位)： 00 無 01-89 嚼檳榔顆數 90 ≥90 顆 91 偶爾嚼 98 有，量不詳 99 不詳 3-4 碼為嚼檳榔年：以實際嚼檳榔年編碼 00 無 98 有，年不詳 99 不詳 5-6 碼為戒嚼檳榔年：以實際戒嚼檳榔年編碼 00 無戒嚼檳榔或戒菸少於30天 88 無嚼檳榔 98 已戒，年不詳 99 不詳				
	000 從未喝酒 001 已戒 002 偶爾喝(不論年數) 003 習慣性喝酒<10 年 004 習慣性喝酒≥10 年 009 習慣性喝酒，但年數不詳 999 病歷未記載或不詳				

附錄三 台灣人口年齡組成圖，民國 108 年

POPULATION DEMOGRAPHY OF TAIWAN IN 2019



附錄四 1976 年、2000 年世界標準人口

年齡（歲）	世界標準人口數	
	1976 年	2000 年
0 – 4	12,000	8,800
5 – 9	10,000	8,700
10 – 14	9,000	8,600
15 – 19	9,000	8,500
20 – 24	8,000	8,200
25 – 29	8,000	7,900
30 – 34	6,000	7,600
35 – 39	6,000	7,200
40 – 44	6,000	6,600
45 – 49	6,000	6,000
50 – 54	5,000	5,400
55 – 59	4,000	4,600
60 – 64	4,000	3,700
65 – 69	3,000	3,000
70 – 74	2,000	2,200
75 – 79	1,000	1,500
80 – 84	500	900
85 以上	500	600
合 計	100,000	100,000

註：1976 年 (同 Segi 1960) 與 2000 年世界標準人口請參考 World Health Organization's publication: [Discussion Paper 31: Age Standardization of Rates: A New WHO Standard \(PDF\)](#)

附錄五 WHO 2017 血液腫瘤分類表

WHO 2017 血液腫瘤分類表

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	2017 WHO Classification	ICD-O-3 codes
Leukemia and myeloid neoplasm , total		
AML		
AML with recurrent genetic abnormalities	98653/98663/98693/98713/ 98773/98783/98793 /98963/98973/99113/ 99123	98653/98663/98693/98713/98963/98973/99113
AML with myelodysplasia-related changes	98953	98953
Therapy-related myeloid neoplasms	99203	99203
Acute myeloid leukemia, NOS	98613	98613
Other acute myeloid leukemia	98403/98673/98703/98723/98733/98743/ 98913/99103/99313	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313
Myeloid sarcoma	99303	99303
Myeloid proliferations related to Down Syndrome	98983	98983
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	97273	97273
ALL		
B lymphoblastic leukemia / lymphoma	98113/98123/98133/98143/98153/98163/ 98173/98183/ 98193	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/ 98353/98363
T lymphoblastic leukemia / lymphoma	98373	98373
CML*	98753	98753
CLL	98233	98233
Acute leukemias of ambiguous lineage	98013/98063/98073/98083/98093	98013/98063/98073/98083/98093
Myeloproliferative neoplasms	97401/97403/97413/97423/98633/98763/ 99453/99463/99503/99613/99623/99633/ 99643/99653/99663/99673/ 99683 /99753	97401/97403/97413/97423/99453/ 98633/98763/99463/99503/ 99603 / 99613/99623/99633/99643/99653/ 99663/99673/99753
Myelodysplastic syndromes	99803/99823/99833/99853/99863/99893/ 99913/99923/ 99933	99803/99823/99833/ 99843 /99853/ 99863/ 99873 /99893/99913/99923
Acute biphenotypic leukemia	-	98053
Other Leukemia	-	98203/98323/98603
Leukemia, NOS	-	98003
Lymphoid neoplasms, total		
Hodgkin lymphoma	96503/96513/96523/96533/96543/96553/ 96593/96633	96503/96513/96523/96533/96593/ 96613/96623 /96633/ 96643/96653/96673
Non-Hodgkin lymphoma		
B-cell lymphoid neoplasms		
Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	96893/96993	96893/96993
Lymphoplasmacytic lymphoma	96713/97613	96713/97613
Follicular lymphoma	95973/96903	95973/ 96753 /96903/ 96913/96953/96983
Mantle cell lymphoma	96733	96733
Burkitt lymphoma	96873	96873/ 98263
Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	96803/96843/96883/97123/97353/97373/ 97383	96803/96843/96883/97123/97353/ 97373/97383
Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	96793	96793
Other B-cell lymphomas	95963/96783/97623/ 97663 /98333/99403	95963/ 96703 /96783/ 97283 /98333/ 99403
T/NK-cell lymphoid neoplasms		
Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	97193	97193
Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides/Sézary syndrome)	97003/97013/97093/97183/97263	97003/97013/97093/97183/97263
Enteropathy-type T-cell lymphoma	97173	97173
Hepatosplenic T-cell lymphoma	97163	97163
Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	97083	97083
Peripheral T-cell lymphoma, NOS	97023	97023
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	97053	97053
Anaplastic large cell lymphoma	97143/ 97153	97143
Adult T-cell lymphoma/leukemia	98273	98273
Other T-cell lymphomas	97243/98313/98343/99483	97243/ 97293 /98343/99483
Plasma cell neoplasm	97313/97323/97343	97313/97323/ 97333 /97343
Histiocytic and dendritic cell neoplasms	97493 /97513/97553/97563/97573/97583/ 97593	97513/97553/97563/97573/97583/ 97593
Malignant lymphoma, NOS and others	-	95903/95913/97503/97543/97603/97643

* CML : Only BCR-ABL1-positive.

附錄六 108 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布

口腔之其他及 未詳細說明部位	ICD-O-FT	英文描述	個案數	百分比
頰黏膜	1450	Cheek mucosa	1589	65.58
口前庭、齒槽溝、頰溝、 唇溝	1451	Vestibule of mouth, Alveolar sulcus, Buccal sulcus, Labial sulcus	16	0.66
硬顎	1452	Hard palate	133	5.49
軟顎	1453	Soft palate	320	13.21
懸雍垂	1454	Uvula	21	0.87
顎	1455	Palate, NOS	26	1.07
臼後區	1456	Retromolar area	191	7.88
包含上述兩個或以上 次分類	1458	Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth	83	3.43
口腔未詳細說明部位	1459	Mouth, NOS	44	1.82

附錄七 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版分類標準

頭頸癌除依照ICD-O-3的口腔、口咽、下咽分類外，亦依照Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版所定義的口腔、口咽、下咽分類進行統計分析，以符合臨床上的判定準則。兩種分類標準各細部位的比較如下表：

Head and Neck Surgery and Oncology, 3 rd (p.19-p.21)	癌症部位	ICD-O-3 分類 (p.6-p.17)
Oral cavity	C00 Lip	Oral cavity
	C02 Other and unspecified parts of tongue (<i>excludes C024</i>)	
	C03 Gum	
	C04 Floor of mouth	
	C050 Hard palate	
	C058 Overlapping lesion of palate	
	C059 Palate, NOS	
	C06 Other and unspecified parts of mouth	
Oropharynx	C01 Base of tongue	Oropharynx
	C024 Lingual tonsil	
	C051 Soft palate, NOS (<i>excludes nasopharyngeal surface of soft palate C113</i>)	
	C052 Uvula	
	C09 Tonsil	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C10 Oropharynx	
Hypopharynx	C142 Waldeyer ring	Hypopharynx
	C148 Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx	
	C12 Pyriform sinus	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
	C13 Hypopharynx	
	C140 Pharynx, NOS	

民國 108 年

長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

民國 108 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

前 言.....	xxxiii
長表資料處理流程.....	xxxviii
民國 108 年主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程	xlvi
貳、癌症期別分類統計表	501
□ 口腔癌.....	502
表一之一 □ 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	502
表一之二 □ 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之三 □ 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	504
表一之四 □ 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	505
表一之五 □ 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	505
□ 咽癌.....	508
表二之一 □ 咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	508
表二之二 □ 咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	510
表二之三 □ 咽癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類	512
表二之四 □ 咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	513
表二之五 □ 咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	514
表二之六 □ 咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	515
表二之七 □ 咽癌(P16-)發生人數按整併期別及治療方式分類	516
表二之八 □ 咽癌(P16-) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	517
表二之九 □ 咽癌(P16-) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	518
表二之十 □ 咽癌(P16-) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	519
下咽癌.....	522
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	522
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	524
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	525
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	525
喉癌	528
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	528
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類	530

表四之三 喉癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	530
表四之四 喉癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	531
表四之五 喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	531
主唾液腺癌.....	534
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	534
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	536
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	536
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	537
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	537
鼻咽癌.....	540
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	540
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	542
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	542
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	543
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	543
食道癌.....	546
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	546
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	548
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	549
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	550
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	551
胃癌	554
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	554
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類	556
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	557
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	558
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	559
結腸癌.....	562
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	562
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	564
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	565

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	566
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	567
直腸癌.....	570
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	570
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類.....	572
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	573
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	574
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	575
肝癌	578
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	578
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	580
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	582
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	584
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類.....	586
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類	588
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類.....	588
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類....	589
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	589
肺癌	592
表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	592
表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	594
表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	596
表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	598
表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	598

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按肺小細胞癌的分期系統及治療方式分類.....	600
表十二之八 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	600
乳癌	602
表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類.....	602
表十三之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	604
表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	607
表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	610
子宮頸癌	616
表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	616
表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	618
表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	619
表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	620
表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	621
表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	622
表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類	623
表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	623
表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	624
表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	625
子宮體癌	628
表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	628
表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類	630
表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	630
表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	631
表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	632
卵巢癌	636
表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	636
表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類	638

表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	638
表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	639
表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類	640
攝護腺癌	644
表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	644
表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	648
表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	650
表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	650
膀胱癌	654
表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	654
表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別之治療方式分類	658
表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	658
表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類	660
表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類	660
惡性淋巴瘤	664
表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類	664
表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	666
表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	667
表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類	668
表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 ..	669

前 言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。我國於民國 68 年開始，即由衛生福利部實施癌症登記計畫，針對 50 床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料(稱為**台灣癌症登記短表資料庫**)為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國 85 年 7 月，由衛生福利部委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』(**Cancer Registry System, CRS**)，以接續進行癌症資料收集、與資料品質監測工作，期建立完整之台灣癌症登記系統。參與**短表資料庫**申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣所有癌症部位之侵襲癌與原位癌個案，欄位包含人口學、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位；此一全國癌症資料庫可了解我國各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

因癌症防治法於民國 92 年 5 月 21 日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

為將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國 90 年國民健康署開始獎勵 15 家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」(**Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB**)進行籌備，並參考美國外科醫學會(**American College of Surgeons**)癌症諮詢委員會(**Commission on Cancer**)所出版的 **FORDS** (**Facility Oncology Registry Data Standards**)，規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國 92 年另成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作(稱為**台灣癌症登記長表資料庫**)，收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料。建構台灣**長表資料庫**，主要目的為收集並追蹤在各醫院**癌症分期與詳細治療或復發**等重要癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

「台灣癌症中心資料庫」初期僅收錄六種癌症部位，民國 91 年參與申報的醫院為 15 家，其中子宮頸癌為必要申報癌症項目，其他 5 種癌症包括：口腔癌(含口咽及下咽)、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至 27 家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療資料；長表癌症資料所收錄之 91-93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之“試辦期”，94-95 年之新診斷資料可視為“穩定期”，此

兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於”試辦期”階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至”穩定期”(94-95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，**長短表資料庫整合為一**，由『**癌症登記中心**』負責全國長短表癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應FORDS版本之修訂，國民健康署於95年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容更依申報詳細和摘要診療資料區分為95與33欄位，各醫院自民國96年1月1日起新診斷的癌症個案全面改採「96年版」癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至95欄位，短表申報項目則增加至33欄位，其中50床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等6種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之”推展期”。另自97年新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍；再於98年起，新增主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤等，以及102年起新增喉癌共16大癌症收錄長表資料。

考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表癌症登記資料庫內，故國民健康署因應癌症診療實務與品質提升需要，於民國99年委託台灣癌症登記學會組成「癌症登記摘錄手冊修訂小組」來規劃及研擬符合我國收錄之前述15大癌症部位特定因子（Site-Specific Factors，簡稱SSF）摘錄內容，其收錄分類包括：(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記（例如：結直腸癌之CEA）、(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標（例如：乳癌之HER2）、(3)治療效果評估、(4)決定存活之極重要的治療副作用（例如：血癌之GVHD）、(5)影響預後的手術病理特徵（例如：結直腸癌之Perineural invasion）等。同時，基於公共衛生的考量，國民健康署亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數（BMI）等致癌因子收錄於「100年版」癌症登記摘錄手冊；故自民國100年1月1日起新診斷的癌症個案全面採用100年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至114欄位，短表申報項目新增為42欄位。

為因應AJCC第八版癌症分期手冊應用於民國107年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國107年1月1日起新診斷的癌症個案全面採用107年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至115欄位，短表新增為45欄位。

台灣癌症登記長表資料庫自民國92年開始收錄91年後新發診斷癌症個案資料，迄今已收錄91-106年新發診斷個案共計951,974筆資料（91年15家申報醫院、92年17家申報醫院、93年30家申報醫院、94年33家申報醫院、95年的33家申報醫院、96年的43家申報醫院、97年的44家申報醫院、98年的54家申報醫院、99年的76家申報醫院、100年的78家、101年的79家、102年的81家、103年的88家、104年的93家、105年的96家、106

年的97家、107年的98家以及108年的101家，名單詳見102-108年參與長表申報醫院名單）；其中94-96與98年資料經統計分析後，選取期別相關資料回饋各醫院以供參考。經大家努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故自97年資料起加入年報，以提供更完整之參考。

本報告針對資料庫中108年16大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。

102-108年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
國立臺灣大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
三軍總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院仁愛院區	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	*	*	*	*	*	*	*
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立萬芳醫院－委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部桃園醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺中醫院	*	*	*	*	*	*	*
中山醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺中榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院中港分院	*	*	*	*	*	*	*
光田醫療社團法人光田綜合醫院（合併大甲分院）	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部豐原醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*	*	*	*
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大醫院	*	*	*	*	*	*	*
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
寶建醫療社團法人寶建醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
大千綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
安泰醫療社團法人安泰醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺南醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部屏東醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部彰化醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺北醫院	*	*	*	*	*	*	*
東元綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
林新醫療社團法人林新醫院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立大同醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
國立陽明大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	*	*	*	*	*	*	*
敏盛綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
郭綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
新北市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院中興院區	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院平等院區	*	*	*	*	*	*	*
聯新國際醫院	*	*	*	*	*	*	*
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫院財團法人新竹國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教耕莘醫院永和分院	*	*	*	*	*	*	*
員生醫院	*	*	*	*			
臺北市立聯合醫院和平院區		*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院婦幼院區		*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院忠孝院區		*	*	*	*	*	*
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院		*	*	*	*	*	*
衛生福利部苗栗醫院		*	*	*	*	*	*
衛生福利部南投醫院		*	*	*	*	*	*
輔英科技大學附設醫院		*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院			*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院			*	*	*	*	*
臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營			*	*	*	*	*
國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處			*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大癌治療醫院			*	*	*	*	*
亞洲大學附屬醫院				*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院				*	*	*	*
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院				*	*		
臺中榮民總醫院嘉義分院				*	*	*	*
中國醫藥大學北港附設醫院					*		
天主教輔仁大學附設醫院						*	*
中國醫藥大學新竹附設醫院						*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院							*
新竹臺大分院生醫醫院							*
國軍臺中總醫院							*
義大醫療財團法人義大大昌醫院							*

* 表示當年度有參與長表申報

長表資料處理流程

一、申報個案條件

具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」，其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 - 個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。 - 個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 - 個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。 - 個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。 - 個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。 - 個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。 - 個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。 - 個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。 - 個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。

Case	Includes
	- 個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診斷與治療。 - 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。（不須申報）
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。（不須申報）
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症（death certificate only, DCO）。（不須申報）
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 - 不清楚之前是否有確診。 - 不清楚之前是否有治療過。 - 之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

- (1)可分析個案：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。
- (2)不分析個案：個案分類為 0、3－9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合（stage group）。

臨床醫師必須記錄可分析個案（個案分類編碼 1 或 2 者）之所有具足夠的 AJCC 編碼訊息（coding scheme）及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時，癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息：

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合，則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根（prefix/suffix descriptor）。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義，請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發，則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定，則記錄為不詳（999）。
- 當個案有多原發且有轉移，切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移，則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後，若醫師可確認何者原發有轉移時，則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期（pediatric staging）而 AJCC 分期不適用時，臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888（不適用）。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時，則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程（first course of treatment）包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候，則「沒有治療（No therapy）」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發（Cancer recurrence）：個案必須先經過一段無病期間（disease-free interval）或緩解（remission），亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後，病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療（Palliative therapy）：世界衛生組織敘述所謂緩和照護（palliative care）為藉由預防或減輕疼痛，以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

一般首次療程起始於最初診斷日四個月內。

- 若個案在申報醫院診斷，於「最初診斷日期」四個月內未接受治療，而在「最初診斷日期」後四個月至一年內，且臨床期別 T、N、M 皆無惡化(T1a 演變至 T1b 視為無惡化)或復發時，則此一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。
- 若個案在外院診斷且不論是否有治療計畫，於「最初診斷日期」四個月內所開始執行的治療，才視為首次療程。換句話說，若個案在他院診斷但未接受治療且超過最初診斷日期四個月後才至申報醫院，則個案於申報醫院所接受的治療，均不可記錄為首次療程。除非申報醫院病歷內容可證實此期間個案臨床期別 T、N、M 皆無惡化或復發，則於一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部分。
- 出院計畫（discharge plan）是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引（established protocol）或經過共識的處置指引（accepted management guidelines）可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，不知癌病是否惡化或復發時，且同時無法諮詢到主責醫師時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療（subsequent treatment），不可記錄於首次療程。

若腫瘤未惡化的前提下，因治療毒性或副作用而修改治療，仍屬首次療程；導引/前導性輔助（Induction or Neoadjuvant therapy）後腫瘤未惡化但對治療反應不佳，而修改治療，仍屬首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 108 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

(1) 個案分類：於申報醫院或外院診斷，且在申報醫院接受首次療程之個案，即個案分類條件為 **1 或 2 者**（請參考 P.xii 個案分類之定義）

(2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
□ 腔 Oral cavity	C00.0-C00.9	Lip
	C02.0-C02.3、C02.8-C02.9	Other and unspecified parts of tongue
	C03.0-C03.1、C03.9	Gum
	C04.0-C04.1、C04.8-C04.9	Floor of mouth
	C05.0	Hard palate
	C05.8-C05.9	Overlapping lesion of palate / Palate
	C06.0-C06.2、C06.8-C06.9	Other and unspecified parts of mouth
□ 咽 Oropharynx P16 分類方式： - 以 AJCC 8 第 10 章 申報視為 P16+ - 其餘 AJCC 章節申報 視為 P16-	C01.9	Base of tongue
	C02.4	Lingual tonsil
	C05.1	Soft palate
	C05.2	Uvula
	C09.0-C09.1、C09.8-C09.9	Tonsil
	C10.0-C10.4、C10.8-C10.9	Oropharynx
	C14.2 C14.8	Waldeyer ring Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
下咽 Hypopharynx	C12.9	Pyriform sinus
	C13.0-C13.2、C13.8-C13.9	Hypopharynx
	C14.0	Pharynx, NOS
唾液腺 Salivary	C07.9	Parotid gland
	C08.0	Submandibular gland
	C08.1	Sublingual gland
	C08.9	Major salivary gland, NOS
鼻咽 Nasopharynx	C11.0-C11.9	Nasopharynx
食道 Esophagus	C15.0-C15.5、C15.8-C15.9	Esophagus
胃 Stomach	C16.0-C16.6、C16.8-C16.9	Stomach

癌症部位	ICD-O-3 編碼	
結腸 Colon	C18.0-C18.9	Colon
直腸 Rectum	C19.9 C20.9	Rectosigmoid junction Rectum
肝 Liver	C22.0 C22.1	Liver Intrahepatic bile duct
喉 Larynx	C32.0-C32.3、C32.8-C32.9	Larynx
肺 Lung	C34.0-C34.3、C34.8-C34.9	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C50.0-C50.9	Breast
子宮頸 Cervix	C53.0-C53.1、C53.8-C53.9	Cervix uteri
子宮體 Corpus Uteri	C54.0 C54.1 C54.2 C54.3 C54.9	Isthmus uteri Endometrium Myometrium Fundus uteri Corpus uteri
卵巢 Ovary	C56.9	Ovary
攝護腺 Prostate	C61.9	Prostate gland
膀胱 Bladder	C67.0-C67.9	Bladder
淋巴 Lymphoma	M-code: 9650-9667 M-code: 9596-9597、 9670-9699、9712、9728、 9735-9738、9761-9762、 9766、9826、9833、9940 M-code: 9700-9709、9714- 9726、9729、9827、9831、 9834、9948 M-code: 9751-9759 M-code: 9590-9591、 9750、-9760、9764	Hodgkin lymphoma Non-Hodgkin B-cell lymphoma Non-Hodgkin T/NK-cell lymphoma Histiocytic and dendritic cell neoplasms Other Malignant lymphoma (不包含 Plasma cell neoplasm，且 9725、9971 不再視為惡性)

(3)各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織形態編碼為 9140、9590-9993。(白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等)

「可分析個案」為診斷年 108 年長表個案，108 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表，108 年共 141,777 筆。長表資料庫內「申報 1 筆個案」直接納入分析，而「重複申報」的個案，則取重複個案當中，以相同身分證字號加上相同癌症部位別，且每一筆申報資料臨床期別相同者，才納入分析。最後實際分析個案為 100,808 人，佔所有可分析申報個案的 95.07%。

108 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

癌症部位 [†]	長短表 申報筆數	長表 申報筆數(%)* [†]	長表資料庫可分析筆數 [‡]					實際分 析筆數	醫院 家數
			申報 筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 3 筆以上			
□ 腔 癌	8608	8319	96.64	6334	5900	428	6	6096	100
□ 咽 癌	2272	2206	97.10	1732	1608	124	0	1661	92
下 咽 癌	1672	1610	96.29	1230	1150	80	0	1189	89
喉 癌	1142	1117	97.81	851	801	50	0	822	89
主唾液腺癌	421	406	96.44	329	291	38	0	308	70
鼻 咽 癌	2277	2205	96.84	1555	1427	122	6	1487	97
食 道 癌	4267	4031	94.47	2747	2587	160	0	2656	99
胃 癌	5416	5006	92.43	3534	3335	196	3	3423	99
結 腸 癌	17143	16031	93.51	13466	12914	546	6	13169	101
直 腸 癌	8912	8361	93.82	6728	6270	434	24	6471	100
肝 癌	14235	13666	96.00	9822	9373	434	15	9566	100
肺 癌	21066	20272	96.23	16094	14605	1370	119	15285	100
乳 癌	24596	23501	95.55	18918	15452	3282	184	17036	101
子 宮 頸 癌	5426	5103	94.05	4240	4027	204	9	4119	100
子 宮 體 癌	4272	4108	96.16	3250	3018	232	0	3129	99
卵 巢 癌	1934	1898	98.14	1636	1497	136	3	1559	88
攝 護 腺 癌	9258	8585	92.73	6816	6085	716	15	6406	99
膀 胱 癌	4599	4218	91.72	3664	3338	308	18	3455	100
惡性淋巴瘤	4261	4160	97.63	3093	2885	196	12	2971	99
合 計	141777	134803	95.08	106039	96563	9056	420	100808	101
				(100.0%)	(91.06%)	(8.54%)	(0.40%)	(95.07%)	

[†]肺癌不含 C33 (Trachea)、卵巢癌不含 C57.0-C57.4 (Fallopian tube)。

^{*}長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

[†]長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

[‡]可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 108 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

五、整併期別與治療組合分類說明

各癌別 AJCC 第八版整併期別流程與婦癌 FIGO 期別、惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別處理流程請參考下頁圖 1-4。自 100 年起，治療組合分析新增「**標靶治療**」與「**局部化療**」兩項目；且於 104 年起，乳癌與攝護腺癌接受「**荷爾蒙治療**」均改以「**內分泌治療**」來呈現。另自 107 年起，治療組合分析可區分**免疫治療**為「**局部性**」或「**全身性**」兩類。

所有可分析個案之治療組合：若於首次療程中**未**接受任何治療方式或拒絕治療，視為「未有首次治療申報紀錄」；於首次療程中**僅接受**為緩解或減輕症狀之照護方式（不包括緩和性手術、放療或化療等），才視為「緩和照護」。自 107 年起，若治療組合描述為"OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

民國 108 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程

圖 1 為 108 年度各癌 AJCC 整併期別流程(不包含惡性淋巴瘤)：




圖 1、108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明

圖 2 為 108 年度子宮頸癌 FIGO 期別：




圖 2、108 年度子宮頸癌 FIGO 臨床期別之整併流

圖 3 為 108 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別




圖 3、108 年度子宮體癌、卵巢癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 4 為 108 年度惡性淋巴瘤期別




圖 4、108 年度惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之處理流程說明

貳、癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6096	100.00	5503	100.00	593	100.00	4203	100.00	1893	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.02	0	0.00	1	0.17	1	0.02	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	7	0.11	5	0.09	2	0.34	6	0.14	1	0.05
25-29 歲	19	0.31	12	0.22	7	1.18	15	0.36	4	0.21
30-34 歲	45	0.74	40	0.73	5	0.84	25	0.59	20	1.06
35-39 歲	182	2.99	169	3.07	13	2.19	125	2.97	57	3.01
40-44 歲	427	7.00	399	7.25	28	4.72	275	6.54	152	8.03
45-49 歲	713	11.70	674	12.25	39	6.58	502	11.94	211	11.15
50-54 歲	908	14.90	855	15.54	53	8.94	638	15.18	270	14.26
55-59 歲	1038	17.03	981	17.83	57	9.61	747	17.77	291	15.37
60-64 歲	1001	16.42	925	16.81	76	12.82	689	16.39	312	16.48
65-69 歲	823	13.50	721	13.10	102	17.20	557	13.25	266	14.05
70-74 歲	405	6.64	330	6.00	75	12.65	278	6.61	127	6.71
75-79 歲	295	4.84	230	4.18	65	10.96	201	4.78	94	4.97
80-84 歲	130	2.13	99	1.80	31	5.23	85	2.02	45	2.38
85 歲以上	102	1.67	63	1.14	39	6.58	59	1.40	43	2.27
臨床期別										
0 期	33	0.54	26	0.47	7	1.18	18	0.43	15	0.79
I 期	1459	23.93	1279	23.24	180	30.35	968	23.03	491	25.94
II 期	1037	17.01	919	16.70	118	19.90	712	16.94	325	17.17
III 期	669	10.97	618	11.23	51	8.60	455	10.83	214	11.30
IV M0	2192	35.96	2026	36.82	166	27.99	1578	37.54	614	32.44
IV M1	52	0.85	44	0.80	8	1.35	34	0.81	18	0.95
不詳	654	10.73	591	10.74	63	10.62	438	10.42	216	11.41
病理期別										
0 期	66	1.08	53	0.96	13	2.19	32	0.76	34	1.80
I 期	1811	29.71	1605	29.17	206	34.74	1238	29.46	573	30.27
II 期	1019	16.72	922	16.75	97	16.36	720	17.13	299	15.80
III 期	626	10.27	564	10.25	62	10.46	430	10.23	196	10.35
IV M0	1728	28.35	1602	29.11	126	21.25	1281	30.48	447	23.61
IV M1	10	0.16	10	0.18	0	0.00	8	0.19	2	0.11
不詳	836	13.71	747	13.57	89	15.01	494	11.75	342	18.07

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6096	100.00	5503	100.00	593	100.00	4203	100.00	1893	100.00
整併期別 ¹										
0 期	66	1.08	53	0.96	13	2.19	33	0.79	33	1.74
I 期	1882	30.87	1667	30.29	215	36.26	1282	30.50	600	31.70
II 期	1057	17.34	952	17.30	105	17.71	744	17.70	313	16.53
III 期	670	10.99	611	11.10	59	9.95	452	10.75	218	11.52
IV M0	2210	36.25	2034	36.96	176	29.68	1565	37.24	645	34.07
IV M1	49	0.80	41	0.75	8	1.35	31	0.74	18	0.95
不詳	162	2.66	145	2.63	17	2.87	96	2.28	66	3.49
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.5402									
治療方式 ^{3,4}										
手術	3106	50.95	2759	50.14	347	58.52	2130	50.68	976	51.56
手術合併化療與放療	1352	22.18	1246	22.64	106	17.88	956	22.75	396	20.92
手術合併放療	635	10.42	587	10.67	48	8.09	442	10.52	193	10.20
手術合併化療	334	5.48	309	5.62	25	4.22	260	6.19	74	3.91
同步化療與放療或/與標 靶治療	262	4.30	240	4.36	22	3.71	150	3.57	112	5.92
非同步化療與放療或/與 標靶治療	43	0.71	39	0.71	4	0.67	28	0.67	15	0.79
放療	56	0.92	48	0.87	8	1.35	20	0.48	36	1.90
化療或/與標靶治療	123	2.02	110	2.00	13	2.19	87	2.07	36	1.90
緩和治療	38	0.62	34	0.62	4	0.67	17	0.40	21	1.11
未有首次治療申報紀錄	13	0.21	10	0.18	3	0.51	7	0.17	6	0.32
其他治療	134	2.20	121	2.20	13	2.19	106	2.52	28	1.48
組織型態										
鱗狀細胞癌	5970	97.93	5417	98.44	553	93.25	4120	98.03	1850	97.73
唾液腺癌	46	0.75	21	0.38	25	4.22	36	0.86	10	0.53
其他特定上皮癌	11	0.19	5	0.09	6	1.01	9	0.21	2	0.11
非特定上皮癌	12	0.20	10	0.18	2	0.34	5	0.12	7	0.37
黏膜惡性黑色素瘤	5	0.08	5	0.09	0	0.00	5	0.12	0	0.00
軟組織肉瘤	14	0.23	12	0.22	2	0.34	9	0.21	5	0.26
其他惡性腫瘤	38	0.62	33	0.60	5	0.84	19	0.45	19	1.00

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.504-505)。

註 4：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口腔癌

表一之二 口腔癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6096	3106	50.95	1352	22.18	635	10.42	334	5.48	262	4.30	43	0.71	56	0.92	123	2.02	38	0.62	13	0.21	134	2.20
0 期	66	63	95.45	0	0.00	1	1.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.52	1	1.52
I 期	1882	1702	90.44	27	1.43	51	2.71	77	4.09	5	0.27	0	0.00	1	0.05	7	0.37	1	0.05	2	0.11	9	0.48
II 期	1057	799	75.59	67	6.34	78	7.38	73	6.91	14	1.32	1	0.09	9	0.85	4	0.38	0	0.00	1	0.09	11	1.04
III 期	670	202	30.15	198	29.55	178	26.57	49	7.31	14	2.09	3	0.45	6	0.90	5	0.75	6	0.90	0	0.00	9	1.34
IV M0	2210	230	10.41	1052	47.60	320	14.48	120	5.43	226	10.23	29	1.31	34	1.54	83	3.76	21	0.95	6	0.27	89	4.03
IV M1	49	0	0.00	2	4.08	0	0.00	2	4.08	1	2.04	10	20.41	5	10.20	19	38.78	5	10.20	0	0.00	5	10.20
不詳	162	110	67.90	6	3.70	7	4.32	13	8.02	2	1.23	0	0.00	1	0.62	5	3.09	5	3.09	3	1.85	10	6.17

表一之三 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	254	128	50.39	64	25.20	31	12.20	9	3.54	10	3.94	0	0.00	2	0.79	6	2.36	0	0.00	0	0.00	4	1.57
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	91	84	92.31	0	0.00	5	5.49	2	2.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	35	29	82.86	2	5.71	2	5.71	1	2.86	1	2.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	29	7	24.14	14	48.28	6	20.69	2	6.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	90	3	3.33	48	53.33	18	20.00	3	3.33	9	10.00	0	0.00	2	2.22	4	4.44	0	0.00	0	0.00	3	3.33
IV M1	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	7	5	71.43	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口腔癌

表一之四 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3086	1511	48.96	789	25.57	312	10.11	175	5.67	131	4.24	19	0.62	13	0.42	53	1.72	14	0.45	3	0.10	66	2.14
0 期	35	34	97.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.86
I 期	909	826	90.87	18	1.98	14	1.54	36	3.96	3	0.33	0	0.00	1	0.11	5	0.55	0	0.00	1	0.11	5	0.55
II 期	542	399	73.62	37	6.83	43	7.93	47	8.67	6	1.11	0	0.00	2	0.37	1	0.18	0	0.00	0	0.00	7	1.29
III 期	343	94	27.41	110	32.07	99	28.86	25	7.29	7	2.04	1	0.29	1	0.29	2	0.58	1	0.29	0	0.00	3	0.87
IV M0	1158	99	8.55	619	53.45	153	13.21	61	5.27	113	9.76	13	1.12	7	0.60	36	3.11	10	0.86	1	0.09	46	3.97
IV M1	21	0	0.00	2	9.52	0	0.00	1	4.76	0	0.00	5	23.81	2	9.52	9	42.86	1	4.76	0	0.00	1	4.76
不詳	78	59	75.64	3	3.85	3	3.85	5	6.41	2	2.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.56	1	1.28	3	3.85

表一之五 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2756	1467	53.23	499	18.11	292	10.60	150	5.44	121	4.39	24	0.87	41	1.49	64	2.32	24	0.87	10	0.36	64	2.32
0 期	31	29	93.55	0	0.00	1	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23	0	0.00
I 期	882	792	89.80	9	1.02	32	3.63	39	4.42	2	0.23	0	0.00	0	0.00	2	0.23	1	0.11	1	0.11	4	0.45
II 期	480	371	77.29	28	5.83	33	6.88	25	5.21	7	1.46	1	0.21	7	1.46	3	0.63	0	0.00	1	0.21	4	0.83
III 期	298	101	33.89	74	24.83	73	24.50	22	7.38	7	2.35	2	0.67	5	1.68	3	1.01	5	1.68	0	0.00	6	2.01
IV M0	962	128	13.31	385	40.02	149	15.49	56	5.82	104	10.81	16	1.66	25	2.60	43	4.47	11	1.14	5	0.52	40	4.16
IV M1	26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.85	1	3.85	5	19.23	3	11.54	8	30.77	4	15.38	0	0.00	4	15.38
不詳	77	46	59.74	3	3.90	4	5.19	7	9.09	0	0.00	0	0.00	1	1.30	5	6.49	3	3.90	2	2.60	6	7.79

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Oral Cavity

**Lip C000–C009, Base of Tongue C019, Other Parts of Tongue C020–C029,
Gum C030–C039, Floor of Mouth C040–C049, Palate C050–C059, Other
Parts of Mouth C060–C069**

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

[SEER Note: Codes 20-27 include shave and wedge resection]

30 Wide excision, NOS

Code 30 includes:

Hemiglossectomy

Partial glossectomy

40 Radical excision of tumor, NOS

41 Radical excision of tumor ONLY

42 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible (marginal, segmental, hemi- or total resection)

43 Combination of 41 WITH resection in continuity with maxilla (partial, subtotal, or total resection)

44 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible and maxilla (marginal, segmental, hemi-, or total resection)

[SEER Note: “In continuity with” or “en bloc” means that all of the tissues were removed during the same

procedure, but not necessarily in a single specimen]

Codes 40–44 include: Total

glossectomy Radical

glossectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-43

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

口咽癌

表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	323	100.00	279	100.00	44	100.00	223	100.00	100	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.31	0	0.00	1	2.27	1	0.45	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	7	2.17	7	2.51	0	0.00	4	1.79	3	3.00
40-44 歲	20	6.19	17	6.09	3	6.82	12	5.38	8	8.00
45-49 歲	27	8.36	24	8.60	3	6.82	17	7.62	10	10.00
50-54 歲	44	13.62	36	12.90	8	18.18	27	12.11	17	17.00
55-59 歲	56	17.34	49	17.56	7	15.91	41	18.39	15	15.00
60-64 歲	65	20.12	53	19.00	12	27.27	44	19.73	21	21.00
65-69 歲	60	18.58	53	19.00	7	15.91	44	19.73	16	16.00
70-74 歲	28	8.67	25	8.96	3	6.82	23	10.31	5	5.00
75-79 歲	9	2.79	9	3.23	0	0.00	5	2.24	4	4.00
80-84 歲	4	1.24	4	1.43	0	0.00	3	1.35	1	1.00
85 歲以上	2	0.62	2	0.72	0	0.00	2	0.90	0	0.00
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	145	44.89	113	40.50	32	72.73	100	44.84	45	45.00
II 期	84	26.01	77	27.60	7	15.91	61	27.35	23	23.00
III 期	76	23.53	73	26.16	3	6.82	52	23.32	24	24.00
IV M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	6	1.86	6	2.15	0	0.00	3	1.35	3	3.00
不詳	12	3.72	10	3.58	2	4.55	7	3.14	5	5.00
病理期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	91	28.17	74	26.52	17	38.64	64	28.70	27	27.00
II 期	12	3.72	12	4.30	0	0.00	8	3.59	4	4.00
III 期	1	0.31	1	0.36	0	0.00	1	0.45	0	0.00
IV M0	1	0.31	1	0.36	0	0.00	1	0.45	0	0.00
IV M1	1	0.31	1	0.36	0	0.00	0	0.00	1	1.00
不詳	217	67.18	190	68.10	27	61.36	149	66.82	68	68.00

表二之一 □咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	323	100.00	279	100.00	44	100.00	223	100.00	100	100.00
整併期別 ¹										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	158	48.92	124	44.44	34	77.27	105	47.09	53	53.00
II 期	78	24.15	72	25.81	6	13.64	60	26.91	18	18.00
III 期	73	22.60	70	25.09	3	6.82	50	22.42	23	23.00
IV M0	1	0.31	1	0.36	0	0.00	1	0.45	0	0.00
IV M1	6	1.86	6	2.15	0	0.00	3	1.35	3	3.00
不詳	7	2.17	6	2.15	1	2.27	4	1.79	3	3.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.2661									
治療方式 ^{3,4}										
手術	25	7.74	22	7.89	3	6.82	15	6.73	10	10.00
手術合併化療與放療	71	21.98	55	19.71	16	36.36	48	21.52	23	23.00
手術合併放療	17	5.26	15	5.38	2	4.55	10	4.48	7	7.00
手術合併化療	15	4.64	14	5.02	1	2.27	13	5.83	2	2.00
同步化療與放療或/與標 靶治療	143	44.27	128	45.88	15	34.09	103	46.19	40	40.00
非同步化療與放療或/與 標靶治療	15	4.64	12	4.30	3	6.82	11	4.93	4	4.00
放療	7	2.17	6	2.15	1	2.27	5	2.24	2	2.00
放療合併標靶治療	9	2.79	7	2.51	2	4.55	6	2.69	3	3.00
化療或/與標靶治療	13	4.02	13	4.66	0	0.00	6	2.69	7	7.00
緩和治療	2	0.62	2	0.72	0	0.00	2	0.90	0	0.00
未有首次治療申報紀錄	1	0.31	1	0.36	0	0.00	0	0.00	1	1.00
其他治療	5	1.55	4	1.43	1	2.27	4	1.79	1	1.00
組織型態										
鱗狀細胞癌	323	100.00	279	100.00	44	100.00	223	100.00	100	100.00

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.512-515)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之二 口咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1338	100.00	1256	100.00	82	100.00	885	100.00	453	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.07	0	0.00	1	1.22	0	0.00	1	0.22
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	7	0.52	5	0.40	2	2.44	5	0.56	2	0.44
35-39 歲	22	1.64	20	1.59	2	2.44	17	1.92	5	1.10
40-44 歲	82	6.13	80	6.37	2	2.44	51	5.76	31	6.84
45-49 歲	164	12.26	156	12.42	8	9.76	111	12.54	53	11.70
50-54 歲	234	17.49	224	17.83	10	12.20	155	17.51	79	17.44
55-59 歲	267	19.96	255	20.30	12	14.63	179	20.23	88	19.43
60-64 歲	240	17.94	222	17.68	18	21.95	163	18.42	77	17.00
65-69 歲	158	11.81	148	11.78	10	12.20	103	11.64	55	12.14
70-74 歲	75	5.61	66	5.25	9	10.98	51	5.76	24	5.30
75-79 歲	53	3.96	50	3.98	3	3.66	31	3.50	22	4.86
80-84 歲	20	1.49	20	1.59	0	0.00	12	1.36	8	1.77
85 歲以上	15	1.12	10	0.80	5	6.10	7	0.79	8	1.77
臨床期別										
0 期	10	0.75	10	0.80	0	0.00	8	0.90	2	0.44
I 期	219	16.37	208	16.56	11	13.41	146	16.50	73	16.11
II 期	175	13.08	167	13.30	8	9.76	129	14.58	46	10.15
III 期	152	11.36	144	11.46	8	9.76	94	10.62	58	12.80
IV M0	606	45.29	575	45.78	31	37.80	395	44.63	211	46.58
IV M1	45	3.36	42	3.34	3	3.66	26	2.94	19	4.19
不詳	131	9.79	110	8.76	21	25.61	87	9.83	44	9.71
病理期別										
0 期	22	1.64	21	1.67	1	1.22	11	1.24	11	2.43
I 期	222	16.59	211	16.80	11	13.41	160	18.08	62	13.69
II 期	101	7.55	92	7.32	9	10.98	73	8.25	28	6.18
III 期	65	4.86	63	5.02	2	2.44	47	5.31	18	3.97
IV M0	129	9.64	123	9.79	6	7.32	97	10.96	32	7.06
IV M1	6	0.45	6	0.48	0	0.00	3	0.34	3	0.66
不詳	793	59.27	740	58.92	53	64.63	494	55.82	299	66.00

表二之二 □咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 (續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1338	100.00	1256	100.00	82	100.00	885	100.00	453	100.00
整併期別 ¹										
0 期	23	1.72	22	1.75	1	1.22	12	1.36	11	2.43
I 期	259	19.36	247	19.67	12	14.63	180	20.34	79	17.44
II 期	183	13.68	171	13.61	12	14.63	131	14.80	52	11.48
III 期	159	11.88	151	12.02	8	9.76	101	11.41	58	12.80
IV M0	608	45.44	577	45.94	31	37.80	397	44.86	211	46.58
IV M1	45	3.36	42	3.34	3	3.66	26	2.94	19	4.19
不詳	61	4.56	46	3.66	15	18.29	38	4.29	23	5.08
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.6113									
治療方式 ^{3,4}										
手術	295	22.05	276	21.97	19	23.17	207	23.39	88	19.43
手術合併化療與放療	184	13.75	172	13.69	12	14.63	122	13.79	62	13.69
手術合併放療	51	3.81	45	3.58	6	7.32	30	3.39	21	4.64
手術合併化療	54	4.04	52	4.14	2	2.44	50	5.65	4	0.88
同步化療與放療或/與標 靶治療	477	35.65	448	35.67	29	35.37	313	35.37	164	36.20
非同步化療與放療或/與 標靶治療	60	4.48	57	4.54	3	3.66	35	3.95	25	5.52
放療	51	3.81	49	3.90	2	2.44	26	2.94	25	5.52
放療合併標靶治療	24	1.79	22	1.75	2	2.44	11	1.24	13	2.87
放療合併化療與免疫治療	5	0.37	5	0.40	0	0.00	4	0.45	1	0.22
化療或/與標靶治療	81	6.05	81	6.45	0	0.00	51	5.76	30	6.62
緩和治療	23	1.72	19	1.51	4	4.88	11	1.24	12	2.65
未有首次治療申報紀錄	4	0.30	4	0.32	0	0.00	1	0.11	3	0.66
其他治療	29	2.17	26	2.07	3	3.66	24	2.71	5	1.10
組織型態										
鱗狀細胞癌	1284	95.96	1223	97.37	61	74.39	849	95.93	435	96.03
唾液腺癌	23	1.72	8	0.64	15	18.29	17	1.92	6	1.32
神經內分泌癌	1	0.07	1	0.08	0	0.00	1	0.11	0	0.00
其他特定上皮癌	2	0.15	1	0.08	1	1.22	2	0.23	0	0.00
非特定上皮癌	12	0.90	11	0.88	1	1.22	6	0.68	6	1.32
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.07	0	0.00	1	1.22	1	0.11	0	0.00
軟組織肉瘤	4	0.30	4	0.32	0	0.00	2	0.23	2	0.44
其他惡性腫瘤	11	0.82	8	0.64	3	3.66	7	0.79	4	0.88

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.516-519)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之三 口咽癌(P16+)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	323	25	7.74	71	21.98	17	5.26	15	4.64	143	44.27	15	4.64	7	2.17	9	2.79	13	4.02	2	0.62	1	0.31	5	1.55
I 期	158	21	13.29	53	33.54	13	8.23	9	5.70	45	28.48	2	1.27	7	4.43	4	2.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.53
II 期	78	0	0.00	12	15.38	3	3.85	6	7.69	50	64.10	3	3.85	0	0.00	2	2.56	2	2.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	73	1	1.37	1	1.37	0	0.00	0	0.00	47	64.38	7	9.59	0	0.00	3	4.11	10	13.70	2	2.74	1	1.37	1	1.37
IV M0	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	6	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	1	16.67	3	50.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	7	3	42.86	4	57.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之四 口咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	6	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50
I 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之五 口咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	147	11	7.48	43	29.25	7	4.76	7	4.76	60	40.82	7	4.76	2	1.36	2	1.36	4	2.72	2	1.36	0	0.00	2	1.36
I 期	82	10	12.20	35	42.68	6	7.32	3	3.66	22	26.83	2	2.44	2	2.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.44
II 期	33	0	0.00	7	21.21	0	0.00	4	12.12	19	57.58	1	3.03	0	0.00	1	3.03	1	3.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	64.29	4	14.29	0	0.00	1	3.57	3	10.71	2	7.14	0	0.00	0	0.00
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之六 口咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	168	14	8.33	27	16.07	10	5.95	8	4.76	77	45.83	8	4.76	5	2.98	7	4.17	9	5.36	0	0.00	1	0.60	2	1.19
I 期	75	11	14.67	18	24.00	7	9.33	6	8.00	22	29.33	0	0.00	5	6.67	4	5.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.67
II 期	41	0	0.00	5	12.20	3	7.32	2	4.88	27	65.85	2	4.88	0	0.00	1	2.44	1	2.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	42	1	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	28	66.67	3	7.14	0	0.00	2	4.76	7	16.67	0	0.00	1	2.38	0	0.00
IV M0	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	5	2	40.00	3	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之七 口咽癌(P16-)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1338	295	22.05	184	13.75	51	3.81	54	4.04	477	35.65	60	4.48	51	3.81	24	1.79	5	0.37	81	6.05	23	1.72	4	0.30	29	2.17
0 期	23	23	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	259	186	71.81	11	4.25	12	4.63	14	5.41	13	5.02	4	1.54	13	5.02	1	0.39	0	0.00	3	1.16	0	0.00	0	0.00	2	0.77
II 期	183	49	26.78	24	13.11	17	9.29	14	7.65	48	26.23	4	2.19	16	8.74	4	2.19	0	0.00	3	1.64	2	1.09	0	0.00	2	1.09
III 期	159	9	5.66	27	16.98	17	10.69	11	6.92	67	42.14	8	5.03	6	3.77	1	0.63	1	0.63	7	4.40	1	0.63	0	0.00	4	2.52
IV M0	608	5	0.82	115	18.91	4	0.66	11	1.81	338	55.59	25	4.11	14	2.30	17	2.80	3	0.49	46	7.57	12	1.97	3	0.49	15	2.47
IV M1	45	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00	3	6.67	15	33.33	0	0.00	0	0.00	1	2.22	18	40.00	6	13.33	0	0.00	1	2.22
不詳	61	23	37.70	6	9.84	1	1.64	4	6.56	8	13.11	4	6.56	2	3.28	1	1.64	0	0.00	4	6.56	2	3.28	1	1.64	5	8.20

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之八 口咽癌(P16-) 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	30	6	20.00	5	16.67	3	10.00	1	3.33	13	43.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	0	0.00	0	0.00	1	3.33
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	5	4	80.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	19	0	0.00	4	21.05	0	0.00	1	5.26	12	63.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	1	5.26
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之九 口咽癌(P16-) 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	747	153	20.48	119	15.93	24	3.21	32	4.28	292	39.09	38	5.09	19	2.54	7	0.94	2	0.27	37	4.95	8	1.07	1	0.13	15	2.01
0 期	15	15	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	140	98	70.00	8	5.71	5	3.57	9	6.43	10	7.14	3	2.14	7	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	96	26	27.08	17	17.71	8	8.33	6	6.25	25	26.04	3	3.13	6	6.25	2	2.08	0	0.00	1	1.04	0	0.00	0	0.00	2	2.08
III 期	89	4	4.49	18	20.22	10	11.24	8	8.99	37	41.57	6	6.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	3.37	0	0.00	0	0.00	3	3.37
IV M0	355	1	0.28	72	20.28	0	0.00	7	1.97	216	60.85	15	4.23	5	1.41	5	1.41	1	0.28	21	5.92	3	0.85	1	0.28	8	2.25
IV M1	28	0	0.00	1	3.57	0	0.00	0	0.00	1	3.57	8	28.57	0	0.00	0	0.00	1	3.57	11	39.29	5	17.86	0	0.00	1	3.57
不詳	24	9	37.50	3	12.50	1	4.17	2	8.33	3	12.50	3	12.50	1	4.17	0	0.00	0	0.00	1	4.17	0	0.00	0	0.00	1	4.17

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之十 口咽癌(P16-) 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	561	136	24.24	60	10.70	24	4.28	21	3.74	172	30.66	22	3.92	32	5.70	17	3.03	3	0.53	43	7.66	15	2.67	3	0.53	13	2.32
0 期	8	8	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	114	84	73.68	3	2.63	6	5.26	5	4.39	3	2.63	1	0.88	6	5.26	1	0.88	0	0.00	3	2.63	0	0.00	0	0.00	2	1.75
II 期	86	23	26.74	7	8.14	8	9.30	8	9.30	23	26.74	1	1.16	10	11.63	2	2.33	0	0.00	2	2.33	2	2.33	0	0.00	0	0.00
III 期	68	5	7.35	9	13.24	6	8.82	3	4.41	29	42.65	2	2.94	6	8.82	1	1.47	1	1.47	4	5.88	1	1.47	0	0.00	1	1.47
IV M0	234	4	1.71	39	16.67	4	1.71	3	1.28	110	47.01	10	4.27	9	3.85	12	5.13	2	0.85	24	10.26	9	3.85	2	0.85	6	2.56
IV M1	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76	7	41.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	41.18	1	5.88	0	0.00	0	0.00
不詳	34	12	35.29	2	5.88	0	0.00	2	5.88	5	14.71	1	2.94	1	2.94	1	2.94	0	0.00	3	8.82	2	5.88	1	2.94	4	11.76

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrimiform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

28 Stripping

30 Pharyngectomy, NOS

31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy

32 Total pharyngectomy

40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS
(does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)

42 WITH bone [mandibulectomy]

43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS

51 WITHOUT laryngectomy

52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1189	100.00	1154	100.00	35	100.00	746	100.00	443	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	2	0.17	1	0.09	1	2.86	1	0.13	1	0.23
35-39 歲	12	1.01	10	0.87	2	5.71	9	1.21	3	0.68
40-44 歲	65	5.47	64	5.55	1	2.86	36	4.83	29	6.55
45-49 歲	127	10.68	125	10.83	2	5.71	70	9.38	57	12.87
50-54 歲	211	17.75	206	17.85	5	14.29	137	18.36	74	16.70
55-59 歲	273	22.96	268	23.22	5	14.29	178	23.86	95	21.44
60-64 歲	202	16.99	194	16.81	8	22.86	127	17.02	75	16.93
65-69 歲	151	12.70	149	12.91	2	5.71	97	13.00	54	12.19
70-74 歲	54	4.54	50	4.33	4	11.43	39	5.23	15	3.39
75-79 歲	50	4.21	49	4.25	1	2.86	32	4.29	18	4.06
80-84 歲	28	2.35	25	2.17	3	8.57	14	1.88	14	3.16
85 歲以上	14	1.18	13	1.13	1	2.86	6	0.80	8	1.81
臨床期別										
0 期	12	1.01	12	1.04	0	0.00	8	1.07	4	0.90
I 期	92	7.74	89	7.71	3	8.57	70	9.38	22	4.97
II 期	109	9.17	107	9.27	2	5.71	75	10.05	34	7.67
III 期	127	10.68	122	10.57	5	14.29	82	10.99	45	10.16
IV M0	739	62.15	719	62.31	20	57.14	443	59.38	296	66.82
IV M1	60	5.05	58	5.03	2	5.71	37	4.96	23	5.19
不詳	50	4.21	47	4.07	3	8.57	31	4.16	19	4.29
病理期別										
0 期	14	1.18	14	1.21	0	0.00	12	1.61	2	0.45
I 期	71	5.97	71	6.15	0	0.00	55	7.37	16	3.61
II 期	20	1.68	20	1.73	0	0.00	13	1.74	7	1.58
III 期	23	1.93	21	1.82	2	5.71	18	2.41	5	1.13
IV M0	188	15.81	188	16.29	0	0.00	121	16.22	67	15.12
IV M1	6	0.50	6	0.52	0	0.00	6	0.80	0	0.00
不詳	867	72.92	834	72.27	33	94.29	521	69.84	346	78.10

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1189	100.00	1154	100.00	35	100.00	746	100.00	443	100.00
整併期別 ¹										
0 期	18	1.51	18	1.56	0	0.00	14	1.88	4	0.90
I 期	103	8.66	100	8.67	3	8.57	77	10.32	26	5.87
II 期	108	9.08	106	9.19	2	5.71	76	10.19	32	7.22
III 期	115	9.67	109	9.45	6	17.14	71	9.52	44	9.93
IV M0	748	62.91	729	63.17	19	54.29	448	60.05	300	67.72
IV M1	59	4.96	57	4.94	2	5.71	36	4.83	23	5.19
不詳	38	3.20	35	3.03	3	8.57	24	3.22	14	3.16
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.6212									
治療方式 ^{3,4}										
手術	99	8.33	98	8.49	1	2.86	76	10.19	23	5.19
手術合併化療與放療	144	12.11	144	12.48	0	0.00	95	12.73	49	11.06
手術合併放療	46	3.87	44	3.81	2	5.71	28	3.75	18	4.06
手術合併化療	27	2.27	27	2.34	0	0.00	22	2.95	5	1.13
同步化療與放療或/與標 靶治療	577	48.53	556	48.18	21	60.00	369	49.46	208	46.95
非同步化療與放療或/與 標靶治療	70	5.89	69	5.98	1	2.86	38	5.09	32	7.22
放療	45	3.78	43	3.73	2	5.71	22	2.95	23	5.19
放療合併標靶治療	26	2.19	24	2.08	2	5.71	11	1.47	15	3.39
放療合併化療與免疫治療	6	0.50	5	0.43	1	2.86	6	0.80	0	0.00
化療或/與標靶治療	97	8.16	93	8.06	4	11.43	54	7.24	43	9.71
緩和治療	28	2.35	27	2.34	1	2.86	11	1.47	17	3.84
未有首次治療申報紀錄	3	0.25	3	0.26	0	0.00	0	0.00	3	0.68
其他治療	21	1.77	21	1.82	0	0.00	14	1.88	7	1.58
組織型態										
鱗狀細胞癌	1167	98.15	1137	98.53	30	85.71	730	97.86	437	98.65
唾液腺癌	2	0.17	1	0.09	1	2.86	2	0.27	0	0.00
神經內分泌癌	1	0.08	1	0.09	0	0.00	1	0.13	0	0.00
其他特定上皮癌	2	0.17	2	0.17	0	0.00	2	0.27	0	0.00
非特定上皮癌	8	0.67	8	0.69	0	0.00	5	0.67	3	0.68
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.08	0	0.00	1	2.86	1	0.13	0	0.00
其他惡性腫瘤	8	0.67	5	0.43	3	8.57	5	0.67	3	0.68

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.524-525)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

下咽癌

表三之二 下咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1189	99	8.33	144	12.11	46	3.87	27	2.27	577	48.53	70	5.89	45	3.78	26	2.19	6	0.50	97	8.16	28	2.35	3	0.25	21	1.77
0 期	18	14	77.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	2	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00
I 期	103	46	44.66	3	2.91	11	10.68	7	6.80	14	13.59	1	0.97	20	19.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.97	0	0.00	0	0.00
II 期	108	7	6.48	7	6.48	8	7.41	4	3.70	61	56.48	4	3.70	9	8.33	3	2.78	0	0.00	2	1.85	1	0.93	0	0.00	2	1.85
III 期	115	4	3.48	6	5.22	10	8.70	3	2.61	73	63.48	4	3.48	5	4.35	5	4.35	1	0.87	4	3.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	748	20	2.67	127	16.98	17	2.27	10	1.34	410	54.81	38	5.08	8	1.07	17	2.27	4	0.53	58	7.75	19	2.54	2	0.27	18	2.41
IV M1	59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.69	23	38.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29	49.15	5	8.47	0	0.00	1	1.69
不詳	38	8	21.05	1	2.63	0	0.00	3	7.89	17	44.74	0	0.00	1	2.63	1	2.63	1	2.63	4	10.53	2	5.26	0	0.00	0	0.00

表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	71.43	2	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	7.14
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	71.43	2	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	7.14
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

下咽癌

表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	676	59	8.73	94	13.91	24	3.55	12	1.78	341	50.44	47	6.95	24	3.55	3	0.44	3	0.44	47	6.95	8	1.18	2	0.30	12	1.78
0 期	15	12	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00
I 期	58	27	46.55	2	3.45	6	10.34	3	5.17	7	12.07	1	1.72	12	20.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	56	4	7.14	2	3.57	5	8.93	2	3.57	32	57.14	3	5.36	5	8.93	1	1.79	0	0.00	1	1.79	0	0.00	0	0.00	1	1.79
III 期	59	3	5.08	4	6.78	4	6.78	3	5.08	37	62.71	2	3.39	3	5.08	1	1.69	0	0.00	2	3.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	436	9	2.06	85	19.50	9	2.06	4	0.92	254	58.26	21	4.82	2	0.46	1	0.23	2	0.46	31	7.11	7	1.61	1	0.23	10	2.29
IV M1	32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	62.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	34.38	0	0.00	0	0.00	1	3.13
不詳	20	4	20.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	10	50.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00

表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療或與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	499	40	8.02	50	10.02	22	4.41	15	3.01	226	45.29	21	4.21	21	4.21	23	4.61	3	0.60	50	10.02	20	4.01	0	0.00	8	1.60
0 期	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	45	19	42.22	1	2.22	5	11.11	4	8.89	7	15.56	0	0.00	8	17.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00
II 期	52	3	5.77	5	9.62	3	5.77	2	3.85	29	55.77	1	1.92	4	7.69	2	3.85	0	0.00	1	1.92	1	1.92	0	0.00	1	1.92
III 期	56	1	1.79	2	3.57	6	10.71	0	0.00	36	64.29	2	3.57	2	3.57	4	7.14	1	1.79	2	3.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	298	11	3.69	42	14.09	8	2.68	6	2.01	146	48.99	15	5.03	6	2.01	16	5.37	2	0.67	27	9.06	12	4.03	0	0.00	7	2.35
IV M1	27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.70	3	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	66.67	5	18.52	0	0.00	0	0.00
不詳	18	4	22.22	0	0.00	0	0.00	3	16.67	7	38.89	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	2	11.11	1	5.56	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyrimiform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 28 Stripping
- 30 Pharyngectomy, NOS
 - 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
 - 32 Total pharyngectomy
- 40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS (does NOT include total mandibular resection)
[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]
 - 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
 - 42 WITH bone [mandibulectomy]
 - 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

- 50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
 - 51 WITHOUT laryngectomy
 - 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

喉癌

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	822	100.00	773	100.00	49	100.00	580	100.00	242	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	1	0.12	1	0.13	0	0.00	1	0.17	0	0.00
40-44 歲	22	2.68	19	2.46	3	6.12	16	2.76	6	2.48
45-49 歲	39	4.74	37	4.79	2	4.08	26	4.48	13	5.37
50-54 歲	101	12.29	100	12.94	1	2.04	65	11.21	36	14.88
55-59 歲	140	17.03	134	17.34	6	12.24	99	17.07	41	16.94
60-64 歲	152	18.49	143	18.50	9	18.37	108	18.62	44	18.18
65-69 歲	141	17.15	127	16.43	14	28.57	102	17.59	39	16.12
70-74 歲	79	9.61	75	9.70	4	8.16	60	10.34	19	7.85
75-79 歲	85	10.34	80	10.35	5	10.20	59	10.17	26	10.74
80-84 歲	37	4.50	36	4.66	1	2.04	28	4.83	9	3.72
85 歲以上	25	3.04	21	2.72	4	8.16	16	2.76	9	3.72
臨床期別										
0 期	18	2.19	17	2.20	1	2.04	12	2.07	6	2.48
I 期	365	44.40	346	44.76	19	38.78	271	46.72	94	38.84
II 期	119	14.48	112	14.49	7	14.29	82	14.14	37	15.29
III 期	79	9.61	75	9.70	4	8.16	55	9.48	24	9.92
IV M0	170	20.68	160	20.70	10	20.41	114	19.66	56	23.14
IV M1	5	0.61	5	0.65	0	0.00	2	0.34	3	1.24
不詳	66	8.03	58	7.50	8	16.33	44	7.59	22	9.09
病理期別										
0 期	36	4.38	31	4.01	5	10.20	28	4.83	8	3.31
I 期	170	20.68	160	20.70	10	20.41	134	23.10	36	14.88
II 期	34	4.14	33	4.27	1	2.04	26	4.48	8	3.31
III 期	17	2.07	13	1.68	4	8.16	13	2.24	4	1.65
IV M0	46	5.60	42	5.43	4	8.16	36	6.21	10	4.13
IV M1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	519	63.14	494	63.91	25	51.02	343	59.14	176	72.73

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	822	100.00	773	100.00	49	100.00	580	100.00	242	100.00
整併期別 ¹										
0 期	39	4.74	34	4.40	5	10.20	29	5.00	10	4.13
I 期	377	45.86	357	46.18	20	40.82	276	47.59	101	41.74
II 期	122	14.84	115	14.88	7	14.29	89	15.34	33	13.64
III 期	75	9.12	70	9.06	5	10.20	50	8.62	25	10.33
IV M0	175	21.29	166	21.47	9	18.37	117	20.17	58	23.97
IV M1	4	0.49	4	0.52	0	0.00	2	0.34	2	0.83
不詳	30	3.65	27	3.49	3	6.12	17	2.93	13	5.37
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.7237									
治療方式 ^{3,4}										
手術	262	31.87	243	31.44	19	38.78	197	33.97	65	26.86
手術合併化療與放療	44	5.35	41	5.30	3	6.12	36	6.21	8	3.31
手術合併放療	44	5.35	43	5.56	1	2.04	30	5.17	14	5.79
手術合併放療與標靶治療	5	0.61	5	0.65	0	0.00	4	0.69	1	0.41
手術合併化療	14	1.70	14	1.81	0	0.00	14	2.41	0	0.00
同步化療與放療或/與標 靶治療	185	22.51	177	22.90	8	16.33	127	21.90	58	23.97
非同步化療與放療	11	1.34	11	1.42	0	0.00	4	0.69	7	2.89
放療	207	25.18	196	25.36	11	22.45	133	22.93	74	30.58
放療合併標靶治療	17	2.07	15	1.94	2	4.08	6	1.03	11	4.55
化療	15	1.82	13	1.68	2	4.08	12	2.07	3	1.24
緩和治療	3	0.36	3	0.39	0	0.00	3	0.52	0	0.00
未有首次治療申報紀錄	5	0.61	3	0.39	2	4.08	5	0.86	0	0.00
其他治療	10	1.22	9	1.16	1	2.04	9	1.55	1	0.41
組織型態										
鱗狀細胞癌	802	97.57	757	97.93	45	91.84	568	97.93	234	96.69
神經內分泌癌	4	0.49	3	0.39	1	2.04	2	0.34	2	0.83
其他特定上皮癌	3	0.36	3	0.39	0	0.00	2	0.34	1	0.41
非特定上皮癌	6	0.73	4	0.52	2	4.08	4	0.69	2	0.83
軟組織肉瘤	1	0.12	1	0.13	0	0.00	1	0.17	0	0.00
其他惡性腫瘤	6	0.73	5	0.65	1	2.04	3	0.52	3	1.24

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.530-531)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

喉癌

表四之二 喉癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併放療與標靶治療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	822	262	31.87	44	5.35	44	5.35	5	0.61	14	1.70	185	22.51	11	1.34	207	25.18	17	2.07	15	1.82	3	0.36	5	0.61	10	1.22
0 期	39	34	87.18	0	0.00	1	2.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	377	159	42.18	5	1.33	28	7.43	0	0.00	5	1.33	14	3.71	2	0.53	160	42.44	0	0.00	2	0.53	0	0.00	0	0.00	2	0.53
II 期	122	33	27.05	7	5.74	4	3.28	1	0.82	2	1.64	34	27.87	1	0.82	31	25.41	3	2.46	3	2.46	1	0.82	1	0.82	1	0.82
III 期	75	10	13.33	4	5.33	3	4.00	2	2.67	2	2.67	40	53.33	1	1.33	4	5.33	6	8.00	2	2.67	0	0.00	1	1.33	0	0.00
IV M0	175	5	2.86	27	15.43	8	4.57	1	0.57	5	2.86	95	54.29	6	3.43	6	3.43	6	3.43	8	4.57	2	1.14	1	0.57	5	2.86
IV M1	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00
不詳	30	21	70.00	1	3.33	0	0.00	1	3.33	0	0.00	2	6.67	0	0.00	2	6.67	1	3.33	0	0.00	0	0.00	2	6.67	0	0.00

表四之三 喉癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併放療與標靶治療		手術合併化療		同步化療與放療或與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	62	14	22.58	6	9.68	2	3.23	0	0.00	1	1.61	21	33.87	2	3.23	12	19.35	1	1.61	2	3.23	0	0.00	0	0.00	1	1.61
0 期	5	4	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	26	8	30.77	2	7.69	2	7.69	0	0.00	0	0.00	4	15.38	0	0.00	9	34.62	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	5	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	22	1	4.55	3	13.64	0	0.00	0	0.00	1	4.55	13	59.09	2	9.09	0	0.00	1	4.55	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100
不詳	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

喉癌

表四之四 喉癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併放療與標靶治療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	534	169	31.65	34	6.37	30	5.62	0	0.00	7	1.31	133	24.91	8	1.50	130	24.34	5	0.94	10	1.87	2	0.37	1	0.19	5	0.94
0 期	21	19	90.48	0	0.00	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	246	105	42.68	3	1.22	18	7.32	0	0.00	2	0.81	7	2.85	2	0.81	106	43.09	0	0.00	1	0.41	0	0.00	0	0.00	2	0.81
II 期	80	23	28.75	6	7.50	2	2.50	0	0.00	2	2.50	27	33.75	1	1.25	16	20.00	0	0.00	2	2.50	0	0.00	1	1.25	0	0.00
III 期	48	6	12.50	3	6.25	3	6.25	0	0.00	1	2.08	30	62.50	0	0.00	1	2.08	2	4.17	2	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	122	3	2.46	21	17.21	6	4.92	0	0.00	2	1.64	69	56.56	4	3.28	4	3.28	3	2.46	5	4.10	2	1.64	0	0.00	3	2.46
IV M1	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	16	13	81.25	1	6.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表四之五 喉癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併放療與標靶治療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	226	79	34.96	4	1.77	12	5.31	5	2.21	6	2.65	31	13.72	1	0.44	65	28.76	11	4.87	3	1.33	1	0.44	4	1.77	4	1.77
0 期	13	11	84.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	105	46	43.81	0	0.00	8	7.62	0	0.00	3	2.86	3	2.86	0	0.00	45	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	37	10	27.03	0	0.00	2	5.41	1	2.70	0	0.00	5	13.51	0	0.00	13	35.14	3	8.11	1	2.70	1	2.70	0	0.00	1	2.70
III 期	25	4	16.00	1	4.00	0	0.00	2	8.00	1	4.00	8	32.00	1	4.00	3	12.00	4	16.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00
IV M0	31	1	3.23	3	9.68	2	6.45	1	3.23	2	6.45	13	41.94	0	0.00	2	6.45	2	6.45	2	6.45	0	0.00	1	3.23	2	6.45
IV M1	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
不詳	13	7	53.85	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00	2	15.38	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Larynx

C32

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision

[SEER Note: Codes 30-80 include major salivary gland, NOS]

- 30 Less than total parotidectomy, NOS; less than total removal of major salivary gland, NOS
 - 31 Facial nerve spared
 - 32 Facial nerve sacrificed
 - 33 Superficial lobe ONLY
 - 34 Facial nerve spared
 - 35 Facial nerve sacrificed
 - 36 Deep lobe (Total)
- [SEER Note: Codes 30-36 are with or without superficial lobe]
- 37 Facial nerve spared
 - 38 Facial nerve sacrificed

[SEER Note: Codes 40-80 may include submandibulectomy and submaxillectomy]

- 40 Total parotidectomy, NOS; total removal of major salivary gland, NOS
 - 41 Facial nerve spared
 - 42 Facial nerve sacrificed
- 50 Radical parotidectomy, NOS; radical removal of major salivary gland, NOS
 - 51 WITHOUT removal of temporal bone
 - 52 WITH removal of temporal bone
 - 53 WITH removal of overlying skin (requires graft or flap coverage)
- 80 Parotidectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

主唾液腺癌

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	308	100.00	176	100.00	132	100.00	212	100.00	96	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	8	2.60	3	1.70	5	3.79	8	3.77	0	0.00
20-24 歲	5	1.62	2	1.14	3	2.27	3	1.42	2	2.08
25-29 歲	10	3.25	4	2.27	6	4.55	9	4.25	1	1.04
30-34 歲	7	2.27	3	1.70	4	3.03	6	2.83	1	1.04
35-39 歲	21	6.82	14	7.95	7	5.30	14	6.60	7	7.29
40-44 歲	13	4.22	9	5.11	4	3.03	10	4.72	3	3.13
45-49 歲	22	7.14	11	6.25	11	8.33	17	8.02	5	5.21
50-54 歲	35	11.36	15	8.52	20	15.15	24	11.32	11	11.46
55-59 歲	48	15.58	27	15.34	21	15.91	30	14.15	18	18.75
60-64 歲	43	13.96	25	14.20	18	13.64	27	12.74	16	16.67
65-69 歲	38	12.34	26	14.77	12	9.09	26	12.26	12	12.50
70-74 歲	17	5.52	14	7.95	3	2.27	11	5.19	6	6.25
75-79 歲	16	5.19	10	5.68	6	4.55	11	5.19	5	5.21
80-84 歲	10	3.25	6	3.41	4	3.03	5	2.36	5	5.21
85 歲以上	15	4.87	7	3.98	8	6.06	11	5.19	4	4.17
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	41	13.31	20	11.36	21	15.91	30	14.15	11	11.46
II 期	64	20.78	37	21.02	27	20.45	43	20.28	21	21.88
III 期	27	8.77	15	8.52	12	9.09	15	7.08	12	12.50
IV 期	77	25.00	49	27.84	28	21.21	54	25.47	23	23.96
不詳	99	32.14	55	31.25	44	33.33	70	33.02	29	30.21
病理期別										
0 期	1	0.32	1	0.57	0	0.00	1	0.47	0	0.00
I 期	62	20.13	30	17.05	32	24.24	46	21.70	16	16.67
II 期	80	25.97	46	26.14	34	25.76	54	25.47	26	27.08
III 期	49	15.91	24	13.64	25	18.94	35	16.51	14	14.58
IV 期	56	18.18	37	21.02	19	14.39	44	20.75	12	12.50
不詳	60	19.48	38	21.59	22	16.67	32	15.09	28	29.17

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	308	100.00	176	100.00	132	100.00	212	100.00	96	100.00
整併期別 ¹										
0 期	1	0.32	1	0.57	0	0.00	1	0.47	0	0.00
I 期	66	21.43	32	18.18	34	25.76	48	22.64	18	18.75
II 期	83	26.95	48	27.27	35	26.52	56	26.42	27	28.13
III 期	53	17.21	27	15.34	26	19.70	36	16.98	17	17.71
IV 期	82	26.62	54	30.68	28	21.21	61	28.77	21	21.88
不詳	23	7.47	14	7.95	9	6.82	10	4.72	13	13.54
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.7371									
治療方式 ^{3,4}										
手術	88	28.57	50	28.41	38	28.79	60	28.30	28	29.17
手術合併化療與放療	61	19.81	37	21.02	24	18.18	39	18.40	22	22.92
手術合併放療	119	38.64	63	35.80	56	42.42	84	39.62	35	36.46
手術合併化療	4	1.30	3	1.70	1	0.76	4	1.89	0	0.00
同步化療與放療	7	2.27	4	2.27	3	2.27	5	2.36	2	2.08
非同步化療與放療	6	1.95	5	2.84	1	0.76	5	2.36	1	1.04
放療	3	0.97	3	1.70	0	0.00	2	0.94	1	1.04
化療	6	1.95	2	1.14	4	3.03	4	1.89	2	2.08
緩和治療	2	0.65	1	0.57	1	0.76	1	0.47	1	1.04
未有首次治療申報紀錄	1	0.32	0	0.00	1	0.76	0	0.00	1	1.04
其他治療	11	3.57	8	4.55	3	2.27	8	3.77	3	3.13
組織型態										
黏液表皮樣癌	64	20.78	33	18.75	31	23.48	42	19.81	22	22.92
鱗狀細胞癌	23	7.47	16	9.09	7	5.30	12	5.66	11	11.46
腺癌	6	1.95	5	2.84	1	0.76	4	1.89	2	2.08
腺樣囊狀癌	55	17.86	27	15.34	28	21.21	32	15.09	23	23.96
腺泡細胞癌	28	9.09	14	7.95	14	10.61	25	11.79	3	3.13
惡性混合性腫瘤	38	12.34	23	13.07	15	11.36	29	13.68	9	9.38
淋巴上皮癌	17	5.52	7	3.98	10	7.58	12	5.66	5	5.21
其他特定上皮癌	61	19.81	42	23.86	19	14.39	45	21.23	16	16.67
非特定上皮癌	13	4.22	8	4.55	5	3.79	9	4.25	4	4.17
軟組織肉瘤	2	0.65	1	0.57	1	0.76	2	0.94	0	0.00
其他惡性腫瘤	1	0.32	0	0.00	1	0.76	0	0.00	1	1.04

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.536-537)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

主唾液腺癌

表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	308	88	28.57	61	19.81	119	38.64	4	1.30	7	2.27	6	1.95	3	0.97	6	1.95	2	0.65	1	0.32	11	3.57
0 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	66	33	50.00	2	3.03	31	46.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	83	28	33.73	14	16.87	41	49.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	53	7	13.21	17	32.08	27	50.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89	0	0.00	1	1.89
IV 期	82	9	10.98	21	25.61	14	17.07	4	4.88	7	8.54	6	7.32	3	3.66	6	7.32	1	1.22	1	1.22	10	12.20
不詳	23	10	43.48	7	30.43	6	26.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	86	31	36.05	14	16.28	35	40.70	0	0.00	2	2.33	0	0.00	0	0.00	1	1.16	1	1.16	0	0.00	2	2.33
0 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	30	22	73.33	0	0.00	8	26.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	27	7	25.93	4	14.81	16	59.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	12	0	0.00	3	25.00	9	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	11	0	0.00	4	36.36	1	9.09	0	0.00	2	18.18	0	0.00	0	0.00	1	9.09	1	9.09	0	0.00	2	18.18
不詳	5	1	20.00	3	60.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

主唾液腺癌

表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	164	32	19.51	40	24.39	67	40.85	2	1.22	4	2.44	5	3.05	2	1.22	4	2.44	0	0.00	0	0.00	8	4.88
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	31	8	25.81	2	6.45	21	67.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	43	14	32.56	10	23.26	19	44.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	30	4	13.33	11	36.67	14	46.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33
IV 期	46	1	2.17	13	28.26	8	17.39	2	4.35	4	8.70	5	10.87	2	4.35	4	8.70	0	0.00	0	0.00	7	15.22
不詳	14	5	35.71	4	28.57	5	35.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	58	25	43.10	7	12.07	17	29.31	2	3.45	1	1.72	1	1.72	1	1.72	1	1.72	1	1.72	1	1.72	1	1.72
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	5	3	60.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	13	7	53.85	0	0.00	6	46.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	11	3	27.27	3	27.27	4	36.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00
IV 期	25	8	32.00	4	16.00	5	20.00	2	8.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	0	0.00	1	4.00	1	4.00
不詳	4	4	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Parotid and Other Unspecified Glands

Parotid Gland C079, Major Salivary Glands C080–C089

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

[SEER Note: Codes 30-80 include major salivary gland, NOS]

- 30 Less than total parotidectomy, NOS; less than total removal of major salivary gland, NOS
 - 31 Facial nerve spared
 - 32 Facial nerve sacrificed
- 33 Superficial lobe ONLY
 - 34 Facial nerve spared
 - 35 Facial nerve sacrificed
- 36 Deep lobe (Total)

[SEER Note: Codes 30-36 are with or without superficial lobe]

- 37 Facial nerve spared
- 38 Facial nerve sacrificed

[SEER Note: Codes 40-80 may include submandibulectomy and submaxillectomy]

- 40 Total parotidectomy, NOS; total removal of major salivary gland, NOS
 - 41 Facial nerve spared
 - 42 Facial nerve sacrificed
- 50 Radical parotidectomy, NOS; radical removal of major salivary gland, NOS
 - 51 WITHOUT removal of temporal bone
 - 52 WITH removal of temporal bone
 - 53 WITH removal of overlying skin (requires graft or flap coverage)
- 80 Parotidectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

鼻咽癌

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1487	100.00	1160	100.00	327	100.00	931	100.00	556	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00
15-19 歲	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00
20-24 歲	9	0.61	8	0.69	1	0.31	5	0.54	4	0.72
25-29 歲	19	1.28	13	1.12	6	1.83	15	1.61	4	0.72
30-34 歲	67	4.51	49	4.22	18	5.50	46	4.94	21	3.78
35-39 歲	143	9.62	109	9.40	34	10.40	93	9.99	50	8.99
40-44 歲	210	14.12	164	14.14	46	14.07	141	15.15	69	12.41
45-49 歲	199	13.38	158	13.62	41	12.54	121	13.00	78	14.03
50-54 歲	210	14.12	166	14.31	44	13.46	133	14.29	77	13.85
55-59 歲	201	13.52	174	15.00	27	8.26	131	14.07	70	12.59
60-64 歲	140	9.41	107	9.22	33	10.09	82	8.81	58	10.43
65-69 歲	140	9.41	102	8.79	38	11.62	81	8.70	59	10.61
70-74 歲	62	4.17	53	4.57	9	2.75	35	3.76	27	4.86
75-79 歲	50	3.36	31	2.67	19	5.81	30	3.22	20	3.60
80-84 歲	21	1.41	15	1.29	6	1.83	9	0.97	12	2.16
85 歲以上	14	0.94	9	0.78	5	1.53	7	0.75	7	1.26
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	121	8.14	96	8.28	25	7.65	74	7.95	47	8.45
II 期	322	21.65	245	21.12	77	23.55	187	20.09	135	24.28
III 期	477	32.08	369	31.81	108	33.03	296	31.79	181	32.55
IV M0	443	29.79	354	30.52	89	27.22	307	32.98	136	24.46
IV M1	114	7.67	87	7.50	27	8.26	64	6.87	50	8.99
不詳	10	0.67	9	0.78	1	0.31	3	0.32	7	1.26
病理期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	1	0.07	1	0.09	0	0.00	0	0.00	1	0.18
II 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	11	0.74	8	0.69	3	0.92	11	1.18	0	0.00
IV M1	14	0.94	11	0.95	3	0.92	8	0.86	6	1.08
不詳	1461	98.25	1140	98.28	321	98.17	912	97.96	549	98.74

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1487	100.00	1160	100.00	327	100.00	931	100.00	556	100.00
整併期別 ¹										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	121	8.14	96	8.28	25	7.65	74	7.95	47	8.45
II 期	322	21.65	245	21.12	77	23.55	187	20.09	135	24.28
III 期	477	32.08	369	31.81	108	33.03	296	31.79	181	32.55
IV M0	444	29.86	354	30.52	90	27.52	308	33.08	136	24.46
IV M1	113	7.60	87	7.50	26	7.95	63	6.77	50	8.99
不詳	10	0.67	9	0.78	1	0.31	3	0.32	7	1.26
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	-									
治療方式 ^{3,4}										
同步化療與放療	1122	75.45	877	75.60	245	74.92	700	75.19	422	75.90
非同步化療與放療	145	9.75	115	9.91	30	9.17	96	10.31	49	8.81
放療	121	8.14	94	8.10	27	8.26	72	7.73	49	8.81
放療合併化療與免疫治療	22	1.48	18	1.55	4	1.22	20	2.15	2	0.36
化療	54	3.63	37	3.19	17	5.20	34	3.65	20	3.60
緩和治療	9	0.61	8	0.69	1	0.31	2	0.21	7	1.26
未有首次治療申報紀錄	5	0.34	3	0.26	2	0.61	0	0.00	5	0.90
其他治療	9	0.61	8	0.69	1	0.31	7	0.75	2	0.36
組織型態										
非角化鱗狀細胞癌	1415	95.16	1103	95.09	312	95.41	886	95.17	529	95.14
角化鱗狀細胞癌	29	1.95	24	2.07	5	1.53	20	2.15	9	1.62
唾液腺癌	3	0.20	2	0.17	1	0.31	2	0.21	1	0.18
其他特定上皮癌	4	0.27	4	0.34	0	0.00	3	0.32	1	0.18
非特定上皮癌	34	2.29	25	2.16	9	2.75	19	2.04	15	2.70
其他惡性腫瘤	2	0.13	2	0.17	0	0.00	1	0.11	1	0.18

註 1：整併期別*-請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：鼻咽癌個案因接受手術治療甚少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.542-543)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

鼻咽癌

表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1487	1122	75.45	145	9.75	121	8.14	22	1.48	54	3.63	9	0.61	5	0.34	9	0.61
I 期	121	21	17.36	3	2.48	93	76.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.65	2	1.65
II 期	322	289	89.75	16	4.97	11	3.42	0	0.00	4	1.24	0	0.00	0	0.00	2	0.62
III 期	477	429	89.94	28	5.87	6	1.26	3	0.63	9	1.89	1	0.21	0	0.00	1	0.21
IV M0	444	371	83.56	35	7.88	7	1.58	12	2.70	15	3.38	0	0.00	3	0.68	1	0.23
IV M1	113	8	7.08	62	54.87	2	1.77	7	6.19	26	23.01	6	5.31	0	0.00	2	1.77
不詳	10	4	40.00	1	10.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	1	10.00

表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	649	509	78.43	59	9.09	44	6.78	15	2.31	20	3.08	0	0.00	0	0.00	2	0.31
I 期	53	11	20.75	2	3.77	40	75.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	119	110	92.44	6	5.04	2	1.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.84
III 期	228	208	91.23	14	6.14	0	0.00	1	0.44	5	2.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	206	174	84.47	15	7.28	2	0.97	9	4.37	6	2.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	39	3	7.69	21	53.85	0	0.00	5	12.82	9	23.08	0	0.00	0	0.00	1	2.56
不詳	4	3	75.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

鼻咽癌

表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	691	527	76.27	72	10.42	53	7.67	6	0.87	26	3.76	0	0.00	2	0.29	5	0.72
I 期	58	9	15.52	1	1.72	46	79.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.45
II 期	177	161	90.96	9	5.08	3	1.69	0	0.00	3	1.69	0	0.00	0	0.00	1	0.56
III 期	207	187	90.34	12	5.80	3	1.45	1	0.48	3	1.45	0	0.00	0	0.00	1	0.48
IV M0	194	167	86.08	16	8.25	1	0.52	3	1.55	5	2.58	0	0.00	2	1.03	0	0.00
IV M1	54	3	5.56	34	62.96	0	0.00	2	3.70	15	27.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100

表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	147	86	58.50	14	9.52	24	16.33	1	0.68	8	5.44	9	6.12	3	2.04	2	1.36
I 期	10	1	10.00	0	0.00	7	70.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00
II 期	26	18	69.23	1	3.85	6	23.08	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	42	34	80.95	2	4.76	3	7.14	1	2.38	1	2.38	1	2.38	0	0.00	0	0.00
IV M0	44	30	68.18	4	9.09	4	9.09	0	0.00	4	9.09	0	0.00	1	2.27	1	2.27
IV M1	20	2	10.00	7	35.00	2	10.00	0	0.00	2	10.00	6	30.00	0	0.00	1	5.00
不詳	5	1	20.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00

1 鼻咽癌個案僅依照臨床期別進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx

Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119

Pyiform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

20 Local tumor excision, NOS

26 Polypectomy

27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

21 Photodynamic therapy (PDT)

22 Electrocautery

23 Cryosurgery

24 Laser ablation

25 Laser excision

28 Stripping

30 Pharyngectomy, NOS

31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy

32 Total pharyngectomy

40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS (does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note: Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy)

NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)

42 WITH bone [mandibulectomy]

43 WITH both 41 and 42

[SEER Note: Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS

51 WITHOUT laryngectomy

52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

食道癌

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2656	100.00	2491	100.00	165	100.00	1600	100.00	1056	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.04	1	0.04	0	0.00	1	0.06	0	0.00
30-34 歲	3	0.11	2	0.08	1	0.61	2	0.13	1	0.09
35-39 歲	22	0.83	17	0.68	5	3.03	11	0.69	11	1.04
40-44 歲	114	4.29	110	4.42	4	2.42	63	3.94	51	4.83
45-49 歲	260	9.79	244	9.80	16	9.70	142	8.88	118	11.17
50-54 歲	404	15.21	386	15.50	18	10.91	261	16.31	143	13.54
55-59 歲	552	20.78	529	21.24	23	13.94	334	20.88	218	20.64
60-64 歲	506	19.05	485	19.47	21	12.73	324	20.25	182	17.23
65-69 歲	366	13.78	341	13.69	25	15.15	215	13.44	151	14.30
70-74 歲	165	6.21	153	6.14	12	7.27	99	6.19	66	6.25
75-79 歲	124	4.67	108	4.34	16	9.70	68	4.25	56	5.30
80-84 歲	80	3.01	63	2.53	17	10.30	50	3.13	30	2.84
85 歲以上	59	2.22	52	2.09	7	4.24	30	1.88	29	2.75
臨床期別										
0 期	121	4.56	118	4.74	3	1.82	78	4.88	43	4.07
I 期	277	10.43	265	10.64	12	7.27	206	12.88	71	6.72
II 期	399	15.02	368	14.77	31	18.79	222	13.88	177	16.76
III 期	698	26.28	657	26.37	41	24.85	410	25.63	288	27.27
IV 期	1060	39.91	992	39.82	68	41.21	621	38.81	439	41.57
不詳	101	3.80	91	3.65	10	6.06	63	3.94	38	3.60
病理期別										
0 期	116	4.37	108	4.34	8	4.85	88	5.50	28	2.65
I 期	417	15.70	400	16.06	17	10.30	309	19.31	108	10.23
II 期	124	4.67	117	4.70	7	4.24	75	4.69	49	4.64
III 期	177	6.66	167	6.70	10	6.06	108	6.75	69	6.53
IV 期	128	4.82	123	4.94	5	3.03	81	5.06	47	4.45
不詳	1694	63.78	1576	63.27	118	71.52	939	58.69	755	71.50
整併期別 ¹										
0 期	143	5.38	134	5.38	9	5.45	103	6.44	40	3.79
I 期	313	11.78	303	12.16	10	6.06	224	14.00	89	8.43
II 期	342	12.88	317	12.73	25	15.15	179	11.19	163	15.44
III 期	714	26.88	671	26.94	43	26.06	419	26.19	295	27.94
IV 期	1065	40.10	996	39.98	69	41.82	626	39.13	439	41.57
不詳	79	2.97	70	2.81	9	5.45	49	3.06	30	2.84

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2656	100.00	2491	100.00	165	100.00	1600	100.00	1056	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.4103									
治療方式 ^{3,4}										
手術	393	14.80	371	14.89	22	13.33	287	17.94	106	10.04
手術合併化療與放療	517	19.47	488	19.59	29	17.58	344	21.50	173	16.38
手術合併放療	14	0.53	11	0.44	3	1.82	8	0.50	6	0.57
手術合併化療	29	1.09	26	1.04	3	1.82	15	0.94	14	1.33
同步化療與放療	862	32.45	809	32.48	53	32.12	471	29.44	391	37.03
非同步化療與放療	304	11.45	288	11.56	16	9.70	176	11.00	128	12.12
放療	119	4.48	109	4.38	10	6.06	58	3.63	61	5.78
放療合併化療與免疫治療	27	1.02	25	1.00	2	1.21	20	1.25	7	0.66
化療	138	5.20	129	5.18	9	5.45	75	4.69	63	5.97
化療合併免疫治療	25	0.94	24	0.96	1	0.61	19	1.19	6	0.57
緩和治療	118	4.44	107	4.30	11	6.67	62	3.88	56	5.30
未有首次治療申報紀錄	43	1.62	39	1.57	4	2.42	23	1.44	20	1.89
其他治療	67	2.52	65	2.61	2	1.21	42	2.63	25	2.37
組織型態										
鱗狀細胞癌	2470	93.00	2331	93.58	139	84.24	1489	93.06	981	92.90
腺癌	88	3.31	75	3.01	13	7.88	53	3.31	35	3.31
腺性鱗狀癌	10	0.38	9	0.36	1	0.61	8	0.50	2	0.19
神經內分泌癌	30	1.13	26	1.04	4	2.42	17	1.06	13	1.23
其他特定上皮癌	15	0.56	13	0.52	2	1.21	9	0.56	6	0.57
非特定上皮癌	19	0.72	18	0.72	1	0.61	9	0.56	10	0.95
胃腸基質瘤	7	0.26	6	0.24	1	0.61	6	0.38	1	0.09
其他惡性肉瘤	6	0.23	4	0.16	2	1.21	5	0.31	1	0.09
其他惡性腫瘤	11	0.41	9	0.36	2	1.21	4	0.25	7	0.66

註 1：整併期別*-請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.548-551)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

食道癌

表七之二 食道癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2656	393	14.80	517	19.47	14	0.53	29	1.09	862	32.45	304	11.45	119	4.48	27	1.02	138	5.20	25	0.94	118	4.44	43	1.62	67	2.52
0 期	143	114	79.72	0	0.00	0	0.00	1	0.70	2	1.40	1	0.70	1	0.70	0	0.00	3	2.10	0	0.00	0	0.00	10	6.99	11	7.69
I 期	313	224	71.57	20	6.39	8	2.56	2	0.64	30	9.58	2	0.64	12	3.83	0	0.00	7	2.24	0	0.00	0	0.00	5	1.60	3	0.96
II 期	342	35	10.23	98	28.65	4	1.17	13	3.80	139	40.64	6	1.75	27	7.89	0	0.00	10	2.92	0	0.00	7	2.05	1	0.29	2	0.58
III 期	714	11	1.54	295	41.32	1	0.14	9	1.26	316	44.26	11	1.54	17	2.38	8	1.12	19	2.66	0	0.00	9	1.26	5	0.70	13	1.82
IV 期	1065	2	0.19	100	9.39	0	0.00	2	0.19	359	33.71	274	25.73	59	5.54	19	1.78	82	7.70	22	2.07	93	8.73	16	1.50	37	3.47
不詳	79	7	8.86	4	5.06	1	1.27	2	2.53	16	20.25	10	12.66	3	3.80	0	0.00	17	21.52	3	3.80	9	11.39	6	7.59	1	1.27

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

食道癌

表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	400	57	14.25	89	22.25	3	0.75	4	1.00	131	32.75	54	13.50	12	3.00	8	2.00	21	5.25	5	1.25	5	1.25	8	2.00	3	0.75
0 期	19	12	63.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26	1	5.26	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	3	15.79	1	5.26
I 期	55	39	70.91	4	7.27	3	5.45	0	0.00	4	7.27	0	0.00	2	3.64	0	0.00	2	3.64	0	0.00	0	0.00	1	1.82	0	0.00
II 期	45	5	11.11	20	44.44	0	0.00	1	2.22	16	35.56	0	0.00	2	4.44	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	102	0	0.00	49	48.04	0	0.00	2	1.96	45	44.12	2	1.96	0	0.00	1	0.98	2	1.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.98
IV 期	173	0	0.00	16	9.25	0	0.00	0	0.00	64	36.99	50	28.90	8	4.62	7	4.05	14	8.09	5	2.89	4	2.31	4	2.31	1	0.58
不詳	6	1	16.67	0	0.00	0	0.00	1	16.67	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

食道癌

表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1828	277	15.15	390	21.33	11	0.60	21	1.15	599	32.77	213	11.65	59	3.23	15	0.82	96	5.25	15	0.82	58	3.17	22	1.20	52	2.84
0 期	104	85	81.73	0	0.00	0	0.00	1	0.96	1	0.96	0	0.00	1	0.96	0	0.00	2	1.92	0	0.00	0	0.00	5	4.81	9	8.65
I 期	221	156	70.59	15	6.79	5	2.26	2	0.90	22	9.95	2	0.90	9	4.07	0	0.00	4	1.81	0	0.00	0	0.00	4	1.81	2	0.90
II 期	238	26	10.92	68	28.57	4	1.68	8	3.36	100	42.02	3	1.26	14	5.88	0	0.00	9	3.78	0	0.00	3	1.26	1	0.42	2	0.84
III 期	502	6	1.20	226	45.02	1	0.20	7	1.39	218	43.43	5	1.00	7	1.39	6	1.20	11	2.19	0	0.00	4	0.80	0	0.00	11	2.19
IV 期	716	1	0.14	78	10.89	0	0.00	2	0.28	247	34.50	196	27.37	27	3.77	9	1.26	58	8.10	15	2.09	48	6.70	8	1.12	27	3.77
不詳	47	3	6.38	3	6.38	1	2.13	1	2.13	11	23.40	7	14.89	1	2.13	0	0.00	12	25.53	0	0.00	3	6.38	4	8.51	1	2.13

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

食道癌

表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	428	59	13.79	38	8.88	0	0.00	4	0.93	132	30.84	37	8.64	48	11.21	4	0.93	21	4.91	5	1.17	55	12.85	13	3.04	12	2.80
0 期	20	17	85.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.00	1	5.00
I 期	37	29	78.38	1	2.70	0	0.00	0	0.00	4	10.81	0	0.00	1	2.70	0	0.00	1	2.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.70
II 期	59	4	6.78	10	16.95	0	0.00	4	6.78	23	38.98	3	5.08	11	18.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	6.78	0	0.00	0	0.00
III 期	110	5	4.55	20	18.18	0	0.00	0	0.00	53	48.18	4	3.64	10	9.09	1	0.91	6	5.45	0	0.00	5	4.55	5	4.55	1	0.91
IV 期	176	1	0.57	6	3.41	0	0.00	0	0.00	48	27.27	28	15.91	24	13.64	3	1.70	10	5.68	2	1.14	41	23.30	4	2.27	9	5.11
不詳	26	3	11.54	1	3.85	0	0.00	0	0.00	4	15.38	2	7.69	2	7.69	0	0.00	4	15.38	3	11.54	5	19.23	2	7.69	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Esophagus

C150–C159

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Partial esophagectomy
- 40 Total esophagectomy, NOS
- 50 Esophagectomy, NOS WITH laryngectomy and/or gastrectomy, NOS

[SEER Note: Codes 50-55 include partial esophagectomy, total esophagectomy, or esophagectomy, NOS.]

- 51 WITH laryngectomy
 - 52 WITH gastrectomy, NOS
 - 53 Partial gastrectomy
 - 54 Total gastrectomy
 - 55 Combination of 51 WITH any of 52–54
- 80 Esophagectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

胃癌

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3423	100.00	2085	100.00	1338	100.00	2096	100.00	1327	100.00
年齡										
00-04 歲	1	0.03	1	0.05	0	0.00	1	0.05	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	7	0.20	7	0.34	0	0.00	5	0.24	2	0.15
25-29 歲	5	0.15	4	0.19	1	0.07	4	0.19	1	0.08
30-34 歲	24	0.70	9	0.43	15	1.12	17	0.81	7	0.53
35-39 歲	44	1.29	20	0.96	24	1.79	26	1.24	18	1.36
40-44 歲	99	2.89	50	2.40	49	3.66	70	3.34	29	2.19
45-49 歲	136	3.97	64	3.07	72	5.38	78	3.72	58	4.37
50-54 歲	232	6.78	134	6.43	98	7.32	165	7.87	67	5.05
55-59 歲	371	10.84	232	11.13	139	10.39	244	11.64	127	9.57
60-64 歲	492	14.37	311	14.92	181	13.53	312	14.89	180	13.56
65-69 歲	533	15.57	358	17.17	175	13.08	338	16.13	195	14.69
70-74 歲	374	10.93	246	11.80	128	9.57	242	11.55	132	9.95
75-79 歲	420	12.27	235	11.27	185	13.83	241	11.50	179	13.49
80-84 歲	325	9.49	191	9.16	134	10.01	174	8.30	151	11.38
85 歲以上	360	10.52	223	10.70	137	10.24	179	8.54	181	13.64
臨床期別										
0 期	72	2.10	51	2.45	21	1.57	54	2.58	18	1.36
I 期	813	23.75	470	22.54	343	25.64	532	25.38	281	21.18
II 期	541	15.80	338	16.21	203	15.17	324	15.46	217	16.35
III 期	710	20.74	473	22.69	237	17.71	453	21.61	257	19.37
IV 期	984	28.75	581	27.87	403	30.12	595	28.39	389	29.31
不詳	303	8.85	172	8.25	131	9.79	138	6.58	165	12.43
病理期別										
0 期	60	1.75	37	1.77	23	1.72	42	2.00	18	1.36
I 期	709	20.71	424	20.34	285	21.30	460	21.95	249	18.76
II 期	488	14.26	285	13.67	203	15.17	310	14.79	178	13.41
III 期	738	21.56	466	22.35	272	20.33	452	21.56	286	21.55
IV 期	531	15.51	299	14.34	232	17.34	347	16.56	184	13.87
不詳	897	26.21	574	27.53	323	24.14	485	23.14	412	31.05
整併期別 ¹										
0 期	72	2.10	46	2.21	26	1.94	52	2.48	20	1.51
I 期	785	22.93	473	22.69	312	23.32	507	24.19	278	20.95
II 期	530	15.48	308	14.77	222	16.59	324	15.46	206	15.52
III 期	866	25.30	563	27.00	303	22.65	519	24.76	347	26.15
IV 期	1081	31.58	646	30.98	435	32.51	652	31.11	429	32.33
不詳	89	2.60	49	2.35	40	2.99	42	2.00	47	3.54

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3423	100.00	2085	100.00	1338	100.00	2096	100.00	1327	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.4832									
治療方式 ^{3,4}										
手術	1071	31.29	659	31.61	412	30.79	680	32.44	391	29.46
手術合併化療	928	27.11	559	26.81	369	27.58	582	27.77	346	26.07
手術合併全身與局部化療	75	2.19	38	1.82	37	2.77	61	2.91	14	1.06
手術合併化療與放療	123	3.59	80	3.84	43	3.21	61	2.91	62	4.67
手術合併標靶治療	124	3.62	69	3.31	55	4.11	77	3.67	47	3.54
手術合併化療與免疫治療	20	0.58	13	0.62	7	0.52	19	0.91	1	0.08
化療	521	15.22	318	15.25	203	15.17	318	15.17	203	15.30
化療合併免疫治療	28	0.82	17	0.82	11	0.82	23	1.10	5	0.38
放療	30	0.88	17	0.82	13	0.97	9	0.43	21	1.58
同步化療與放療	52	1.52	47	2.25	5	0.37	39	1.86	13	0.98
非同步化療與放療	55	1.61	27	1.29	28	2.09	27	1.29	28	2.11
標靶治療	26	0.76	17	0.82	9	0.67	17	0.81	9	0.68
緩和治療	245	7.16	144	6.91	101	7.55	107	5.10	138	10.40
未有首次治療申報紀錄	49	1.43	29	1.39	20	1.49	23	1.10	26	1.96
其他治療	76	2.22	51	2.45	25	1.87	53	2.53	23	1.73
組織型態										
腺癌	2972	86.82	1819	87.24	1153	86.17	1827	87.17	1145	86.28
腺性鱗狀癌	12	0.35	9	0.43	3	0.22	8	0.38	4	0.30
鱗狀細胞癌	24	0.70	20	0.96	4	0.30	17	0.81	7	0.53
神經內分泌癌	110	3.21	64	3.07	46	3.44	66	3.15	44	3.32
其他特定上皮癌	11	0.32	9	0.43	2	0.15	6	0.29	5	0.38
非特定上皮癌	53	1.55	33	1.58	20	1.49	26	1.24	27	2.03
胃腸基質瘤	216	6.31	117	5.61	99	7.40	131	6.25	85	6.41
其他惡性肉瘤	6	0.18	2	0.10	4	0.30	4	0.19	2	0.15
其他惡性腫瘤	19	0.56	12	0.58	7	0.52	11	0.52	8	0.60

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.556-559)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胃癌

表八之二 胃癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3423	1071	31.29	928	27.11	75	2.19	123	3.59	124	3.62	20	0.58	521	15.22	28	0.82	30	0.88	52	1.52	55	1.61	26	0.76	245	7.16	49	1.43	76	2.22
0 期	72	60	83.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	16.67	0	0.00
I 期	785	676	86.11	39	4.97	1	0.13	6	0.76	3	0.38	0	0.00	18	2.29	0	0.00	3	0.38	4	0.51	1	0.13	1	0.13	19	2.42	7	0.89	7	0.89
II 期	530	131	24.72	272	51.32	8	1.51	19	3.58	38	7.17	0	0.00	16	3.02	0	0.00	3	0.57	7	1.32	1	0.19	4	0.75	18	3.40	8	1.51	5	0.94
III 期	866	118	13.63	448	51.73	28	3.23	75	8.66	60	6.93	13	1.50	38	4.39	2	0.23	7	0.81	17	1.96	5	0.58	3	0.35	36	4.16	4	0.46	12	1.39
IV 期	1081	51	4.72	165	15.26	38	3.52	22	2.04	19	1.76	7	0.65	441	40.80	26	2.41	17	1.57	23	2.13	47	4.35	17	1.57	147	13.60	10	0.93	51	4.72
不詳	89	35	39.33	4	4.49	0	0.00	1	1.12	4	4.49	0	0.00	8	8.99	0	0.00	0	0.00	1	1.12	1	1.12	1	1.12	25	28.09	8	8.99	1	1.12

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	316	71	22.47	98	31.01	19	6.01	18	5.70	12	3.80	3	0.95	55	17.41	7	2.22	1	0.32	4	1.27	5	1.58	1	0.32	5	1.58	3	0.95	14	4.43
0 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00
I 期	59	51	86.44	5	8.47	0	0.00	1	1.69	0	0.00	0	0.00	2	3.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	45	7	15.56	31	68.89	1	2.22	3	6.67	2	4.44	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	66	5	7.58	39	59.09	3	4.55	10	15.15	6	9.09	0	0.00	1	1.52	1	1.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.52
IV 期	135	1	0.74	23	17.04	15	11.11	3	2.22	3	2.22	3	2.22	51	37.78	6	4.44	1	0.74	4	2.96	5	3.70	1	0.74	5	3.70	1	0.74	13	9.63
不詳	10	7	70.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1628	519	31.88	492	30.22	47	2.89	76	4.67	77	4.73	12	0.74	251	15.42	14	0.86	1	0.06	16	0.98	24	1.47	14	0.86	42	2.58	7	0.43	36	2.21
0 期	37	32	86.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	13.51	0	0.00
I 期	426	377	88.50	25	5.87	1	0.23	3	0.70	2	0.47	0	0.00	3	0.70	0	0.00	0	0.00	2	0.47	0	0.00	0	0.00	4	0.94	2	0.47	7	1.64
II 期	233	46	19.74	138	59.23	6	2.58	11	4.72	21	9.01	0	0.00	2	0.86	0	0.00	0	0.00	2	0.86	1	0.43	3	1.29	0	0.00	0	0.00	3	1.29
III 期	415	36	8.67	231	55.66	22	5.30	47	11.33	39	9.40	8	1.93	14	3.37	1	0.24	0	0.00	3	0.72	1	0.24	3	0.72	3	0.72	0	0.00	7	1.69
IV 期	489	13	2.66	94	19.22	18	3.68	15	3.07	12	2.45	4	0.82	229	46.83	13	2.66	1	0.20	9	1.84	22	4.50	7	1.43	33	6.75	0	0.00	19	3.89
不詳	28	15	53.57	4	14.29	0	0.00	0	0.00	3	10.71	0	0.00	3	10.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.57	2	7.14	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併全身與局部化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		化療合併免疫治療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1479	481	32.52	338	22.85	9	0.61	29	1.96	35	2.37	5	0.34	215	14.54	7	0.47	28	1.89	32	2.16	26	1.76	11	0.74	198	13.39	39	2.64	26	1.76
0 期	34	28	82.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	17.65	0	0.00
I 期	300	248	82.67	9	3.00	0	0.00	2	0.67	1	0.33	0	0.00	13	4.33	0	0.00	3	1.00	2	0.67	1	0.33	1	0.33	15	5.00	5	1.67	0	0.00
II 期	252	78	30.95	103	40.87	1	0.40	5	1.98	15	5.95	0	0.00	13	5.16	0	0.00	3	1.19	5	1.98	0	0.00	1	0.40	18	7.14	8	3.17	2	0.79
III 期	385	77	20.00	178	46.23	3	0.78	18	4.68	15	3.90	5	1.30	23	5.97	0	0.00	7	1.82	14	3.64	4	1.04	0	0.00	33	8.57	4	1.04	4	1.04
IV 期	457	37	8.10	48	10.50	5	1.09	4	0.88	4	0.88	0	0.00	161	35.23	7	1.53	15	3.28	10	2.19	20	4.38	9	1.97	109	23.85	9	1.97	19	4.16
不詳	51	13	25.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	9.80	0	0.00	0	0.00	1	1.96	1	1.96	0	0.00	23	45.10	7	13.73	1	1.96

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Stomach

C160–C169

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)
- Any combination of 20 or 26–27 WITH**
 - 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Gastrectomy, NOS (partial, subtotal, hemi-)
 - 31 Antrectomy, lower (distal-less than 40% of stomach)***
 - 32 Lower (distal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)
 - 33 Upper (proximal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)

Code 30 includes:

Partial gastrectomy, including a sleeve resection of the stomach
Billroth I: anastomosis to duodenum (duodenostomy)
Billroth II: anastomosis to jejunum (jejunostomy)

- 40 Near-total or total gastrectomy, NOS
 - 41 Near-total gastrectomy
 - 42 Total gastrectomy

A total gastrectomy may follow a previous partial resection of the stomach

- 50 Gastrectomy, NOS WITH removal of a portion of esophagus
 - 51 Partial or subtotal gastrectomy
 - 52 Near total or total gastrectomy

Codes 50–52 are used for gastrectomy resection when only portions of esophagus are included in procedure

- 60 Gastrectomy with a resection in continuity with the resection of other organs, NOS***
 - 61 Partial or subtotal gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 62 Near total or total gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
 - 63 Radical gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***

Codes 60–63 are used for gastrectomy resections with organs other than esophagus.

Portions of esophagus may or may not be included in the resection.

[SEER Note: Codes 60-63 may include omentectomy among the organs/tissues removed. “In continuity with” or “en bloc” means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen

- 80 Gastrectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

*** Incidental splenectomy NOT included

結腸癌

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	13169	100.00	7512	100.00	5657	100.00	6447	100.00	6722	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	2	0.02	1	0.01	1	0.02	1	0.02	1	0.01
15-19 歲	6	0.05	3	0.04	3	0.05	3	0.05	3	0.04
20-24 歲	12	0.09	5	0.07	7	0.12	4	0.06	8	0.12
25-29 歲	34	0.26	20	0.27	14	0.25	18	0.28	16	0.24
30-34 歲	66	0.50	34	0.45	32	0.57	34	0.53	32	0.48
35-39 歲	215	1.63	118	1.57	97	1.71	114	1.77	101	1.50
40-44 歲	463	3.52	261	3.47	202	3.57	236	3.66	227	3.38
45-49 歲	693	5.26	371	4.94	322	5.69	351	5.44	342	5.09
50-54 歲	1232	9.36	693	9.23	539	9.53	604	9.37	628	9.34
55-59 歲	1541	11.70	947	12.61	594	10.50	752	11.66	789	11.74
60-64 歲	1941	14.74	1199	15.96	742	13.12	923	14.32	1018	15.14
65-69 歲	2149	16.32	1303	17.35	846	14.95	1081	16.77	1068	15.89
70-74 歲	1431	10.87	845	11.25	586	10.36	712	11.04	719	10.70
75-79 歲	1274	9.67	680	9.05	594	10.50	629	9.76	645	9.60
80-84 歲	1114	8.46	543	7.23	571	10.09	538	8.34	576	8.57
85 歲以上	996	7.56	489	6.51	507	8.96	447	6.93	549	8.17
臨床期別 ¹										
0 期	3129	23.76	1983	26.40	1146	20.26	1160	17.99	1969	29.29
I 期	1554	11.80	875	11.65	679	12.00	849	13.17	705	10.49
II 期	1353	10.27	773	10.29	580	10.25	679	10.53	674	10.03
III 期	3103	23.56	1670	22.23	1433	25.33	1654	25.66	1449	21.56
IV 期	2193	16.65	1151	15.32	1042	18.42	1168	18.12	1025	15.25
不詳	1837	13.95	1060	14.11	777	13.74	937	14.53	900	13.39
病理期別 ¹										
0 期	3971	30.15	2478	32.99	1493	26.39	1650	25.59	2321	34.53
I 期	1702	12.92	989	13.17	713	12.60	947	14.69	755	11.23
II 期	2180	16.55	1224	16.29	956	16.90	1153	17.88	1027	15.28
III 期	2531	19.22	1353	18.01	1178	20.82	1287	19.96	1244	18.51
IV 期	1691	12.84	891	11.86	800	14.14	919	14.25	772	11.48
不詳	1094	8.31	577	7.68	517	9.14	491	7.62	603	8.97
整併期別 ^{1,2}										
0 期	3977	30.20	2483	33.05	1494	26.41	1652	25.62	2325	34.59
I 期	1742	13.23	1018	13.55	724	12.80	970	15.05	772	11.48
II 期	2221	16.87	1244	16.56	977	17.27	1174	18.21	1047	15.58
III 期	2697	20.48	1439	19.16	1258	22.24	1367	21.20	1330	19.79
IV 期	2315	17.58	1212	16.13	1103	19.50	1227	19.03	1088	16.19
不詳	217	1.65	116	1.54	101	1.79	57	0.88	160	2.38

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	13169	100.00	7512	100.00	5657	100.00	6447	100.00	6722	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ³	0.6554									
治療方式 ^{4,5}										
手術	7328	55.65	4322	57.53	3006	53.14	3477	53.93	3851	57.29
手術合併化療	3583	27.21	1998	26.60	1585	28.02	1772	27.49	1811	26.94
手術合併化療與放療	129	0.98	71	0.95	58	1.03	49	0.76	80	1.19
手術合併化療、放療與標靶治療	49	0.37	28	0.37	21	0.37	24	0.37	25	0.37
手術合併化療與標靶治療	867	6.58	456	6.07	411	7.27	494	7.66	373	5.55
非同步化療與放療	37	0.28	25	0.33	12	0.21	24	0.37	13	0.19
化療或/與標靶治療	665	5.05	361	4.81	304	5.37	366	5.68	299	4.45
緩和治療	312	2.37	147	1.96	165	2.92	132	2.05	180	2.68
未有首次治療申報紀錄	85	0.65	41	0.55	44	0.78	38	0.59	47	0.70
其他治療	114	0.87	63	0.84	51	0.90	71	1.10	43	0.64
組織型態										
原位癌										
腺癌	3597	99.50	2253	99.51	1344	99.48	1412	99.58	2185	99.45
非特定上皮癌	18	0.50	11	0.49	7	0.52	6	0.42	12	0.55
侵襲癌										
腺癌	9292	97.26	5145	98.04	4147	96.31	4918	97.79	4374	96.66
神經內分泌癌	114	1.19	50	0.95	64	1.49	49	0.97	65	1.44
其他特定上皮癌	23	0.24	8	0.15	15	0.35	8	0.16	15	0.33
非特定上皮癌	43	0.45	17	0.32	26	0.60	19	0.38	24	0.53
胃腸基質瘤	6	0.06	2	0.04	4	0.09	4	0.08	2	0.04
其他惡性肉瘤	2	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02
其他惡性腫瘤	74	0.77	25	0.48	49	1.14	30	0.60	44	0.97

註 1：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 2：整併期別*-請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註(p.564-567)。

註 5：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

結腸癌

表九之二 結腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		非同步化療與放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	13169	7328	55.65	3583	27.21	129	0.98	49	0.37	867	6.58	37	0.28	665	5.05	312	2.37	85	0.65	114	0.87
0 期	3977	3950	99.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.05	25	0.63	0	0.00
I 期	1742	1656	95.06	48	2.76	2	0.11	0	0.00	1	0.06	0	0.00	10	0.57	13	0.75	11	0.63	1	0.06
II 期	8	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1834	850	46.35	905	49.35	23	1.25	1	0.05	3	0.16	0	0.00	13	0.71	23	1.25	10	0.55	6	0.33
IIB 期	238	61	25.63	158	66.39	11	4.62	0	0.00	1	0.42	0	0.00	0	0.00	3	1.26	1	0.42	3	1.26
IIC 期	141	34	24.11	88	62.41	5	3.55	1	0.71	1	0.71	0	0.00	2	1.42	7	4.96	0	0.00	3	2.13
III 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	260	28	10.77	217	83.46	6	2.31	0	0.00	1	0.38	1	0.38	2	0.77	4	1.54	0	0.00	1	0.38
IIIB 期	1760	251	14.26	1396	79.32	18	1.02	2	0.11	20	1.14	0	0.00	20	1.14	41	2.33	6	0.34	6	0.34
IIIC 期	676	88	13.02	470	69.53	44	6.51	1	0.15	18	2.66	2	0.30	14	2.07	21	3.11	4	0.59	14	2.07
IV 期	2315	228	9.85	291	12.57	19	0.82	44	1.90	820	35.42	34	1.47	596	25.75	179	7.73	27	1.17	77	3.33
不詳	217	173	79.72	10	4.61	1	0.46	0	0.00	2	0.92	0	0.00	8	3.69	19	8.76	1	0.46	3	1.38

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		非同步化療與放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1491	696	46.68	480	32.19	17	1.14	9	0.60	170	11.40	6	0.40	88	5.90	3	0.20	2	0.13	20	1.34
0 期	431	431	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	157	152	96.82	5	3.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	161	52	32.30	104	64.60	1	0.62	1	0.62	2	1.24	0	0.00	0	0.00	1	0.62	0	0.00	0	0.00
IIB 期	26	2	7.69	24	92.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	21	2	9.52	18	85.71	1	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	33	1	3.03	32	96.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	189	7	3.70	173	91.53	3	1.59	1	0.53	4	2.12	0	0.00	1	0.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC 期	115	3	2.61	93	80.87	10	8.70	0	0.00	6	5.22	0	0.00	1	0.87	0	0.00	0	0.00	2	1.74
IV 期	322	14	4.35	29	9.01	2	0.62	7	2.17	157	48.76	6	1.86	86	26.71	2	0.62	2	0.62	17	5.28
不詳	31	27	87.10	2	6.45	0	0.00	0	0.00	1	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		非同步化療與放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6863	3994	58.20	1832	26.69	72	1.05	27	0.39	519	7.56	20	0.29	298	4.34	41	0.60	17	0.25	43	0.63
0 期	2493	2483	99.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	0.40	0	0.00
I 期	974	942	96.71	27	2.77	1	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.41	0	0.00
II 期	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	804	300	37.31	484	60.20	15	1.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.25	1	0.12	0	0.00	2	0.25
IIB 期	101	16	15.84	76	75.25	7	6.93	0	0.00	1	0.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.99
IIC 期	59	11	18.64	41	69.49	3	5.08	1	1.69	0	0.00	0	0.00	1	1.69	1	1.69	0	0.00	1	1.69
III 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	150	9	6.00	135	90.00	3	2.00	0	0.00	1	0.67	0	0.00	0	0.00	1	0.67	0	0.00	1	0.67
IIIB 期	825	59	7.15	738	89.45	11	1.33	1	0.12	13	1.58	0	0.00	0	0.00	1	0.12	0	0.00	2	0.24
IIIC 期	259	13	5.02	205	79.15	20	7.72	1	0.39	9	3.47	0	0.00	4	1.54	2	0.77	0	0.00	5	1.93
IV 期	1089	65	5.97	120	11.02	12	1.10	24	2.20	495	45.45	20	1.84	286	26.26	34	3.12	2	0.18	31	2.85
不詳	105	92	87.62	6	5.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4.76	1	0.95	1	0.95	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		非同步化療與放療		化療或與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4815	2638	54.79	1271	26.40	40	0.83	13	0.27	178	3.70	11	0.23	279	5.79	268	5.57	66	1.37	51	1.06
0 期	1053	1036	98.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.19	15	1.42	0	0.00
I 期	611	562	91.98	16	2.62	1	0.16	0	0.00	1	0.16	0	0.00	10	1.64	13	2.13	7	1.15	1	0.16
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	869	498	57.31	317	36.48	7	0.81	0	0.00	1	0.12	0	0.00	11	1.27	21	2.42	10	1.15	4	0.46
IIB 期	111	43	38.74	58	52.25	4	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.70	1	0.90	2	1.80
IIC 期	61	21	34.43	29	47.54	1	1.64	0	0.00	1	1.64	0	0.00	1	1.64	6	9.84	0	0.00	2	3.28
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	77	18	23.38	50	64.94	3	3.90	0	0.00	0	0.00	1	1.30	2	2.60	3	3.90	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	746	185	24.80	485	65.01	4	0.54	0	0.00	3	0.40	0	0.00	19	2.55	40	5.36	6	0.80	4	0.54
IIIC 期	302	72	23.84	172	56.95	14	4.64	0	0.00	3	0.99	2	0.66	9	2.98	19	6.29	4	1.32	7	2.32
IV 期	904	149	16.48	142	15.71	5	0.55	13	1.44	168	18.58	8	0.88	224	24.78	143	15.82	23	2.54	29	3.21
不詳	81	54	66.67	2	2.47	1	1.23	0	0.00	1	1.23	0	0.00	3	3.70	18	22.22	0	0.00	2	2.47

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Colon

C180–C189

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 27 Excisional biopsy
 - 26 Polypectomy, NOS
 - 28 Polypectomy-endoscopic
 - 29 Polypectomy-surgical excision
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–29 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation

[SEER Note: Codes 21 to 24 above combine 20 Local tumor excision, 27 Excisional biopsy,

26 Polypectomy, NOS, 28 Polypectomy-endoscopic or 29 Polypectomy-surgical excision WITH 21 PDT, 22 Electrocautery, 23 Cryosurgery, or 24 Laser ablation]

- 25 Laser excision

- 30 Partial colectomy [but less than hemicolectomy] segmental resection
 - 32 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 30 includes but is not limited to the following procedures: Appendectomy (for an appendix primary only), enterocolectomy, ileocolectomy, partial colectomy, NOS, partial resection of transverse colon and flexures, and segmental resection (such as cecectomy or sigmoidectomy). Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

- 40 Subtotal colectomy/hemicolectomy (total right or left colon and a portion of transverse colon)
 - 41 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Code 40 includes extended (but less than total) right or left colectomy. Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”.]

- 50 Total colectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction; may include a portion of the rectum)

- 51 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

- 60 Total proctocolectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction, including the entire rectum)

[SEER Note: Commonly used for familial polyposis or polyposis coli]

- 61 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note: Removal of a short portion of the distal ileum is **not** “removal of a contiguous organ”]

70 Colectomy or coloproctectomy with resection of contiguous organ(s), NOS (where there is not enough information to code 32, 41, 51, or 61)

Code 70 includes: Any colectomy (partial, hemicolectomy, or total) WITH a resection of any other organs in continuity with the primary site. Other organs may be partially or totally removed. Other

organs may include, but are not limited to, oophorectomy, partial proctectomy, rectal mucosectomy, or pelvic exenteration.

[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Colectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

直腸癌

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6471	100.00	4011	100.00	2460	100.00	3326	100.00	3145	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	11	0.17	10	0.25	1	0.04	5	0.15	6	0.19
25-29 歲	25	0.39	15	0.37	10	0.41	13	0.39	12	0.38
30-34 歲	44	0.68	24	0.60	20	0.81	23	0.69	21	0.67
35-39 歲	150	2.32	95	2.37	55	2.24	70	2.10	80	2.54
40-44 歲	274	4.23	164	4.09	110	4.47	159	4.78	115	3.66
45-49 歲	434	6.71	252	6.28	182	7.40	249	7.49	185	5.88
50-54 歲	695	10.74	431	10.75	264	10.73	360	10.82	335	10.65
55-59 歲	796	12.30	511	12.74	285	11.59	424	12.75	372	11.83
60-64 歲	1010	15.61	687	17.13	323	13.13	526	15.81	484	15.39
65-69 歲	995	15.38	653	16.28	342	13.90	531	15.97	464	14.75
70-74 歲	665	10.28	403	10.05	262	10.65	335	10.07	330	10.49
75-79 歲	526	8.13	319	7.95	207	8.41	252	7.58	274	8.71
80-84 歲	461	7.12	255	6.36	206	8.37	212	6.37	249	7.92
85 歲以上	385	5.95	192	4.79	193	7.85	167	5.02	218	6.93
臨床期別 ¹										
0 期	720	11.13	457	11.39	263	10.69	300	9.02	420	13.35
I 期	1063	16.43	655	16.33	408	16.59	554	16.66	509	16.18
II 期	768	11.87	477	11.89	291	11.83	384	11.55	384	12.21
III 期	1741	26.90	1099	27.40	642	26.10	958	28.80	783	24.90
IV 期	1076	16.63	665	16.58	411	16.71	569	17.11	507	16.12
不詳	1103	17.05	658	16.40	445	18.09	561	16.87	542	17.23
病理期別 ¹										
0 期	1100	17.00	677	16.88	423	17.20	504	15.15	596	18.95
I 期	1347	20.82	844	21.04	503	20.45	742	22.31	605	19.24
II 期	790	12.21	530	13.21	260	10.57	436	13.11	354	11.26
III 期	1235	19.09	732	18.25	503	20.45	633	19.03	602	19.14
IV 期	682	10.54	431	10.75	251	10.20	378	11.37	304	9.67
不詳	1317	20.35	797	19.87	520	21.14	633	19.03	684	21.75
整併期別 ^{1,2}										
0 期	1094	16.91	672	16.75	422	17.15	500	15.03	594	18.89
I 期	1302	20.12	800	19.95	502	20.41	712	21.41	590	18.76
II 期	836	12.92	541	13.49	295	11.99	428	12.87	408	12.97
III 期	1819	28.11	1128	28.12	691	28.09	970	29.16	849	27.00
IV 期	1115	17.23	692	17.25	423	17.20	591	17.77	524	16.66
不詳	305	4.71	178	4.44	127	5.16	125	3.76	180	5.72

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6471	100.00	4011	100.00	2460	100.00	3326	100.00	3145	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ³	0.572									
治療方式 ^{4,5}										
手術	2853	44.09	1738	43.33	1115	45.33	1453	43.69	1400	44.52
手術合併化療	1350	20.86	804	20.04	546	22.20	724	21.77	626	19.90
手術合併化療與放療	1204	18.61	824	20.54	380	15.45	615	18.49	589	18.73
手術合併放療	61	0.94	39	0.97	22	0.89	27	0.81	34	1.08
同步化療與放療	273	4.22	179	4.46	94	3.82	138	4.15	135	4.29
非同步化療與放療	145	2.24	93	2.32	52	2.11	67	2.01	78	2.48
放療	49	0.76	24	0.60	25	1.02	26	0.78	23	0.73
化療或/與標靶治療	316	4.88	199	4.96	117	4.76	169	5.08	147	4.67
緩和治療	128	1.98	62	1.55	66	2.68	56	1.68	72	2.29
未有首次治療申報紀錄	42	0.65	24	0.60	18	0.73	23	0.69	19	0.60
其他治療	50	0.77	25	0.62	25	1.02	28	0.84	22	0.70
組織型態										
原位癌										
腺癌	940	99.37	588	99.16	352	99.72	404	99.51	536	99.26
非特定上皮癌	6	0.63	5	0.84	1	0.28	2	0.49	4	0.74
侵襲癌										
腺癌	4891	88.52	3050	89.23	1841	87.38	2606	89.25	2285	87.72
神經內分泌癌	534	9.67	318	9.30	216	10.25	266	9.11	268	10.29
其他特定上皮癌	33	0.60	11	0.32	22	1.04	24	0.82	9	0.35
非特定上皮癌	20	0.36	11	0.32	9	0.43	6	0.21	14	0.54
胃腸基質瘤	24	0.43	13	0.38	11	0.52	13	0.45	11	0.42
其他惡性肉瘤	1	0.02	1	0.03	0	0.00	1	0.03	0	0.00
其他惡性腫瘤	22	0.40	14	0.41	8	0.38	4	0.14	18	0.69

註 1：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期

註 2：整併期別* -請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)-之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註(p.572-575)。

註 5：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

直腸癌

表十之二 直腸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6471	2853	44.09	1350	20.86	1204	18.61	61	0.94	273	4.22	145	2.24	49	0.76	316	4.88	128	1.98	42	0.65	50	0.77
0 期	1094	1080	98.72	2	0.18	2	0.18	2	0.18	0	0.00	0	0.00	1	0.09	0	0.00	1	0.09	6	0.55	0	0.00
I 期	1302	1095	84.10	35	2.69	69	5.30	28	2.15	35	2.69	2	0.15	11	0.84	6	0.46	10	0.77	9	0.69	2	0.15
II 期	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00
IIA 期	725	219	30.21	233	32.14	173	23.86	11	1.52	61	8.41	6	0.83	8	1.10	10	1.38	3	0.41	1	0.14	0	0.00
IIB 期	55	13	23.64	21	38.18	13	23.64	1	1.82	2	3.64	2	3.64	0	0.00	0	0.00	1	1.82	2	3.64	0	0.00
IIC 期	52	6	11.54	17	32.69	13	25.00	1	1.92	7	13.46	4	7.69	3	5.77	1	1.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	217	11	5.07	115	53.00	63	29.03	2	0.92	12	5.53	3	1.38	2	0.92	6	2.76	2	0.92	0	0.00	1	0.46
IIIB 期	1181	97	8.21	454	38.44	500	42.34	13	1.10	79	6.69	9	0.76	5	0.42	8	0.68	9	0.76	2	0.17	5	0.42
IIIC 期	421	26	6.18	128	30.40	188	44.66	1	0.24	44	10.45	6	1.43	6	1.43	8	1.90	9	2.14	1	0.24	4	0.95
IV 期	1115	70	6.28	338	30.31	164	14.71	1	0.09	32	2.87	111	9.96	13	1.17	272	24.39	76	6.82	11	0.99	27	2.42
不詳	305	236	77.38	6	1.97	19	6.23	1	0.33	1	0.33	2	0.66	0	0.00	5	1.64	17	5.57	10	3.28	8	2.62

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	938	468	49.89	186	19.83	181	19.30	4	0.43	29	3.09	12	1.28	1	0.11	40	4.26	3	0.32	5	0.53	9	0.96
0 期	126	124	98.41	0	0.00	1	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.79	0	0.00
I 期	235	221	94.04	1	0.43	9	3.83	2	0.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.85	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	72	17	23.61	35	48.61	15	20.83	0	0.00	3	4.17	1	1.39	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB 期	6	1	16.67	2	33.33	3	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	5	1	20.00	2	40.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	31	0	0.00	21	67.74	9	29.03	0	0.00	1	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	160	9	5.63	56	35.00	81	50.63	2	1.25	11	6.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.63
IIIC 期	60	1	1.67	18	30.00	36	60.00	0	0.00	5	8.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	144	2	1.39	51	35.42	25	17.36	0	0.00	8	5.56	10	6.94	1	0.69	39	27.08	2	1.39	0	0.00	6	4.17
不詳	99	92	92.93	0	0.00	1	1.01	0	0.00	0	0.00	1	1.01	0	0.00	0	0.00	1	1.01	2	2.02	2	2.02

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3496	1567	44.82	755	21.60	741	21.20	20	0.57	104	2.97	71	2.03	13	0.37	164	4.69	19	0.54	13	0.37	29	0.83
0 期	688	684	99.42	1	0.15	0	0.00	1	0.15	0	0.00	0	0.00	1	0.15	0	0.00	0	0.00	1	0.15	0	0.00
I 期	696	606	87.07	21	3.02	39	5.60	11	1.58	10	1.44	1	0.14	1	0.14	0	0.00	2	0.29	4	0.57	1	0.14
II 期	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67
IIA 期	345	86	24.93	129	37.39	101	29.28	4	1.16	21	6.09	1	0.29	2	0.58	1	0.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB 期	23	6	26.09	9	39.13	7	30.43	0	0.00	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	25	1	4.00	10	40.00	7	28.00	0	0.00	3	12.00	1	4.00	3	12.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	133	6	4.51	75	56.39	43	32.33	0	0.00	3	2.26	1	0.75	1	0.75	2	1.50	1	0.75	0	0.00	1	0.75
IIIB 期	621	27	4.35	246	39.61	309	49.76	4	0.64	29	4.67	2	0.32	0	0.00	2	0.32	0	0.00	0	0.00	2	0.32
IIIC 期	219	8	3.65	64	29.22	112	51.14	0	0.00	21	9.59	2	0.91	2	0.91	5	2.28	3	1.37	0	0.00	2	0.91
IV 期	591	25	4.23	195	32.99	109	18.44	0	0.00	16	2.71	62	10.49	3	0.51	150	25.38	11	1.86	4	0.68	16	2.71
不詳	152	118	77.63	4	2.63	14	9.21	0	0.00	1	0.66	0	0.00	0	0.00	4	2.63	2	1.32	4	2.63	5	3.29

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2037	818	40.16	409	20.08	282	13.84	37	1.82	140	6.87	62	3.04	35	1.72	112	5.50	106	5.20	24	1.18	12	0.59
0 期	280	272	97.14	1	0.36	1	0.36	1	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.36	4	1.43	0	0.00
I 期	371	268	72.24	13	3.50	21	5.66	15	4.04	25	6.74	1	0.27	10	2.70	6	1.62	8	2.16	3	0.81	1	0.27
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IIA 期	308	116	37.66	69	22.40	57	18.51	7	2.27	37	12.01	4	1.30	6	1.95	8	2.60	3	0.97	1	0.32	0	0.00
IIB 期	26	6	23.08	10	38.46	3	11.54	1	3.85	2	7.69	1	3.85	0	0.00	0	0.00	1	3.85	2	7.69	0	0.00
IIC 期	22	4	18.18	5	22.73	5	22.73	1	4.55	3	13.64	3	13.64	0	0.00	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	53	5	9.43	19	35.85	11	20.75	2	3.77	8	15.09	2	3.77	1	1.89	4	7.55	1	1.89	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	400	61	15.25	152	38.00	110	27.50	7	1.75	39	9.75	7	1.75	5	1.25	6	1.50	9	2.25	2	0.50	2	0.50
IIIC 期	142	17	11.97	46	32.39	40	28.17	1	0.70	18	12.68	4	2.82	4	2.82	3	2.11	6	4.23	1	0.70	2	1.41
IV 期	380	43	11.32	92	24.21	30	7.89	1	0.26	8	2.11	39	10.26	9	2.37	83	21.84	63	16.58	7	1.84	5	1.32
不詳	54	26	48.15	2	3.70	4	7.41	1	1.85	0	0.00	1	1.85	0	0.00	1	1.85	14	25.93	4	7.41	1	1.85

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Rectosigmoid

C199

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 26 Polypectomy
 - 27 Excisional biopsy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy (EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
 - 25 Laser excision
 - 30 Wedge or segmental resection; partial proctosigmoidectomy, NOS
 - 31 Plus resection of contiguous organs; example: small bowel, bladder
- Procedures coded 30 include, but are not limited to:

Anterior resection
Hartmann operation
Low anterior resection (LAR)
Partial colectomy, NOS
Rectosigmoidectomy, NOS
Sigmoidectomy

- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note: Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy

[SEER Note: Procedures coded 50 include but are not limited to: Abdominoperineal resection (A & P resection), anterior/posterior resection (A/P resection)/Miles' operation, Rankin's operation]

- 51 Total colectomy

[SEER Note: Removal of the colon from cecum to rectosigmoid or portion of rectum]

- 55 Total colectomy WITH ileostomy, NOS

56 Ileorectal reconstruction

57 Total colectomy WITH other pouch; example: Koch pouch

- 60 Total proctocolectomy, NOS [SEER Note: Combination of 50 and 51]

65 Total proctocolectomy WITH ileostomy, NOS

66 Total proctocolectomy WITH ileostomy and pouch

Removal of the colon from cecum to the rectosigmoid or a portion of the rectum.

- 70 Colectomy or proctocolectomy resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

[SEER Note: Procedures that may be part of an en bloc resection include, but are not limited to: an oophorectomy and a rectal mucosectomy. Code 70 includes any colectomy (partial, hemicolectomy or total) with an en bloc resection of any other organs. The "other organs" may be partially or totally resected. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen.]

- 80 Colectomy, NOS; Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS

- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

Rectum

C209

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10-14

- 20 Local tumor excision, NOS
 - 27 Excisional biopsy
 - 26 Polypectomy
 - 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
 - 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
 - 22 Electrocautery
 - 23 Cryosurgery
 - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 28 Curette and fulguration
- 30 Wedge or segmental resection; partial proctectomy, NOS
 - Procedures coded 30 include, but are not limited to:
 - Anterior resection
 - Hartmann's operation
 - Low anterior resection (LAR)
 - Transsacral rectosigmoidectomy
 - Total mesorectal excision (TME)
- 40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note: Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

- 50 Total proctectomy
 - Procedure coded 50 includes, but is not limited to:
 - Abdominoperineal resection (Miles Procedure)
 - [SEER Note: Also called A & P resection, anterior/posterior (A/P) resection/Miles' operation, Rankin's operation]

- 60 Total proctocolectomy, NOS
- 70 Proctectomy or proctocolectomy with resection in continuity with other organs; pelvic exenteration
 - [SEER Note: In continuity with or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]
- 80 Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肝癌

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	8521	100.00	6047	100.00	2474	100.00	5001	100.00	3520	100.00
年齡										
00-04 歲	13	0.15	9	0.15	4	0.16	13	0.26	0	0.00
05-09 歲	3	0.04	3	0.05	0	0.00	3	0.06	0	0.00
10-14 歲	2	0.02	1	0.02	1	0.04	2	0.04	0	0.00
15-19 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.04	1	0.02	0	0.00
20-24 歲	1	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
25-29 歲	10	0.12	5	0.08	5	0.20	8	0.16	2	0.06
30-34 歲	29	0.34	24	0.40	5	0.20	16	0.32	13	0.37
35-39 歲	88	1.03	73	1.21	15	0.61	57	1.14	31	0.88
40-44 歲	217	2.55	185	3.06	32	1.29	150	3.00	67	1.90
45-49 歲	338	3.97	303	5.01	35	1.41	220	4.40	118	3.35
50-54 歲	653	7.66	562	9.29	91	3.68	401	8.02	252	7.16
55-59 歲	1045	12.26	882	14.59	163	6.59	616	12.32	429	12.19
60-64 歲	1330	15.61	1026	16.97	304	12.29	817	16.34	513	14.57
65-69 歲	1524	17.89	1063	17.58	461	18.63	930	18.60	594	16.88
70-74 歲	1156	13.57	748	12.37	408	16.49	690	13.80	466	13.24
75-79 歲	1003	11.77	589	9.74	414	16.73	528	10.56	475	13.49
80-84 歲	656	7.70	339	5.61	317	12.81	331	6.62	325	9.23
85 歲以上	452	5.30	234	3.87	218	8.81	217	4.34	235	6.68
臨床期別										
I 期	3804	44.64	2555	42.25	1249	50.49	2333	46.65	1471	41.79
II 期	1524	17.89	1057	17.48	467	18.88	895	17.90	629	17.87
III 期	1997	23.44	1527	25.25	470	19.00	1135	22.70	862	24.49
IV 期	1026	12.04	796	13.16	230	9.30	540	10.80	486	13.81
不詳	170	2.00	112	1.85	58	2.34	98	1.96	72	2.05
病理期別										
I 期	1311	15.39	954	15.78	357	14.43	909	18.18	402	11.42
II 期	876	10.28	671	11.10	205	8.29	629	12.58	247	7.02
III 期	397	4.66	320	5.29	77	3.11	270	5.40	127	3.61
IV 期	112	1.31	94	1.55	18	0.73	68	1.36	44	1.25
不詳	5825	68.36	4008	66.28	1817	73.44	3125	62.49	2700	76.70
整併期別 ¹										
I 期	3401	39.91	2245	37.13	1156	46.73	2025	40.49	1376	39.09
II 期	1957	22.97	1391	23.00	566	22.88	1221	24.42	736	20.91
III 期	1984	23.28	1510	24.97	474	19.16	1133	22.66	851	24.18
IV 期	1031	12.10	804	13.30	227	9.18	542	10.84	489	13.89
不詳	148	1.74	97	1.60	51	2.06	80	1.60	68	1.93
BCLC 期別										
0 期	849	9.96	548	9.06	301	12.17	493	9.86	356	10.11
A 期	2865	33.62	1941	32.10	924	37.35	1747	34.93	1118	31.76
B 期	1847	21.68	1372	22.69	475	19.20	1119	22.38	728	20.68
C 期	2044	23.99	1577	26.08	467	18.88	1202	24.04	842	23.92
D 期	657	7.71	426	7.04	231	9.34	324	6.48	333	9.46
不詳	259	3.04	183	3.03	76	3.07	116	2.32	143	4.06

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	8521	100.00	6047	100.00	2474	100.00	5001	100.00	3520	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.5105									
治療方式 ^{3,4}										
手術	2289	26.86	1705	28.20	584	23.61	1551	31.01	738	20.97
肝臟移植	44	0.52	33	0.55	11	0.44	41	0.82	3	0.09
局部治療	1523	17.87	943	15.59	580	23.44	786	15.72	737	20.94
栓塞	1341	15.74	921	15.23	420	16.98	741	14.82	600	17.05
手術合併局部治療	47	0.55	35	0.58	12	0.49	31	0.62	16	0.45
手術合併栓塞	117	1.37	88	1.46	29	1.17	71	1.42	46	1.31
手術合併標靶治療	52	0.61	41	0.68	11	0.44	39	0.78	13	0.37
局部治療合併栓塞	511	6.00	317	5.24	194	7.84	316	6.32	195	5.54
標靶治療	430	5.05	336	5.56	94	3.80	259	5.18	171	4.86
栓塞合併標靶治療	197	2.31	153	2.53	44	1.78	116	2.32	81	2.30
放療	166	1.95	120	1.98	46	1.86	94	1.88	72	2.05
放療合併栓塞	86	1.01	71	1.17	15	0.61	50	1.00	36	1.02
放療合併栓塞與標靶治療	97	1.14	86	1.42	11	0.44	70	1.40	27	0.77
放療合併標靶治療	189	2.22	158	2.61	31	1.25	87	1.74	102	2.90
化療	67	0.79	56	0.93	11	0.44	35	0.70	32	0.91
化療合併標靶治療	59	0.69	50	0.83	9	0.36	28	0.56	31	0.88
免疫治療	38	0.45	31	0.51	7	0.28	26	0.52	12	0.34
免疫治療合併標靶治療	64	0.75	49	0.81	15	0.61	53	1.06	11	0.31
緩和治療	575	6.75	374	6.18	201	8.12	248	4.96	327	9.29
未有首次治療申報紀錄	113	1.33	68	1.12	45	1.82	36	0.72	77	2.19
其他治療	516	6.06	412	6.81	104	4.20	323	6.46	193	5.48
組織型態										
肝細胞癌	8411	98.71	5973	98.78	2438	98.54	4929	98.56	3482	98.92
膽管癌	9	0.11	9	0.15	0	0.00	6	0.12	3	0.09
合併肝細胞癌和膽管癌	30	0.35	23	0.38	7	0.28	11	0.22	19	0.54
肝母細胞瘤	16	0.19	12	0.20	4	0.16	16	0.32	0	0.00
其他特定上皮癌	13	0.15	4	0.07	9	0.36	7	0.14	6	0.17
非特定上皮癌	4	0.05	2	0.03	2	0.08	3	0.06	1	0.03
血管肉瘤	23	0.27	17	0.28	6	0.24	17	0.34	6	0.17
其他惡性肉瘤	8	0.09	5	0.08	3	0.12	6	0.12	2	0.06
其他惡性腫瘤	7	0.08	2	0.03	5	0.20	6	0.12	1	0.03

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.582-587)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝內膽管癌

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1045	100.00	608	100.00	437	100.00	647	100.00	398	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	3	0.29	2	0.33	1	0.23	2	0.31	1	0.25
30-34 歲	2	0.19	1	0.16	1	0.23	2	0.31	0	0.00
35-39 歲	11	1.05	8	1.32	3	0.69	8	1.24	3	0.75
40-44 歲	23	2.20	13	2.14	10	2.29	17	2.63	6	1.51
45-49 歲	46	4.40	33	5.43	13	2.97	32	4.95	14	3.52
50-54 歲	98	9.38	76	12.50	22	5.03	67	10.36	31	7.79
55-59 歲	130	12.44	95	15.63	35	8.01	93	14.37	37	9.30
60-64 歲	167	15.98	103	16.94	64	14.65	106	16.38	61	15.33
65-69 歲	186	17.80	101	16.61	85	19.45	116	17.93	70	17.59
70-74 歲	142	13.59	71	11.68	71	16.25	81	12.52	61	15.33
75-79 歲	100	9.57	49	8.06	51	11.67	52	8.04	48	12.06
80-84 歲	77	7.37	27	4.44	50	11.44	44	6.80	33	8.29
85 歲以上	60	5.74	29	4.77	31	7.09	27	4.17	33	8.29
臨床期別										
0 期	1	0.10	1	0.16	0	0.00	1	0.15	0	0.00
I 期	213	20.38	134	22.04	79	18.08	156	24.11	57	14.32
II 期	123	11.77	71	11.68	52	11.90	77	11.90	46	11.56
III 期	202	19.33	119	19.57	83	18.99	109	16.85	93	23.37
IV 期	422	40.38	236	38.82	186	42.56	266	41.11	156	39.20
不詳	84	8.04	47	7.73	37	8.47	38	5.87	46	11.56
病理期別										
0 期	4	0.38	3	0.49	1	0.23	2	0.31	2	0.50
I 期	136	13.01	91	14.97	45	10.30	104	16.07	32	8.04
II 期	109	10.43	73	12.01	36	8.24	75	11.59	34	8.54
III 期	69	6.60	42	6.91	27	6.18	46	7.11	23	5.78
IV 期	83	7.94	38	6.25	45	10.30	61	9.43	22	5.53
不詳	644	61.63	361	59.38	283	64.76	359	55.49	285	71.61
整併期別 ¹										
0 期	4	0.38	3	0.49	1	0.23	2	0.31	2	0.50
I 期	180	17.22	114	18.75	66	15.10	135	20.87	45	11.31
II 期	160	15.31	96	15.79	64	14.65	103	15.92	57	14.32
III 期	216	20.67	127	20.89	89	20.37	117	18.08	99	24.87
IV 期	432	41.34	240	39.47	192	43.94	272	42.04	160	40.20
不詳	53	5.07	28	4.61	25	5.72	18	2.78	35	8.79

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1045	100.00	608	100.00	437	100.00	647	100.00	398	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.5644									
治療方式 ^{3,4}										
手術	262	25.07	167	27.47	95	21.74	191	29.52	71	17.84
化療	278	26.60	152	25.00	126	28.83	187	28.90	91	22.86
化療合併免疫治療	19	1.82	9	1.48	10	2.29	16	2.47	3	0.75
放療	45	4.31	27	4.44	18	4.12	25	3.86	20	5.03
放療合併化療	66	6.32	44	7.24	22	5.03	39	6.03	27	6.78
手術合併化療	53	5.07	33	5.43	20	4.58	34	5.26	19	4.77
手術合併放療	6	0.57	3	0.49	3	0.69	3	0.46	3	0.75
手術合併化療與放療	27	2.58	17	2.80	10	2.29	17	2.63	10	2.51
局部治療	20	1.91	10	1.64	10	2.29	14	2.16	6	1.51
栓塞	14	1.34	11	1.81	3	0.69	8	1.24	6	1.51
緩和治療	174	16.65	82	13.49	92	21.05	70	10.82	104	26.13
未有首次治療申報紀錄	30	2.87	18	2.96	12	2.75	7	1.08	23	5.78
其他治療	51	4.88	35	5.76	16	3.66	36	5.56	15	3.77
組織型態										
膽管癌	892	85.36	506	83.22	386	88.33	532	82.23	360	90.45
合併肝細胞癌和膽管癌	122	11.67	86	14.14	36	8.24	92	14.22	30	7.54
其他特定上皮癌	20	1.91	10	1.64	10	2.29	17	2.63	3	0.75
非特定上皮癌	10	0.96	6	0.99	4	0.92	6	0.93	4	1.01
其他惡性腫瘤	1	0.10	0	0.00	1	0.23	0	0.00	1	0.25

註 1：整併期別* -請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.588-589)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.5%者，則不呈現於報告中。

肝癌

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8521	2289	26.86	44	0.52	1523	17.87	1341	15.74	47	0.55	117	1.37	52	0.61	511	6.00	430	5.05	197	2.31
I 期	3401	1237	36.37	18	0.53	1211	35.61	372	10.94	19	0.56	39	1.15	2	0.06	273	8.03	4	0.12	5	0.15
II 期	1957	746	38.12	22	1.12	294	15.02	436	22.28	22	1.12	20	1.02	4	0.20	201	10.27	2	0.10	19	0.97
III 期	1984	261	13.16	4	0.20	7	0.35	437	22.03	4	0.20	58	2.92	29	1.46	31	1.56	201	10.13	105	5.29
IV 期	1031	11	1.07	0	0.00	5	0.48	85	8.24	1	0.10	0	0.00	16	1.55	3	0.29	222	21.53	67	6.50
不詳	148	34	22.97	0	0.00	6	4.05	11	7.43	1	0.68	0	0.00	1	0.68	3	2.03	1	0.68	1	0.68

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	702	212	30.20	5	0.71	80	11.40	76	10.83	3	0.43	18	2.56	11	1.57	28	3.99	39	5.56	19	2.71
I 期	244	121	49.59	2	0.82	63	25.82	15	6.15	2	0.82	7	2.87	0	0.00	17	6.97	0	0.00	0	0.00
II 期	153	61	39.87	2	1.31	17	11.11	38	24.84	1	0.65	3	1.96	1	0.65	11	7.19	0	0.00	4	2.61
III 期	169	27	15.98	1	0.59	0	0.00	17	10.06	0	0.00	8	4.73	6	3.55	0	0.00	20	11.83	11	6.51
IV 期	111	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4.50	0	0.00	0	0.00	3	2.70	0	0.00	19	17.12	4	3.60
不詳	25	3	12.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.590。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.590。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.590。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.590。

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療		放療合併 栓塞		放療合併 栓塞與 標靶治療		放療合併 標靶治療		化療		化療合併 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併 標靶治療		緩和治療 ⁶		未有 首次治療 申報紀錄 ⁷		其他治療 ⁸	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
166	1.95	86	1.01	97	1.14	189	2.22	67	0.79	59	0.69	38	0.45	64	0.75	575	6.75	113	1.33	516	6.06
35	1.03	29	0.85	1	0.03	1	0.03	2	0.06	1	0.03	0	0.00	1	0.03	57	1.68	19	0.56	75	2.21
20	1.02	10	0.51	2	0.10	0	0.00	5	0.26	1	0.05	1	0.05	0	0.00	42	2.15	18	0.92	92	4.70
67	3.38	41	2.07	50	2.52	88	4.44	28	1.41	32	1.61	17	0.86	25	1.26	250	12.60	42	2.12	207	10.43
37	3.59	6	0.58	44	4.27	99	9.60	24	2.33	22	2.13	19	1.84	37	3.59	196	19.01	26	2.52	111	10.77
7	4.73	0	0.00	0	0.00	1	0.68	8	5.41	3	2.03	1	0.68	1	0.68	30	20.27	8	5.41	31	20.95

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療		放療合併栓塞		放療合併 栓塞與 標靶治療		放療合併 標靶治療		化療		化療合併 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併 標靶治療		緩和治療 ⁶		未有 首次治療 申報紀錄 ⁷		其他治療 ⁸	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
10	1.42	9	1.28	13	1.85	21	2.99	12	1.71	3	0.43	8	1.14	13	1.85	25	3.56	9	1.28	88	12.54
3	1.23	4	1.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.41	1	0.41	8	3.28
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.65	0	0.00	1	0.65	0	0.00	1	0.65	2	1.31	10	6.54
2	1.18	5	2.96	6	3.55	11	6.51	4	2.37	2	1.18	3	1.78	3	1.78	8	4.73	4	2.37	31	18.34
5	4.50	0	0.00	7	6.31	10	9.01	5	4.50	1	0.90	4	3.60	10	9.01	14	12.61	2	1.80	22	19.82
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	17	68.00

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4552	1382	30.36	39	0.86	806	17.71	618	13.58	28	0.62	66	1.45	32	0.70	281	6.17	223	4.90	105	2.31
I 期	1817	746	41.06	16	0.88	641	35.28	158	8.70	10	0.55	20	1.10	2	0.11	143	7.87	1	0.06	1	0.06
II 期	1093	463	42.36	20	1.83	154	14.09	202	18.48	14	1.28	10	0.91	3	0.27	114	10.43	0	0.00	7	0.64
III 期	1024	147	14.36	3	0.29	2	0.20	207	20.21	2	0.20	36	3.52	17	1.66	20	1.95	100	9.77	52	5.08
IV 期	553	7	1.27	0	0.00	4	0.72	45	8.14	1	0.18	0	0.00	10	1.81	2	0.36	122	22.06	44	7.96
不詳	65	19	29.23	0	0.00	5	7.69	6	9.23	1	1.54	0	0.00	0	0.00	2	3.08	0	0.00	1	1.54

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		肝臟移植 ³		局部治療 ⁴		栓塞 ⁵		手術合併局部治療		手術合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3267	695	21.27	0	0.00	637	19.50	647	19.80	16	0.49	33	1.01	9	0.28	202	6.18	168	5.14	73	2.23
I 期	1340	370	27.61	0	0.00	507	37.84	199	14.85	7	0.52	12	0.90	0	0.00	113	8.43	3	0.22	4	0.30
II 期	711	222	31.22	0	0.00	123	17.30	196	27.57	7	0.98	7	0.98	0	0.00	76	10.69	2	0.28	8	1.13
III 期	791	87	11.00	0	0.00	5	0.63	213	26.93	2	0.25	14	1.77	6	0.76	11	1.39	81	10.24	42	5.31
IV 期	367	4	1.09	0	0.00	1	0.27	35	9.54	0	0.00	0	0.00	3	0.82	1	0.27	81	22.07	19	5.18
不詳	58	12	20.69	0	0.00	1	1.72	4	6.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.72	1	1.72	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.590。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.590。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.590。

5 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.590。

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療		放療合併 併發症		放療合併 併發症與 標靶治療		放療合併 標靶治療		化療		化療合併 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併 標靶治療		緩和治療 ⁶		未有 首次治療 申報紀錄 ⁷		其他治療 ⁸	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
81	1.78	34	0.75	61	1.34	102	2.24	44	0.97	42	0.92	20	0.44	31	0.68	190	4.17	40	0.88	327	7.18
9	0.50	5	0.28	0	0.00	0	0.00	2	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	0.50	5	0.28	49	2.70
6	0.55	7	0.64	0	0.00	0	0.00	4	0.37	1	0.09	0	0.00	0	0.00	17	1.56	8	0.73	63	5.76
43	4.20	20	1.95	34	3.32	51	4.98	18	1.76	22	2.15	10	0.98	12	1.17	80	7.81	14	1.37	134	13.09
19	3.44	2	0.36	27	4.88	51	9.22	16	2.89	17	3.07	10	1.81	18	3.25	76	13.74	12	2.17	70	12.66
4	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	6.15	2	3.08	0	0.00	1	1.54	8	12.31	1	1.54	11	16.92

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療		放療合併 併發症		放療合併 併發症與 標靶治療		放療合併 標靶治療		化療		化療合併 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併 標靶治療		緩和治療 ⁶		未有 首次治療 申報紀錄 ⁷		其他治療 ⁸	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
75	2.30	43	1.32	23	0.70	66	2.02	11	0.34	14	0.43	10	0.31	20	0.61	360	11.02	64	1.96	101	3.09
23	1.72	20	1.49	1	0.07	1	0.07	0	0.00	1	0.07	0	0.00	1	0.07	47	3.51	13	0.97	18	1.34
14	1.97	3	0.42	2	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	3.38	8	1.13	19	2.67
22	2.78	16	2.02	10	1.26	26	3.29	6	0.76	8	1.01	4	0.51	10	1.26	162	20.48	24	3.03	42	5.31
13	3.54	4	1.09	10	2.72	38	10.35	3	0.82	4	1.09	5	1.36	9	2.45	106	28.88	12	3.27	19	5.18
3	5.17	0	0.00	0	0.00	1	1.72	2	3.45	1	1.72	1	1.72	0	0.00	21	36.21	7	12.07	3	5.17

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類

期別	分析數	手術 ¹		肝臟移植 ²		局部治療 ³		栓塞 ⁴		手術合併局部治療		手術合併合併栓塞		手術合併標靶治療		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8521	2289	26.86	44	0.52	1523	17.87	1341	15.74	47	0.55	117	1.37	52	0.61	511	6.00	430	5.05	197	2.31
0 期	849	287	33.80	1	0.12	434	51.12	50	5.89	4	0.47	7	0.82	0	0.00	49	5.77	0	0.00	0	0.00
A 期	2865	1197	41.78	15	0.52	909	31.73	280	9.77	20	0.70	23	0.80	3	0.10	296	10.33	1	0.03	6	0.21
B 期	1847	603	32.65	6	0.32	85	4.60	629	34.06	15	0.81	58	3.14	9	0.49	118	6.39	13	0.70	39	2.11
C 期	2044	135	6.60	4	0.20	47	2.30	255	12.48	4	0.20	24	1.17	36	1.76	38	1.86	376	18.40	147	7.19
D 期	657	6	0.91	15	2.28	21	3.20	99	15.07	2	0.30	0	0.00	0	0.00	4	0.61	32	4.87	4	0.61
不詳	259	61	23.55	3	1.16	27	10.42	28	10.81	2	0.77	5	1.93	4	1.54	6	2.32	8	3.09	1	0.39

1 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65、66、90。術式編碼詳見 p.590。

2 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.590。

3 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.590。

4 「栓塞」定義：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.590。

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類(續)

放療		放療合併 合併栓塞		放療合併 栓塞與 標靶治療		放療合併 標靶治療		化療		化療合併 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併 標靶治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
166	1.95	86	1.01	97	1.14	189	2.22	67	0.79	59	0.69	38	0.45	64	0.75	575	6.75	113	1.33	516	6.06
3	0.35	2	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12	1	0.12	10	1.18
20	0.70	9	0.31	1	0.03	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00	1	0.03	2	0.07	6	0.21	75	2.62
27	1.46	39	2.11	8	0.43	2	0.11	10	0.54	3	0.16	2	0.11	4	0.22	41	2.22	9	0.49	127	6.88
76	3.72	32	1.57	87	4.26	170	8.32	42	2.05	51	2.50	29	1.42	51	2.50	151	7.39	33	1.61	256	12.52
31	4.72	4	0.61	0	0.00	13	1.98	5	0.76	2	0.30	6	0.91	7	1.07	341	51.90	54	8.22	11	1.67
9	3.47	0	0.00	1	0.39	4	1.54	9	3.47	3	1.16	1	0.39	1	0.39	39	15.06	10	3.86	37	14.29

5 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝內膽管癌

表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療		化療合併 免疫治療		放療		放療合併 化療		手術合併 化療		手術合併 放療		手術合併 化療與 放療		局部治療		栓塞		緩和 治療 ³		未有 首次治療 申報紀錄 ⁴		其他 治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1045	262	25.07	278	26.60	19	1.82	45	4.31	66	6.32	53	5.07	6	0.57	27	2.58	20	1.91	14	1.34	174	16.65	30	2.87	51	4.88
I 期	4	4	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	180	126	70.00	4	2.22	0	0.00	4	2.22	2	1.11	7	3.89	3	1.67	3	1.67	16	8.89	4	2.22	6	3.33	2	1.11	3	1.67
III 期	160	84	52.50	17	10.63	1	0.63	6	3.75	1	0.63	15	9.38	2	1.25	5	3.13	3	1.88	5	3.13	10	6.25	2	1.25	9	5.63
IV 期	216	33	15.28	46	21.30	4	1.85	11	5.09	17	7.87	20	9.26	1	0.46	15	6.94	0	0.00	3	1.39	48	22.22	7	3.24	11	5.09
不詳	432	9	2.08	204	47.22	14	3.24	22	5.09	44	10.19	9	2.08	0	0.00	3	0.69	0	0.00	1	0.23	88	20.37	12	2.78	26	6.02

表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療		化療合併 免疫治療		放療		放療合併 化療		手術合併 化療		手術合併 放療		手術合併 化療與 放療		局部治療		栓塞		緩和 治療 ³		未有 首次治療 申報紀錄 ⁴		其他 治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	85	25	29.41	21	24.71	2	2.35	2	2.35	5	5.88	10	11.76	1	1.18	4	4.71	0	0.00	0	0.00	3	3.53	1	1.18	11	12.94
I 期	19	12	63.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15.79	1	5.26	2	10.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00
II 期	15	10	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	13.33
III 期	18	1	5.56	6	33.33	0	0.00	1	5.56	2	11.11	3	16.67	0	0.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	3	16.67
IV 期	32	1	3.13	15	46.88	2	6.25	1	3.13	3	9.38	1	3.13	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00	2	6.25	0	0.00	6	18.75
不詳	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝內膽管癌

表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療		化療合併 免疫治療		放療		放療合併 化療		手術合併 化療		手術合併 放療		手術合併 化療與 放療		局部治療		栓塞		緩和 治療 ³		未有 首次治療 申報紀錄 ⁴		其他 治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	581	164	28.23	174	29.95	15	2.58	18	3.10	43	7.40	36	6.20	3	0.52	15	2.58	10	1.72	6	1.03	54	9.29	9	1.55	34	5.85
I 期	4	4	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	103	83	80.58	2	1.94	0	0.00	3	2.91	0	0.00	4	3.88	0	0.00	0	0.00	7	6.80	1	0.97	0	0.00	0	0.00	3	2.91
III 期	100	55	55.00	11	11.00	0	0.00	3	3.00	1	1.00	10	10.00	2	2.00	3	3.00	2	2.00	2	2.00	3	3.00	1	1.00	7	7.00
IV 期	110	15	13.64	25	22.73	4	3.64	3	2.73	9	8.18	14	12.73	1	0.91	10	9.09	0	0.00	3	2.73	17	15.45	3	2.73	6	5.45
不詳	244	5	2.05	132	54.10	11	4.51	8	3.28	31	12.70	6	2.46	0	0.00	1	0.41	0	0.00	0	0.00	29	11.89	4	1.64	17	6.97

表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		化療		化療合併 免疫治療		放療		放療合併 化療		手術合併 化療		手術合併 放療		手術合併 化療與 放療		局部治療		栓塞		緩和 治療 ³		未有 首次治療 申報紀錄 ⁴		其他 治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	379	73	19.26	83	21.90	2	0.53	25	6.60	18	4.75	7	1.85	2	0.53	8	2.11	10	2.64	8	2.11	117	30.87	20	5.28	6	1.58
I 期	58	31	53.45	2	3.45	0	0.00	1	1.72	2	3.45	0	0.00	2	3.45	1	1.72	9	15.52	3	5.17	6	10.34	1	1.72	0	0.00
II 期	45	19	42.22	6	13.33	1	2.22	3	6.67	0	0.00	2	4.44	0	0.00	2	4.44	1	2.22	3	6.67	7	15.56	1	2.22	0	0.00
III 期	88	17	19.32	15	17.05	0	0.00	7	7.95	6	6.82	3	3.41	0	0.00	4	4.55	0	0.00	0	0.00	30	34.09	4	4.55	2	2.27
IV 期	156	3	1.92	57	36.54	1	0.64	13	8.33	10	6.41	2	1.28	0	0.00	1	0.64	0	0.00	1	0.64	57	36.54	8	5.13	3	1.92
不詳	32	3	9.38	3	9.38	0	0.00	1	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.13	17	53.13	6	18.75	1	3.13

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

C22.0–C22.1

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Transcatheter arterial embolization (TAE)

16 Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI) /acetic acid

17 Heat-Radio-frequency ablation (RFA)

18 Any combination of 15,16 or 17

19 Other (ultrasound)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–19.

20 Wedge or segmental resection, NOS

21 Wedge resection

22 Segmental resection, NOS

23 One

24 Two

25 Three

26 Segmental resection AND local tumor destruction TAE only

27 Segmental resection AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

28 Segmental resection AND local tumor destruction RFA only

29 Any combination of 26, 27 or 28

Specimen sent to pathology from surgical events 20–26.

30 Lobectomy, NOS

31 Right lobectomy

32 Left lobectomy

33 Lobectomy AND local tumor destruction TAE only

34 Lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

35 Lobectomy AND local tumor destruction RFA only

38 Any combination of 33, 34 or 35

50 Extended lobectomy, NOS (extended: resection of a single lobe plus a segment of another lobe)

51 Extended Right lobectomy

52 Extended Left lobectomy

53 Extended lobectomy AND local tumor destruction TAE only

54 Extended lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only

55 Extended lobectomy AND local tumor destruction RFA only

59 Any combination of 53, 54 or 55

60 Hepatectomy, NOS

61 Total hepatectomy and transplant

65 Excision of a bile duct (for an intra-hepatic bile duct primary only)

66 Excision of a bile duct PLUS partial hepatectomy

75 Bile duct and hepatectomy WITH transplant

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肺癌

表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌¹發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	14352	100.00	7073	100.00	7279	100.00	9461	100.00	4891	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	2	0.01	2	0.03	0	0.00	2	0.02	0	0.00
20-24 歲	6	0.04	2	0.03	4	0.05	6	0.06	0	0.00
25-29 歲	30	0.21	15	0.21	15	0.21	24	0.25	6	0.12
30-34 歲	69	0.48	25	0.35	44	0.60	53	0.56	16	0.33
35-39 歲	228	1.59	85	1.20	143	1.96	167	1.77	61	1.25
40-44 歲	459	3.20	172	2.43	287	3.94	332	3.51	127	2.60
45-49 歲	726	5.06	285	4.03	441	6.06	531	5.61	195	3.99
50-54 歲	1266	8.82	535	7.56	731	10.04	904	9.56	362	7.40
55-59 歲	1866	13.00	869	12.29	997	13.70	1339	14.15	527	10.77
60-64 歲	2262	15.76	1099	15.54	1163	15.98	1571	16.61	691	14.13
65-69 歲	2500	17.42	1333	18.85	1167	16.03	1646	17.40	854	17.46
70-74 歲	1637	11.41	877	12.40	760	10.44	1058	11.18	579	11.84
75-79 歲	1542	10.74	832	11.76	710	9.75	937	9.90	605	12.37
80-84 歲	1008	7.02	532	7.52	476	6.54	541	5.72	467	9.55
85 歲以上	751	5.23	410	5.80	341	4.68	350	3.70	401	8.20
臨床期別										
0 期	210	1.46	68	0.96	142	1.95	189	2.00	21	0.43
I 期	4667	32.52	1775	25.10	2892	39.73	3676	38.85	991	20.26
II 期	572	3.99	309	4.37	263	3.61	400	4.23	172	3.52
III 期	1527	10.64	1091	15.42	436	5.99	902	9.53	625	12.78
IV 期	6367	44.36	3454	48.83	2913	40.02	3711	39.22	2656	54.30
不詳	1009	7.03	376	5.32	633	8.70	583	6.16	426	8.71
病理期別										
0 期	746	5.20	212	3.00	534	7.34	622	6.57	124	2.54
I 期	4717	32.87	1803	25.49	2914	40.03	3629	38.36	1088	22.24
II 期	538	3.75	287	4.06	251	3.45	387	4.09	151	3.09
III 期	529	3.69	291	4.11	238	3.27	368	3.89	161	3.29
IV 期	2638	18.38	1328	18.78	1310	18.00	1704	18.01	934	19.10
不詳	5184	36.12	3152	44.56	2032	27.92	2751	29.08	2433	49.74
整併期別 ²										
0 期	746	5.20	212	3.00	534	7.34	622	6.57	124	2.54
I 期	4801	33.45	1838	25.99	2963	40.71	3662	38.71	1139	23.29
II 期	628	4.38	350	4.95	278	3.82	432	4.57	196	4.01
III 期	1581	11.02	1078	15.24	503	6.91	946	10.00	635	12.98
IV 期	6462	45.03	3500	49.48	2962	40.69	3757	39.71	2705	55.31
不詳	134	0.93	95	1.34	39	0.54	42	0.44	92	1.88

表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	14352	100.00	7073	100.00	7279	100.00	9461	100.00	4891	100.00
臨床與病理期別一致性 Kappa ³	0.7505									
治療方式 ^{4,5,6}										
手術	5123	35.70	1884	26.64	3239	44.50	3987	42.14	1136	23.23
手術合併化療，有/無標靶治療	1234	8.60	619	8.75	615	8.45	876	9.26	358	7.32
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	290	2.02	181	2.56	109	1.50	168	1.78	122	2.49
手術合併標靶治療	236	1.64	76	1.07	160	2.20	162	1.71	74	1.51
手術合併放療與標靶治療	40	0.28	21	0.30	19	0.26	23	0.24	17	0.35
化療	1023	7.13	758	10.72	265	3.64	568	6.00	455	9.30
化療合併標靶治療	346	2.41	186	2.63	160	2.20	168	1.78	178	3.64
標靶治療	2302	16.04	874	12.36	1428	19.62	1413	14.93	889	18.18
放療	442	3.08	320	4.52	122	1.68	246	2.60	196	4.01
非同步放療與標靶治療	746	5.20	316	4.47	430	5.91	469	4.96	277	5.66
非同步放療與化療	515	3.59	389	5.50	126	1.73	269	2.84	246	5.03
非同步放療、化療與標靶治療	162	1.13	92	1.30	70	0.96	86	0.91	76	1.55
非同步放療與化療合併免疫治療，有/ 無標靶治療	104	0.72	84	1.19	20	0.27	71	0.75	33	0.67
同步放療與化療	493	3.44	405	5.73	88	1.21	279	2.95	214	4.38
同步放療與化療與標靶治療	62	0.43	38	0.54	24	0.33	26	0.27	36	0.74
同步放療與化療合併免疫治療，有/無 標靶治療	66	0.46	52	0.74	14	0.19	48	0.51	18	0.37
免疫治療	78	0.54	56	0.79	22	0.30	56	0.59	22	0.45
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	207	1.44	133	1.88	74	1.02	149	1.57	58	1.19
緩和治療	555	3.87	370	5.23	185	2.54	205	2.17	350	7.16
未有首次治療申報紀錄	80	0.56	50	0.71	30	0.41	22	0.23	58	1.19
其他治療	248	1.73	169	2.39	79	1.09	170	1.80	78	1.59
組織型態										
原位癌										
腺癌	746	99.87	212	100.00	534	99.81	622	100.00	124	99.20
其他特定上皮癌	1	0.13	0	0.00	1	0.19	0	0.00	1	0.80
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	1638	12.04	1410	20.55	228	3.38	892	10.09	746	15.65
腺癌	10870	79.90	4731	68.95	6139	91.03	7331	82.94	3539	74.26
腺性鱗狀癌	186	1.37	111	1.62	75	1.11	115	1.30	71	1.49
大細胞癌	165	1.21	110	1.60	55	0.82	102	1.15	63	1.32
肉瘤樣癌	108	0.79	76	1.11	32	0.47	72	0.81	36	0.76
類癌腫瘤	79	0.58	32	0.47	47	0.70	53	0.60	26	0.55
唾液腺樣癌	20	0.15	13	0.19	7	0.10	9	0.10	11	0.23
其他特定上皮癌	13	0.10	7	0.10	6	0.09	6	0.07	7	0.15
非特定上皮癌	372	2.73	284	4.14	88	1.30	210	2.38	162	3.40
惡性肉瘤	18	0.13	15	0.22	3	0.04	13	0.15	5	0.10
其他惡性腫瘤	136	1.00	72	1.05	64	0.95	36	0.41	100	2.10

註 1：小細胞肺癌以外之肺癌，含非小細胞癌、惡性肉瘤等。

註 2：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註(p.596-599)。

註 5：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	933	100.00	829	100.00	104	100.00	498	100.00	435	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.11	1	0.12	0	0.00	1	0.20	0	0.00
35-39 歲	5	0.54	3	0.36	2	1.92	5	1.00	0	0.00
40-44 歲	13	1.39	12	1.45	1	0.96	4	0.80	9	2.07
45-49 歲	21	2.25	16	1.93	5	4.81	9	1.81	12	2.76
50-54 歲	57	6.11	49	5.91	8	7.69	33	6.63	24	5.52
55-59 歲	112	12.00	98	11.82	14	13.46	68	13.65	44	10.11
60-64 歲	166	17.79	149	17.97	17	16.35	80	16.06	86	19.77
65-69 歲	187	20.04	163	19.66	24	23.08	106	21.29	81	18.62
70-74 歲	127	13.61	116	13.99	11	10.58	72	14.46	55	12.64
75-79 歲	113	12.11	103	12.42	10	9.62	60	12.05	53	12.18
80-84 歲	78	8.36	70	8.44	8	7.69	31	6.22	47	10.80
85 歲以上	53	5.68	49	5.91	4	3.85	29	5.82	24	5.52
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	28	3.00	20	2.41	8	7.69	19	3.82	9	2.07
II 期	17	1.82	15	1.81	2	1.92	9	1.81	8	1.84
III 期	209	22.40	185	22.32	24	23.08	107	21.49	102	23.45
IV 期	675	72.35	605	72.98	70	67.31	361	72.49	314	72.18
不詳	4	0.43	4	0.48	0	0.00	2	0.40	2	0.46
病理期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	20	2.14	15	1.81	5	4.81	12	2.41	8	1.84
II 期	6	0.64	5	0.60	1	0.96	4	0.80	2	0.46
III 期	12	1.29	10	1.21	2	1.92	6	1.20	6	1.38
IV 期	209	22.40	185	22.32	24	23.08	127	25.50	82	18.85
不詳	686	73.53	614	74.07	72	69.23	349	70.08	337	77.47
整併期別 ¹										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	25	2.68	20	2.41	5	4.81	14	2.81	11	2.53
II 期	14	1.50	13	1.57	1	0.96	8	1.61	6	1.38
III 期	213	22.83	187	22.56	26	25.00	111	22.29	102	23.45
IV 期	677	72.56	605	72.98	72	69.23	363	72.89	314	72.18
不詳	4	0.43	4	0.48	0	0.00	2	0.40	2	0.46

表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	933	100.00	829	100.00	104	100.00	498	100.00	435	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	-									
肺小細胞癌分期系統										
局限期	141	15.11	131	15.80	10	9.62	85	17.07	56	12.87
廣泛期	419	44.91	377	45.48	42	40.38	232	46.59	187	42.99
不詳	373	39.98	321	38.72	52	50.00	181	36.35	192	44.14
治療方式 ^{3,4}										
手術	13	1.39	8	0.97	5	4.81	7	1.41	6	1.38
手術合併化療	22	2.36	18	2.17	4	3.85	16	3.21	6	1.38
手術合併化療與放療	13	1.39	13	1.57	0	0.00	4	0.80	9	2.07
化療	280	30.01	253	30.52	27	25.96	165	33.13	115	26.44
放療	48	5.14	44	5.31	4	3.85	24	4.82	24	5.52
同步化療與放療	162	17.36	150	18.09	12	11.54	82	16.47	80	18.39
非同步化療與放療	222	23.79	190	22.92	32	30.77	108	21.69	114	26.21
免疫治療合併化療	23	2.47	21	2.53	2	1.92	13	2.61	10	2.30
免疫治療合併化療與放療	41	4.39	34	4.10	7	6.73	29	5.82	12	2.76
緩和治療	80	8.57	75	9.05	5	4.81	37	7.43	43	9.89
未有首次治療申報紀錄	7	0.75	7	0.84	0	0.00	3	0.60	4	0.92
其他治療	22	2.36	16	1.93	6	5.77	10	2.01	12	2.76
組織型態										
侵襲癌										
小細胞癌	933	100.00	829	100.00	104	100.00	498	100.00	435	100.00

註 1：整併期別* -請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：肺小細胞癌個案因接受手術治療少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.600)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	14352	5123	35.70	1234	8.60	290	2.02	236	1.64	40	0.28	1023	7.13	346	2.41	2302	16.04	442	3.08	746	5.20
0 期	746	744	99.73	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	4801	4138	86.19	497	10.35	9	0.19	14	0.29	0	0.00	8	0.17	0	0.00	5	0.10	89	1.85	3	0.06
II 期	628	104	16.56	378	60.19	27	4.30	11	1.75	1	0.16	8	1.27	1	0.16	3	0.48	43	6.85	1	0.16
IIIA 期	681	61	8.96	203	29.81	151	22.17	18	2.64	1	0.15	32	4.70	6	0.88	7	1.03	34	4.99	0	0.00
IIIB 期	598	13	2.17	60	10.03	52	8.70	16	2.68	3	0.50	74	12.37	9	1.51	66	11.04	32	5.35	5	0.84
IIIC 期	302	0	0.00	4	1.32	6	1.99	4	1.32	2	0.66	46	15.23	6	1.99	34	11.26	25	8.28	4	1.32
IV 期	6462	35	0.54	81	1.25	45	0.70	171	2.65	33	0.51	833	12.89	319	4.94	2180	33.74	212	3.28	731	11.31
不詳	134	28	20.90	11	8.21	0	0.00	1	0.75	0	0.00	22	16.42	5	3.73	7	5.22	7	5.22	2	1.49

表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1520	824	54.21	118	7.76	33	2.17	25	1.64	11	0.72	53	3.49	27	1.78	156	10.26	6	0.39	70	4.61
0 期	227	227	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	621	575	92.59	46	7.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	49	5	10.20	34	69.39	4	8.16	1	2.04	1	2.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.04	0	0.00
IIIA 期	56	1	1.79	21	37.50	16	28.57	2	3.57	0	0.00	1	1.79	1	1.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	41	0	0.00	4	9.76	7	17.07	2	4.88	1	2.44	4	9.76	0	0.00	6	14.63	0	0.00	0	0.00
IIIC 期	20	0	0.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	1	5.00	3	15.00	0	0.00	2	10.00	0	0.00	1	5.00
IV 期	487	5	1.03	10	2.05	4	0.82	19	3.90	8	1.64	45	9.24	24	4.93	148	30.39	5	1.03	69	14.17
不詳	19	11	57.89	2	10.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	10.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

表十二：不同治療組合之肺癌發生人數及合併用藥及治療方式分類(續)																					
非同步放療與化療		非同步放療、化療與標靶治療		非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		同步放療與化療		同步放療與化療與標靶治療		同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		免疫治療		免疫治療合併化療，有/無標靶治療		緩和治療 ⁴		未有首次治療申報紀錄 ⁵		其他治療 ⁶	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
515	3.59	162	1.13	104	0.72	493	3.44	62	0.43	66	0.46	78	0.54	207	1.44	555	3.87	80	0.56	248	1.73
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13
3	0.06	0	0.00	0	0.00	2	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	13	0.27	7	0.15	12	0.25
9	1.43	0	0.00	0	0.00	15	2.39	0	0.00	0	0.00	1	0.16	0	0.00	4	0.64	4	0.64	18	2.87
19	2.79	2	0.29	0	0.00	74	10.87	1	0.15	9	1.32	0	0.00	4	0.59	18	2.64	5	0.73	36	5.29
34	5.69	1	0.17	1	0.17	148	24.75	10	1.67	26	4.35	1	0.17	7	1.17	12	2.01	3	0.50	25	4.18
18	5.96	1	0.33	2	0.66	95	31.46	8	2.65	12	3.97	5	1.66	2	0.66	15	4.97	1	0.33	12	3.97
426	6.59	157	2.43	100	1.55	149	2.31	42	0.65	17	0.26	70	1.08	192	2.97	469	7.26	56	0.87	144	2.23
6	4.48	1	0.75	1	0.75	10	7.46	1	0.75	2	1.49	1	0.75	1	0.75	24	17.91	4	2.99	0	0.00

表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

非同步 放療與 化療	非同步 放療、 化療與 標靶治療	非同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療	同步 放療與 化療	同步 放療與 化療與 標靶治療	同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療	免疫治療	免疫治療 合併化療 ，有/無 標靶治療	緩和治療 ⁴	未有 首次治療 申報紀錄 ⁵	其他治療 ⁶
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
47 3.09	23 1.51	13 0.86	29 1.91	5 0.33	6 0.39	6 0.39	30 1.97	7 0.46	2 0.13	29 1.91
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
1 2.04	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 4.08
1 1.79	0 0.00	0 0.00	3 5.36	0 0.00	1 1.79	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 16.07
1 2.44	0 0.00	0 0.00	10 24.39	0 0.00	2 4.88	0 0.00	1 2.44	0 0.00	0 0.00	3 7.32
2 10.00	0 0.00	0 0.00	4 20.00	1 5.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 10.00
41 8.42	23 4.72	13 2.67	11 2.26	4 0.82	3 0.62	5 1.03	29 5.95	7 1.44	1 0.21	13 2.67
1 5.26	0 0.00	0 0.00	1 5.26	0 0.00	0 0.00	1 5.26	0 0.00	0 0.00	1 5.26	0 0.00

4 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肺癌

表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	7894	3203	40.58	782	9.91	205	2.60	154	1.95	22	0.28	493	6.25	179	2.27	1040	13.17	126	1.60	424	5.37
0 期	465	463	99.57	0	0.00	0	0.00	1	0.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	2981	2634	88.36	303	10.16	9	0.30	7	0.23	0	0.00	2	0.07	0	0.00	0	0.00	15	0.50	0	0.00
II 期	337	39	11.57	250	74.18	16	4.75	5	1.48	0	0.00	2	0.59	0	0.00	1	0.30	3	0.89	0	0.00
IIIA 期	374	22	5.88	130	34.76	104	27.81	12	3.21	1	0.27	17	4.55	2	0.53	1	0.27	4	1.07	0	0.00
IIIB 期	308	9	2.92	44	14.29	38	12.34	11	3.57	2	0.65	21	6.82	4	1.30	16	5.19	5	1.62	2	0.65
IIIC 期	158	0	0.00	2	1.27	3	1.90	3	1.90	1	0.63	18	11.39	3	1.90	14	8.86	10	6.33	0	0.00
IV 期	3216	22	0.68	48	1.49	35	1.09	115	3.58	18	0.56	424	13.18	168	5.22	1005	31.25	87	2.71	421	13.09
不詳	55	14	25.45	5	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	16.36	2	3.64	3	5.45	2	3.64	1	1.82

表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療 ³ ，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4938	1096	22.20	334	6.76	52	1.05	57	1.15	7	0.14	477	9.66	140	2.84	1106	22.40	310	6.28	252	5.10
0 期	54	54	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	1199	929	77.48	148	12.34	0	0.00	7	0.58	0	0.00	6	0.50	0	0.00	5	0.42	74	6.17	3	0.25
II 期	242	60	24.79	94	38.84	7	2.89	5	2.07	0	0.00	6	2.48	1	0.41	2	0.83	39	16.12	1	0.41
IIIA 期	251	38	15.14	52	20.72	31	12.35	4	1.59	0	0.00	14	5.58	3	1.20	6	2.39	30	11.95	0	0.00
IIIB 期	249	4	1.61	12	4.82	7	2.81	3	1.20	0	0.00	49	19.68	5	2.01	44	17.67	27	10.84	3	1.20
IIIC 期	124	0	0.00	1	0.81	1	0.81	0	0.00	0	0.00	25	20.16	3	2.42	18	14.52	15	12.10	3	2.42
IV 期	2759	8	0.29	23	0.83	6	0.22	37	1.34	7	0.25	364	13.19	127	4.60	1027	37.22	120	4.35	241	8.74
不詳	60	3	5.00	4	6.67	0	0.00	1	1.67	0	0.00	13	21.67	1	1.67	4	6.67	5	8.33	1	1.67

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

非同步 放療與 化療		非同步 放療、 化療與 標靶治療		非同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		同步 放療與 化療		同步 放療與 化療與 標靶治療		同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併化療 ，有/無 標靶治療		緩和治療 ⁴		未有 首次治療 申報紀錄 ⁵		其他治療 ⁶	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
309	3.91	104	1.32	70	0.89	313	3.97	40	0.51	46	0.58	28	0.35	110	1.39	102	1.29	7	0.09	137	1.74
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.22
2	0.07	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.07	0	0.00	6	0.20
3	0.89	0	0.00	0	0.00	5	1.48	0	0.00	0	0.00	1	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	3.56
10	2.67	0	0.00	0	0.00	39	10.43	1	0.27	6	1.60	0	0.00	2	0.53	3	0.80	0	0.00	20	5.35
12	3.90	0	0.00	1	0.32	99	32.14	5	1.62	20	6.49	0	0.00	2	0.65	1	0.32	0	0.00	16	5.19
6	3.80	1	0.63	1	0.63	66	41.77	6	3.80	11	6.96	1	0.63	1	0.63	5	3.16	1	0.63	5	3.16
271	8.43	103	3.20	68	2.11	97	3.02	27	0.84	9	0.28	26	0.81	104	3.23	86	2.67	5	0.16	77	2.39
5	9.09	0	0.00	0	0.00	6	10.91	1	1.82	0	0.00	0	0.00	1	1.82	5	9.09	1	1.82	0	0.00

表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

非同步 放療與 化療		非同步 放療、 化療與 標靶治療		非同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		同步 放療與 化療		同步 放療與 化療與 標靶治療		同步 放療與 化療合併 免疫治療 ，有/無 標靶治療		免疫治療		免疫治療 合併化療 ，有/無 標靶治療		緩和治療 ⁴		未有 首次治療 申報紀錄 ⁵		其他治療 ⁶	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
159	3.22	35	0.71	21	0.43	151	3.06	17	0.34	14	0.28	44	0.89	67	1.36	446	9.03	71	1.44	82	1.66
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	0.08	0	0.00	0	0.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.08	11	0.92	7	0.58	6	0.50
5	2.07	0	0.00	0	0.00	10	4.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.65	4	1.65	4	1.65
8	3.19	2	0.80	0	0.00	32	12.75	0	0.00	2	0.80	0	0.00	2	0.80	15	5.98	5	1.99	7	2.79
21	8.43	1	0.40	0	0.00	39	15.66	5	2.01	4	1.61	1	0.40	4	1.61	11	4.42	3	1.20	6	2.41
10	8.06	0	0.00	1	0.81	25	20.16	1	0.81	1	0.81	4	3.23	1	0.81	10	8.06	0	0.00	5	4.03
114	4.13	31	1.12	19	0.69	41	1.49	11	0.40	5	0.18	39	1.41	59	2.14	376	13.63	50	1.81	54	1.96
0	0.00	1	1.67	1	1.67	3	5.00	0	0.00	2	3.33	0	0.00	0	0.00	19	31.67	2	3.33	0	0.00

4「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肺癌

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按肺小細胞癌的分期系統及治療方式分類

期別	分析數	手術 ¹		手術合併化療		手術合併化療與放療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		免疫治療合併化療		免疫治療合併化療與放療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	933	13	1.39	22	2.36	13	1.39	280	30.01	48	5.14	162	17.36	222	23.79	23	2.47	41	4.39	80	8.57	7	0.75	22	2.36
局限期	141	7	4.96	9	6.38	4	2.84	25	17.73	6	4.26	61	43.26	15	10.64	0	0.00	10	7.09	4	2.84	0	0.00	0	0.00
廣泛期	419	1	0.24	2	0.48	1	0.24	149	35.56	21	5.01	47	11.22	122	29.12	10	2.39	19	4.53	41	9.79	2	0.48	4	0.95
不詳	373	5	1.34	11	2.95	8	2.14	106	28.42	21	5.63	54	14.48	85	22.79	13	3.49	12	3.22	35	9.38	5	1.34	18	4.83

表十二之八 小細胞肺癌發生人數按整併期別⁵及治療方式分類

期別	分析數	手術 ¹		手術合併化療		手術合併化療與放療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		免疫治療合併化療		免疫治療合併化療與放療		緩和治療 ²		未有首次治療申報紀錄 ³		其他治療 ⁴	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	933	13	1.39	22	2.36	13	1.39	280	30.01	48	5.14	162	17.36	222	23.79	23	2.47	41	4.39	80	8.57	7	0.75	22	2.36
I 期	25	7	28.00	12	48.00	1	4.00	0	0.00	2	8.00	2	8.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00
II 期	14	2	14.29	2	14.29	2	14.29	1	7.14	1	7.14	5	35.71	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	213	2	0.94	4	1.88	7	3.29	38	17.84	12	5.63	89	41.78	33	15.49	0	0.00	13	6.10	12	5.63	1	0.47	2	0.94
IV 期	677	2	0.30	4	0.59	3	0.44	240	35.45	33	4.87	64	9.45	189	27.92	23	3.40	27	3.99	67	9.90	5	0.74	20	2.95
不詳	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00

1 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

5 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

Lung

C340–C349

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (used principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

15 Local tumor destruction, NOS

12 Laser ablation or cryosurgery

13 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

No specimen sent to pathology from surgical events 12-13 and 15

[SEER Note: Assign code 15 for radiofrequency ablation (RFA).]

20 Excision or resection of less than one lobe, NOS

23 Excision, NOS

24 Laser excision

25 Bronchial sleeve resection ONLY

21 Wedge resection

22 Segmental resection, including lingulectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20–25

30 Resection of [at least one] lobe or bilobectomy, but less than the whole lung (partial pneumonectomy, NOS)

33 Lobectomy WITH mediastinal lymph node dissection

The lymph node dissection should also be coded under *Scope of Regional Lymph Node Surgery*

[SEER Note: Assign code 30 when lymph node dissection is not performed, but lymph nodes are obtained as part of the lobectomy specimen.]

45 Lobe or bilobectomy extended, NOS

46 WITH chest wall

47 WITH pericardium

48 WITH diaphragm

55 Pneumonectomy, NOS

[SEER Note: Code 55 includes the following procedures: complete pneumonectomy, sleeve pneumonectomy, standard pneumonectomy, total pneumonectomy, resection of whole lung]

56 WITH mediastinal lymph node dissection (radical pneumonectomy)

The lymph node dissection should also be coded under *Scope of Regional Lymph Node Surgery*

65 Extended pneumonectomy

66 Extended pneumonectomy plus pleura or diaphragm

70 Extended radical pneumonectomy

The lymph node dissection should also be coded under *Scope of Regional Lymph Node Surgery*

[SEER Note: An extended radical pneumonectomy is a radical pneumonectomy (including removal of mediastinal nodes) and the removal of other tissues or nodes]

80 Resection of lung, NOS

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

乳癌

表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	17036	100.00	51	100.00	16985	100.00	9000	100.00	8036	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01
15-19 歲	2	0.01	0	0.00	2	0.01	1	0.01	1	0.01
20-24 歲	17	0.10	0	0.00	17	0.10	12	0.13	5	0.06
25-29 歲	94	0.55	1	1.96	93	0.55	59	0.66	35	0.44
30-34 歲	307	1.80	3	5.88	304	1.79	176	1.96	131	1.63
35-39 歲	839	4.92	2	3.92	837	4.93	464	5.16	375	4.67
40-44 歲	1676	9.84	2	3.92	1674	9.86	903	10.03	773	9.62
45-49 歲	2633	15.46	1	1.96	2632	15.50	1430	15.89	1203	14.97
50-54 歲	2385	14.00	1	1.96	2384	14.04	1296	14.40	1089	13.55
55-59 歲	2416	14.18	7	13.73	2409	14.18	1252	13.91	1164	14.48
60-64 歲	2431	14.27	8	15.69	2423	14.27	1252	13.91	1179	14.67
65-69 歲	1895	11.12	7	13.73	1888	11.12	990	11.00	905	11.26
70-74 歲	901	5.29	7	13.73	894	5.26	465	5.17	436	5.43
75-79 歲	731	4.29	4	7.84	727	4.28	365	4.06	366	4.55
80-84 歲	468	2.75	2	3.92	466	2.74	227	2.52	241	3.00
85 歲以上	240	1.41	6	11.76	234	1.38	108	1.20	132	1.64
臨床期別										
0 期	2679	15.73	1	1.96	2678	15.77	1505	16.72	1174	14.61
I 期	4755	27.91	12	23.53	4743	27.92	2460	27.33	2295	28.56
II 期	5590	32.81	21	41.18	5569	32.79	3081	34.23	2509	31.22
III 期	1322	7.76	3	5.88	1319	7.77	611	6.79	711	8.85
IV 期	1204	7.07	5	9.80	1199	7.06	674	7.49	530	6.60
不詳	1486	8.72	9	17.65	1477	8.70	669	7.43	817	10.17
病理期別										
0 期	2858	16.78	3	5.88	2855	16.81	1526	16.96	1332	16.58
I 期	5824	34.19	15	29.41	5809	34.20	3136	34.84	2688	33.45
II 期	4594	26.97	20	39.22	4574	26.93	2357	26.19	2237	27.84
III 期	1459	8.56	5	9.80	1454	8.56	724	8.04	735	9.15
IV 期	573	3.36	3	5.88	570	3.36	333	3.70	240	2.99
不詳	1728	10.14	5	9.80	1723	10.14	924	10.27	804	10.00
整併期別 ¹										
0 期	2717	15.95	3	5.88	2714	15.98	1447	16.08	1270	15.80
I 期	5395	31.67	15	29.41	5380	31.68	2888	32.09	2507	31.20
II 期	5524	32.43	21	41.18	5503	32.40	2934	32.60	2590	32.23
III 期	2014	11.82	5	9.80	2009	11.83	974	10.82	1040	12.94
IV 期	1244	7.30	6	11.76	1238	7.29	701	7.79	543	6.76
不詳	142	0.83	1	1.96	141	0.83	56	0.62	86	1.07
臨床與病理期別一致性										
Kappa ²	0.5584									

表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	17036	100.00	51	100.00	16985	100.00	9000	100.00	8036	100.00
治療方式 ^{3,4}										
乳房保留術合併內分泌治療	543	3.19	2	3.92	541	3.19	291	3.23	252	3.14
乳房保留術合併化療與內分泌治療	101	0.59	0	0.00	101	0.59	55	0.61	46	0.57
乳房保留術合併化療與標靶治療，有/無內分泌治療	118	0.69	0	0.00	118	0.69	69	0.77	49	0.61
乳房保留術合併放療與內分泌治療	3948	23.17	2	3.92	3946	23.23	2035	22.61	1913	23.81
乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療	1723	10.11	1	1.96	1722	10.14	869	9.66	854	10.63
乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療	591	3.47	0	0.00	591	3.48	334	3.71	257	3.20
乳房保留術	289	1.70	1	1.96	288	1.70	124	1.38	165	2.05
乳房保留術合併化療	85	0.50	0	0.00	85	0.50	40	0.44	45	0.56
乳房保留術合併放療	483	2.84	0	0.00	483	2.84	227	2.52	256	3.19
乳房保留術合併化療與放療	618	3.63	0	0.00	618	3.64	299	3.32	319	3.97
乳房保留術合併化療、放療與標靶治療	381	2.24	0	0.00	381	2.24	207	2.30	174	2.17
乳房切除術合併內分泌治療	2076	12.19	18	35.29	2058	12.12	1218	13.53	858	10.68
乳房切除術合併化療與內分泌治療	894	5.25	9	17.65	885	5.21	496	5.51	398	4.95
乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療	350	2.05	0	0.00	350	2.06	227	2.52	123	1.53
乳房切除術合併放療與內分泌治療	177	1.04	4	7.84	173	1.02	75	0.83	102	1.27
乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療	950	5.58	5	9.80	945	5.56	475	5.28	475	5.91
乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療	297	1.74	1	1.96	296	1.74	131	1.46	166	2.07
乳房切除術	682	4.00	0	0.00	682	4.02	363	4.03	319	3.97
乳房切除術合併化療	419	2.46	0	0.00	419	2.47	219	2.43	200	2.49
乳房切除術合併化療與標靶治療	363	2.13	3	5.88	360	2.12	230	2.56	133	1.66
乳房切除術合併化療與放療	256	1.50	0	0.00	256	1.51	119	1.32	137	1.70
乳房切除術合併化療、放療與標靶治療	223	1.31	0	0.00	223	1.31	91	1.01	132	1.64
化療	134	0.79	1	1.96	133	0.78	64	0.71	70	0.87
化療合併內分泌治療	124	0.73	0	0.00	124	0.73	68	0.76	56	0.70
化療合併標靶治療	263	1.54	1	1.96	262	1.54	160	1.78	103	1.28
內分泌治療	286	1.68	0	0.00	286	1.68	136	1.51	150	1.87
標靶治療合併內分泌治療	123	0.72	0	0.00	123	0.72	78	0.87	45	0.56
放療合併內分泌治療	43	0.25	1	1.96	42	0.25	17	0.19	26	0.32
放療合併化療與內分泌治療	39	0.23	0	0.00	39	0.23	21	0.23	18	0.22
緩和治療	33	0.19	1	1.96	32	0.19	9	0.10	24	0.30
未有首次治療申報紀錄	11	0.06	0	0.00	11	0.06	6	0.07	5	0.06
其他治療	413	2.42	1	1.96	412	2.43	247	2.74	166	2.07
組織型態										
原位癌										
管道內癌	2539	91.89	2	66.67	2537	91.92	1342	91.73	1197	92.08
小葉原位癌	70	2.53	0	0.00	70	2.54	36	2.46	34	2.62
乳頭狀原位癌	146	5.28	1	33.33	145	5.25	79	5.40	67	5.15
其他原位上皮癌	8	0.29	0	0.00	8	0.29	6	0.41	2	0.15
侵襲癌										
侵襲性癌，非特定型	12515	87.68	39	81.25	12476	87.70	6602	87.59	5913	87.78
黏液性癌	429	3.01	0	0.00	429	3.02	210	2.79	219	3.25
侵襲性小葉癌	645	4.52	0	0.00	645	4.53	369	4.90	276	4.10
乳房 Paget 氏病	28	0.20	0	0.00	28	0.20	16	0.21	12	0.18
侵襲性乳頭狀癌	233	1.63	6	12.50	227	1.60	127	1.69	106	1.57
化生性癌	82	0.57	0	0.00	82	0.58	42	0.56	40	0.59
其他特定上皮癌	99	0.69	2	4.17	97	0.68	51	0.68	48	0.71
非特定上皮癌	218	1.53	1	2.08	217	1.53	108	1.43	110	1.63
惡性肉瘤	11	0.08	0	0.00	11	0.08	6	0.08	5	0.07
其他惡性腫瘤	13	0.09	0	0.00	13	0.09	6	0.08	7	0.10

註 1：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註(p.604-611)。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

乳癌

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	17036	543	3.19	101	0.59	118	0.69	3948	23.17	1723	10.11	591	3.47	289	1.70	85	0.50	483	2.84	618	3.63
0 期	2717	259	9.53	0	0.00	0	0.00	1167	42.95	0	0.00	2	0.07	119	4.38	0	0.00	310	11.41	3	0.11
IA 期	5225	163	3.12	23	0.44	18	0.34	2078	39.77	447	8.56	137	2.62	64	1.22	16	0.31	149	2.85	201	3.85
IB 期	170	2	1.18	4	2.35	6	3.53	33	19.41	44	25.88	5	2.94	1	0.59	0	0.00	1	0.59	4	2.35
II 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	3391	70	2.06	28	0.83	40	1.18	534	15.75	620	18.28	182	5.37	35	1.03	31	0.91	16	0.47	241	7.11
IIB 期	2131	16	0.75	24	1.13	21	0.99	104	4.88	352	16.52	168	7.88	8	0.38	15	0.70	2	0.09	108	5.07
III 期	2014	10	0.50	11	0.55	18	0.89	13	0.65	241	11.97	88	4.37	9	0.45	14	0.70	0	0.00	49	2.43
IV 期	1244	6	0.48	10	0.80	14	1.13	3	0.24	13	1.05	8	0.64	3	0.24	8	0.64	0	0.00	10	0.80
不詳	142	17	11.97	1	0.70	1	0.70	16	11.27	6	4.23	1	0.70	50	35.21	0	0.00	5	3.52	2	1.41

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	421	8	1.90	3	0.71	4	0.95	82	19.48	68	16.15	33	7.84	6	1.43	2	0.48	14	3.33	26	6.18
0 期	62	8	12.90	0	0.00	0	0.00	29	46.77	0	0.00	0	0.00	3	4.84	0	0.00	8	12.90	0	0.00
IA 期	105	0	0.00	1	0.95	0	0.00	38	36.19	20	19.05	5	4.76	1	0.95	0	0.00	5	4.76	5	4.76
IB 期	8	0	0.00	0	0.00	2	25.00	1	12.50	0	0.00	1	12.50	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	14.61	26	29.21	8	8.99	0	0.00	1	1.12	1	1.12	12	13.48
IIB 期	69	0	0.00	2	2.90	2	2.90	0	0.00	15	21.74	12	17.39	1	1.45	0	0.00	0	0.00	6	8.70
III 期	61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	11.48	7	11.48	0	0.00	1	1.64	0	0.00	3	4.92
IV 期	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。
3 「內分泌藥物治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療 ¹	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
381 2.24	2076 12.19	894 5.25	350 2.05	177 1.04	950 5.58	297 1.74	682 4.00	419 2.46	363 2.13	256 1.50
0 0.00	455 16.75	0 0.00	1 0.04	11 0.40	0 0.00	0 0.00	365 13.43	1 0.04	1 0.04	0 0.00
89 1.70	1007 19.27	239 4.57	78 1.49	28 0.54	7 0.13	5 0.10	198 3.79	121 2.32	76 1.45	6 0.11
4 2.35	21 12.35	17 10.00	5 2.94	1 0.59	7 4.12	3 1.76	0 0.00	3 1.76	3 1.76	3 1.76
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 50.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
116 3.42	368 10.85	348 10.26	98 2.89	29 0.86	113 3.33	23 0.68	56 1.65	151 4.45	85 2.51	50 1.47
93 4.36	128 6.01	181 8.49	72 3.38	48 2.25	291 13.66	91 4.27	18 0.84	51 2.39	90 4.22	74 3.47
70 3.48	76 3.77	76 3.77	51 2.53	54 2.68	490 24.33	149 7.40	28 1.39	65 3.23	56 2.78	110 5.46
7 0.56	17 1.37	26 2.09	44 3.54	6 0.48	39 3.14	25 2.01	7 0.56	26 2.09	52 4.18	13 1.05
2 1.41	4 2.82	7 4.93	1 0.70	0 0.00	3 2.11	1 0.70	9 6.34	1 0.70	0 0.00	0 0.00

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療 ¹	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
7 1.66	28 6.65	19 4.51	9 2.14	2 0.48	29 6.89	16 3.80	9 2.14	6 1.43	8 1.90	10 2.38
0 0.00	7 11.29	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	6 9.68	0 0.00	0 0.00	0 0.00
1 0.95	14 13.33	6 5.71	1 0.95	2 1.90	2 1.90	0 0.00	1 0.95	0 0.00	0 0.00	0 0.00
0 0.00	0 0.00	1 12.50	0 0.00	0 0.00	2 25.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
3 3.37	5 5.62	6 6.74	2 2.25	0 0.00	1 1.12	2 2.25	2 2.25	2 2.25	2 2.25	1 1.12
2 2.90	1 1.45	2 2.90	5 7.25	0 0.00	7 10.14	7 10.14	0 0.00	1 1.45	2 2.90	2 2.90
1 1.64	0 0.00	2 3.28	1 1.64	0 0.00	15 24.59	7 11.48	0 0.00	3 4.92	3 4.92	7 11.48
0 0.00	0 0.00	2 8.00	0 0.00	0 0.00	2 8.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 4.00	0 0.00
0 0.00	1 50.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		放療合併 內分泌治療		放療合併 化療與 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	223	1.31	134	0.79	124	0.73	263	1.54	286	1.68	123	0.72	43	0.25	39	0.23	33	0.19	11	0.06	413	2.42
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.07	1	0.04	2	0.07
	2	0.04	1	0.02	1	0.02	0	0.00	35	0.67	0	0.00	2	0.04	1	0.02	1	0.02	0	0.00	32	0.61
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.76
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	17	0.50	8	0.24	8	0.24	5	0.15	64	1.89	0	0.00	2	0.06	2	0.06	1	0.03	1	0.03	49	1.45
	58	2.72	12	0.56	8	0.38	12	0.56	25	1.17	2	0.09	1	0.05	0	0.00	1	0.05	1	0.05	56	2.63
	129	6.41	30	1.49	15	0.74	25	1.24	40	1.99	6	0.30	8	0.40	3	0.15	4	0.20	0	0.00	76	3.77
	17	1.37	82	6.59	92	7.40	221	17.77	98	7.88	114	9.16	30	2.41	32	2.57	24	1.93	5	0.40	192	15.43
	0	0.00	1	0.70	0	0.00	0	0.00	6	4.23	1	0.70	0	0.00	1	0.70	0	0.00	3	2.11	3	2.11

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		放療合併 內分泌治療		放療合併 化療與 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	4	0.95	5	1.19	3	0.71	8	1.90	2	0.48	1	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.24	8	1.90
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.61	0	0.00
	1	0.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.90
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.12
	1	1.45	1	1.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2	3.28	1	1.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.64
	0	0.00	3	12.00	3	12.00	8	32.00	1	4.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	16.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

乳癌

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療			
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
合計	5148	104	2.02	41	0.80	32	0.62	1310	25.45	715	13.89	269	5.23	75	1.46	28	0.54	120	2.33	204	3.96
0 期	881	61	6.92	0	0.00	0	0.00	438	49.72	0	0.00	1	0.11	29	3.29	0	0.00	79	8.97	1	0.11
IA 期	1517	25	1.65	7	0.46	4	0.26	666	43.90	175	11.54	58	3.82	8	0.53	5	0.33	32	2.11	55	3.63
IB 期	54	0	0.00	2	3.70	0	0.00	11	20.37	16	29.63	1	1.85	0	0.00	0	0.00	1	1.85	3	5.56
II 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1082	8	0.74	10	0.92	14	1.29	159	14.70	263	24.31	87	8.04	11	1.02	9	0.83	4	0.37	87	8.04
IIB 期	739	1	0.14	10	1.35	5	0.68	30	4.06	159	21.52	82	11.10	4	0.54	8	1.08	1	0.14	33	4.47
III 期	551	1	0.18	5	0.91	3	0.54	1	0.18	91	16.52	36	6.53	0	0.00	3	0.54	0	0.00	22	3.99
IV 期	266	0	0.00	6	2.26	5	1.88	2	0.75	8	3.01	3	1.13	0	0.00	2	0.75	0	0.00	2	0.75
不詳	56	8	14.29	1	1.79	1	1.79	3	5.36	3	5.36	1	1.79	23	41.07	0	0.00	3	5.36	1	1.79

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	9127	254	2.78	50	0.55	64	0.70	2221	24.33	879	9.63	279	3.06	156	1.71	43	0.47	311	3.41	356	3.90
0 期	1566	151	9.64	0	0.00	0	0.00	655	41.83	0	0.00	1	0.06	66	4.21	0	0.00	208	13.28	2	0.13
IA 期	2996	64	2.14	14	0.47	12	0.40	1217	40.62	240	8.01	70	2.34	39	1.30	9	0.30	95	3.17	134	4.47
IB 期	88	1	1.14	2	2.27	3	3.41	17	19.32	27	30.68	3	3.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.14
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1660	25	1.51	14	0.84	21	1.27	266	16.02	310	18.67	85	5.12	17	1.02	15	0.90	5	0.30	125	7.53
IIB 期	1012	1	0.10	10	0.99	11	1.09	47	4.64	161	15.91	71	7.02	3	0.30	7	0.69	1	0.10	64	6.32
III 期	1032	2	0.19	6	0.58	11	1.07	7	0.68	134	12.98	44	4.26	5	0.48	7	0.68	0	0.00	21	2.03
IV 期	701	4	0.57	4	0.57	6	0.86	0	0.00	4	0.57	5	0.71	2	0.29	5	0.71	0	0.00	8	1.14
不詳	72	6	8.33	0	0.00	0	0.00	12	16.67	3	4.17	0	0.00	24	33.33	0	0.00	2	2.78	1	1.39

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。
3 「內分泌藥物治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
123 2.39	504 9.79	297 5.77	112 2.18	44 0.85	350 6.80	112 2.18	153 2.97	82 1.59	75 1.46	62 1.20
0 0.00	166 18.84	0 0.00	0 0.00	9 1.02	0 0.00	0 0.00	92 10.44	0 0.00	1 0.11	0 0.00
26 1.71	245 16.15	83 5.47	26 1.71	10 0.66	3 0.20	2 0.13	47 3.10	18 1.19	15 0.99	0 0.00
0 0.00	4 7.41	7 12.96	1 1.85	1 1.85	3 5.56	2 3.70	0 0.00	1 1.85	0 0.00	0 0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 50.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
36 3.33	73 6.75	111 10.26	44 4.07	5 0.46	48 4.44	9 0.83	6 0.55	31 2.87	18 1.66	15 1.39
40 5.41	13 1.76	66 8.93	17 2.30	12 1.62	108 14.61	36 4.87	2 0.27	14 1.89	20 2.71	24 3.25
19 3.45	2 0.36	21 3.81	13 2.36	5 0.91	173 31.40	49 8.89	2 0.36	11 2.00	9 1.63	22 3.99
1 0.38	0 0.00	8 3.01	10 3.76	2 0.75	15 5.64	13 4.89	0 0.00	7 2.63	12 4.51	1 0.38
1 1.79	1 1.79	1 1.79	1 1.79	0 0.00	0 0.00	1 1.79	3 5.36	0 0.00	0 0.00	0 0.00

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療	乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療	乳房切除術 合併化療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術 合併放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療	乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療	乳房切除術	乳房切除術 合併化療	乳房切除術 合併化療 與標靶治療	乳房切除術 合併化療與 放療
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
235 2.57	982 10.76	488 5.35	192 2.10	58 0.64	510 5.59	150 1.64	396 4.34	252 2.76	229 2.51	148 1.62
0 0.00	232 14.81	0 0.00	1 0.06	2 0.13	0 0.00	0 0.00	238 15.20	1 0.06	0 0.00	0 0.00
61 2.04	540 18.02	136 4.54	48 1.60	15 0.50	2 0.07	3 0.10	118 3.94	88 2.94	51 1.70	6 0.20
4 4.55	8 9.09	9 10.23	3 3.41	0 0.00	2 2.27	1 1.14	0 0.00	1 1.14	3 3.41	2 2.27
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
69 4.16	145 8.73	191 11.51	48 2.89	11 0.66	58 3.49	12 0.72	14 0.84	87 5.24	52 3.13	28 1.69
48 4.74	28 2.77	98 9.68	40 3.95	16 1.58	162 16.01	44 4.35	3 0.30	24 2.37	56 5.53	40 3.95
46 4.46	19 1.84	39 3.78	25 2.42	13 1.26	264 25.58	79 7.66	13 1.26	41 3.97	34 3.29	62 6.01
6 0.86	8 1.14	10 1.43	27 3.85	1 0.14	19 2.71	11 1.57	4 0.57	10 1.43	33 4.71	10 1.43
1 1.39	2 2.78	5 6.94	0 0.00	0 0.00	3 4.17	0 0.00	6 8.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		放療合併 內分泌治療		放療合併 化療與 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	58	1.13	22	0.43	29	0.56	52	1.01	31	0.60	17	0.33	10	0.19	7	0.14	1	0.02	1	0.02	108	2.10
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.33
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	7	0.65	3	0.28	3	0.28	0	0.00	5	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	1.48
	17	2.30	2	0.27	2	0.27	4	0.54	5	0.68	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	3.11
	31	5.63	4	0.73	3	0.54	2	0.36	1	0.18	1	0.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	3.81
	3	1.13	12	4.51	21	7.89	46	17.29	12	4.51	15	5.64	10	3.76	7	2.63	1	0.38	0	0.00	42	15.79
	0	0.00	1	1.79	0	0.00	0	0.00	2	3.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.79	0	0.00

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療	化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		放療合併 內分泌治療		放療合併 化療與 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷			
	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		
	137	1.50	71	0.78	66	0.72	163	1.79	87	0.95	75	0.82	19	0.21	24	0.26	13	0.14	5	0.05	214	2.34
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.06	0	0.00	2	0.13
	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	0.30	0	0.00	1	0.03	1	0.03	0	0.00	0	0.00	22	0.73
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.14
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	9	0.54	3	0.18	3	0.18	4	0.24	17	1.02	0	0.00	0	0.00	2	0.12	0	0.00	0	0.00	24	1.45
	35	3.46	4	0.40	4	0.40	7	0.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.10	26	2.57
	80	7.75	18	1.74	7	0.68	15	1.45	11	1.07	3	0.29	1	0.10	0	0.00	1	0.10	0	0.00	24	2.33
	12	1.71	46	6.56	52	7.42	137	19.54	42	5.99	71	10.13	17	2.43	20	2.85	11	1.57	4	0.57	112	15.98
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.78	1	1.39	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	3	4.17

5「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

乳癌

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術 ² 合併 內分泌治療 ³		乳房保留術 合併化療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療與 標靶治療， 有/無 內分泌治療		乳房保留術 合併放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房保留術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術 合併化療		乳房保留術 合併放療		乳房保留術 合併 化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2340	177	7.56	7	0.30	18	0.77	335	14.32	61	2.61	10	0.43	52	2.22	12	0.51	38	1.62	32	1.37
0 期	208	39	18.75	0	0.00	0	0.00	45	21.63	0	0.00	0	0.00	21	10.10	0	0.00	15	7.21	0	0.00
IA 期	607	74	12.19	1	0.16	2	0.33	157	25.86	12	1.98	4	0.66	16	2.64	2	0.33	17	2.80	7	1.15
IB 期	20	1	5.00	0	0.00	1	5.00	4	20.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	560	37	6.61	4	0.71	5	0.89	96	17.14	21	3.75	2	0.36	7	1.25	6	1.07	6	1.07	17	3.04
IIB 期	311	14	4.50	2	0.64	3	0.96	27	8.68	17	5.47	3	0.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1.61
III 期	370	7	1.89	0	0.00	4	1.08	5	1.35	9	2.43	1	0.27	4	1.08	3	0.81	0	0.00	3	0.81
IV 期	252	2	0.79	0	0.00	3	1.19	1	0.40	1	0.40	0	0.00	1	0.40	1	0.40	0	0.00	0	0.00
不詳	12	3	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房保留術 合併化療、 放療與 標靶治療		乳房切除術 ⁴ 合併 內分泌治療		乳房切除術 合併化療與 內分泌治療		乳房切除術 合併化療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房切除術 合併放療與 內分泌治療		乳房切除術 合併化療、 放療與 內分泌治療		乳房切除術 合併化療、 放療、 內分泌治療 與標靶治療		乳房切除術		乳房切除術 合併化療		乳房切除術 合併化療 與標靶治療		乳房切除術 合併化療 合併化療與 放療	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
16	0.68	562	24.02	90	3.85	37	1.58	73	3.12	61	2.61	19	0.81	124	5.30	79	3.38	51	2.18	36	1.54
0	0.00	50	24.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29	13.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	0.16	208	34.27	14	2.31	3	0.49	1	0.16	0	0.00	0	0.00	32	5.27	15	2.47	10	1.65	0	0.00
0	0.00	9	45.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00	1	5.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	1.43	145	25.89	40	7.14	4	0.71	13	2.32	6	1.07	0	0.00	34	6.07	31	5.54	13	2.32	6	1.07
3	0.96	86	27.65	15	4.82	10	3.22	20	6.43	14	4.50	4	1.29	13	4.18	12	3.86	12	3.86	8	2.57
4	1.08	55	14.86	14	3.78	12	3.24	36	9.73	38	10.27	14	3.78	13	3.51	10	2.70	10	2.70	19	5.14
0	0.00	9	3.57	6	2.38	7	2.78	3	1.19	3	1.19	1	0.40	3	1.19	9	3.57	6	2.38	2	0.79
0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.612。

3 「內分泌藥物治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.612。

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

乳房切除術 合併化療、 放療與 標靶治療		化療		化療 合併 內分泌治療		化療 合併 標靶治療		內分泌治療		標靶治療合併 內分泌治療		放療合併 內分泌治療		放療合併 化療與 內分泌治療		緩和治療 ⁵		未有 首次治療 申報紀錄 ⁶		其他治療 ⁷	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
24	1.03	36	1.54	26	1.11	40	1.71	166	7.09	30	1.28	14	0.60	8	0.34	19	0.81	4	0.17	83	3.55
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.48	0	0.00	0	0.00
0	0.00	1	0.16	1	0.16	0	0.00	24	3.95	0	0.00	1	0.16	0	0.00	1	0.16	0	0.00	3	0.49
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	0.18	2	0.36	2	0.36	1	0.18	41	7.32	0	0.00	2	0.36	0	0.00	1	0.18	1	0.18	8	1.43
5	1.61	5	1.61	2	0.64	1	0.32	20	6.43	1	0.32	1	0.32	0	0.00	1	0.32	0	0.00	7	2.25
16	4.32	7	1.89	5	1.35	8	2.16	28	7.57	2	0.54	7	1.89	3	0.81	3	0.81	0	0.00	30	8.11
2	0.79	21	8.33	16	6.35	30	11.90	43	17.06	27	10.71	3	1.19	5	1.98	12	4.76	1	0.40	34	13.49
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00

5「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Breast

C500–C509

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction, NOS

No specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

20 Partial mastectomy, NOS; less than total mastectomy, NOS

21 Partial mastectomy WITH nipple resection

22 Lumpectomy or excisional biopsy

23 Reexcision of the biopsy site for gross or microscopic residual disease

24 Segmental mastectomy (including wedge resection, quadrantectomy, tylectomy)

Procedures coded 20–24 remove the gross primary tumor and some of the breast tissue (breast-conserving or -preserving). There may be microscopic residual tumor.

30 Subcutaneous mastectomy

A subcutaneous mastectomy, also called a nipple sparing mastectomy, is the removal of breast tissue without the nipple and areolar complex or overlying skin. It is performed to facilitate immediate breast reconstruction. Cases coded 30 may be considered to have undergone breast reconstruction.

40 Total (simple) mastectomy

41 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

43 Reconstruction, NOS

44 Tissue

45 Implant

46 Combined (tissue and implant)

42 WITH removal of uninvolved contralateral breast

47 Reconstruction, NOS

48 Tissue

49 Implant

75 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: “Tissue” for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

[SEER Note: Assign code 43 for a simple mastectomy with tissue expanders and acellular dermal matrix/AlloDerm. The tissue expander indicates preparation for reconstruction. The acellular dermal matrix/AlloDerm is not coded because, while they often accompany an implant procedure, they are not the principle element of reconstructive procedures. The principle elements would be tissue from the patient and/or prosthetics (e.g., gel implants).]

A total (simple) mastectomy removes all breast tissue, the nipple, and areolar complex. An axillary dissection is not done, but sentinel lymph nodes may be removed.

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item **Surgical Procedure/Other Site**.

[SEER Note: Example of single primary with removal of involved contralateral breast--Inflammatory carcinoma involving both breasts. Bilateral simple mastectomies. Code Surgery of Primary Site 41 and code Surgical Procedure of Other Site 1.]

If the **contralateral breast** reveals a **second primary**, each breast is abstracted separately. The surgical procedure is coded 41 for the first primary. The surgical code for the contralateral breast is coded to the procedure performed on that site.

Placement of a tissue expander at the time of original surgery means that reconstruction is planned as part of the first course of treatment. When an expander is placed, code the mastectomy and reconstruction.]

Reconstruction that is planned as part of first course treatment is coded 43-49 or 75, regardless of whether it is done at the time of mastectomy or later.

[**SEER Note:** Reconstruction may be done at the same time as the mastectomy or may be done later. Code 43-49, or 75 if the operative report or medical record states reconstruction will be done later, or if a tissue expander is inserted during the mastectomy procedure. Tissue expander insertion precedes reconstruction.]

76 Bilateral mastectomy for a single tumor involving both breasts, as for bilateral inflammatory carcinoma. (Effective with cases diagnosed 1/1/2011 and forward)

50 Modified radical mastectomy

51 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

53 Reconstruction, NOS

54 Tissue

55 Implant

56 Combined (tissue and implant)

52 WITH removal of uninvolved contralateral breast

57 Reconstruction, NOS

58 Tissue

59 Implant

63 Combined (tissue and implant)

Removal of all breast tissue, the nipple, the areolar complex, and variable amounts of breast skin in continuity with the axilla. The specimen may or may not include a portion of the pectoralis major muscle. If only sentinel lymph nodes are removed, the procedure should be coded a simple mastectomy.

[**SEER Note:** “In continuity with” or “en bloc” means that all the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen. “Tissue” for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment. Assign code 51 or 52 if a patient has an excisional biopsy and axillary dissection followed by a simple mastectomy during the first course of therapy. Code the cumulative result of the surgeries, which is a modified radical mastectomy in this case. Code the most invasive, extensive or definitive surgery in Surgery of Primary Site.]

If contralateral breast reveals a second primary, it is abstracted separately. The surgical procedure is coded 41 or 51 for the first primary. The surgical code for the Contralateral breast is coded to the procedure performed for that site.

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item **Surgical Procedure/Other Site**.

60 Radical mastectomy, NOS

61 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

64 Reconstruction, NOS

- 65 Tissue
- 66 Implant
- 67 Combined (tissue and implant)
- 62 WITH removal of uninvolved contralateral breast
- 68 Reconstruction, NOS
- 69 Tissue
- 73 Implant

74 Combined (tissue and implant)

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amount of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as en bloc axillary dissection. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants).

Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

70 Extended radical mastectomy

71 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

72 WITH removal of uninvolved contralateral breast

[SEER Note: Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amounts of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as removal of internal mammary nodes and en bloc axillary dissection.]

80 Mastectomy, NOS

Specimen sent to pathology for surgical events coded 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮頸癌

表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	4119	100.00	-	-	4119	100.00	2336	100.00	1783	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.02	-	-	1	0.02	1	0.04	0	0.00
15-19 歲	1	0.02	-	-	1	0.02	1	0.04	0	0.00
20-24 歲	35	0.85	-	-	35	0.85	23	0.98	12	0.67
25-29 歲	187	4.54	-	-	187	4.54	111	4.75	76	4.26
30-34 歲	496	12.04	-	-	496	12.04	280	11.99	216	12.11
35-39 歲	677	16.44	-	-	677	16.44	383	16.40	294	16.49
40-44 歲	544	13.21	-	-	544	13.21	302	12.93	242	13.57
45-49 歲	462	11.22	-	-	462	11.22	272	11.64	190	10.66
50-54 歲	337	8.18	-	-	337	8.18	190	8.13	147	8.24
55-59 歲	368	8.93	-	-	368	8.93	218	9.33	150	8.41
60-64 歲	336	8.16	-	-	336	8.16	183	7.83	153	8.58
65-69 歲	279	6.77	-	-	279	6.77	155	6.64	124	6.95
70-74 歲	122	2.96	-	-	122	2.96	74	3.17	48	2.69
75-79 歲	112	2.72	-	-	112	2.72	68	2.91	44	2.47
80-84 歲	101	2.45	-	-	101	2.45	47	2.01	54	3.03
85 歲以上	61	1.48	-	-	61	1.48	28	1.20	33	1.85
FIGO 期別 ¹										
0 期	2889	70.14	-	-	2889	70.14	1531	65.54	1358	76.16
1 期	8	0.19	-	-	8	0.19	4	0.17	4	0.22
1A 期	15	0.36	-	-	15	0.36	6	0.26	9	0.50
1A1 期	71	1.72	-	-	71	1.72	43	1.84	28	1.57
1A2 期	15	0.36	-	-	15	0.36	12	0.51	3	0.17
1B 期	21	0.51	-	-	21	0.51	10	0.43	11	0.62
1B1 期	144	3.50	-	-	144	3.50	90	3.85	54	3.03
1B2 期	120	2.91	-	-	120	2.91	90	3.85	30	1.68
1B3 期	50	1.21	-	-	50	1.21	39	1.67	11	0.62
2A 期	11	0.27	-	-	11	0.27	4	0.17	7	0.39
2A1 期	22	0.53	-	-	22	0.53	14	0.60	8	0.45
2A2 期	31	0.75	-	-	31	0.75	23	0.98	8	0.45
2B 期	144	3.50	-	-	144	3.50	95	4.07	49	2.75
3 期	1	0.02	-	-	1	0.02	0	0.00	1	0.06
3A 期	14	0.34	-	-	14	0.34	10	0.43	4	0.22
3B 期	46	1.12	-	-	46	1.12	28	1.20	18	1.01
3C1 期	196	4.76	-	-	196	4.76	129	5.52	67	3.76
3C2 期	65	1.58	-	-	65	1.58	45	1.93	20	1.12
4 期	2	0.05	-	-	2	0.05	1	0.04	1	0.06
4A 期	44	1.07	-	-	44	1.07	27	1.16	17	0.95
4B 期	127	3.08	-	-	127	3.08	91	3.90	36	2.02
不詳	83	2.02	-	-	83	2.02	44	1.88	39	2.19
臨床期別 ²										
0 期	2889	70.14	-	-	2889	70.14	1531	65.54	1358	76.16
I 期	466	11.31	-	-	466	11.31	310	13.27	156	8.75
II 期	357	8.67	-	-	357	8.67	230	9.85	127	7.12
III 期	121	2.94	-	-	121	2.94	87	3.72	34	1.91
IV 期	191	4.64	-	-	191	4.64	123	5.27	68	3.81
不詳	95	2.31	-	-	95	2.31	55	2.35	40	2.24

表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	4119	100.00	-	-	4119	100.00	2336	100.00	1783	100.00
病理期別 ²										
0 期	2889	70.14	-	-	2889	70.14	1531	65.54	1358	76.16
I 期	443	10.76	-	-	443	10.76	297	12.71	146	8.19
II 期	84	2.04	-	-	84	2.04	50	2.14	34	1.91
III 期	7	0.17	-	-	7	0.17	2	0.09	5	0.28
IV 期	55	1.34	-	-	55	1.34	33	1.41	22	1.23
不詳	641	15.56	-	-	641	15.56	423	18.11	218	12.23
整併期別 ^{2,3}										
0 期	2889	70.14	-	-	2889	70.14	1531	65.54	1358	76.16
I 期	524	12.72	-	-	524	12.72	347	14.85	177	9.93
II 期	373	9.06	-	-	373	9.06	240	10.27	133	7.46
III 期	123	2.99	-	-	123	2.99	87	3.72	36	2.02
IV 期	199	4.83	-	-	199	4.83	126	5.39	73	4.09
不詳	11	0.27	-	-	11	0.27	5	0.21	6	0.34
臨床與病理期別一致性 Kappa ⁴	0.9103									
治療方式 ^{5,6}										
手術	3160	76.72	-	-	3160	76.72	1717	73.50	1443	80.93
手術合併化療與放療	180	4.37	-	-	180	4.37	109	4.67	71	3.98
手術合併放療	82	1.99	-	-	82	1.99	51	2.18	31	1.74
手術合併化療	32	0.78	-	-	32	0.78	20	0.86	12	0.67
同步化療與放療	398	9.66	-	-	398	9.66	269	11.52	129	7.23
非同步化療與放療	73	1.77	-	-	73	1.77	55	2.35	18	1.01
放療	116	2.82	-	-	116	2.82	68	2.91	48	2.69
放療合併化療與免疫治療	14	0.34	-	-	14	0.34	14	0.60	0	0.00
化療	14	0.34	-	-	14	0.34	9	0.39	5	0.28
緩和治療	12	0.29	-	-	12	0.29	2	0.09	10	0.56
未有首次治療申報紀錄	8	0.19	-	-	8	0.19	0	0.00	8	0.45
其他治療	30	0.73	-	-	30	0.73	22	0.94	8	0.45
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞癌	2704	93.60	-	-	2704	93.60	1452	94.84	1252	92.19
腺癌	90	3.12	-	-	90	3.12	58	3.79	32	2.36
其他原位上皮癌	95	3.29	-	-	95	3.29	21	1.37	74	5.45
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	863	70.16	-	-	863	70.16	553	68.70	310	72.94
腺癌	269	21.87	-	-	269	21.87	180	22.36	89	20.94
神經內分泌癌	27	2.20	-	-	27	2.20	20	2.48	7	1.65
其他特定上皮癌	33	2.68	-	-	33	2.68	22	2.73	11	2.59
非特定上皮癌	23	1.87	-	-	23	1.87	18	2.24	5	1.18
惡性黑色素瘤	2	0.16	-	-	2	0.16	2	0.25	0	0.00
混合性上皮與間質腫瘤	4	0.33	-	-	4	0.33	3	0.37	1	0.24
惡性肉瘤	4	0.33	-	-	4	0.33	4	0.50	0	0.00
其他惡性腫瘤	5	0.41	-	-	5	0.41	3	0.37	2	0.47

註 1：FIGO 期別*請參考 108 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

註 2：有癌前病變之 888 期別歸類在 0 期。

註 3：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 4：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 5：參考後續治療方式相關表格之附註(p.618-625)。

註 6：治療性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮頸癌

表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4119	3160	76.72	180	4.37	82	1.99	32	0.78	398	9.66	73	1.77	116	2.82	14	0.34	14	0.34	12	0.29	8	0.19	30	0.73
0 期	2889	2872	99.41	0	0.00	2	0.07	1	0.03	0	0.00	0	0.00	4	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.10	7	0.24
1 期	8	3	37.50	4	50.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	15	12	80.00	1	6.67	2	13.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	71	68	95.77	1	1.41	1	1.41	1	1.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	15	11	73.33	0	0.00	4	26.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	21	8	38.10	9	42.86	1	4.76	1	4.76	2	9.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	144	87	60.42	19	13.19	17	11.81	2	1.39	5	3.47	0	0.00	13	9.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.69
1B2 期	120	41	34.17	30	25.00	19	15.83	5	4.17	15	12.50	1	0.83	8	6.67	0	0.00	1	0.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	50	9	18.00	14	28.00	8	16.00	4	8.00	13	26.00	0	0.00	2	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	11	0	0.00	5	45.45	0	0.00	0	0.00	4	36.36	1	9.09	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	22	3	13.64	5	22.73	3	13.64	0	0.00	8	36.36	1	4.55	2	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	31	1	3.23	12	38.71	3	9.68	0	0.00	12	38.71	0	0.00	2	6.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.23
2B 期	144	0	0.00	18	12.50	1	0.69	2	1.39	99	68.75	2	1.39	18	12.50	0	0.00	2	1.39	0	0.00	0	0.00	2	1.39
3 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	35.71	0	0.00	7	50.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	1	7.14
3B 期	46	0	0.00	4	8.70	0	0.00	1	2.17	23	50.00	5	10.87	8	17.39	2	4.35	0	0.00	1	2.17	0	0.00	2	4.35
3C1 期	196	2	1.02	30	15.31	5	2.55	3	1.53	130	66.33	3	1.53	16	8.16	5	2.55	1	0.51	0	0.00	0	0.00	1	0.51
3C2 期	65	1	1.54	8	12.31	0	0.00	0	0.00	43	66.15	3	4.62	5	7.69	4	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.54
4 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	44	1	2.27	0	0.00	0	0.00	1	2.27	26	59.09	1	2.27	11	25.00	0	0.00	2	4.55	1	2.27	0	0.00	1	2.27
4B 期	127	0	0.00	9	7.09	2	1.57	4	3.15	11	8.66	55	43.31	17	13.39	3	2.36	6	4.72	7	5.51	1	0.79	12	9.45
不詳	83	41	49.40	11	13.25	14	16.87	6	7.23	1	1.20	1	1.20	1	1.20	0	0.00	1	1.20	2	2.41	4	4.82	1	1.20

1 「FIGO」定義：請參考 108 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	224	213	95.09	0	0.00	1	0.45	3	1.34	3	1.34	0	0.00	0	0.00	2	0.89	1	0.45	0	0.00	0	0.00	1	0.45
0 期	204	203	99.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.49
1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	3	3	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	5	2	40.00	0	0.00	1	20.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	1	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 108 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2179	1941	89.08	71	3.26	24	1.10	10	0.46	93	4.27	16	0.73	3	0.14	6	0.28	4	0.18	0	0.00	1	0.05	10	0.46
0 期	1790	1786	99.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.06	3	0.17
1 期	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	8	6	75.00	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	47	45	95.74	1	2.13	0	0.00	1	2.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	9	8	88.89	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	8	5	62.50	3	37.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	57	42	73.68	6	10.53	7	12.28	1	1.75	1	1.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	43	17	39.53	14	32.56	5	11.63	0	0.00	5	11.63	0	0.00	1	2.33	0	0.00	1	2.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	27	4	14.81	8	29.63	5	18.52	4	14.81	5	18.52	0	0.00	1	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	6	0	0.00	4	66.67	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	2	0	0.00	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	14	1	7.14	9	64.29	1	7.14	0	0.00	3	21.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	27	0	0.00	6	22.22	0	0.00	1	3.70	20	74.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	60.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	63	2	3.17	10	15.87	1	1.59	2	3.17	41	65.08	2	3.17	1	1.59	3	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.59
3C2 期	14	1	7.14	2	14.29	0	0.00	0	0.00	9	64.29	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14
4 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	22	0	0.00	1	4.55	0	0.00	0	0.00	1	4.55	11	50.00	0	0.00	2	9.09	2	9.09	0	0.00	0	0.00	5	22.73
不詳	29	22	75.86	3	10.34	2	6.90	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 108 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1320	857	64.92	98	7.42	37	2.80	16	1.21	217	16.44	38	2.88	23	1.74	6	0.45	6	0.45	2	0.15	3	0.23	17	1.29
0 期	765	757	98.95	0	0.00	1	0.13	1	0.13	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.26	3	0.39
1 期	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	4	4	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	17	16	94.12	0	0.00	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	4	2	50.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	12	3	25.00	5	41.67	1	8.33	1	8.33	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	64	37	57.81	12	18.75	9	14.06	1	1.56	1	1.56	0	0.00	3	4.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.56
1B2 期	52	16	30.77	14	26.92	11	21.15	2	3.85	4	7.69	1	1.92	4	7.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	18	4	22.22	6	33.33	1	5.56	0	0.00	7	38.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	11	3	27.27	2	18.18	1	9.09	0	0.00	5	45.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	11	0	0.00	3	27.27	0	0.00	0	0.00	7	63.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09
2B 期	71	0	0.00	11	15.49	1	1.41	1	1.41	53	74.65	1	1.41	2	2.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.82
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	66.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67
3B 期	23	0	0.00	4	17.39	0	0.00	0	0.00	12	52.17	2	8.70	1	4.35	2	8.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.70
3C1 期	95	0	0.00	18	18.95	2	2.11	1	1.05	69	72.63	1	1.05	2	2.11	1	1.05	1	1.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C2 期	37	0	0.00	5	13.51	0	0.00	0	0.00	26	70.27	1	2.70	2	5.41	3	8.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	68.00	0	0.00	5	20.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00
4B 期	61	0	0.00	7	11.48	0	0.00	4	6.56	8	13.11	30	49.18	2	3.28	0	0.00	2	3.28	1	1.64	1	1.64	6	9.84
不詳	36	14	38.89	8	22.22	7	19.44	5	13.89	0	0.00	1	2.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.78	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 108 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	396	149	37.63	11	2.78	20	5.05	3	0.76	85	21.46	19	4.80	90	22.73	0	0.00	3	0.76	10	2.53	4	1.01	2	0.51
0 期	130	126	96.92	0	0.00	1	0.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	4	4	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	1	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	22	7	31.82	1	4.55	1	4.55	0	0.00	3	13.64	0	0.00	10	45.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	20	6	30.00	2	10.00	2	10.00	1	5.00	6	30.00	0	0.00	3	15.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	4	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	9	0	0.00	1	11.11	2	22.22	0	0.00	3	33.33	1	11.11	2	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	6	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	2	33.33	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	46	0	0.00	1	2.17	0	0.00	0	0.00	26	56.52	1	2.17	16	34.78	0	0.00	2	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	6	75.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00
3B 期	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	8	44.44	1	5.56	7	38.89	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00
3C1 期	34	0	0.00	2	5.88	2	5.88	0	0.00	17	50.00	0	0.00	13	38.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C2 期	14	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	8	57.14	2	14.29	3	21.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	15	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	46.67	0	0.00	6	40.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00
4B 期	42	0	0.00	1	2.38	2	4.76	0	0.00	2	4.76	14	33.33	15	35.71	0	0.00	1	2.38	6	14.29	0	0.00	1	2.38
不詳	15	3	20.00	0	0.00	5	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	1	6.67	4	26.67	1	6.67

1 「FIGO」定義：請參考 108 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4119	3160	76.72	180	4.37	82	1.99	32	0.78	398	9.66	73	1.77	116	2.82	14	0.34	14	0.34	12	0.29	8	0.19	30	0.73
0 期	2889	2872	99.41	0	0.00	2	0.07	1	0.03	0	0.00	0	0.00	4	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.10	7	0.24
I 期	524	280	53.44	75	14.31	63	12.02	16	3.05	57	10.88	2	0.38	25	4.77	2	0.38	1	0.19	0	0.00	0	0.00	3	0.57
II 期	373	6	1.61	80	21.45	12	3.22	5	1.34	221	59.25	6	1.61	34	9.12	4	1.07	2	0.54	0	0.00	0	0.00	3	0.80
III 期	123	0	0.00	10	8.13	2	1.63	1	0.81	75	60.98	4	3.25	20	16.26	5	4.07	1	0.81	2	1.63	0	0.00	3	2.44
IV 期	199	2	1.01	14	7.04	3	1.51	7	3.52	42	21.11	60	30.15	32	16.08	3	1.51	10	5.03	9	4.52	3	1.51	14	7.04
不詳	11	0	0.00	1	9.09	0	0.00	2	18.18	3	27.27	1	9.09	1	9.09	0	0.00	0	0.00	1	9.09	2	18.18	0	0.00

表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	224	213	95.09	0	0.00	1	0.45	3	1.34	3	1.34	0	0.00	0	0.00	2	0.89	1	0.45	0	0.00	0	0.00	1	0.45
0 期	204	203	99.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.49
I 期	10	9	90.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	6	1	16.67	0	0.00	1	16.67	0	0.00	3	50.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2179	1941	89.08	71	3.26	24	1.10	10	0.46	93	4.27	16	0.73	3	0.14	6	0.28	4	0.18	0	0.00	1	0.05	10	0.46
0 期	1790	1786	99.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.06	3	0.17
I 期	245	153	62.45	38	15.51	22	8.98	7	2.86	20	8.16	1	0.41	2	0.82	1	0.41	1	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	86	1	1.16	28	32.56	1	1.16	2	2.33	49	56.98	1	1.16	0	0.00	2	2.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.33
III 期	26	0	0.00	2	7.69	1	3.85	0	0.00	20	76.92	1	3.85	1	3.85	1	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	32	1	3.13	3	9.38	0	0.00	1	3.13	4	12.50	13	40.63	0	0.00	2	6.25	3	9.38	0	0.00	0	0.00	5	15.63
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1320	857	64.92	98	7.42	37	2.80	16	1.21	217	16.44	38	2.88	23	1.74	6	0.45	6	0.45	2	0.15	3	0.23	17	1.29
0 期	765	757	98.95	0	0.00	1	0.13	1	0.13	0	0.00	0	0.00	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.26	3	0.39
I 期	205	97	47.32	34	16.59	32	15.61	6	2.93	24	11.71	1	0.49	7	3.41	1	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.46
II 期	191	3	1.57	48	25.13	4	2.09	2	1.05	126	65.97	1	0.52	5	2.62	1	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.52
III 期	57	0	0.00	6	10.53	0	0.00	1	1.75	38	66.67	2	3.51	2	3.51	4	7.02	1	1.75	0	0.00	0	0.00	3	5.26
IV 期	98	0	0.00	9	9.18	0	0.00	6	6.12	27	27.55	33	33.67	8	8.16	0	0.00	5	5.10	2	2.04	1	1.02	7	7.14
不詳	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別1及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	396	149	37.63	11	2.78	20	5.05	3	0.76	85	21.46	19	4.80	90	22.73	0	0.00	3	0.76	10	2.53	4	1.01	2	0.51
0 期	130	126	96.92	0	0.00	1	0.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	64	21	32.81	3	4.69	9	14.06	2	3.13	13	20.31	0	0.00	16	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	90	1	1.11	4	4.44	6	6.67	1	1.11	43	47.78	4	4.44	29	32.22	0	0.00	2	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	40	0	0.00	2	5.00	1	2.50	0	0.00	17	42.50	1	2.50	17	42.50	0	0.00	0	0.00	2	5.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	67	1	1.49	2	2.99	3	4.48	0	0.00	11	16.42	14	20.90	24	35.82	0	0.00	1	1.49	7	10.45	2	2.99	2	2.99
不詳	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	2	40.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Cervix Uteri

C530–C539

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

[SEER Note: **Do not code** dilation and curettage (D&C) as Surgery of Primary Site **for invasive cancers**]

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)
 - 16 Laser ablation
 - 17 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

- 20 Local tumor excision, NOS
 - [SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement. Procedures in code 20 include but are not limited to: cryosurgery, electrocautery, excisional biopsy, laser ablation, or thermal ablation.]
- 26 Excisional biopsy, NOS
- 27 Cone biopsy
- 24 Cone biopsy WITH gross excision of lesion
- 29 Trachelectomy(**radical**); removal of cervical stump; cervicectomy

Any combination of 20, 24, 26, 27 or 29 WITH

- 21 Electrocautery
 - 22 Cryosurgery
 - 23 Laser ablation or excision
- 25 Dilatation and curettage; endocervical curettage (for in situ only)
- 28 Loop electrocautery excision procedure (LEEP)
- 30 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff**
- 40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tubes and/or ovary
 - Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also**
- 50 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy
 - 51 Modified radical hysterectomy
 - 52 Extended hysterectomy
 - 53 Radical hysterectomy; Wertheim procedure
 - 54 Extended radical hysterectomy
- 60 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 61 WITHOUT removal of tubes and ovaries
 - 62 WITH removal of tubes and ovaries
- 70 Pelvic exenteration
 - 71 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

72 Posterior exenteration

Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

73 Total exenteration

Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

74 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-74.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮體癌

表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3129	100.00	-	-	3129	100.00	2040	100.00	1089	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	3	0.10	-	-	3	0.10	3	0.15	0	0.00
20-24 歲	8	0.26	-	-	8	0.26	4	0.20	4	0.37
25-29 歲	32	1.02	-	-	32	1.02	24	1.18	8	0.73
30-34 歲	89	2.84	-	-	89	2.84	67	3.28	22	2.02
35-39 歲	177	5.66	-	-	177	5.66	120	5.88	57	5.23
40-44 歲	244	7.80	-	-	244	7.80	159	7.79	85	7.81
45-49 歲	361	11.54	-	-	361	11.54	245	12.01	116	10.65
50-54 歲	539	17.23	-	-	539	17.23	350	17.16	189	17.36
55-59 歲	574	18.34	-	-	574	18.34	367	17.99	207	19.01
60-64 歲	467	14.92	-	-	467	14.92	291	14.26	176	16.16
65-69 歲	322	10.29	-	-	322	10.29	215	10.54	107	9.83
70-74 歲	162	5.18	-	-	162	5.18	99	4.85	63	5.79
75-79 歲	81	2.59	-	-	81	2.59	50	2.45	31	2.85
80-84 歲	47	1.50	-	-	47	1.50	29	1.42	18	1.65
85 歲以上	23	0.74	-	-	23	0.74	17	0.83	6	0.55
FIGO 期別 ¹										
0 期	184	5.88	-	-	184	5.88	156	7.65	28	2.57
1 期	5	0.16	-	-	5	0.16	1	0.05	4	0.37
1A 期	1223	39.09	-	-	1223	39.09	706	34.61	517	47.47
1B 期	344	10.99	-	-	344	10.99	202	9.90	142	13.04
1C 期	6	0.19	-	-	6	0.19	4	0.20	2	0.18
2 期	96	3.07	-	-	96	3.07	53	2.60	43	3.95
2A 期	5	0.16	-	-	5	0.16	3	0.15	2	0.18
2B 期	5	0.16	-	-	5	0.16	1	0.05	4	0.37
3 期	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.05	0	0.00
3A 期	84	2.68	-	-	84	2.68	45	2.21	39	3.58
3B 期	25	0.80	-	-	25	0.80	12	0.59	13	1.19
3C 期	3	0.10	-	-	3	0.10	2	0.10	1	0.09
3C1 期	103	3.29	-	-	103	3.29	53	2.60	50	4.59
3C2 期	62	1.98	-	-	62	1.98	34	1.67	28	2.57
4A 期	4	0.13	-	-	4	0.13	1	0.05	3	0.28
4B 期	137	4.38	-	-	137	4.38	84	4.12	53	4.87
不詳	842	26.91	-	-	842	26.91	682	33.43	160	14.69

表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3129	100.00	-	-	3129	100.00	2040	100.00	1089	100.00
臨床期別										
0 期	184	5.88	-	-	184	5.88	156	7.65	28	2.57
I 期	1921	61.39	-	-	1921	61.39	1243	60.93	678	62.26
II 期	146	4.67	-	-	146	4.67	95	4.66	51	4.68
III 期	264	8.44	-	-	264	8.44	171	8.38	93	8.54
IV 期	183	5.85	-	-	183	5.85	127	6.23	56	5.14
不詳	431	13.77	-	-	431	13.77	248	12.16	183	16.80
病理期別										
0 期	184	5.88	-	-	184	5.88	156	7.65	28	2.57
I 期	2027	64.78	-	-	2027	64.78	1318	64.61	709	65.11
II 期	144	4.60	-	-	144	4.60	89	4.36	55	5.05
III 期	340	10.87	-	-	340	10.87	205	10.05	135	12.40
IV 期	203	6.49	-	-	203	6.49	133	6.52	70	6.43
不詳	231	7.38	-	-	231	7.38	139	6.81	92	8.45
整併期別 ²										
0 期	184	5.88	-	-	184	5.88	156	7.65	28	2.57
I 期	2115	67.59	-	-	2115	67.59	1382	67.75	733	67.31
II 期	155	4.95	-	-	155	4.95	96	4.71	59	5.42
III 期	360	11.51	-	-	360	11.51	223	10.93	137	12.58
IV 期	245	7.83	-	-	245	7.83	161	7.89	84	7.71
不詳	70	2.24	-	-	70	2.24	22	1.08	48	4.41
臨床與病理期別一致性 Kappa ³	0.6921									
治療方式 ^{4,5,6}										
手術	1537	49.12	-	-	1537	49.12	992	48.63	545	50.05
手術合併放療	493	15.76	-	-	493	15.76	304	14.90	189	17.36
手術合併放療與化療，有/無標靶治療	317	10.13	-	-	317	10.13	206	10.10	111	10.19
手術合併化療，有/無標靶治療	331	10.58	-	-	331	10.58	217	10.64	114	10.47
手術合併內分泌治療	179	5.72	-	-	179	5.72	122	5.98	57	5.23
化療	26	0.83	-	-	26	0.83	20	0.98	6	0.55
放療	31	0.99	-	-	31	0.99	25	1.23	6	0.55
內分泌治療	77	2.46	-	-	77	2.46	59	2.89	18	1.65
緩和治療	10	0.32	-	-	10	0.32	5	0.25	5	0.46
未有首次治療申報紀錄	7	0.22	-	-	7	0.22	5	0.25	2	0.18
其他治療	121	3.87	-	-	121	3.87	85	4.17	36	3.31
組織型態										
子宮內膜癌	2771	88.56	-	-	2771	88.56	1816	89.02	955	87.70
惡性 Muller 氏混合性腫瘤	154	4.92	-	-	154	4.92	99	4.85	55	5.05
絨毛膜癌	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.05	0	0.00
其他特定上皮癌	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.05	0	0.00
非特定上皮癌	10	0.32	-	-	10	0.32	7	0.34	3	0.28
平滑肌肉瘤	94	3.00	-	-	94	3.00	59	2.89	35	3.21
子宮內膜基質肉瘤	67	2.14	-	-	67	2.14	40	1.96	27	2.48
其他惡性肉瘤	26	0.83	-	-	26	0.83	16	0.78	10	0.92
其他惡性腫瘤	5	0.16	-	-	5	0.16	1	0.05	4	0.37

註 1：FIGO 期別*請參考 108 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

註 2：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註(p.630-632)。

註 5：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮體癌

表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	3129	1537 49.12	493 15.76	317 10.13	331 10.58	179 5.72	26 0.83	31 0.99	77 2.46	10 0.32	7 0.22	121 3.87
0 期	184	110 59.78	0 0.00	0 0.00	0 0.00	53 28.80	0 0.00	0 0.00	14 7.61	0 0.00	2 1.09	5 2.72
I 期	2115	1320 62.41	384 18.16	76 3.59	119 5.63	106 5.01	0 0.00	17 0.80	56 2.65	1 0.05	2 0.09	34 1.61
II 期	155	18 11.61	72 46.45	31 20.00	10 6.45	8 5.16	1 0.65	3 1.94	2 1.29	0 0.00	0 0.00	10 6.45
III 期	360	27 7.50	26 7.22	166 46.11	102 28.33	5 1.39	0 0.00	5 1.39	0 0.00	1 0.28	1 0.28	27 7.50
IV 期	245	18 7.35	9 3.67	42 17.14	92 37.55	2 0.82	24 9.80	4 1.63	1 0.41	7 2.86	2 0.82	44 17.96
不詳	70	44 62.86	2 2.86	2 2.86	8 11.43	5 7.14	1 1.43	2 2.86	4 5.71	1 1.43	0 0.00	1 1.43

表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	309	116 37.54	19 6.15	14 4.53	15 4.85	57 18.45	3 0.97	0 0.00	63 20.39	0 0.00	2 0.65	20 6.47
0 期	71	27 38.03	0 0.00	0 0.00	0 0.00	31 43.66	0 0.00	0 0.00	10 14.08	0 0.00	1 1.41	2 2.82
I 期	179	86 48.04	12 6.70	1 0.56	2 1.12	21 11.73	0 0.00	0 0.00	47 26.26	0 0.00	1 0.56	9 5.03
II 期	14	1 7.14	6 42.86	2 14.29	0 0.00	2 14.29	0 0.00	0 0.00	2 14.29	0 0.00	0 0.00	1 7.14
III 期	24	1 4.17	1 4.17	10 41.67	10 41.67	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 8.33
IV 期	12	0 0.00	0 0.00	1 8.33	2 16.67	0 0.00	3 25.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	6 50.00
不詳	9	1 11.11	0 0.00	0 0.00	1 11.11	3 33.33	0 0.00	0 0.00	4 44.44	0 0.00	0 0.00	0 0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	1718	968 56.34	231 13.45	165 9.60	173 10.07	85 4.95	15 0.87	7 0.41	14 0.81	5 0.29	1 0.06	54 3.14
0 期	104	75 72.12	0 0.00	0 0.00	0 0.00	22 21.15	0 0.00	0 0.00	4 3.85	0 0.00	0 0.00	3 2.88
I 期	1191	826 69.35	186 15.62	35 2.94	63 5.29	57 4.79	0 0.00	4 0.34	9 0.76	0 0.00	0 0.00	11 0.92
II 期	81	13 16.05	32 39.51	19 23.46	6 7.41	3 3.70	1 1.23	1 1.23	0 0.00	0 0.00	0 0.00	6 7.41
III 期	172	14 8.14	9 5.23	86 50.00	48 27.91	0 0.00	0 0.00	1 0.58	0 0.00	0 0.00	0 0.00	14 8.14
IV 期	127	8 6.30	3 2.36	24 18.90	51 40.16	1 0.79	14 11.02	0 0.00	1 0.79	5 3.94	1 0.79	19 14.96
不詳	43	32 74.42	1 2.33	1 2.33	5 11.63	2 4.65	0 0.00	1 2.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 2.33

表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併放療	手術合併放療與化療，有/無標靶治療	手術合併化療，有/無標靶治療	手術合併內分泌治療	化療	放療	內分泌治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	1102	453 41.11	243 22.05	138 12.52	143 12.98	37 3.36	8 0.73	24 2.18	0 0.00	5 0.45	4 0.36	47 4.26
0 期	9	8 88.89	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 11.11	0 0.00
I 期	745	408 54.77	186 24.97	40 5.37	54 7.25	28 3.76	0 0.00	13 1.74	0 0.00	1 0.13	1 0.13	14 1.88
II 期	60	4 6.67	34 56.67	10 16.67	4 6.67	3 5.00	0 0.00	2 3.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 5.00
III 期	164	12 7.32	16 9.76	70 42.68	44 26.83	5 3.05	0 0.00	4 2.44	0 0.00	1 0.61	1 0.61	11 6.71
IV 期	106	10 9.43	6 5.66	17 16.04	39 36.79	1 0.94	7 6.60	4 3.77	0 0.00	2 1.89	1 0.94	19 17.92
不詳	18	11 61.11	1 5.56	1 5.56	2 11.11	0 0.00	1 5.56	1 5.56	0 0.00	1 5.56	0 0.00	0 0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併放療		手術合併放療與化療，有/無標靶治療		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併內分泌治療		化療		放療		內分泌治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3129	1537	49.12	493	15.76	317	10.13	331	10.58	179	5.72	26	0.83	31	0.99	77	2.46	10	0.32	7	0.22	121	3.87
0 期	184	110	59.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	53	28.80	0	0.00	0	0.00	14	7.61	0	0.00	2	1.09	5	2.72
1 期	5	4	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	1223	912	74.57	165	13.49	34	2.78	53	4.33	45	3.68	0	0.00	1	0.08	4	0.33	0	0.00	0	0.00	9	0.74
1B 期	344	100	29.07	161	46.80	30	8.72	30	8.72	15	4.36	0	0.00	1	0.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	2.03
1C 期	6	1	16.67	2	33.33	1	16.67	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	96	9	9.38	57	59.38	18	18.75	6	6.25	2	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.17
2A 期	5	1	20.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	5	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	84	7	8.33	8	9.52	35	41.67	28	33.33	2	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.76
3B 期	25	3	12.00	6	24.00	8	32.00	4	16.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	12.00
3C 期	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	103	6	5.83	10	9.71	57	55.34	20	19.42	1	0.97	0	0.00	1	0.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	7.77
3C2 期	62	6	9.68	1	1.61	29	46.77	22	35.48	0	0.00	0	0.00	1	1.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.84
4A 期	4	2	50.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	137	8	5.84	5	3.65	30	21.90	67	48.91	2	1.46	6	4.38	0	0.00	0	0.00	2	1.46	0	0.00	17	12.41
不詳	842	367	43.59	75	8.91	71	8.43	92	10.93	57	6.77	20	2.38	27	3.21	59	7.01	8	0.95	5	0.59	61	7.24

1 「FIGO 期別」-請參考 108 年度子宮體癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Corpus Uteri

C540–C559

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction or excision, NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction, NOS

I

11 Photodynamic therapy (PDT)

12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)

13 Cryosurgery

14 Laser

15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)

16 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS; simple excision, NOS

24 Excisional biopsy

25 Polypectomy

26 Myomectomy

Any combination of 20 or 24–26 WITH

21 Electrocautery

22 Cryosurgery

23 Laser ablation or excision

[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement]

30 Subtotal hysterectomy/supracervical hysterectomy/fundectomy WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

31 WITHOUT tube(s) and ovary(ies)

32 WITH tube(s) and ovary(ies)

[SEER Note: For these procedures, the cervix is left in place]

40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

50 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tube(s) and/or ovary(ies)

Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

60 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy

61 Modified radical hysterectomy

62 Extended hysterectomy

63 Radical hysterectomy; Wertheim procedure

[SEER Note: Use code 63 for "Type III" hysterectomy]

64 Extended radical hysterectomy

65 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

66 WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)

67 WITH removal of tube(s) and ovary(ies)

- 75 Pelvic exenteration
- 76 Anterior exenteration
 - Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
- 77 Posterior exenteration
 - Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
- 78 Total exenteration
 - Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
 - [SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]
- 79 Extended exenteration
 - Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-79.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

卵巢癌

表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1559	100.00	-	-	1559	100.00	1068	100.00	491	100.00
年齡										
00-04 歲	3	0.19	-	-	3	0.19	3	0.28	0	0.00
05-09 歲	1	0.06	-	-	1	0.06	1	0.09	0	0.00
10-14 歲	2	0.13	-	-	2	0.13	1	0.09	1	0.20
15-19 歲	12	0.77	-	-	12	0.77	9	0.84	3	0.61
20-24 歲	25	1.60	-	-	25	1.60	17	1.59	8	1.63
25-29 歲	39	2.50	-	-	39	2.50	34	3.18	5	1.02
30-34 歲	53	3.40	-	-	53	3.40	39	3.65	14	2.85
35-39 歲	89	5.71	-	-	89	5.71	61	5.71	28	5.70
40-44 歲	167	10.71	-	-	167	10.71	116	10.86	51	10.39
45-49 歲	201	12.89	-	-	201	12.89	146	13.67	55	11.20
50-54 歲	266	17.06	-	-	266	17.06	184	17.23	82	16.70
55-59 歲	203	13.02	-	-	203	13.02	140	13.11	63	12.83
60-64 歲	168	10.78	-	-	168	10.78	113	10.58	55	11.20
65-69 歲	144	9.24	-	-	144	9.24	98	9.18	46	9.37
70-74 歲	72	4.62	-	-	72	4.62	52	4.87	20	4.07
75-79 歲	56	3.59	-	-	56	3.59	23	2.15	33	6.72
80-84 歲	43	2.76	-	-	43	2.76	23	2.15	20	4.07
85 歲以上	15	0.96	-	-	15	0.96	8	0.75	7	1.43
FIGO 期別 ¹										
1 期	2	0.13	-	-	2	0.13	1	0.09	1	0.20
1A 期	241	15.46	-	-	241	15.46	167	15.64	74	15.07
1B 期	8	0.51	-	-	8	0.51	5	0.47	3	0.61
1C 期	15	0.96	-	-	15	0.96	7	0.66	8	1.63
1C1 期	182	11.67	-	-	182	11.67	132	12.36	50	10.18
1C2 期	98	6.29	-	-	98	6.29	65	6.09	33	6.72
1C3 期	45	2.89	-	-	45	2.89	32	3.00	13	2.65
2 期	1	0.06	-	-	1	0.06	1	0.09	0	0.00
2A 期	53	3.40	-	-	53	3.40	28	2.62	25	5.09
2B 期	73	4.68	-	-	73	4.68	52	4.87	21	4.28
3A1 期	48	3.08	-	-	48	3.08	30	2.81	18	3.67
3A2 期	43	2.76	-	-	43	2.76	32	3.00	11	2.24
3B 期	78	5.00	-	-	78	5.00	50	4.68	28	5.70
3C 期	200	12.83	-	-	200	12.83	147	13.76	53	10.79
4 期	7	0.45	-	-	7	0.45	7	0.66	0	0.00
4A 期	40	2.57	-	-	40	2.57	28	2.62	12	2.44
4B 期	140	8.98	-	-	140	8.98	107	10.02	33	6.72
不詳	285	18.28	-	-	285	18.28	177	16.57	108	22.00

表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1559	100.00	-	-	1559	100.00	1068	100.00	491	100.00
臨床期別										
I 期	500	32.07	-	-	500	32.07	335	31.37	165	33.60
II 期	83	5.32	-	-	83	5.32	57	5.34	26	5.30
III 期	406	26.04	-	-	406	26.04	279	26.12	127	25.87
IV 期	224	14.37	-	-	224	14.37	158	14.79	66	13.44
不詳	346	22.19	-	-	346	22.19	239	22.38	107	21.79
病理期別										
I 期	667	42.78	-	-	667	42.78	459	42.98	208	42.36
II 期	133	8.53	-	-	133	8.53	86	8.05	47	9.57
III 期	404	25.91	-	-	404	25.91	286	26.78	118	24.03
IV 期	216	13.86	-	-	216	13.86	168	15.73	48	9.78
不詳	139	8.92	-	-	139	8.92	69	6.46	70	14.26
整併期別 ²										
I 期	667	42.78	-	-	667	42.78	456	42.70	211	42.97
II 期	136	8.72	-	-	136	8.72	86	8.05	50	10.18
III 期	452	28.99	-	-	452	28.99	316	29.59	136	27.70
IV 期	250	16.04	-	-	250	16.04	181	16.95	69	14.05
不詳	54	3.46	-	-	54	3.46	29	2.72	25	5.09
臨床與病理期別一致性 Kappa ³	0.7757									
治療方式 ^{4,5}										
手術	304	19.50	-	-	304	19.50	193	18.07	111	22.61
手術合併化療	855	54.84	-	-	855	54.84	593	55.52	262	53.36
手術合併化療與標靶治療	224	14.37	-	-	224	14.37	161	15.07	63	12.83
手術合併化療與免疫治療， 有/無標靶治療	40	2.57	-	-	40	2.57	39	3.65	1	0.20
手術合併化療與內分泌治療	10	0.64	-	-	10	0.64	8	0.75	2	0.41
手術合併化療與放療	9	0.58	-	-	9	0.58	5	0.47	4	0.81
化療或/與標靶治療	76	4.87	-	-	76	4.87	51	4.78	25	5.09
緩和治療	20	1.28	-	-	20	1.28	5	0.47	15	3.05
未有首次治療申報紀錄	2	0.13	-	-	2	0.13	1	0.09	1	0.20
其他治療	19	1.22	-	-	19	1.22	12	1.12	7	1.43
組織型態										
漿液性腺癌	511	32.78	-	-	511	32.78	362	33.90	149	30.35
黏液性腺癌	158	10.13	-	-	158	10.13	106	9.93	52	10.59
子宮內膜樣癌	231	14.82	-	-	231	14.82	158	14.79	73	14.87
明亮細胞癌	329	21.10	-	-	329	21.10	239	22.38	90	18.33
混合細胞腺癌	62	3.98	-	-	62	3.98	48	4.49	14	2.85
非特定腺癌	51	3.27	-	-	51	3.27	27	2.53	24	4.89
生殖細胞瘤	57	3.66	-	-	57	3.66	40	3.75	17	3.46
性索間質腫瘤	74	4.75	-	-	74	4.75	41	3.84	33	6.72
其他特定上皮癌	34	2.18	-	-	34	2.18	22	2.06	12	2.44
非特定上皮癌	30	1.92	-	-	30	1.92	15	1.40	15	3.05
惡性肉瘤	8	0.51	-	-	8	0.51	6	0.56	2	0.41
其他惡性腫瘤	14	0.90	-	-	14	0.90	4	0.37	10	2.04

註 1：FIGO 期別*請參考 108 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

註 2：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註(p.638-640)。

註 5：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

卵巢癌

表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療		手術合併化療與內分泌治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1559	304	19.50	855	54.84	224	14.37	40	2.57	10	0.64	9	0.58	76	4.87	20	1.28	2	0.13	19	1.22
I 期	667	219	32.83	406	60.87	36	5.40	1	0.15	2	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.45
II 期	136	14	10.29	103	75.74	12	8.82	1	0.74	2	1.47	2	1.47	0	0.00	2	1.47	0	0.00	0	0.00
III 期	452	24	5.31	239	52.88	112	24.78	27	5.97	5	1.11	4	0.88	29	6.42	4	0.88	1	0.22	7	1.55
IV 期	250	17	6.80	89	35.60	62	24.80	11	4.40	1	0.40	3	1.20	46	18.40	12	4.80	0	0.00	9	3.60
不詳	54	30	55.56	18	33.33	2	3.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	2	3.70	1	1.85	0	0.00

表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療		手術合併化療與內分泌治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	224	65	29.02	128	57.14	16	7.14	4	1.79	5	2.23	1	0.45	3	1.34	0	0.00	1	0.45	1	0.45
I 期	139	51	36.69	82	58.99	4	2.88	0	0.00	1	0.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.72
II 期	17	1	5.88	12	70.59	2	11.76	0	0.00	1	5.88	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	35	2	5.71	20	57.14	7	20.00	2	5.71	3	8.57	0	0.00	1	2.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	15	0	0.00	8	53.33	3	20.00	2	13.33	0	0.00	0	0.00	2	13.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	18	11	61.11	6	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併化療	手術合併化療與標靶治療	手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	手術合併化療與內分泌治療	手術合併化療與放療	化療或/與標靶治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	837	150 17.92	484 57.83	137 16.37	25 2.99	2 0.24	4 0.48	21 2.51	4 0.48	0 0.00	10 1.19
I 期	391	109 27.88	251 64.19	28 7.16	1 0.26	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.51
II 期	80	8 10.00	61 76.25	9 11.25	1 1.25	0 0.00	1 1.25	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
III 期	233	11 4.72	126 54.08	66 28.33	18 7.73	1 0.43	2 0.86	5 2.15	1 0.43	0 0.00	3 1.29
IV 期	108	7 6.48	39 36.11	32 29.63	5 4.63	1 0.93	1 0.93	15 13.89	3 2.78	0 0.00	5 4.63
不詳	25	15 60.00	7 28.00	2 8.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 4.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00

表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²	手術合併化療	手術合併化療與標靶治療	手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療	手術合併化療與內分泌治療	手術合併化療與放療	化療或/與標靶治療	緩和治療 ³	未有首次治療申報紀錄 ⁴	其他治療 ⁵
		申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
合計	498	89 17.87	243 48.80	71 14.26	11 2.21	3 0.60	4 0.80	52 10.44	16 3.21	1 0.20	8 1.61
I 期	137	59 43.07	73 53.28	4 2.92	0 0.00	1 0.73	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
II 期	39	5 12.82	30 76.92	1 2.56	0 0.00	1 2.56	0 0.00	0 0.00	2 5.13	0 0.00	0 0.00
III 期	184	11 5.98	93 50.54	39 21.20	7 3.80	1 0.54	2 1.09	23 12.50	3 1.63	1 0.54	4 2.17
IV 期	127	10 7.87	42 33.07	27 21.26	4 3.15	0 0.00	2 1.57	29 22.83	9 7.09	0 0.00	4 3.15
不詳	11	4 36.36	5 45.45	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 18.18	0 0.00	0 0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與免疫治療，有/無標靶治療		手術合併化療與內分泌治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1559	304	19.50	855	54.84	224	14.37	40	2.57	10	0.64	9	0.58	76	4.87	20	1.28	2	0.13	19	1.22
1 期	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	241	126	52.28	108	44.81	4	1.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.24
1B 期	8	1	12.50	7	87.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1C 期	15	2	13.33	12	80.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1C1 期	182	31	17.03	132	72.53	18	9.89	0	0.00	1	0.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1C2 期	98	15	15.31	74	75.51	8	8.16	1	1.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1C3 期	45	5	11.11	37	82.22	2	4.44	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	53	7	13.21	38	71.70	6	11.32	1	1.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.89	0	0.00	0	0.00
2B 期	73	7	9.59	57	78.08	5	6.85	0	0.00	2	2.74	2	2.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	48	2	4.17	30	62.50	12	25.00	2	4.17	1	2.08	0	0.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A1 期	43	1	2.33	30	69.77	7	16.28	3	6.98	1	2.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.33
3A2 期	78	5	6.41	44	56.41	25	32.05	3	3.85	0	0.00	1	1.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	200	9	4.50	99	49.50	58	29.00	14	7.00	3	1.50	3	1.50	8	4.00	1	0.50	0	0.00	5	2.50
3C 期	7	0	0.00	3	42.86	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 期	40	3	7.50	16	40.00	15	37.50	1	2.50	0	0.00	0	0.00	2	5.00	1	2.50	0	0.00	2	5.00
4A 期	140	10	7.14	51	36.43	40	28.57	7	5.00	1	0.71	3	2.14	20	14.29	3	2.14	0	0.00	5	3.57
4B 期	9	8	88.89	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	276	71	25.72	114	41.30	20	7.25	8	2.90	0	0.00	0	0.00	44	15.94	14	5.07	2	0.72	3	1.09

1 「FIGO 期別」-請參考 108 年度卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Ovary

C569

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

17 Local tumor destruction, NOS

No specimen sent to pathology from surgical event 17

25 Total removal of tumor or (single) ovary, NOS

26 Resection of ovary (wedge, subtotal, or partial) ONLY, NOS; unknown if hysterectomy done

27 WITHOUT hysterectomy

28 WITH hysterectomy

35 Unilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

36 WITHOUT hysterectomy

37 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 37 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

50 Bilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done

51 WITHOUT hysterectomy

52 WITH hysterectomy

[SEER Note: Use code 52 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]

55 Unilateral or bilateral (salpingo-) oophorectomy WITH OMENTECTOMY, NOS; partial or total; unknown if hysterectomy done

56 WITHOUT hysterectomy

57 WITH hysterectomy

60 Debulking; cytoreductive surgery, NOS

61 WITH colon (including appendix) and/or small intestine resection (not incidental)

62 WITH partial resection of urinary tract (not incidental)

63 Combination of 61 and 62

Debulking is a partial or total removal of the tumor mass and can involve the removal of multiple organ sites. It may include removal of ovaries and/or the uterus (a hysterectomy). The pathology report may or may not identify ovarian tissue. A debulking is usually followed by another treatment modality such as chemotherapy.

[SEER Note: Debulking or cytoreductive surgery is implied by the following phrases in the operative report, pathology report, discharge summary, or consultation.

(This is not intended to be a complete list. Other phrases may also imply debulking).

Adjuvant treatment pending surgical reduction of tumor

Ovaries, tubes buried in tumor

Tumor burden

Tumor cakes

Very large tumor mass

Do not code debulking or cytoreductive surgery based on: multiple biopsies alone, the mention of "multiple tissue fragments" or "removal of multiple implants." Multiple biopsies and multiple specimens confirm the presence or absence of metastasis.]

- 70 Pelvic exenteration, NOS
- 71 Anterior exenteration
Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]
- 72 Posterior exenteration
Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]
- 73 Total exenteration
Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]
- 74 Extended exenteration
Includes pelvic blood vessels or bony pelvis
- 80 (Salpingo-) oophorectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 25-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

攝護腺癌

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6406	100.00	6406	100.00	-	-	3649	100.00	2757	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.02	1	0.02	-	-	1	0.03	0	0.00
35-39 歲	1	0.02	1	0.02	-	-	1	0.03	0	0.00
40-44 歲	6	0.09	6	0.09	-	-	5	0.14	1	0.04
45-49 歲	23	0.36	23	0.36	-	-	11	0.30	12	0.44
50-54 歲	101	1.58	101	1.58	-	-	63	1.73	38	1.38
55-59 歲	309	4.82	309	4.82	-	-	209	5.73	100	3.63
60-64 歲	781	12.19	781	12.19	-	-	511	14.00	270	9.79
65-69 歲	1377	21.50	1377	21.50	-	-	823	22.55	554	20.09
70-74 歲	1266	19.76	1266	19.76	-	-	764	20.94	502	18.21
75-79 歲	1179	18.40	1179	18.40	-	-	630	17.27	549	19.91
80-84 歲	791	12.35	791	12.35	-	-	359	9.84	432	15.67
85 歲以上	571	8.91	571	8.91	-	-	272	7.45	299	10.85
臨床與病理期別一致性										
Kappa ¹	0.4996									
治療方式 ^{2,3,4}										
根除性手術	1463	22.84	1463	22.84	-	-	1046	28.67	417	15.13
冷凍療法	9	0.14	9	0.14	-	-	9	0.25	0	0.00
HIFU	50	0.78	50	0.78	-	-	40	1.10	10	0.36
TURP/其他手術	552	8.62	552	8.62	-	-	294	8.06	258	9.36
根除性手術合併內分泌治療，有/無放療	533	8.32	533	8.32	-	-	333	9.13	200	7.25
HIFU 合併內分泌治療，有/無放療	56	0.87	56	0.87	-	-	46	1.26	10	0.36
TURP 合併內分泌治療，有/無放療	975	15.22	975	15.22	-	-	373	10.22	602	21.84
雷射或 TURP 合併化療與內分泌治療	27	0.42	27	0.42	-	-	19	0.52	8	0.29
放療	85	1.33	85	1.33	-	-	44	1.21	41	1.49
內分泌治療	1103	17.22	1103	17.22	-	-	578	15.84	525	19.04
放療合併內分泌治療	1068	16.67	1068	16.67	-	-	546	14.96	522	18.93
化療合併內分泌治療	85	1.33	85	1.33	-	-	61	1.67	24	0.87
化療合併放療與內分泌治療	36	0.56	36	0.56	-	-	24	0.66	12	0.44
緩和治療	15	0.23	15	0.23	-	-	7	0.19	8	0.29
未有首次治療申報紀錄	216	3.37	216	3.37	-	-	150	4.11	66	2.39
拒絕治療	14	0.22	14	0.22	-	-	10	0.27	4	0.15
其他治療	119	1.86	119	1.86	-	-	69	1.89	50	1.81

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6406	100.00	6406	100.00	-	-	3649	100.00	2757	100.00
組織型態										
腺癌	6299	98.33	6299	98.33	-	-	3611	98.96	2688	97.50
神經內分泌癌	19	0.30	19	0.30	-	-	7	0.19	12	0.44
其他特定上皮癌	1	0.02	1	0.02	-	-	0	0.00	1	0.04
非特定上皮癌	26	0.41	26	0.41	-	-	13	0.36	13	0.47
惡性肉瘤	2	0.03	2	0.03	-	-	2	0.05	0	0.00
其他惡性腫瘤	59	0.92	59	0.92	-	-	16	0.44	43	1.56
TNM 診斷組合(臨床期別)										
Stage I										
cT1a-cN0M0	378	7.36	378	7.36	-	-	200	7.14	178	7.62
cT2aN0M0	76	1.48	76	1.48	-	-	55	1.96	21	0.90
pT2N0M0	65	1.27	65	1.27	-	-	53	1.89	12	0.51
Stage IIA										
cT1a-cN0M0	106	2.06	106	2.06	-	-	49	1.75	57	2.44
cT2aN0M0	44	0.86	44	0.86	-	-	19	0.68	25	1.07
pT2N0M0	1	0.02	1	0.02	-	-	0	0.00	1	0.04
cT2bN0M0	14	0.27	14	0.27	-	-	8	0.29	6	0.26
cT2cN0M0	136	2.65	136	2.65	-	-	64	2.29	72	3.08
Stage IIB										
T1-2N0M0	413	8.04	413	8.04	-	-	249	8.89	164	7.02
Stage IIC										
T1-2N0M0 Grade3	233	4.54	233	4.54	-	-	146	5.21	87	3.72
T1-2N0M0 Grade4	128	2.49	128	2.49	-	-	62	2.21	66	2.83
Stage IIIA										
T1-2N0M0	503	9.79	503	9.79	-	-	229	8.18	274	11.73
Stage IIIB										
T3-4N0M0	590	11.49	590	11.49	-	-	383	13.68	207	8.86
Stage IIIC										
TanyN0M0	524	10.20	524	10.20	-	-	283	10.11	241	10.32
Stage IVA										
TanyN1M0	344	6.70	344	6.70	-	-	188	6.71	156	6.68
Stage IVB										
TanyNanyM1	1581	30.78	1581	30.78	-	-	812	29.00	769	32.92
其他	1270	-	1270	-	-	-	849	-	421	-

註 1：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 2：參考後續治療方式相關表格之附註(p.648-651)。

註 3：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中(冷凍療法依委員建議呈現)。

攝護腺癌

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6406	100.00	6406	100.00	-	-	3649	100.00	2757	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)										
Stage I										
cT1a-cN0M0	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
cT2aN0M0	2	0.10	2	0.10	-	-	0	0.00	2	0.31
pT2N0M0	134	6.70	134	6.70	-	-	95	6.97	39	6.12
Stage IIA										
cT1a-cN0M0	1	0.05	1	0.05	-	-	0	0.00	1	0.16
cT2aN0M0	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
pT2N0M0	1	0.05	1	0.05	-	-	0	0.00	1	0.16
cT2bN0M0	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
cT2cN0M0	1	0.05	1	0.05	-	-	1	0.07	0	0.00
Stage IIB										
T1-2N0M0	397	19.85	397	19.85	-	-	273	20.03	124	19.47
Stage IIC										
T1-2N0M0 Grade3	210	10.50	210	10.50	-	-	138	10.12	72	11.30
T1-2N0M0 Grade4	52	2.60	52	2.60	-	-	32	2.35	20	3.14
Stage IIIA										
T1-2N0M0	116	5.80	116	5.80	-	-	74	5.43	42	6.59
Stage IIIB										
T3-4N0M0	509	25.45	509	25.45	-	-	381	27.95	128	20.09
Stage IIIC										
TanyN0M0	239	11.95	239	11.95	-	-	158	11.59	81	12.72
Stage IVA										
TanyN1M0	137	6.85	137	6.85	-	-	97	7.12	40	6.28
Stage IVB										
TanyNanyM1	201	10.05	201	10.05	-	-	114	8.36	87	13.66
其他	4406	-	4406	-	-	-	2286	-	2120	-

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6406	100.00	6406	100.00	-	-	3649	100.00	2757	100.00
TNM 診斷組合(整併期別 ⁵⁾)										
Stage I										
cT1a-cN0M0	378	6.05	378	6.05	-	-	200	5.59	178	6.67
cT2aN0M0	76	1.22	76	1.22	-	-	55	1.54	21	0.79
pT2N0M0	134	2.14	134	2.14	-	-	95	2.65	39	1.46
Stage IIA										
cT1a-cN0M0	106	1.70	106	1.70	-	-	49	1.37	57	2.13
cT2aN0M0	44	0.70	44	0.70	-	-	19	0.53	25	0.94
pT2N0M0	1	0.02	1	0.02	-	-	0	0.00	1	0.04
cT2bN0M0	14	0.22	14	0.22	-	-	8	0.22	6	0.22
cT2cN0M0	136	2.18	136	2.18	-	-	64	1.79	72	2.70
Stage IIB										
T1-2N0M0	679	10.86	679	10.86	-	-	433	12.09	246	9.21
Stage IIC										
T1-2N0M0 Grade3	360	5.76	360	5.76	-	-	227	6.34	133	4.98
T1-2N0M0 Grade4	157	2.51	157	2.51	-	-	80	2.23	77	2.88
Stage IIIA										
T1-2N0M0	524	8.38	524	8.38	-	-	246	6.87	278	10.41
Stage IIIB										
T3-4N0M0	969	15.50	969	15.50	-	-	668	18.66	301	11.27
Stage IIIC										
TanyN0M0	641	10.26	641	10.26	-	-	359	10.03	282	10.56
Stage IVA										
TanyN1M0	448	7.17	448	7.17	-	-	263	7.35	185	6.93
Stage IVB										
TanyNanyM1	1583	25.33	1583	25.33	-	-	814	22.74	769	28.80
其他	156	-	156	-	-	-	69	-	87	-

註 5：整併期別* -請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

攝護腺癌

表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		冷凍療法 ³		HIFU ⁴		TURP/ 其他手術 ⁵		根除性手術 合併 內分泌治療 ⁶ ，有/無放療		HIFU 合併 內分泌治療 ，有/無放療		TURP 合併 內分泌治療 ，有/無放療		雷射或 TURP 合併 化療與 內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6406	1463	22.84	9	0.14	50	0.78	552	8.62	533	8.32	56	0.87	975	15.22	27	0.42
I 期	588	136	23.13	0	0	11	1.87	259	44.05	7	1.19	1	0.17	29	4.93	0	0
II 期	1545	661	42.78	5	0.32	31	2.01	180	11.65	78	5.05	29	1.88	141	9.13	0	0
III 期	2134	623	29.19	4	0.19	8	0.37	71	3.33	305	14.29	25	1.17	353	16.54	1	0.05
IV 期	2031	28	1.38	0	0.00	0	0.00	7	0.34	140	6.89	1	0.05	436	21.47	26	1.28
不詳	108	15	13.89	0	0.00	0	0.00	35	32.41	3	2.78	0	0.00	16	14.81	0	0

表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		冷凍療法 ³		HIFU ⁴		TURP/ 其他手術 ⁵		根除性手術 合併 內分泌治療 ⁶ ，有/無放療		HIFU 合併 內分泌治療 ，有/無放療		TURP 合併 內分泌治療 ，有/無放療		雷射或 TURP 合併 化療與 內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	441	188	42.63	0	0.00	4	0.91	19	4.31	74	16.78	5	1.13	23	5.22	2	0.45
I 期	57	28	49.12	0	0.00	1	1.75	12	21.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	148	96	64.86	0	0.00	3	2.03	5	3.38	12	8.11	5	3.38	6	4.05	0	0.00
III 期	117	60	51.28	0	0.00	0	0.00	1	0.85	38	32.48	0	0.00	3	2.56	0	0.00
IV 期	115	3	2.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	20.87	0	0.00	14	12.17	2	1.74
不詳	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC 8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.652。

3 「冷凍療法」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.652。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.652。

5 「TURP/其他手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.652。

6 「內分泌治」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01-31 及內分泌處置編碼為 10-50。

表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療	內分泌治療	放療合併 內分泌治療	化療合併 內分泌治療	化療合併 放療與 內分泌治療	緩和治療 ⁷	未有 首次治療 申報紀錄 ⁸	拒絕治療	其他治療 ⁹
申報數 申報數	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
85 85	1103 17.22	1068 16.67	85 1.33	36 0.56	15 0.23	216 3.37	14 0.22	119 1.86
20 20	6 1.02	18 3.06	0 0.00	0 0.00	3 0.51	83 14.12	2 0.34	13 2.21
53 53	52 3.37	194 12.56	0 0.00	0 0.00	1 0.06	78 5.05	9 0.58	33 2.14
11 11	188 8.81	472 22.12	0 0.00	1 0.05	1 0.05	38 1.78	3 0.14	30 1.41
1 1	841 41.41	382 18.81	85 4.19	35 1.72	8 0.39	1 0.05	0 0.00	40 1.97
0 0	16 14.81	2 1.85	0 0.00	0 0.00	2 1.85	16 14.81	0 0.00	3 2.78

表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療	內分泌治療	放療合併 內分泌治療	化療合併 內分泌治療	化療合併 放療與 內分泌治療	緩和治療 ⁷	未有 首次治療 申報紀錄 ⁸	拒絕治療	其他治療 ⁹
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
1 0.23	36 8.16	35 7.94	14 3.17	3 0.68	0 0.00	24 5.44	2 0.45	11 2.49
1 1.75	0 0.00	1 1.75	0 0.00	0 0.00	0 0.00	13 22.81	0 0.00	1 1.75
0 0.00	0 0.00	8 5.41	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 6.08	2 1.35	2 1.35
0 0.00	2 1.71	7 5.98	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.85	0 0.00	5 4.27
0 0.00	34 29.57	19 16.52	14 12.17	3 2.61	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 1.74
0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 25.00	0 0.00	1 25.00

7 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

8 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，此處個案均為積極監測(active surveillance)/觀察等待(watchful waiting)。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

攝護腺癌

表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		冷凍療法 ³		HIFU ⁴		TURP/ 其他手術 ⁵		根除性手術 合併 內分泌治療 ⁶ ，有/無放療		HIFU 合併 內分泌治療 ，有/無放療		TURP 合併 內分泌治療 ，有/無放療		雷射或 TURP 合併 化療與 內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3424	1107	32.33	4	0.12	31	0.91	250	7.30	384	11.21	29	0.85	349	10.19	19	0.55
I 期	350	96	27.43	0	0.00	9	2.57	135	38.57	7	2.00	1	0.29	14	4.00	0	0.00
II 期	927	494	53.29	2	0.22	18	1.94	82	8.85	53	5.72	13	1.40	73	7.87	0	0.00
III 期	1140	486	42.63	2	0.18	4	0.35	20	1.75	223	19.56	14	1.23	99	8.68	0	0.00
IV 期	969	22	2.27	0	0.00	0	0.00	2	0.21	99	10.22	1	0.10	160	16.51	19	1.96
不詳	38	9	23.68	0	0.00	0	0.00	11	28.95	2	5.26	0	0.00	3	7.89	0	0.00

表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		冷凍療法 ³		HIFU ⁴		TURP/ 其他手術 ⁵		根除性手術 合併 內分泌治療 ⁶ ，有/無放療		HIFU 合併 內分泌治療 ，有/無放療		TURP 合併 內分泌治療 ，有/無放療		雷射或 TURP 合併 化療與 內分泌治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2541	168	6.61	5	0.20	15	0.59	283	11.14	75	2.95	22	0.87	603	23.73	6	0.24
I 期	181	12	6.63	0	0.00	1	0.55	112	61.88	0	0.00	0	0.00	15	8.29	0	0.00
II 期	470	71	15.11	3	0.64	10	2.13	93	19.79	13	2.77	11	2.34	62	13.19	0	0.00
III 期	877	77	8.78	2	0.23	4	0.46	50	5.70	44	5.02	11	1.25	251	28.62	1	0.11
IV 期	947	3	0.32	0	0.00	0	0.00	5	0.53	17	1.80	0	0.00	262	27.67	5	0.53
不詳	66	5	7.58	0	0.00	0	0.00	23	34.85	1	1.52	0	0.00	13	19.70	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC 8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.652。

3 「冷凍療法」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.652。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17 及 27。術式編碼詳見 p.652。

5 「TURP/其他手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、15、16、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.652。

6 「內分泌治」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01-31 及內分泌處置編碼為 10-50。

表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療	內分泌治療	放療合併 內分泌治療	化療合併 內分泌治療	化療合併 放療與 內分泌治療	緩和治療 ⁷	未有 首次治療 申報紀錄 ⁸	拒絕治療	其他治療 ⁹
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
44 1.29	396 11.57	543 15.86	51 1.49	27 0.79	2 0.06	106 3.10	6 0.18	76 2.22
12 3.43	3 0.86	8 2.29	0 0.00	0 0.00	0 0.00	53 15.14	1 0.29	11 3.14
27 2.91	10 1.08	96 10.36	0 0.00	0 0.00	0 0.00	32 3.45	4 0.43	23 2.48
5 0.44	34 2.98	220 19.30	0 0.00	1 0.09	1 0.09	12 1.05	1 0.09	18 1.58
0 0.00	346 35.71	219 22.60	51 5.26	26 2.68	1 0.10	0 0.00	0 0.00	23 2.37
0 0.00	3 7.89	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 23.68	0 0.00	1 2.63

表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類(續)

放療	內分泌治療	放療合併 內分泌治療	化療合併 內分泌治療	化療合併 放療與 內分泌治療	緩和治療 ⁷	未有 首次治療 申報紀錄 ⁸	拒絕治療	其他治療 ⁹
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
40 1.57	671 26.41	490 19.28	20 0.79	6 0.24	13 0.51	86 3.38	6 0.24	32 1.26
7 3.87	3 1.66	9 4.97	0 0.00	0 0.00	3 1.66	17 9.39	1 0.55	1 0.55
26 5.53	42 8.94	90 19.15	0 0.00	0 0.00	1 0.21	37 7.87	3 0.64	8 1.70
6 0.68	152 17.33	245 27.94	0 0.00	0 0.00	0 0.00	25 2.85	2 0.23	7 0.80
1 0.11	461 48.68	144 15.21	20 2.11	6 0.63	7 0.74	1 0.11	0 0.00	15 1.58
0 0.00	13 19.70	2 3.03	0 0.00	0 0.00	2 3.03	6 9.09	0 0.00	1 1.52

7 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

8 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，此處個案均為積極監測(active surveillance)/觀察等待(watchful waiting)。

9 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Prostate

C619

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

18 Local tumor destruction or excision, NOS

19 Transurethral resection (TURP), NOS

Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 18 or 19

(principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction [or excision], NOS

14 Cryoprostatectomy

15 Laser ablation

16 Hyperthermia

17 Other method of local tumor destruction

No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

[SEER Note: Assign **code 15** for Niagara laser photovaporization of the prostate. Assign **code 16** for Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT). Assign **code 17** for High Intensity Focused Ultrasonography (HIFU) and for Transurethral Needle Ablation (TUNA).]

20 Local tumor excision, NOS

21 Transurethral resection (TURP), NOS

22 TURP—cancer is incidental finding during surgery for benign disease

23 TURP—patient has suspected/known cancer

Any combination of 20–23 WITH

24 Cryosurgery

25 Laser

26 Hyperthermia

27 HIFU

30 Subtotal, segmental, or simple prostatectomy, which may leave all or part of the capsule intact

[SEER Note: May include suprapubic prostatectomy.]

50 Radical prostatectomy, NOS; total prostatectomy, NOS

Includes excision of the prostate, prostatic capsule, ejaculatory ducts, seminal vesicle(s); and may include a narrow cuff of bladder neck.

70 Prostatectomy WITH resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

Surgeries coded 70 are any prostatectomy WITH resection in continuity with any other organs.

The other organs may be partially or totally removed. Procedures may include, but are not limited to cystoprostatectomy, radical cystectomy, and prostatectomy.

[SEER Note: “In continuity with” or “en bloc” means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Prostatectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

膀胱癌

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3455	100.00	2380	100.00	1075	100.00	1844	100.00	1611	100.00
年齡										
00-04 歲	1	0.03	0	0.00	1	0.09	1	0.05	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	3	0.09	3	0.13	0	0.00	3	0.16	0	0.00
25-29 歲	6	0.17	4	0.17	2	0.19	5	0.27	1	0.06
30-34 歲	7	0.20	5	0.21	2	0.19	6	0.33	1	0.06
35-39 歲	31	0.90	26	1.09	5	0.47	16	0.87	15	0.93
40-44 歲	44	1.27	36	1.51	8	0.74	21	1.14	23	1.43
45-49 歲	72	2.08	58	2.44	14	1.30	46	2.49	26	1.61
50-54 歲	167	4.83	128	5.38	39	3.63	84	4.56	83	5.15
55-59 歲	298	8.63	222	9.33	76	7.07	160	8.68	138	8.57
60-64 歲	465	13.46	332	13.95	133	12.37	243	13.18	222	13.78
65-69 歲	565	16.35	394	16.55	171	15.91	314	17.03	251	15.58
70-74 歲	480	13.89	321	13.49	159	14.79	266	14.43	214	13.28
75-79 歲	531	15.37	336	14.12	195	18.14	286	15.51	245	15.21
80-84 歲	404	11.69	256	10.76	148	13.77	209	11.33	195	12.10
85 歲以上	381	11.03	259	10.88	122	11.35	184	9.98	197	12.23
臨床與病理期別一致性										
Kappa ¹	0.4419									
治療方式 ^{2,3,4}										
根除性手術	92	2.66	59	2.48	33	3.07	63	3.42	29	1.80
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療	93	2.69	70	2.94	23	2.14	67	3.63	26	1.61
根除性手術合併局部化療	29	0.84	15	0.63	14	1.30	21	1.14	8	0.50
根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療	22	0.64	13	0.55	9	0.84	18	0.98	4	0.25
部分切除性手術	25	0.72	14	0.59	11	1.02	17	0.92	8	0.50
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種	23	0.67	15	0.63	8	0.74	16	0.87	7	0.43
以上										
TURBT	644	18.64	432	18.15	212	19.72	301	16.32	343	21.29
TURBT 合併局部化療	1744	50.48	1233	51.81	511	47.53	883	47.89	861	53.45
TURBT 合併局部免疫治療	73	2.11	51	2.14	22	2.05	45	2.44	28	1.74
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	162	4.69	110	4.62	52	4.84	100	5.42	62	3.85
TURBT 合併全身化療	92	2.66	66	2.77	26	2.42	51	2.77	41	2.55
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療(化學	57	1.65	43	1.81	14	1.30	35	1.90	22	1.37
或免疫任一種以上)										
TURBT 合併全身免疫治療，有/無化療(全身	46	1.33	34	1.43	12	1.12	31	1.68	15	0.93
或局部任一種以上)										
放療(有/無 TURBT)	69	2.00	37	1.55	32	2.98	35	1.90	34	2.11
放療合併化療(有/無 TURBT)	151	4.37	97	4.08	54	5.02	75	4.07	76	4.72
化療	17	0.49	12	0.50	5	0.47	15	0.81	2	0.12
緩和治療	25	0.72	15	0.63	10	0.93	11	0.60	14	0.87
未有首次治療申報紀錄	10	0.29	8	0.34	2	0.19	5	0.27	5	0.31
其他治療	81	2.34	56	2.35	25	2.33	55	2.98	26	1.61

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3455	100.00	2380	100.00	1075	100.00	1844	100.00	1611	100.00
組織型態										
原位癌										
泌尿上皮癌	95	7.81	57	6.75	38	10.24	56	8.37	39	7.13
乳突狀原位癌	1118	91.94	786	93.02	332	89.49	611	91.33	507	92.69
非特定原位上皮癌	3	0.25	2	0.24	1	0.27	2	0.30	1	0.18
侵襲癌										
泌尿上皮癌	2142	95.67	1474	96.03	668	94.89	1121	95.40	1021	95.96
腺癌	32	1.43	23	1.50	9	1.28	18	1.53	14	1.32
鱗狀細胞癌	17	0.76	10	0.65	7	0.99	12	1.02	5	0.47
神經內分泌癌	31	1.38	24	1.56	7	0.99	14	1.19	17	1.60
非特定上皮癌	6	0.27	1	0.07	5	0.71	3	0.26	3	0.28
惡性黑色素瘤	3	0.13	0	0.00	3	0.43	2	0.17	1	0.09
惡性肉瘤	2	0.09	0	0.00	2	0.28	2	0.17	0	0.00
其他惡性腫瘤	6	0.27	3	0.20	3	0.43	3	0.26	3	0.28
TNM 診斷組合(臨床期別)										
Stage 0										
TaN0M0	1098	41.43	779	42.68	319	38.67	608	42.28	490	40.43
TisN0M0	62	2.34	33	1.81	29	3.52	47	3.27	15	1.24
Stage I										
T1N0M0	1164	43.92	806	44.16	358	43.39	598	41.59	566	46.70
Stage II										
T2aN0M0	7	0.26	6	0.33	1	0.12	2	0.14	5	0.41
T2bN0M0	7	0.26	3	0.16	4	0.48	2	0.14	5	0.41
Stage IIIA										
T3N0M0	19	0.72	12	0.66	7	0.85	13	0.90	6	0.50
T4aN0M0	50	1.89	37	2.03	13	1.58	27	1.88	23	1.90
T1-4aN1M0	32	1.21	16	0.88	16	1.94	19	1.32	13	1.07
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	53	2.00	37	2.03	16	1.94	31	2.16	22	1.82
Stage IVA										
T4bN0M0	15	0.57	9	0.49	6	0.73	10	0.70	5	0.41
TanyNanyM1a	35	1.32	20	1.10	15	1.82	18	1.25	17	1.40
Stage IVB										
TanyNanyM1b	108	4.08	67	3.67	41	4.97	63	4.38	45	3.71
其他	805	-	555	-	250	-	406	-	399	-

註 1：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 2：參考後續治療方式相關表格之附註(p.658-661)。

註 3：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

膀胱癌

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3455	100.00	2380	100.00	1075	100.00	1844	100.00	1611	100.00
TNM 診斷組合(病理期別)										
Stage 0										
TaN0M0	104	32.50	82	36.12	22	23.66	57	29.69	47	36.72
TisN0M0	4	1.25	2	0.88	2	2.15	2	1.04	2	1.56
Stage I										
T1N0M0	88	27.50	60	26.43	28	30.11	54	28.13	34	26.56
Stage II										
T2aN0M0	15	4.69	12	5.29	3	3.23	9	4.69	6	4.69
T2bN0M0	12	3.75	7	3.08	5	5.38	6	3.13	6	4.69
Stage IIIA										
T3N0M0	37	11.56	22	9.69	15	16.13	25	13.02	12	9.38
T4aN0M0	11	3.44	7	3.08	4	4.30	9	4.69	2	1.56
T1-4aN1M0	6	1.88	6	2.64	0	0.00	5	2.60	1	0.78
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	10	3.13	9	3.96	1	1.08	6	3.13	4	3.13
Stage IVA										
T4bN0M0	1	0.31	1	0.44	0	0.00	1	0.52	0	0.00
TanyNanyM1a	7	2.19	5	2.20	2	2.15	3	1.56	4	3.13
Stage IVB										
TanyNanyM1b	25	7.81	14	6.17	11	11.83	15	7.81	10	7.81
其他	3135	-	2153	-	982	-	1652	-	1483	-

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3455	100.00	2380	100.00	1075	100.00	1844	100.00	1611	100.00
TNM 診斷組合(整併期別 ⁵⁾)										
Stage 0										
TaNO0M0	1159	41.26	825	42.64	334	38.22	633	41.67	526	40.78
TisNO0M0	66	2.35	35	1.81	31	3.55	49	3.23	17	1.32
Stage I										
T1NO0M0	1202	42.79	832	43.00	370	42.33	618	40.68	584	45.27
Stage II										
T2aNO0M0	17	0.61	13	0.67	4	0.46	9	0.59	8	0.62
T2bNO0M0	14	0.50	7	0.36	7	0.80	6	0.39	8	0.62
Stage IIIA										
T3NO0M0	38	1.35	23	1.19	15	1.72	25	1.65	13	1.01
T4aNO0M0	53	1.89	38	1.96	15	1.72	29	1.91	24	1.86
T1-4aN1M0	35	1.25	19	0.98	16	1.83	21	1.38	14	1.09
Stage IIIB										
T1-4aN2-3M0	60	2.14	43	2.22	17	1.95	34	2.24	26	2.02
Stage IVA										
T4bNO0M0	16	0.57	10	0.52	6	0.69	11	0.72	5	0.39
TanyNanyM1a	35	1.25	20	1.03	15	1.72	18	1.18	17	1.32
Stage IVB										
TanyNanyM1b	114	4.06	70	3.62	44	5.03	66	4.34	48	3.72
其他	646	-	445	-	201	-	325	-	321	-

註 5：整併期別*請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

膀胱癌

表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別¹之治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3455	92	2.66	93	2.69	29	0.84	22	0.64	25	0.72	23	0.67	644	18.64	1744	50.48	73	2.11
0 期	1225	8	0.65	0	0.00	2	0.16	0	0.00	2	0.16	1	0.08	300	24.49	802	65.47	25	2.04
I 期	1202	31	2.58	5	0.42	7	0.58	0	0.00	5	0.42	5	0.42	147	12.23	793	65.97	44	3.66
II 期	446	22	4.93	34	7.62	14	3.14	5	1.12	8	1.79	12	2.69	82	18.39	96	21.52	4	0.90
III 期	331	24	7.25	50	15.11	5	1.51	13	3.93	7	2.11	4	1.21	58	17.52	23	6.95	0	0.00
IV 期	167	3	1.80	4	2.40	1	0.60	3	1.80	0	0.00	0	0.00	30	17.96	1	0.60	0	0.00
不詳	84	4	4.76	0	0.00	0	0.00	1	1.19	3	3.57	1	1.19	27	32.14	29	34.52	0	0.00

表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	164	1	0.61	4	2.44	1	0.61	1	0.61	5	3.05	0	0.00	36	21.95	79	48.17	3	1.83
0 期	84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26	30.95	51	60.71	1	1.19
I 期	42	1	2.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	14.29	24	57.14	2	4.76
II 期	13	0	0.00	2	15.38	1	7.69	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	2	15.38	0	0.00
III 期	9	0	0.00	2	22.22	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00
IV 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	27.27	0	0.00	3	27.27	2	18.18	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03。

表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療		TURBT 合併 全身化療		TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)		TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)		放療 (有/無 TURBT)		放療 合併化療 (有/無 TURBT)		化療		緩和治療 ⁸		未有 首次治療 申報紀錄 ⁹		其它治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
162	4.69	92	2.66	57	1.65	46	1.33	69	2.00	151	4.37	17	0.49	25	0.72	10	0.29	81	2.34
52	4.24	3	0.24	3	0.24	2	0.16	3	0.24	2	0.16	0	0.00	0	0.00	5	0.41	15	1.22
105	8.74	13	1.08	16	1.33	7	0.58	7	0.58	11	0.92	0	0.00	0	0.00	1	0.08	5	0.42
5	1.12	18	4.04	24	5.38	7	1.57	21	4.71	67	15.02	0	0.00	1	0.22	0	0.00	26	5.83
0	0.00	29	8.76	5	1.51	15	4.53	18	5.44	51	15.41	8	2.42	4	1.21	1	0.30	16	4.83
0	0.00	23	13.77	9	5.39	14	8.38	19	11.38	20	11.98	9	5.39	15	8.98	2	1.20	14	8.38
0	0.00	6	7.14	0	0.00	1	1.19	1	1.19	0	0.00	0	0.00	5	5.95	1	1.19	5	5.95

表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療		TURBT 合併 全身化療		TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)		TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)		放療 (有/無 TURBT)		放療 合併化療 (有/無 TURBT)		化療		緩和治療 ⁸		未有 首次治療 申報紀錄 ⁹		其它治療 ¹⁰	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
9	5.49	5	3.05	4	2.44	4	2.44	0	0.00	4	2.44	0	0.00	0	0.00	1	0.61	7	4.27
4	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.19	1	1.19
5	11.90	2	4.76	2	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	2	15.38	1	7.69	0	0.00	0	0.00	2	15.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69
0	0.00	1	11.11	1	11.11	2	22.22	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	27.27

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

膀胱癌

表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1495	53	3.55	62	4.15	11	0.74	13	0.87	8	0.54	17	1.14	224	14.98	781	52.24	39	2.61
0 期	556	5	0.90	0	0.00	2	0.36	0	0.00	0	0.00	1	0.18	123	22.12	367	66.01	15	2.70
I 期	553	22	3.98	3	0.54	3	0.54	0	0.00	2	0.36	3	0.54	51	9.22	366	66.18	24	4.34
II 期	164	11	6.71	18	10.98	4	2.44	4	2.44	4	2.44	10	6.10	21	12.80	31	18.90	0	0.00
III 期	134	10	7.46	38	28.36	1	0.75	6	4.48	2	1.49	3	2.24	14	10.45	8	5.97	0	0.00
IV 期	61	3	4.92	3	4.92	1	1.64	2	3.28	0	0.00	0	0.00	9	14.75	0	0.00	0	0.00
不詳	27	2	7.41	0	0.00	0	0.00	1	3.70	0	0.00	0	0.00	6	22.22	9	33.33	0	0.00

表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 ²		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 ³		根除性手術合併局部化療		根除性手術合併免疫治療，有/無全身化療		部分切除性手術 ⁴		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT ⁵		TURBT合併局部化療		TURBT合併局部免疫治療 ⁶	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1796	38	2.12	27	1.50	17	0.95	8	0.45	12	0.67	6	0.33	384	21.38	884	49.22	31	1.73
0 期	585	3	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.34	0	0.00	151	25.81	384	65.64	9	1.54
I 期	607	8	1.32	2	0.33	4	0.66	0	0.00	3	0.49	2	0.33	90	14.83	403	66.39	18	2.97
II 期	269	11	4.09	14	5.20	9	3.35	1	0.37	2	0.74	2	0.74	61	22.68	63	23.42	4	1.49
III 期	188	14	7.45	10	5.32	4	2.13	6	3.19	5	2.66	1	0.53	43	22.87	15	7.98	0	0.00
IV 期	101	0	0.00	1	0.99	0	0.00	1	0.99	0	0.00	0	0.00	21	20.79	1	0.99	0	0.00
不詳	46	2	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.17	18	39.13	18	39.13	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(108 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.662。

3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。

4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.662。

5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.662。

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03。

表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療	TURBT 合併 全身化療	TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)	TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)	放療 (有/無 TURBT)	放療 合併化療 (有/無 TURBT)	化療	緩和治療 ⁸	未有 首次治療 申報紀錄 ⁹	其它治療 ¹⁰
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
80 5.35	45 3.01	24 1.61	19 1.27	9 0.60	58 3.88	11 0.74	4 0.27	2 0.13	35 2.34
29 5.22	2 0.36	2 0.36	1 0.18	0 0.00	1 0.18	0 0.00	0 0.00	2 0.36	6 1.08
49 8.86	6 1.08	6 1.08	6 1.08	2 0.36	5 0.90	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 0.90
2 1.22	9 5.49	11 6.71	2 1.22	2 1.22	26 15.85	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 5.49
0 0.00	13 9.70	2 1.49	5 3.73	0 0.00	17 12.69	6 4.48	2 1.49	0 0.00	7 5.22
0 0.00	9 14.75	3 4.92	5 8.20	4 6.56	9 14.75	5 8.20	2 3.28	0 0.00	6 9.84
0 0.00	6 22.22	0 0.00	0 0.00	1 3.70	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 7.41

表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別¹之治療方式分類(續)

TURBT 合併 局部化療 與局部 免疫治療	TURBT 合併 全身化療	TURBT 合併全身 化療與局部 藥物治療 (化學或免疫 任一種以上)	TURBT 合併全身 免疫治療 ⁷ ，有/無化療 (全身或局部 任一種以上)	放療 (有/無 TURBT)	放療 合併化療 (有/無 TURBT)	化療	緩和治療 ⁸	未有 首次治療 申報紀錄 ⁹	其它治療 ¹⁰
申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %	申報數 %
73 4.06	42 2.34	29 1.61	23 1.28	60 3.34	89 4.96	6 0.33	21 1.17	7 0.39	39 2.17
19 3.25	1 0.17	1 0.17	1 0.17	3 0.51	1 0.17	0 0.00	0 0.00	2 0.34	8 1.37
51 8.40	5 0.82	8 1.32	1 0.16	5 0.82	6 0.99	0 0.00	0 0.00	1 0.16	0 0.00
3 1.12	7 2.60	12 4.46	5 1.86	19 7.06	39 14.50	0 0.00	1 0.37	0 0.00	16 5.95
0 0.00	15 7.98	2 1.06	8 4.26	18 9.57	33 17.55	2 1.06	2 1.06	1 0.53	9 4.79
0 0.00	14 13.86	6 5.94	7 6.93	15 14.85	10 9.90	4 3.96	13 12.87	2 1.98	6 5.94
0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 2.17	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 10.87	1 2.17	0 0.00

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03。

8 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

Bladder

C670–C679

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

- 00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
- 10 Local tumor destruction, NOS
 - 11 Photodynamic therapy (PDT)
 - 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
 - 13 Cryosurgery
 - 14 Laser
 - 15 Intravesical therapy
 - 16 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) or other immunotherapy
[SEER Note : Code BCG as both surgery and immunotherapy]

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

- 20 Local tumor excision, NOS
- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy
[SEER Note : Code TURB as 27]

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 30 Partial cystectomy
- 50 Simple/total/complete cystectomy
- 60 Complete cystectomy with reconstruction
[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]
 - 61 Radical cystectomy PLUS ileal conduit
 - 62 Radical cystectomy PLUS continent reservoir or pouch, NOS
 - 63 Radical cystectomy PLUS abdominal pouch (cutaneous)
 - 64 Radical cystectomy PLUS in situ pouch (orthotopic)

When the procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

- 70 Pelvic exenteration, NOS
 - 71 Radical cystectomy including anterior exenteration
[SEER Note : Use code 71 for cystoprostatectomy.]

For females, includes removal of bladder, uterus, ovaries, entire vaginal wall, and entire urethra. For males, includes removal of the prostate. When a procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

- 72 Posterior exenteration
For females, also includes removal of vagina, rectum and anus. For males, also includes prostate, rectum and anus.

- 73 Total exenteration
Includes all tissue and organs removed for an anterior and posterior exenteration.
[SEER Note : Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes. The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery (癌登欄位序號 #4.16 or 4.17).]

- 74 Extended exenteration
Includes pelvic blood vessels and/or bony pelvis

- 80 Cystectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

- 90 Surgery, NOS
- 99 Unknown if surgery performed; death

惡性淋巴瘤

表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2971	100.00	1609	100.00	1362	100.00	1967	100.00	1004	100.00
年齡										
00-04 歲	11	0.37	7	0.44	4	0.29	11	0.56	0	0.00
05-09 歲	7	0.24	5	0.31	2	0.15	7	0.36	0	0.00
10-14 歲	17	0.57	12	0.75	5	0.37	17	0.86	0	0.00
15-19 歲	35	1.18	21	1.31	14	1.03	25	1.27	10	1.00
20-24 歲	65	2.19	34	2.11	31	2.28	49	2.49	16	1.59
25-29 歲	78	2.63	36	2.24	42	3.08	56	2.85	22	2.19
30-34 歲	77	2.59	49	3.05	28	2.06	53	2.69	24	2.39
35-39 歲	108	3.64	52	3.23	56	4.11	85	4.32	23	2.29
40-44 歲	118	3.97	59	3.67	59	4.33	78	3.97	40	3.98
45-49 歲	152	5.12	96	5.97	56	4.11	107	5.44	45	4.48
50-54 歲	207	6.97	112	6.96	95	6.98	142	7.22	65	6.47
55-59 歲	298	10.03	174	10.81	124	9.10	191	9.71	107	10.66
60-64 歲	406	13.67	212	13.18	194	14.24	260	13.22	146	14.54
65-69 歲	411	13.83	214	13.30	197	14.46	285	14.49	126	12.55
70-74 歲	294	9.90	161	10.01	133	9.77	189	9.61	105	10.46
75-79 歲	274	9.22	142	8.83	132	9.69	169	8.59	105	10.46
80-84 歲	223	7.51	112	6.96	111	8.15	128	6.51	95	9.46
85 歲以上	190	6.40	111	6.90	79	5.80	115	5.85	75	7.47
Ann Arbor 期別 ¹										
I 期	134	4.51	75	4.66	59	4.33	86	4.37	48	4.78
IE 期	337	11.34	162	10.07	175	12.85	220	11.18	117	11.65
II 期	305	10.27	143	8.89	162	11.89	188	9.56	117	11.65
II Bulky 期	37	1.25	22	1.37	15	1.10	23	1.17	14	1.39
II E 期	249	8.38	128	7.96	121	8.88	164	8.34	85	8.47
III 期	487	16.39	278	17.28	209	15.35	306	15.56	181	18.03
IV 期	1087	36.59	614	38.16	473	34.73	747	37.98	340	33.86
不詳	335	11.28	187	11.62	148	10.87	233	11.85	102	10.16
整併期別 ²										
I 期	471	15.85	237	14.73	234	17.18	306	15.56	165	16.43
II 期	591	19.89	293	18.21	298	21.88	375	19.06	216	21.51
III 期	487	16.39	278	17.28	209	15.35	306	15.56	181	18.03
IV 期	1087	36.59	614	38.16	473	34.73	747	37.98	340	33.86
不詳	335	11.28	187	11.62	148	10.87	233	11.85	102	10.16

表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2971	100.00	1609	100.00	1362	100.00	1967	100.00	1004	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa ³	-									
治療方式 ^{4,5,6}										
手術	78	2.63	36	2.24	42	3.08	48	2.44	30	2.99
手術合併化療，有/無標靶治療	105	3.53	58	3.60	47	3.45	47	2.39	58	5.78
手術合併放療	25	0.84	11	0.68	14	1.03	14	0.71	11	1.10
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	27	0.91	16	0.99	11	0.81	14	0.71	13	1.29
放療	102	3.43	57	3.54	45	3.30	59	3.00	43	4.28
放療合併化療	113	3.80	69	4.29	44	3.23	73	3.71	40	3.98
放療合併化療與標靶治療	204	6.87	94	5.84	110	8.08	125	6.35	79	7.87
化療	431	14.51	254	15.79	177	13.00	311	15.81	120	11.95
化療合併標靶治療	1372	46.18	742	46.12	630	46.26	901	45.81	471	46.91
化療合併骨幹移植，有/無標靶治療	50	1.68	31	1.93	19	1.40	46	2.34	4	0.40
紫外光化或抗生素治療等其他療法	68	2.29	37	2.30	31	2.28	58	2.95	10	1.00
內分泌治療或/與標靶治療	63	2.12	34	2.11	29	2.13	42	2.14	21	2.09
標靶治療	27	0.91	11	0.68	16	1.17	19	0.97	8	0.80
緩和治療	77	2.59	43	2.67	34	2.50	39	1.98	38	3.78
未有首次治療申報紀錄	145	4.88	67	4.16	78	5.73	107	5.44	38	3.78
其他治療	84	2.83	49	3.05	35	2.57	64	3.25	20	1.99
組織型態										
何杰金氏淋巴瘤	181	6.09	90	5.59	91	6.68	131	6.66	50	4.98
非何杰金氏淋巴瘤	2632	88.59 (100.00)	1429	88.81 (100.00)	1203	88.33 (100.00)	1733	88.10 (100.00)	899	89.54 (100.00)
B 細胞淋巴樣瘤	2345	(89.10)	1237	(86.56)	1108	(92.10)	1526	(88.06)	819	(91.10)
T/NK 細胞淋巴樣瘤	287	(10.90)	192	(13.44)	95	(7.90)	207	(11.94)	80	(8.90)
組織細胞與樹突狀細胞瘤	28	0.94	12	0.75	16	1.17	21	1.07	7	0.70
其他惡性淋巴瘤	130	4.38	78	4.85	52	3.82	82	4.17	48	4.78

註 1：「Ann Arbor 期別」定義：請參考(108 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

註 2：整併期別*-請參考 108 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：惡性淋巴瘤個案因 Ann Arbor 期別屬於臨床分期，無病理期別，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註(p.666-669)。

註 5：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

惡性淋巴瘤

表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2971	78	2.63	105	3.53	25	0.84	27	0.91	102	3.43	113	3.80	204	6.87	431	14.51	1372	46.18	50	1.68	68	2.29	63	2.12	27	0.91	77	2.59	145	4.88	84	2.83
I 期	471	39	8.28	16	3.40	15	3.18	9	1.91	41	8.70	33	7.01	43	9.13	29	6.16	117	24.84	2	0.42	49	10.40	6	1.27	6	1.27	6	1.27	37	7.86	23	4.88
II 期	591	6	1.02	29	4.91	3	0.51	4	0.68	24	4.06	41	6.94	62	10.49	92	15.57	274	46.36	2	0.34	5	0.85	7	1.18	2	0.34	5	0.85	23	3.89	12	2.03
III 期	487	0	0.00	10	2.05	1	0.21	2	0.41	2	0.41	11	2.26	24	4.93	75	15.40	292	59.96	10	2.05	1	0.21	10	2.05	3	0.62	11	2.26	25	5.13	10	2.05
IV 期	1087	9	0.83	34	3.13	0	0.00	2	0.18	14	1.29	18	1.66	52	4.78	160	14.72	622	57.22	32	2.94	4	0.37	28	2.58	13	1.20	31	2.85	47	4.32	21	1.93
不詳	335	24	7.16	16	4.78	6	1.79	10	2.99	21	6.27	10	2.99	23	6.87	75	22.39	67	20.00	4	1.19	9	2.69	12	3.58	3	0.90	24	7.16	13	3.88	18	5.37

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(108 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	398	10	2.51	7	1.76	2	0.50	5	1.26	5	1.26	47	11.81	40	10.05	113	28.39	119	29.90	12	3.02	12	3.02	3	0.75	1	0.25	1	0.25	8	2.01	13	3.27
I 期	59	8	13.56	1	1.69	2	3.39	0	0.00	0	0.00	7	11.86	10	16.95	4	6.78	14	23.73	0	0.00	9	15.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.69	3	5.08
II 期	125	0	0.00	4	3.20	0	0.00	2	1.60	2	1.60	22	17.60	18	14.40	33	26.40	37	29.60	1	0.80	1	0.80	0	0.00	1	0.80	0	0.00	1	0.80	3	2.40
III 期	47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.13	0	0.00	6	12.77	6	12.77	20	42.55	12	25.53	1	2.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.13
IV 期	107	0	0.00	2	1.87	0	0.00	0	0.00	1	0.93	8	7.48	3	2.80	27	25.23	52	48.60	9	8.41	0	0.00	1	0.93	0	0.00	0	0.00	3	2.80	1	0.93
不詳	60	2	3.33	0	0.00	0	0.00	2	3.33	2	3.33	4	6.67	3	5.00	29	48.33	4	6.67	1	1.67	2	3.33	2	3.33	0	0.00	1	1.67	3	5.00	5	8.33

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(108 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	775	24	3.10	34	4.39	9	1.16	6	0.77	34	4.39	32	4.13	50	6.45	88	11.35	366	47.23	25	3.23	25	3.23	8	1.03	4	0.52	4	0.52	43	5.55	23	2.97
I 期	139	14	10.07	4	2.88	5	3.60	4	2.88	19	13.67	14	10.07	9	6.47	7	5.04	25	17.99	1	0.72	18	12.95	0	0.00	2	1.44	1	0.72	9	6.47	7	5.04
II 期	150	0	0.00	11	7.33	1	0.67	1	0.67	6	4.00	8	5.33	17	11.33	23	15.33	72	48.00	0	0.00	2	1.33	1	0.67	0	0.00	0	0.00	7	4.67	1	0.67
III 期	127	0	0.00	2	1.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.57	4	3.15	13	10.24	84	66.14	6	4.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	9.45	4	3.15
IV 期	279	3	1.08	10	3.58	0	0.00	1	0.36	4	1.43	5	1.79	17	6.09	33	11.83	169	60.57	15	5.38	0	0.00	3	1.08	2	0.72	3	1.08	9	3.23	5	1.79
不詳	80	7	8.75	7	8.75	3	3.75	0	0.00	5	6.25	3	3.75	3	3.75	12	15.00	16	20.00	3	3.75	5	6.25	4	5.00	0	0.00	0	0.00	6	7.50	6	7.50

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(108 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別¹及治療方式分類

期別	分析數	手術 ²		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		紫外光化或抗生素治療等其他療法		內分泌治療或/與標靶治療		標靶治療		緩和治療 ³		未有首次治療申報紀錄 ⁴		其他治療 ⁵	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1798	44	2.45	64	3.56	14	0.78	16	0.89	63	3.50	34	1.89	114	6.34	230	12.79	887	49.33	13	0.72	31	1.72	52	2.89	22	1.22	72	4.00	94	5.23	48	2.67
I 期	273	17	6.23	11	4.03	8	2.93	5	1.83	22	8.06	12	4.40	24	8.79	18	6.59	78	28.57	1	0.37	22	8.06	6	2.20	4	1.47	5	1.83	27	9.89	13	4.76
II 期	316	6	1.90	14	4.43	2	0.63	1	0.32	16	5.06	11	3.48	27	8.54	36	11.39	165	52.22	1	0.32	2	0.63	6	1.90	1	0.32	5	1.58	15	4.75	8	2.53
III 期	313	0	0.00	8	2.56	1	0.32	1	0.32	2	0.64	3	0.96	14	4.47	42	13.42	196	62.62	3	0.96	1	0.32	10	3.19	3	0.96	11	3.51	13	4.15	5	1.60
IV 期	701	6	0.86	22	3.14	0	0.00	1	0.14	9	1.28	5	0.71	32	4.56	100	14.27	401	57.20	8	1.14	4	0.57	24	3.42	11	1.57	28	3.99	35	4.99	15	2.14
不詳	195	15	7.69	9	4.62	3	1.54	8	4.10	14	7.18	3	1.54	17	8.72	34	17.44	47	24.10	0	0.00	2	1.03	6	3.08	3	1.54	23	11.79	4	2.05	7	3.59

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(108 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未有首次治療申報紀錄」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。