

施打HPV疫苗 守護健康 保護自己



守護健康

衛生福利部 國民健康署 廣告

國民健康署運用菸品健康福利捐支應

107年5月

什麼是HPV?




人類乳突病毒(Human Papillomavirus, 簡稱HPV)是一種DNA病毒，分為低危險型與高危險型，是重要的性接觸傳染病原。

HPV第16、18型是最常見的高危險型，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的。

誰會感染HPV

HPV感染者一般沒有明顯症狀，通常9成的HPV感染會在1年內消失。若HPV感染超過1年不消失就稱為持續性感染，女性未來罹患子宮頸癌的機會較高。

目前研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有**5-8成**的機會感染到HPV。女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV的感染風險。



HPV疫苗種類有哪些呢？



目前我國食品藥物管理署已核准3種HPV疫苗上市，分別為「保蓓(Cervarix)」及「嘉喜(Gardasil)」與「嘉喜9(Gardasil 9)」。

3種HPV疫苗均可預防第16、18型HPV病毒感染引起之子宮頸癌，疫苗上市前均經過嚴謹的安全性試驗評估，顯示HPV疫苗是安全且有效的。

誰可以打HPV疫苗

適用對象	保蓓(二價) Cervarix		嘉喜(四價) Gardasil		嘉喜9(九價) Gardasil 9	
適用對象	9-14歲； 女性	15歲以上； 女性	9-13歲； 女性	14-45歲女性 9-26歲男性	9-14歲； 男女性	15-45歲； 男女性
接種劑數	2劑	3劑	2劑	3劑	2劑	3劑

世界衛生組織建議對9-14歲女生性行為尚未活躍且未曾感染人類乳突病毒接種較有效益，所以國民健康署推動以國中女生為對象的接種服務。

接種疫苗注意事項跟副作用

1.

- 接種前如有以下情形者，應告知醫師並請醫師評估：懷孕或準備懷孕者不宜接種、本身有特殊疾病者、藥物和食物過敏史、免疫功能異常、出血性問題、任何身體不適如發燒、感染。


懷孕者



藥物/食物過敏者




身體不適



免疫功能異常



特別注意：



30分鐘



2.

接種HPV疫苗可能發生的常見不良反應為注射部位疼痛、局部腫脹、發癢、輕微發燒、頭痛、頭暈等，大多數屬輕微至中等程度且為時甚短。

3.

接種後應原地休息30分鐘，沒有任何不良反應再離開，如果之後有任何不舒服的情形都請通知學校校護、醫療院所或衛生所等原接種單位。

預防子宮頸癌的方法

安全
性行為

接種
HPV疫苗

子宮頸
抹片

持續感染人類乳突病毒(HPV)是發生子宮頸癌的主因，預防子宮頸癌的方法，除了可經由全程安全性行為、子宮頸抹片篩檢外，接種HPV疫苗是最佳選擇之一。

相關資訊請上國民健康署官網<https://www.hpa.gov.tw>

