中華民國 107 年

癌症登記報告

CANCER REGISTRY ANNUAL REPORT, 2018

TAIWAN



衛 生 福 利 部 國 民 健 康 署
編 印

中華民國 109 年 12 月出版

HEALTH PROMOTION ADMINISTRATION
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE
TAIWAN
DECEMBER 2020

經費由國民健康署菸品健康福利捐支應

目　　錄

民國 107 年長短表癌症登記工作 xi
前　言 xiii
癌症登記資料處理流程圖 xvi
癌症登記資料偵測流程圖 xvii
參與癌症登記醫院名單 xxiii
癌症登記小組諮詢委員名單 xxv

壹、民國 107 年癌症別發生率統計
一、民國 107 年侵襲癌發生率及死亡率 1
全癌症 2
台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 3
口腔、口咽及下咽（ICD-O-3　C00 - C14（主唾液腺 C07 - C08，鼻咽 C11 除外）） 6
口腔（ICD-O-3　C00 - C06） 8
唇（ICD-O-3　C00（唇的皮膚 C44.0 除外）） 10
舌（ICD-O-3　C01 - C02） 11
齒齦（ICD-O-3　C03） 12
口底（ICD-O-3　C04） 13
口腔之其他及未詳細說明部位（ICD-O-3　C05 - C06） 14
口咽（ICD-O-3　C09 - C10） 15
下咽（ICD-O-3　C12 - C13） 16
咽和唇、口腔及咽之分界不明部位（ICD-O-3　C14） 17
口腔（ICD-O-3　分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.） 18
口咽（ICD-O-3　分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.） 20
下咽（ICD-O-3　分類依據請參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.） 22
主唾液腺（ICD-O-3　C07 - C08） 24
鼻咽（ICD-O-3　C11） 26
消化器官及腹膜（ICD-O-3　C15 - C26，C48）
食道（ICD-O-3　C15） 28
胃（ICD-O-3　C16） 30
小腸（ICD-O-3　C17） 32

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門（ICD-O-3　C18 - C21）..... 34
結腸（ICD-O-3　C18）..... 36
直腸、乙狀結腸連結部及肛門（ICD-O-3　C19 - C21）..... 38
肝及肝內膽管（ICD-O-3　C22）..... 40
膽囊及肝外膽管（ICD-O-3　C23 - C24）..... 42
胰（ICD-O-3　C25）..... 44
後腹膜腔及腹膜（ICD-O-3　C48）..... 46
消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位（ICD-O-3　C26）..... 48
呼吸系統及胸腔內器官（ICD-O-3　C30 - C39）
鼻腔、副竇、中耳及內耳（ICD-O-3　C30 - C31）..... 50
喉（ICD-O-3　C32）..... 52
肺、支氣管及氣管（ICD-O-3　C33 - C34）..... 54
胸膜（ICD-O-3　C38.4）..... 56
胸腺、心臟及縱膈（ICD-O-3　C37 - C38.3，C38.8）..... 58
骨、關節及關節軟骨（ICD-O-3　C40 - C41）..... 60
結締組織、軟組織及其他皮下組織（ICD-O-3　C47，C49）..... 62
皮膚（ICD-O-3　C44）..... 64
皮膚，惡性黑色素瘤（ICD-O-3　C44　M-87203 - M-87903）..... 66
皮膚，非惡性黑色素瘤（ICD-O-3　C44　M-87203 - M-87903 除外）..... 68
乳房（ICD-O-3　C50）..... 70
女性生殖器官（ICD-O-3　C51 - C58）
子宮頸（ICD-O-3　C53）..... 72
子宮體（ICD-O-3　C54）..... 74
卵巢、輸卵管及寬韌帶（ICD-O-3　C56，C57.0 - C57.4）..... 76
陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官（ICD-O-3　C51 - C52，C57.7 - C57.9）..... 78
男性生殖器官（ICD-O-3　C60 - C63）
攝護腺（ICD-O-3　C61）..... 80
睪丸（ICD-O-3　C62）..... 82
陰莖及其他男性生殖器官（ICD-O-3　C60，C63）..... 84
泌尿器官（ICD-O-3　C64 - C68）

膀胱（ICD-O-3　C67）.....86
腎（ICD-O-3　C64）.....88
腎盂及其他泌尿系統（ICD-O-3　C65 - C66，C68）.....90
眼及淚腺（ICD-O-3　C69）.....92
中樞神經系統（ICD-O-3　C70 - C72）
腦（ICD-O-3　C71）.....94
腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位（ICD-O-3　C70，C72）.....96
甲狀腺（ICD-O-3　C73）.....98
其他內分泌腺（ICD-O-3　C74 - C75）.....100
不明原發部位（ICD-O-3　C80）.....102
白血病（ICD-O-3　M-980 - M-999，詳細範圍請見附錄五）.....104
急性淋巴性白血病.....106
慢性淋巴性白血病.....108
急性骨髓性白血病.....110
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性.....112
惡性淋巴瘤（ICD-O-3　M-959 - M-976，詳細範圍請見附錄五)
淋巴結惡性淋巴瘤（ICD-O-3　C77　M-95903 - M-97643）.....114
淋巴結外惡性淋巴瘤（ICD-O-3　C00 -C80　（C77 除外)　M-95903 - M-97643）.....116
惡性淋巴瘤申報發生人數按原發部位及細胞形態分類表.....118
何杰金氏淋巴瘤.....120
非何杰金氏淋巴瘤.....122
漿細胞瘤.....124

二、民國 107 年原位癌發生率.....127
台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年.....128
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌（ICD-O-3　C18 - C21）.....132
肺、支氣管及氣管，原位癌（ICD-O-3　C33 - C34）.....134
乳房，原位癌（ICD-O-3　C50）.....136
子宮頸，原位癌（ICD-O-3　C53）.....138
膀胱，原位癌（ICD-O-3　C67）.....140

三、民國 107 年癌症申報發生人數分類統計表 143
表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類 144
表一之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類【依據 WHO 2017 年的分類】 158
表二之一　台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口） 168
表二之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類】 178
表三　台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類 188
表四之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類 252
表四之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類 260
表五之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類 264
表五之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類 272
表六　台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類 276
表七　台灣癌症申報發生人數按癌症形態、性別及年齡分類 280
表八　台灣癌症申報發生人數按原發部位及分化程度分類 404
表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類 412
表十　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 80 至 107 年 476
附錄一　ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準 488
附錄二　衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表) 492
附錄三　台灣人口年齡組成圖，民國 107 年 494
附錄四　1976 年、2000 年世界標準人口 495
附錄五　WHO 2017 血液腫瘤分類表 496
附錄六　107 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布 497
附錄七　Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版分類標準 498

民國 107 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

前　言 xxxiii
長表資料處理流程 xxxviii
民國 107 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程 xlvi
貳、癌症期別分類統計表 501
口腔癌 502
表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 502
表一之二 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類 504
表一之三 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 504
表一之四 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 505
表一之五 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 505
口咽癌 508
表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 508
表二之二 口咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 510
表二之三 口咽癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類 512
表二之四 口咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 513
表二之五 口咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 514
表二之六 口咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 515
表二之七 口咽癌(P16-)發生人數按整併期別及治療方式分類 516
表二之八 口咽癌(P16-) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 517
表二之九 口咽癌(P16-) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 518
表二之十 口咽癌(P16-) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 519
下咽癌 522
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 522
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類 524
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 524
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 525
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 525
喉癌 528
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 528
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類 530

表四之三 喉癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 530
表四之四 喉癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 531
表四之五 喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 531
主唾液腺癌 534
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 534
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類 536
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 536
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 537
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 537
鼻咽癌 540
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 540
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類 542
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 542
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 543
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 543
食道癌 546
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 546
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類 548
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 548
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 549
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 549
胃癌 552
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 552
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類 554
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 555
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 556
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 557
結腸癌 560
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 560
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類 562
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 563

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 564
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 565
直腸癌 568
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 568
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類 570
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 571
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 572
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 573
肝癌 576
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 576
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 578
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類 580
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 580
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 582
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 582
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類 584
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類 586
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 586
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 587
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 587
肺癌 590
表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 590
表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 592
表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類 594
表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 594

表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 596
表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 596
表十二之七 小細胞肺癌發生人數按肺小細胞癌的分期系統及治療方式分類 598
表十二之八 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類 598
乳癌 600
表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 600
表十三之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類 602
表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 602
表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 605
表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 605
表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 608
子宮頸癌 614
表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 614
表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 616
表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 617
表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 618
表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 619
表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 620
表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類 621
表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 621
表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 622
表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 622
表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 623
子宮體癌 626
表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 626
表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類 628
表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 628
表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 629
表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 629

表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 630
卵巢癌 634
表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 634
表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類 636
表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 636
表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 637
表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 637
表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 638
攝護腺癌 642
表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 642
表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類 644
表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 644
表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 646
表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 646
膀胱癌 650
表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 650
表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別之治療方式分類 652
表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 652
表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 654
表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 654
惡性淋巴瘤 658
表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 658
表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 660
表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 661
表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 662
表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 663

民國 107 年

長短表癌症登記工作

前　言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首，每年奪走 4 萬多人的生命，不但影響病患和家人之生活品質，也造成龐大的工作人年損失和醫療費用支出。如何有效防治癌症，是台灣當前重要的醫療照護與公共衛生課題之一。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。民國 92 年 5 月公布之癌症防治法規定，癌症防治醫療機構應提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。

為了使我國的癌症監測工作更有系統，衛生福利部自民國 68 年起建立以 50 床以上的醫院為申報單位之新發癌症登記申報系統，並設立癌症登記委員會訂定新發癌症個案登記作業標準；台灣癌症登記系統之資料蒐集與處理作業可分 2 個階段：第 1 階段由申報醫院對其院內診斷或治療之新發癌症個案，進行個案確定與資料蒐集，申報醫院依據癌症登記委員會設計之標準化格式與代碼進行資料登錄或轉錄，以書面、媒體或線上登錄方式申報至癌症登記中心；第 2 階段由癌症登記中心進行新發癌症資料之整理、分析、檔案製作與年報之編撰。本年報資料係以截至民國 109 年 3 月 3 日止，200 家 50 床以上申報醫院所申報之民國 107 年間新發診斷為**侵襲癌**與**原位癌**的個案進行分析。茲說明申報個案條件、新發個案資料蒐集與處理、發生率計算、申報資料品質指標，及癌症登記年報圖表之製作與編排於后：

一、申報個案條件

凡具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年至民國 90 年之新發癌症診斷個案之腫瘤學分類，係採 ICD-O, Field Trial Edition（ICD-O-FT），自民國 91 年 1 月 1 日起之新發診斷癌症個案，申報分類標準採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3），該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼，因此本報告中除列出所有個案組織形態個案數分布外，也增列經顯微鏡檢證實之組織形態個案數分布。多重原發性腫瘤部分，癌登申報自民國 96 年後新診斷個案均採用 SEER ”Multiple Primary and Histology Coding Rule” 規則進行多發癌症判斷與申報。本報告資料處理與分析係參照國際癌症研究總署（International Agency

for Research on Cancer, IARC）之多重原發性腫瘤分類標準（附錄一），進行歸類與計算，此與 IARC 發表之五大洲癌症發生率採用相同標準，以便於國際比較使用。

二、新發個案資料蒐集與處理

(一) 申報時程與方式

為縮短癌症登記申報作業時程與邏輯偵測回覆即時性，國民健康署與癌症登記中心建置「線上邏輯偵測與申報作業」且於民國 99 年 8 月正式上線。故所有癌登醫院需將申報資料依標準化格式以線上申報方式或轉錄儲存於電子媒體中，按季申報（每年 3、6、9、12 月）給癌症登記中心進行資料彙整與處理。所有資料申報最遲須於新發個案確定診斷後 **12 個月內**進行。

於民國 91 年以前，癌症登記資料庫僅收錄**短表 20 欄位**之癌症診療相關資料。自民國 91 年起，開始著手**長表 65 欄位**癌症資料收集工作，且僅**口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌**等 6 種癌症納入長表申報作業。後續於民國 95 年依照診療資料詳細程度區分之**長表及短表**資料庫申報內容進行改版，則各癌登醫院自民國 96 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案應全部改採**「96 年版」**癌症登記項目申報；此階段長表申報項目為 **95 欄位**，短表申報項目則為 **33 欄位**；其中僅申報短表醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫，原自民國 91 年起陸續參與長表申報醫院，則依 95 欄位長表內容申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等 6 種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫。另自民國 97 年新增**食道癌、胃癌、攝護腺癌**及**膀胱癌**；再於民國 98 年起，新增**主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌**與**血液腫瘤**等至長表申報範圍；民國 102 年再加入**喉癌**共 16 種癌症收錄長表資料。因參與長表申報醫院之 16 種主要癌症，僅需申報長表格式，無需再將同一個案申報至短表資料庫。

於民國 99 年，為因應癌症診療實務與品質提升需要，且考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表資料庫內，故規劃及研擬符合我國收錄前述 15 種癌症部位特定因子（Site-Specific Factors，簡稱 SSF）之摘錄內容，其收錄分類包括：(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記（例如：結直腸癌之 CEA）、(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標（例如：乳癌之 HER2）、(3)治療效果評估、(4)決定存活之極重要的治療副作用（例如：血癌之 GVHD）、(5)影響預後的手術病理特徵（例如：結直腸癌之 Perineural invasion）等。此外，同時基於公共衛生的考量，亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數（BMI）等危險因

子收錄於「**100 年版**」癌症登記摘錄手冊；故自民國 100 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 100 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 114 欄位，短表申報項目新增為 42 欄位。

為因應 AJCC 第八版癌症分期手冊應用於民國 107 年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100 年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107 年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國 107 年 1 月 1 日起新診斷的癌症個案全面採用 107 年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至 115 欄位，短表新增為 45 欄位。

(二) 申報資料內容

衛生福利部訂定之結構式新發癌症個案摘錄表（附錄二）內容包含：

1 申報機構：包括醫療機構名稱、代碼。

2 患者資料：包括病歷號碼、姓名、身分證字號、性別、出生年月日、戶籍地代碼。

3 癌症確認：包括診斷年齡、癌症發生順序號碼、個案分類、首次就診日期、最初診斷日期、原發部位、側性、組織形態、性態碼、分級/分化、癌症診斷方式和首次顯微鏡檢證實日期。

4 最初診斷期別：包括臨床/病理 TNM stage。（僅長表收錄）

5 首次療程：包括申報醫院首次療程中各項治療及治療開始日期。（民國 99 年以前「標靶藥物」皆歸類在「化學治療」項目下進行申報與年報分析。自民國 100 年起，因新增標靶藥物治療項目，故「標靶治療」將獨立分析與呈現。民國 107 年起，新增「其他治療」項目與臨床試驗化學治療、臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療、臨床試驗免疫治療、臨床試驗標靶治療選項）

6 結果：包括首次復發型式與復發日期、生存狀態、死亡日期。（僅長表收錄）


7 危險因子：包括身高、體重、吸菸行為、嚼檳榔行為及喝酒行為。（民國 100 年起新增收錄項目，民國 107 年起長表新增「首次治療前生活功能狀態評估」項目）

8 部位特定因子（SSF）：依各癌別不同，包括結直腸癌之 CEA 與 Perineural invasion、乳癌之 HER2、血癌之 GVHD 等。（民國 100 年起長表新增收錄項目）


(三) 資料處理流程及偵測標準

癌症登記中心於收到資料後之處理及偵測流程如下圖：

癌症登記資料處理流程圖



癌症登記資料偵測流程圖



(四) 年報資料處理

癌症登記中心須將長表資料先截取短表資訊後（不包括癌症部位特定因子內容），再進行全國癌症登記年報之資料處理與分析。故本年報第一部分之「民國 107 年癌症發生率統計」（第 1-498 頁）包含長短表資料共同分析；而第二部分之「民國 107 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計」（第 499-663 頁）僅分析長表資料內容。

截至民國 109 年 3 月 3 日止，癌症登記中心共收到民國 107 年新發診斷之侵襲癌 149,973 例，原位癌 15,886 例，經身分證字號、姓名、罹癌部位、與組織形態比對，剔除重複申報病例及不符申報定義的個案後，共有 116,131 例侵襲癌個案，其中男性 61,779 例、女性 54,352 例。

依 ICD-O-3 多重原發性腫瘤分類標準（附錄一）進行分析之民國 107 年年報，合併歸類後減少 36,138 筆，其癌症個案數差異整理如下：

癌症發生醫院申報個案合併歸類前後分布

項目	侵襲癌與原位癌		侵襲癌	
107 年癌症發生醫院申報數	**165,859**		**149,973**	
重複個案合併方式	**重複個案數**	**合併後個案數**	**重複個案數**	**合併後個案數**
同一個案癌症部位相同且組織形態同組者	**20,306**	**145,553**	**19,597**	**130,376**
同一個案組織形態有 Lymphoma 或 Leukemia 或 Kaposi Sarcoma 經檢查為重複者	**757**	**144,796**	**757**	**129,619**
同一個案癌症部位代碼前三碼相同且資料為三筆以上者	**13,321**	**131,475**	**11,923**	**117,696**
多重部位原發個案合併歸類者	**1,469**	**130,006**	**1,281**	**116,415**
同一個案之癌症部位其一為「不明原發部位」	**285**	**129,721**	**284**	**116,131**
107 年癌症發生個案數	**129,721**		**116,131**	
重複個案處理前後差異數（%）	**36,138（21.79%）**		**33,842（22.57%）**	

三、發生率計算與個案數變化

本報告發生率係以台灣之人口為分母，新發報告個案為分子計算。人口數係依據內政部所提供之民國 107 年性別、年齡別人口數之電子檔計算所得。全癌

症之侵襲癌粗發生率為每 10 萬人口 492.31，其中男性為 527.44，女性為 457.66。為便於與不同人口結構族群比較，本年報分別以 1976 年及 2000 年世界標準人口計算年齡標準化發生率，以 2000 年世界人口計算之全癌症之侵襲癌年齡標準化發生率是每 10 萬人口 309.84，其中男性為 341.30、女性為 284.66。各癌症之性別、年齡別發生數與發生率，及年齡標準化發生率均列於報告內。

民國 107 年全癌症個案數為 116,131 人，較 106 年的 111,684 人增加 4,447 人，增加率為 3.98%。增加數如下表：

107 年癌症個案數增加最多前 5 名

癌症部位	發生數		增加數	增加百分比*
	106 年	107 年		
1.肺、支氣管及氣管	14,282	15,345	1,063	7.44%
2.攝護腺(前列腺)	5,866	6,644	778	13.26%
3.甲狀腺	4,053	4,445	392	9.67%
4.口腔、口咽、及下咽	7,797	8,170	373	4.78%
5.胰	2,469	2,750	281	11.38%

*增加百分比=（當年發生數 – 前一年發生數）÷ 前一年發生數 ×100%

四、申報資料品質指標

自癌症個案診斷年民國 88 年起，癌症登記中心於每年將各醫院申報個案資料，與全國死亡檔的資料比對，扣除已申報個案後，將未申報個案名單提供申報醫院進行個案申報條件之確認，以促進該院申報個案之完整，並縮短申報時程；之後診斷年民國 91 年的個案開始，比對的資料檔加入全民健康保險重大傷病檔中診斷為癌症的個案，以及台灣子宮頸癌篩檢報告檔中的子宮頸細胞抹片檔確診為高度病變以上個案；診斷年民國 93 年開始加入子宮頸切片檔確診為高度病變以上個案；民國 94 年起則加入衛生福利部大腸癌、乳癌、口腔癌篩檢計畫診斷為癌症的個案；上述重大傷病檔、死亡檔、大腸癌、乳癌、口腔癌與子宮頸癌篩檢檔作為追蹤的可能癌症個案資料來源。

此外，資料品質的指標主要是用以評估登記系統的完整性及效度，IARC 係以僅有死亡診斷的個案百分比（Percentage of Death Certificate Only Cases, DCO%）作為完整性的指標、以及經形態學證實的個案百分比（Percentage of Morphologically Verified Cases, MV%）作為效度的指標。為使指標具可比較性，本年報也依據 IARC 慣例以 DCO%及 MV%作為申報資料品質指標。

(一) 申報之完整性與縮短年報誤差

藉由每年例行的癌症個案申報提醒、催收程序，合併各可能癌症個案資料來源、與癌症登記申報資料庫，計算各年癌症登記申報完整性從 90 年的 91.28%，提升至 107 年約 98.24%，顯示依據各癌症資料來源進行醫院催收作業，對癌症登記申報的完整性實有相當助益。另資料申報時程由民國 93 年之前的 23 個月，近年來已縮短為 14 個月。

(二) 僅有死亡診斷的個案百分比（DCO%）

僅有死亡登記的個案是指死亡登記中記載在當年死於癌症，但從未經由任何途徑申報到登記系統的個案，這些個案的資料及診斷僅依據死亡證明書上的紀錄，資料較不周延，亦無經過進一步的鑑定，若此等個案的比例太高，即表示登記系統覆蓋面不夠完整，而且系統中的資料品質較參差不齊。經由資料檔案比對催收的結果，DCO%由診斷年民國 87 年的 8.84%降至民國 107 年的 0.79%。另民國 105-107 年之重要癌症 DCO%如下表所示：

民國 105-107 年重要癌症僅有死亡診斷的個案百分比分布

癌症部位	民國 105 年*			民國 106 年*			民國 107 年		
	癌症	DCO		癌症	DCO		癌症	DCO	
	個案數	個案數	百分比**	個案數	個案數	百分比**	個案數	個案數	百分比**
女性乳房	15,302	24	0.16%	17,000	41	0.24%	17,073	34	0.20%
結腸及直腸	19,775	92	0.46%	21,356	92	0.43%	21,174	94	0.44%
肝及肝內膽管	11,534	246	2.09%	11,634	195	1.65%	11,360	204	1.76%
肺、支氣管及氣管	14,322	220	1.51%	15,320	202	1.30%	16,071	228	1.40%
攝護腺	5,509	36	0.65%	6,110	26	0.42%	6,681	38	0.57%
口腔，口咽及下咽	8,153	17	0.21%	8,189	15	0.18%	8,422	23	0.27%
胃	3,981	42	1.04%	4,081	48	1.16%	4,082	32	0.78%
子宮頸	4,313	12	0.28%	4,355	5	0.11%	4,323	5	0.12%
皮膚	4,243	6	0.14%	4,437	5	0.11%	4,621	3	0.06%
子宮體	2,575	1	0.04%	2,863	3	0.10%	2,934	1	0.03%
全癌症	120,520	1,051	0.86%	127,825	977	0.76%	129,723	1,027	0.79%

* 民國 105、106 年的數據為 109 年 8 月增修資料後之結果

** DCO%=DCO 個案數÷（DCO 個案數＋癌症個案數）×100%

(三) 經形態學證實的個案百分比（MV%）

經形態學證實的個案意指經由組織學、細胞學、血液學等顯微鏡檢證實為癌

症的個案。一般而言，MV%高表示癌症個案診斷的正確性較高。MV%高低依不同腫瘤差異甚大，除少數腫瘤（如：肝、腦幹…等）外，MV%應以高值較佳。民國 107 年全癌症個案之 MV%為 92.84%，男性為 91.51%，女性為 94.35%。

五、癌症登記年報圖表之製作與編排

本報告各部位分類原則係參照 IARC 發表之五大洲癌症發生率標準。民國 91 年之前的癌症登記報告，除子宮頸癌依侵襲癌、原位癌分列外，其餘癌症係將原位癌與侵襲癌個案資料合併分析，製作圖表。自民國 92 年起，癌症登記報告則將所有癌症個案依「侵襲癌」、「原位癌」分別進行處理與分析，報告內容僅以「侵襲癌」資料進行圖表製作，原位癌部分則列出子宮頸、乳房、結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門、膀胱和肺的資料供參考。

民國 96 年癌症登記報告開始，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。民國 97 年起，癌症登記報告新增修三個部份：第一部份為新增口腔癌參考 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd 版所修訂的口腔、口咽、下咽分類，以符合臨床醫師判斷的參考價值；第二部份為新增血液腫瘤依據 WHO 2008 年分類編修，將血液腫瘤採新、舊分類併呈；第三部份是將『長短表癌症發生率統計』與『長表申報十六種癌症期別與治療方式分析』合訂為一冊，內容除癌症發生率統計外，還增加主要癌症期別與治療分佈之統計分析資料。

民國 99 年至 105 年癌症登記報告，血液腫瘤僅採「WHO 2008 年分類標準暨 2010 年台灣編修版」呈現，民國 106 年癌症登記報告起，血液腫瘤採「WHO 2017 年分類標準暨 2018 年台灣編修版」新分類呈現，請見附錄五。民國 100 年起，因應五都改制，本年報表三「台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類」由原 25 縣市改為 22 縣市呈現。

自民國 101 年癌症登記報告開始，表七組織形態係依據 WHO (World Health Organization Classification of Tumours) 各癌別分類原則進行分組，個案數較少的組織形態將依以下原則合併：對上皮癌為主的癌症部位，「其他特定上皮癌」為特定的 carcinoma，未能歸在表格內已列出之 carcinoma 主要分組中，將合併在此分類；「非特定上皮癌」為 carcinoma, NOS，無法歸類至 carcinoma 任一組；「其他惡性腫瘤」包含 Neoplasm, malignant，以及少數不可歸於任一分組者。對惡性肉瘤為主的癌症部位，「其他惡性肉瘤」包含其他特定惡性肉瘤（Other specified sarcoma）及非特定惡性肉瘤（Sarcoma, NOS）；「其他惡性腫瘤」包含 Neoplasm, malignant 及少數非惡性肉瘤。

因為癌症登記資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或歷年延遲申報的個

案，每年製作年報時將重新統計，請見本年報表十，其中民國 92 年至 93 年新發個案報告數年度變化率增加幅度較大，可能係因 92 年 SARS 流行影響個案就醫所致。

六、存活率分析

存活率資料可參考癌症登記中心網站：

http://tcr.cph.ntu.edu.tw/main.php?Page=A5B3

七、長表申報 16 種癌症特定因子(SSF)分佈統計表

長表申報 16 種癌症特定因子(SSF)分佈統計資料可參考癌症登記中心網站:

http://tcr.cph.ntu.edu.tw/main.php?Page=A5#t02

參與癌症登記醫院名單

1. 國立臺灣大學醫學院附設醫院
2. 臺北榮民總醫院
3. 三軍總醫院附設民眾診療服務處
4. 臺北市立聯合醫院中興院區
5. 臺北市立聯合醫院仁愛院區
6. 臺北市立聯合醫院和平院區
7. 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院
8. 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院
9. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
10. 臺北醫學大學附設醫院
11. 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
12. 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
13. 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院
14. 中山醫療社團法人中山醫院
15. 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處
16. 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院
17. 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院
18. 博仁綜合醫院
19. 臺北市立聯合醫院婦幼院區
20. 臺北市立聯合醫院陽明院區
21. 西園醫療社團法人西園醫院
22. 臺北市立聯合醫院忠孝院區
23. 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
24. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
25. 振興醫療財團法人振興醫院
26. 臺北市立萬芳醫院
27. 衛生福利部胸腔病院
28. 康寧醫療財團法人康寧醫院
29. 臺北市立關渡醫院
30. 中國醫藥大學附設醫院臺北分院
31. 衛生福利部基隆醫院
32. 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會台灣礦工醫院
33. 三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處
34. 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
35. 衛生福利部臺北醫院
36. 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院
37. 板橋中興醫院
38. 新北市立聯合醫院
39. 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
40. 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院
41. 祐民醫院
42. 宏仁醫院
43. 板橋國泰醫院
44. 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
45. 新泰綜合醫院
46. 仁愛醫院
47. 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
48. 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院
49. 衛生福利部雙和醫院
50. 天主教輔仁大學附設醫院
51. 國立陽明大學附設醫院
52. 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院
53. 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院
54. 臺北榮民總醫院蘇澳分院
55. 財團法人蘭陽仁愛醫院
56. 臺北榮民總醫院員山分院
57. 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
58. 臺北榮民總醫院新竹分院
59. 南門綜合醫院
60. 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處
61. 東元醫療社團法人東元綜合醫院
62. 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院
63. 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院
64. 新仁醫院
65. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院
66. 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院
67. 中國醫藥大學新竹附設醫院
68. 新國民醫療社團法人新國民醫院
69. 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院
70. 衛生福利部桃園醫院
71. 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處
72. 敏盛綜合醫院
73. 龍潭敏盛醫院
74. 天成醫院
75. 臺北榮民總醫院桃園分院
76. 聯新國際醫院
77. 怡仁綜合醫院
78. 天成醫療社團法人天晟醫院
79. 衛生福利部桃園醫院新屋分院
80. 重光醫院
81. 衛生福利部苗栗醫院
82. 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院
83. 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院
84. 大千綜合醫院
85. 協和醫院
86. 梓榮醫療社團法人弘大醫院
87. 衛生福利部臺中醫院
88. 中山醫學大學附設醫院
89. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處
90. 澄清綜合醫院
91. 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院
92. 臺中榮民總醫院
93. 中國醫藥大學附設醫院
94. 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院
95. 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院
96. 澄清綜合醫院中港分院
97. 林新醫療社團法人林新醫院
98. 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院
99. 光田醫療社團法人光田綜合醫院
100. 童綜合醫療社團法人童綜合醫院

參與癌症登記醫院名單

101. 衛生福利部豐原醫院
102. 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
103. 清泉醫院
104. 賢德醫院
105. 中國醫藥大學附設醫院豐原分院
106. 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
107. 亞洲大學附屬醫院
108. 衛生福利部彰化醫院
109. 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
110. 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
111. 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院
112. 員榮醫療社團法人員榮醫院
113. 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院
114. 員林何醫院
115. 員生醫院
116. 惠來醫療社團法人宏仁醫院
117. 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院
118. 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院
119. 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院
120. 衛生福利部南投醫院
121. 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院
122. 臺中榮民總醫院埔里分院
123. 佑民醫療社團法人佑民醫院
124. 竹山秀傳醫院
125. 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院
126. 衛生福利部嘉義醫院
127. 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
128. 臺中榮民總醫院嘉義分院
129. 衛生福利部朴子醫院
130. 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
131. 臺中榮民總醫院灣橋分院
132. 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院
133. 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
134. 陽明醫院
135. 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
136. 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
137. 中國醫藥大學北港附設醫院
138. 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院
139. 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院
140. 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院
141. 衛生福利部臺南醫院
142. 奇美醫療財團法人奇美醫院
143. 郭綜合醫院
144. 國立成功大學醫學院附設醫院
145. 台南市立醫院
146. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院
147. 臺南市立安南醫院
148. 衛生福利部新營醫院
149. 高雄榮民總醫院臺南分院
150. 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
151. 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院
152. 衛生福利部臺南醫院新化分院
153. 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
154. 高雄市立民生醫院
155. 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
156. 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處
157. 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院
158. 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院
159. 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處
160. 高雄市立聯合醫院
161. 高雄榮民總醫院
162. 祐生醫院
163. 健仁醫院
164. 健新醫院
165. 高雄市立小港醫院
166. 高雄市立大同醫院
167. 義大醫療財團法人義大大昌醫院
168. 衛生福利部旗山醫院
169. 高雄市立鳳山醫院
170. 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處
171. 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
172. 高雄市立岡山醫院
173. 建佑醫院
174. 劉光雄醫院
175. 義大醫療財團法人義大醫院
176. 義大醫療財團法人義大癌治療醫院
177. 衛生福利部澎湖醫院
178. 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處
179. 衛生福利部屏東醫院
180. 輔英科技大學附設醫院
181. 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
182. 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處
183. 民眾醫院
184. 南門醫療社團法人南門醫院
185. 高雄榮民總醫院屏東分院
186. 安泰醫療社團法人安泰醫院
187. 寶建醫療社團法人寶建醫院
188. 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院
189. 枋寮醫療社團法人枋寮醫院
190. 衛生福利部臺東醫院
191. 東基醫療財團法人台東基督教醫院
192. 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院
193. 臺北榮民總醫院臺東分院
194. 衛生福利部花蓮醫院
195. 臺北榮民總醫院玉里分院
196. 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
197. 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處
198. 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
199. 衛生福利部金門醫院

癌症登記小組諮詢委員名單

朱旆億
秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院病理科主任

李文宗
臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授

李偉華
衛生福利部雙和醫院病理科教授兼專任主任級主治醫師

李興中
新竹國泰綜合醫院院長

林成俊
長庚紀念醫院林口總院胃腸肝膽科系副教授

林秀玲
臺灣大學醫學院附設醫院癌症防治中心專員

邱昭華
台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任

侯明鋒
高雄醫學大學附設中和紀念醫院教授

柯政郁
臺灣大學醫學院附設醫院耳鼻喉科暨耳鼻喉部主任

洪志宏
長庚紀念醫院林口總院副院長

張廷彰
長庚紀念醫院林口總院婦產部教授

張獻崑
長庚紀念醫院林口總院腫瘤科主治醫師

陳健弘
臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院副院長

癌症登記小組諮詢委員名單

游山林
輔仁大學醫學院醫學系助理教授

黃經民
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院放射腫瘤科主任

蒲永孝
臺灣大學醫學院泌尿科教授

鄭永銘
臺灣大學醫學院附設醫院病理部主任

鄭安理
臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院腫瘤內科部教授

鄭鴻鈞
和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任

賴美淑
臺灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所名譽教授

（依姓名筆劃順序排序）

壹、民國 107 年

癌症別發生率統計

一、民國 107 年

侵襲癌發生率及死亡率

全癌症


自民國 71 年起，癌症即成為台灣 10 大死因之首。民國 107 年台灣共有 48,784 人死於惡性腫瘤，占所有死亡人數的 28.22%，每 10 萬人口粗死亡率為 206.81，每 10 萬人口年齡標準化死亡率 [3] 為 120.11。同年，初次診斷為癌症的人數共有 116,131 人，每 10 萬人口粗發生率為 492.31，每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3] 為 309.84。有關年齡別、性別之癌症發生率及死亡率見下圖，男、女性 10 大癌症之發生率及死亡率見下表：

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	61,779	54,352
年齡中位數	65	62
粗率(每 10 萬人口)	527.44	457.66
年齡標準化率 [2](每 10 萬人口)	304.75	257.60
年齡標準化率 [3](每 10 萬人口)	341.30	284.66
性別比(年齡標準化率 [3])	1.20	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	29,624	19,160
年齡中位數	68	71
粗率(每 10 萬人口)	252.92	161.33
年齡標準化率 [2](每 10 萬人口)	135.87	75.93
年齡標準化率 [3](每 10 萬人口)	156.59	88.02
性別比(年齡標準化率 [3])	1.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



台灣全癌症
年齡別發生率，民國107年



台灣全癌症
年齡別死亡率，民國107年

台灣 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 （以年齡標準化率 [2b] 排序）

10 大癌症（不含原位癌 [4]）發生率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數（人）	粗發生率	年齡標準化發生率 [2a]	年齡標準化發生率 [2b]
1	C50	女性乳房	14,217	119.71 [5a]	72.97 [5a]	78.86 [5a]
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,525	70.05	36.97	41.84
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	15,345	65.05	34.39	38.75
4	C61	攝護腺(前列腺)	6,644	56.72 [5b]	29.34 [5b]	34.69 [5b]
5	C22	肝及肝內膽管	11,342	48.08	25.45	28.63
6	C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽	8,170	34.63	20.87	22.45
		口腔	5,344	22.65	13.71	14.78
		口咽	1,617	6.85	4.12	4.42
		下咽	1,209	5.13	3.04	3.25
7	C54	子宮體	2,787	23.47 [5a]	14.37 [5a]	15.48 [5a]
8	C73	甲狀腺	4,445	18.84	13.15	14.27
9	C44	皮膚	4,049	17.16	8.04	9.60
10	C16	胃	3,798	16.10	8.12	9.29
	C00-C80	全癌症	116,131	492.31	278.79	309.84

10 大癌症（含原位癌 [4]）發生率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數（人）	粗發生率	年齡標準化發生率 [2a]	年齡標準化發生率 [2b]
1	C50	女性乳房	16,988	143.04 [5a]	87.86 [5a]	94.64 [5a]
	C50	女性乳房原位癌	2,771	23.33 [5a]	14.89 [5a]	15.77 [5a]
	C50	女性乳房侵襲癌	14,217	119.71 [5a]	72.97 [5a]	78.86 [5a]
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	21,130	89.58	47.87	53.73
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	4,605	19.52	10.90	11.90
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	16,525	70.05	36.97	41.84
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	16,023	67.93	36.18	40.65
		肺、支氣管及氣管原位癌	678	2.87	1.78	1.90
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	15,345	65.05	34.39	38.75
4	C61	攝護腺(前列腺)	6,679	57.02 [5b]	29.49 [5b]	34.88 [5b]
5	C22	肝及肝內膽管	11,347	48.10	25.46	28.64
6	C53	子宮頸	4,322	36.39 [5a]	24.92 [5a]	27.83 [5a]
	C53	子宮頸原位癌	2,889	24.33 [5a]	17.86 [5a]	19.98 [5a]
	C53	子宮頸侵襲癌	1,433	12.07 [5a]	7.06 [5a]	7.85 [5a]
7	C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽	8,298	35.18	21.20	22.81
		口腔	5,436	23.04	13.95	15.04
		口咽	1,634	6.93	4.16	4.46
		下咽	1,228	5.21	3.09	3.30
8	C54	子宮體	2,934	24.71 [5a]	15.27 [5a]	16.47 [5a]
9	C73	甲狀腺	4,445	18.84	13.15	14.27
10	C44	皮膚	4,510	19.12	8.94	10.70
	C00-C80	全癌症	129,721	549.92	314.02	348.54

10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數（人）	粗死亡率	年齡標準化死亡率 [2a]	年齡標準化死亡率 [2b]
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,388	39.80	19.16	22.46
2	C22	肝及肝內膽管	8,222	34.86	17.23	20.04
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	5,823	24.69	11.67	13.78
4	C50	女性乳房	2,418	20.36 [5a]	11.24 [5a]	12.34 [5a]
5	C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽	3,027	12.83	7.42	8.06
6	C61	攝護腺(前列腺)	1,377	11.76 [5b]	5.03 [5b]	6.52 [5b]
7	C25	胰	2,292	9.72	4.80	5.53
8	C16	胃	2,299	9.75	4.60	5.41
9	C15	食道	1,929	8.18	4.68	5.06
10	C53	子宮頸	653	5.50 [5a]	2.84 [5a]	3.20 [5a]
	C00-C97	全癌症	48,784	206.81	104.20	120.11

註：
1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率 [2a] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率 [2b] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. (a)每 10 萬女性人口發生率及死亡率；(b)每 10 萬男性人口發生率及死亡率。

台灣男性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 （以年齡標準化率 [2b] 排序）

男性 10 大癌症（不含原位癌 [4]）發生率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數（人）	粗發生率	年齡標準化發生率 [2a]	年齡標準化發生率 [2b]
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,512	81.21	45.27	51.17
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,424	71.92	39.31	44.88
3	C22	肝及肝內膽管	7,819	66.76	38.03	42.33
4	C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽	7,400	63.18	39.22	42.15
		口腔	4,755	40.60	25.35	27.28
		口咽	1,478	12.62	7.78	8.37
		下咽	1,167	9.96	6.09	6.51
5	C61	攝護腺(前列腺)	6,644	56.72	29.34	34.69
6	C15	食道	2,579	22.02	13.23	14.25
7	C16	胃	2,334	19.93	10.65	12.18
8	C44	皮膚	2,153	18.38	9.30	11.16
9	C91-C95	白血病	1,455	12.42	9.06	9.63
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,512	12.91	7.74	8.64
	C00-C80	全癌症	61,779	527.44	304.75	341.30

男性 10 大癌症（含原位癌 [4]）發生率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數（人）	粗發生率	年齡標準化發生率 [2a]	年齡標準化發生率 [2b]
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	12,438	106.19	59.79	66.97
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	2,926	24.98	14.53	15.80
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	9,512	81.21	45.27	51.17
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,607	73.48	40.32	45.95
		肺、支氣管及氣管原位癌	183	1.56	1.00	1.07
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	8,424	71.92	39.31	44.88
3	C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽	7,511	64.13	39.82	42.79
		口腔	4,831	41.25	25.78	27.73
		口咽	1,494	12.76	7.86	8.45
		下咽	1,186	10.13	6.18	6.61
4	C22	肝及肝內膽管	7,820	66.76	38.03	42.34
5	C61	攝護腺(前列腺)	6,679	57.02	29.49	34.88
6	C15	食道	2,726	23.27	13.99	15.06
7	C16	胃	2,397	20.46	10.93	12.50
8	C44	皮膚	2,387	20.38	10.31	12.37
9	C67	膀胱	2,363	20.17	10.63	12.32
10	C91-C95[5]	白血病	1,455	12.42	9.06	9.63
	C00-C80	全癌症	66,505	567.79	327.87	366.84

男性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數（人）	粗死亡率	年齡標準化死亡率 [2a]	年齡標準化死亡率 [2b]
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,913	50.48	25.98	30.66
2	C22	肝及肝內膽管	5,576	47.61	25.88	29.61
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	3,340	28.52	14.57	17.19
4	C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽	2,779	23.73	14.26	15.48
5	C15	食道	1,792	15.30	9.07	9.81
6	C16	胃	1,385	11.82	5.92	7.01
7	C61	攝護腺(前列腺)	1,377	11.76	5.03	6.52
8	C25	胰	1,220	10.42	5.58	6.36
9	C91-C95	白血病	636	5.43	3.43	3.82
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	697	5.95	3.21	3.75
	C00-C97	全癌症	29,624	252.92	135.87	156.59

註：
1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率 [2a] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率 [2b] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括 ICD-O-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見 p.498 附錄七。
4. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。
5. 白血病：ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

台灣女性 10 大癌症，按發生率及死亡率排序 （以年齡標準化率 [2b] 排序）

女性 10 大癌症（不含原位癌 [3]）發生率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數（人）	粗發生率	年齡標準化發生率 [2a]	年齡標準化發生率 [2b]
1	C50	女性乳房	14,217	119.71	72.97	78.86
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,921	58.28	30.26	33.69
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	7,013	59.05	29.50	33.55
4	C73	甲狀腺	3,302	27.80	19.38	21.01
5	C22	肝及肝內膽管	3,523	29.66	13.79	16.02
6	C54	子宮體	2,787	23.47	14.37	15.48
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,557	13.11	8.57	9.25
8	C44	皮膚	1,896	15.96	6.93	8.27
9	C53	子宮頸	1,433	12.07	7.06	7.85
10	C16	胃	1,464	12.33	5.88	6.76
	C00-C80	全癌症	54,352	457.66	257.60	284.66

女性 10 大癌症（含原位癌 [3]）發生率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數（人）	粗發生率	年齡標準化發生率 [2a]	年齡標準化發生率 [2b]
1	C50	女性乳房	16,988	143.04	87.86	94.64
	C50	女性乳房原位癌	2,771	23.33	14.89	15.77
	C50	女性乳房侵襲癌	14,217	119.71	72.97	78.86
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,692	73.19	37.06	41.87
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌	1,679	14.14	7.56	8.32
	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門侵襲癌	7,013	59.05	29.50	33.55
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,416	62.45	32.78	36.38
		肺、支氣管及氣管原位癌	495	4.17	2.53	2.70
		肺、支氣管及氣管侵襲癌	6,921	58.28	30.26	33.69
4	C53	子宮頸	4,322	36.39	24.92	27.83
	C53	子宮頸原位癌	2,889	24.33	17.86	19.98
	C53	子宮頸侵襲癌	1,433	12.07	7.06	7.85
5	C73	甲狀腺	3,302	27.80	19.38	21.01
6	C54	子宮體	2,934	24.71	15.27	16.47
7	C22	肝及肝內膽管	3,527	29.70	13.81	16.03
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,587	13.36	8.75	9.44
9	C44	皮膚	2,123	17.88	7.76	9.27
10	C16	胃	1,502	12.65	6.01	6.94
	C00-C80	全癌症	63,216	532.30	304.93	336.59

女性 10 大癌症死亡率（每 10 萬人口），民國 107 年

順位	ICD-10	原發部位	個案數（人）	粗死亡率	年齡標準化死亡率 [2a]	年齡標準化死亡率 [2b]
1	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,475	29.26	13.24	15.46
2	C50	女性乳房	2,418	20.36	11.24	12.34
3	C22	肝及肝內膽管	2,646	22.28	9.31	11.35
4	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	2,483	20.91	9.13	10.85
5	C25	胰	1,072	9.03	4.07	4.76
6	C16	胃	914	7.70	3.46	4.06
7	C53	子宮頸	653	5.50	2.84	3.20
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	624	5.25	2.87	3.18
9	C91-C95	白血病	460	3.87	2.13	2.37
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	478	4.02	1.77	2.11
	C00-C97	全癌症	19,160	161.33	75.93	88.02

註：
1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤 : ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。
2. 年齡標準化率 [2a] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率 [2b] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
3. 原位癌：組織形態之分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2；結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含 High grade dysplasia。

口腔、口咽及下咽 (主唾液腺、鼻咽除外)


ICD-O-FT　T-140 - T-149 (T-142，T-147除外)
ICD-O-3　C00 - C14 (C07 - C08，C11除外)
ICD-9　140-149 (142，147除外)
ICD-10　C00 - C14 (C07 - C08，C11除外)

民國 107 年，口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 7.04%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 6.20%。發生率的排名於男性為第 4 位、女性為第 15 位；死亡率的排名於男性為第 4 位、女性為第 16 位。民國 107 年初次診斷為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 8,170 人；當年死因為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤者共計 3,027 人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,400	770
年齡中位數	57	62
粗率(每10萬人口)	63.18	6.48
年齡標準化率[2](每10萬人口)	39.22	3.56
年齡標準化率[3](每10萬人口)	42.15	3.92
性別比(年齡標準化率[3])	10.75	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,779	248
年齡中位數	59	68
粗率(每10萬人口)	23.73	2.09
年齡標準化率[2](每10萬人口)	14.26	1.03
年齡標準化率[3](每10萬人口)	15.48	1.16
性別比(年齡標準化率[3])	13.34	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

8,170位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為8,116位，證實率為99.34%，男性證實率為99.35%，女性為99.22%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之97.84%，女性個案之92.86%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	7,240	97.84	7,229	99.85	715	92.86	715	100.00
唾液腺癌	43	0.58	43	100.00	33	4.29	33	100.00
神經內分泌癌	6	0.08	6	100.00	1	0.13	1	100.00
其他特定上皮癌	13	0.18	13	100.00	5	0.65	5	100.00
非特定上皮癌	36	0.49	33	91.67	3	0.39	2	66.67
黏膜惡性黑色素瘤	4	0.05	4	100.00	5	0.65	5	100.00
軟組織肉瘤	18	0.24	18	100.00	3	0.39	3	100.00
其他惡性腫瘤	40	0.54	6	15.00	5	0.65	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	73		73	100.00	49		49	100.00
總計 [2]	7,400	100.00	7,352	99.35	770	100.00	764	99.22

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

8,170位口腔、口咽及下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占64.44%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,724	63.84	541	70.26	5,265	64.44
放射線治療	3,676	49.68	307	39.87	3,983	48.75
化學治療	3,585	48.45	276	35.84	3,861	47.26
免疫治療	76	1.03	8	1.04	84	1.03
標靶治療	457	6.18	32	4.16	489	5.99
緩和照護	447	6.04	48	6.23	495	6.06
其他治療	4	0.05	0	0.00	4	0.05
未有首次治療申報紀錄	539	7.28	70	9.09	609	7.45

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

口腔 (主唾液腺除外)

ICD-O-FT	**T-140 - T-145 (T-142除外)**
ICD-O-3	**C00 - C06**
ICD-9	**140-145 (142除外)**
ICD-10	**C00 - C06**


民國 107 年，口腔惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的 5.20%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的 4.27%。民國 107 年初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 6,041 人；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 2,084 人。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,408	633
年齡中位數	57	63
粗率(每10萬人口)	46.17	5.33
年齡標準化率[2](每10萬人口)	28.79	2.92
年齡標準化率[3](每10萬人口)	30.98	3.22
性別比(年齡標準化率)	9.62	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,883	201
年齡中位數	59	70
粗率(每10萬人口)	16.08	1.69
年齡標準化率[2](每10萬人口)	9.66	0.81
年齡標準化率[3](每10萬人口)	10.53	0.92
性別比(年齡標準化率)	11.45	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

6,041位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,025位，證實率為99.74%，男性證實率為99.74%，女性為99.68%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.22%，女性個案之92.42%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	5,312	98.22	5,309	99.94	585	92.42	585	100.00
唾液腺癌	37	0.68	37	100.00	32	5.06	32	100.00
其他特定上皮癌	6	0.11	6	100.00	4	0.63	4	100.00
非特定上皮癌	20	0.37	19	95.00	3	0.47	2	66.67
黏膜惡性黑色素瘤	4	0.07	4	100.00	5	0.79	5	100.00
軟組織肉瘤	14	0.26	14	100.00	3	0.47	3	100.00
其他惡性腫瘤	15	0.28	5	33.33	1	0.16	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	13		13	100.00	13		13	100.00
總計 [2]	5,408	100.00	5,394	99.74	633	100.00	631	99.68

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,041位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.97%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,223	78.09	487	76.94	4,710	77.97
放射線治療	2,278	42.12	211	33.33	2,489	41.20
化學治療	2,140	39.57	190	30.02	2,330	38.57
免疫治療	36	0.67	4	0.63	40	0.66
標靶治療	215	3.98	21	3.32	236	3.91
緩和照護	220	4.07	37	5.85	257	4.25
其他治療	4	0.07	0	0.00	4	0.07
未有首次治療申報紀錄	353	6.53	59	9.32	412	6.82

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

唇 (唇的皮膚 C44.0 除外)


ICD-O-FT T-140
ICD-O-3 C00

民國 107 年，初次診斷為唇惡性腫瘤者共計 287 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 3.51%；當年死因為唇惡性腫瘤者共計 28 人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	256	31
年齡中位數	57	74
粗率(每10萬人口)	2.19	0.26
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	1.36	0.14
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	1.47	0.16
性別比(年齡標準化率[3])	9.19	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	24	4
年齡中位數	60	80
粗率(每10萬人口)	0.20	0.03
年齡標準化率2 (每10萬人口)	0.13	0.01
年齡標準化率3 (每10萬人口)	0.13	0.02
性別比(年齡標準化率[3])	6.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

舌


ICD-O-FT T-141
ICD-O-3 C01 - C02

民國 107 年，初次診斷為舌惡性腫瘤者共計 2,235 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 27.36%；當年死因為舌惡性腫瘤者共計 627 人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,897	338
年齡中位數	56	60
粗率(每10萬人口)	16.20	2.85
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	10.25	1.62
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	10.99	1.76
性別比(年齡標準化率[3])	6.24	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	530	97
年齡中位數	58	69
粗率(每10萬人口)	4.52	0.82
年齡標準化率2 (每10萬人口)	2.77	0.40
年齡標準化率3 (每10萬人口)	3.03	0.45
性別比(年齡標準化率[3])	6.73	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

齒齦


ICD-O-FT T-143
ICD-O-3 C03

民國 107 年，初次診斷為齒齦惡性腫瘤者共計 821 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 10.05%；當年死因為齒齦惡性腫瘤者共計 170 人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	721	100
年齡中位數	60	69
粗率(每10萬人口)	6.16	0.84
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	3.66	0.41
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	3.97	0.48
性別比(年齡標準化率[3])	8.27	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	148	22
年齡中位數	60	66
粗率(每10萬人口)	1.26	0.19
年齡標準化率2 (每10萬人口)	0.75	0.10
年齡標準化率3 (每10萬人口)	0.82	0.10
性別比(年齡標準化率[3])	8.20	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

口底


ICD-O-FT T-144
ICD-O-3 C04

民國 107 年，初次診斷為口底惡性腫瘤者共計 250 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 3.06%；當年死因為口底惡性腫瘤者共計 26 人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	229	21
年齡中位數	56	58
粗率(每10萬人口)	1.96	0.18
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	1.22	0.10
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	1.29	0.11
性別比(年齡標準化率[3])	11.73	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	24	2
年齡中位數	58	63
粗率(每10萬人口)	0.20	0.02
年齡標準化率2 (每10萬人口)	0.13	0.01
年齡標準化率3 (每10萬人口)	0.14	0.01
性別比(年齡標準化率[3])	14.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

口腔之其他及未詳細說明部位


ICD-O-FT T-145
ICD-O-3 C05 - C06

民國 107 年，初次診斷為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計 2,448 人(未詳細說明部位有 43 人，詳細分布請見 p.497 附錄六)，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 29.96%；當年死因為口腔之其他及未詳細說明部位惡性腫瘤者共計1,233人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,305	143
年齡中位數	56	65
粗率(每10萬人口)	19.68	1.20
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	12.30	0.65
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	13.25	0.72
性別比(年齡標準化率[3])	18.40	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,157	76
年齡中位數	59	70
粗率(每10萬人口)	9.88	0.64
年齡標準化率2 (每10萬人口)	5.89	0.30
年齡標準化率3 (每10萬人口)	6.41	0.34
性別比(年齡標準化率[3])	18.85	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

口咽


ICD-O-FT T-146
ICD-O-3 C09 - C10

民國 107 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 913 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 11.18%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 345 人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	819	94
年齡中位數	57	59
粗率(每10萬人口)	6.99	0.79
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	4.31	0.45
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	4.63	0.48
性別比(年齡標準化率[3])	9.65	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	322	23
年齡中位數	57	59
粗率(每10萬人口)	2.75	0.19
年齡標準化率2 (每10萬人口)	1.70	0.11
年齡標準化率3 (每10萬人口)	1.82	0.12
性別比(年齡標準化率[3])	15.17	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

下咽


ICD-O-FT T-148
ICD-O-3 C12 - C13

民國 107 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,201 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 14.70%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 535 人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,159	42
年齡中位數	58	58
粗率(每10萬人口)	9.90	0.35
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	6.04	0.19
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	6.46	0.21
性別比(年齡標準化率[3])	30.76	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	514	21
年齡中位數	60	55
粗率(每10萬人口)	4.39	0.18
年齡標準化率2 (每10萬人口)	2.62	0.09
年齡標準化率3 (每10萬人口)	2.82	0.11
性別比(年齡標準化率[3])	25.64	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 ICD-O-FT T-149 ICD-O-3 C14


民國 107 年，初次診斷為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 15 人，占口腔、口咽及下咽惡性腫瘤發生個案數的 0.18%；當年死因為咽和唇、口腔及咽之分界不明部位惡性腫瘤者共計 63 人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	14	1
年齡中位數	62	62
粗率(每10萬人口)	0.12	0.01
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	0.07	0.00
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	0.08	0.00
性別比(年齡標準化率[3])	17.88	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	60	3
年齡中位數	64	66
粗率(每10萬人口)	0.51	0.03
年齡標準化率2 (每10萬人口)	0.28	0.01
年齡標準化率3 (每10萬人口)	0.31	0.01
性別比(年齡標準化率[3])	31.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

口腔 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT　T-140 、T-141(T-1410、T-1416除外) 、T-143、T-144、T-145(T-1453、T-1454除外)

ICD-O-3　C00、C02(C024除外)、C03、C04、C050、C058、C059、C06


民國 107 年，初次診斷為口腔惡性腫瘤者共計 5,344 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 4.60%；當年死因為口腔惡性腫瘤者共計 1,979 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 4.06%。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	4,755	589
年齡中位數	57	63
粗率(每10萬人口)	40.60	4.96
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	25.35	2.70
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	27.28	2.99
性別比(年齡標準化率[3])	9.12	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,787	192
年齡中位數	59	70
粗率(每10萬人口)	15.26	1.62
年齡標準化率2 (每10萬人口)	9.16	0.78
年齡標準化率3 (每10萬人口)	9.98	0.88
性別比(年齡標準化率[3])	11.34	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

5,344位口腔惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,335位，證實率為99.83%，男性證實率為99.85%，女性為99.66%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之98.51%，女性個案之93.38%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	4,684	98.51	4,684	100.00	550	93.38	550	100.00
唾液腺癌	22	0.46	22	100.00	25	4.24	25	100.00
其他特定上皮癌	6	0.13	6	100.00	3	0.51	3	100.00
非特定上皮癌	18	0.38	17	94.44	2	0.34	1	50.00
黏膜惡性黑色素瘤	3	0.06	3	100.00	5	0.85	5	100.00
軟組織肉瘤	12	0.25	12	100.00	3	0.51	3	100.00
其他惡性腫瘤	10	0.21	4	40.00	1	0.17	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	4		4	100.00	5		5	100.00
總計 [2]	4,755	100.00	4,748	99.85	589	100.00	587	99.66

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,344位口腔惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占82.58%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3,948	83.03	465	78.95	4,413	82.58
放射線治療	1,906	40.08	181	30.73	2,087	39.05
化學治療	1,753	36.87	166	28.18	1,919	35.91
免疫治療	24	0.50	4	0.68	28	0.52
標靶治療	152	3.20	17	2.89	169	3.16
緩和照護	169	3.55	33	5.60	202	3.78
其他治療	4	0.08	0	0.00	4	0.07
未有首次治療申報紀錄	298	6.27	57	9.68	355	6.64

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

口咽 (Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT　T-1410、T-1416、T-1453、T-1454、T-146、T-1491、T-1498

ICD-O-3　C01、C024、C051、C052、C09、C10、C142、C148


民國 107 年，初次診斷為口咽惡性腫瘤者共計 1,617 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 1.39%；當年死因為口咽惡性腫瘤者共計 453 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 0.93%。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,478	139
年齡中位數	57	59
粗率(每10萬人口)	12.62	1.17
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	7.78	0.67
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	8.37	0.72
性別比(年齡標準化率[3])	11.63	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	420	33
年齡中位數	57	61
粗率(每10萬人口)	3.59	0.28
年齡標準化率2 (每10萬人口)	2.22	0.15
年齡標準化率3 (每10萬人口)	2.38	0.16
性別比(年齡標準化率[3])	14.88	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,617位口咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,596位，證實率為98.70%，男性證實率為98.65%，女性為99.28%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.68%，女性個案之91.37%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,429	96.68	1,421	99.44	127	91.37	127	100.00
p16+	298	20.16	297	99.66	73	52.52	73	100.00
p16-	1,081	73.14	1,078	99.72	52	37.41	52	100.00
未申報 p16 狀態	50	3.38	46	92.00	2	1.44	2	100.00
唾液腺癌	17	1.15	17	100.00	8	5.76	8	100.00
其他特定上皮癌	7	0.47	7	100.00	2	1.44	2	100.00
非特定上皮癌	5	0.34	5	100.00	1	0.72	1	100.00
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.07	1	100.00	0	0.00	0	0.00
軟組織肉瘤	6	0.41	6	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	13	0.88	1	7.69	1	0.72	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	68		68	100.00	44		44	100.00
總計 [2]	1,478	100.00	1,458	98.65	139	100.00	138	99.28

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,617位口咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占65.00%，放射線治療者次之，占64.07%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	511	34.57	62	44.60	573	35.44
放射線治療	933	63.13	103	74.10	1,036	64.07
化學治療	961	65.02	90	64.75	1,051	65.00
免疫治療	23	1.56	3	2.16	26	1.61
標靶治療	153	10.35	12	8.63	165	10.20
緩和照護	133	9.00	9	6.47	142	8.78
未有首次治療申報紀錄	140	9.47	8	5.76	148	9.15

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

下咽(Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd)

ICD-O-FT　T-148、T-1490

ICD-O-3　C12、C13、C140


民國 107 年，初次診斷為下咽惡性腫瘤者共計 1,209 人，占全部惡性腫瘤發生個案數的 1.04%；當年死因為下咽惡性腫瘤者共計 595 人，占全部惡性腫瘤死亡個案數的 1.22%。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,167	42
年齡中位數	58	58
粗率(每10萬人口)	9.96	0.35
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	6.09	0.19
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	6.51	0.21
性別比(年齡標準化率[3])	31.00	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	572	23
年齡中位數	61	55
粗率(每10萬人口)	4.88	0.19
年齡標準化率2 (每10萬人口)	2.89	0.10
年齡標準化率3 (每10萬人口)	3.12	0.12
性別比(年齡標準化率[3])	26.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,209位下咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,185位，證實率為98.01%，男性證實率為98.20%，女性為92.86%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.57%，女性個案之90.48%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,127	96.57	1,124	99.73	38	90.48	38	100.00
唾液腺癌	4	0.34	4	100.00	0	0.00	0	0.00
神經內分泌癌	6	0.51	6	100.00	1	2.38	1	100.00
非特定上皮癌	13	1.11	11	84.62	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	17	1.46	1	5.88	3	7.14	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	1		1	100.00	.		.	.
總計 [2]	1,167	100.00	1,146	98.20	42	100.00	39	92.86

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,209位下咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占73.70%，放射線治療者次之，占71.13%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	265	22.71	14	33.33	279	23.08
放射線治療	837	71.72	23	54.76	860	71.13
化學治療	871	74.64	20	47.62	891	73.70
免疫治療	29	2.49	1	2.38	30	2.48
標靶治療	152	13.02	3	7.14	155	12.82
緩和照護	145	12.43	6	14.29	151	12.49
未有首次治療申報紀錄	101	8.65	5	11.90	106	8.77

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

主唾液腺

ICD-O-FT	**T-142**
ICD-O-3	**C07 - C08**
ICD-9	**142**
ICD-10	**C07 - C08**


民國107年，主唾液腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.30%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.12%。發生率的排名於男性為第25位、女性為第27位；死亡率的排名於男性為第28位、女性為第33位。民國107年初次診斷為主唾液腺惡性腫瘤者共計347人；當年死因為主唾液腺惡性腫瘤者共計59人。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	195	152
年齡中位數	59	56
粗率(每10萬人口)	1.66	1.28
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.10	0.83
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.19	0.90
性別比(年齡標準化率[3])	1.32	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	43	16
年齡中位數	65	52
粗率(每10萬人口)	0.37	0.13
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.21	0.08
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.23	0.09
性別比(年齡標準化率[3])	2.56	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

347位主唾液腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為346位，證實率為99.71%，男性證實率為100.00%，女性為99.34%。

男性患者的組織形態分布，以其他特定上皮癌最多，占男性個案之29.23%，女性患者的組織形態分布，以黏液表皮樣癌最多，占女性個案之26.32%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
黏液表皮樣癌	32	16.41	32	100.00	40	26.32	39	97.50
鱗狀細胞癌	15	7.69	15	100.00	4	2.63	4	100.00
腺癌，非特定	10	5.13	10	100.00	3	1.97	3	100.00
腺樣囊狀癌	28	14.36	28	100.00	31	20.39	31	100.00
腺泡細胞癌	16	8.21	16	100.00	22	14.47	22	100.00
惡性混合性腫瘤	15	7.69	15	100.00	12	7.89	12	100.00
淋巴上皮癌	7	3.59	7	100.00	14	9.21	14	100.00
其他特定上皮癌	57	29.23	57	100.00	22	14.47	22	100.00
非特定上皮癌	8	4.10	8	100.00	2	1.32	2	100.00
軟組織肉瘤	3	1.54	3	100.00	2	1.32	2	100.00
其他惡性腫瘤	4	2.05	4	100.00	0	0.00	0	0.00
惡性淋巴瘤[1]	15		15	100.00	19		19	100.00
總計[2]	195	100.00	195	100.00	152	100.00	151	99.34

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

347位主唾液腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占85.30%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	159	81.54	137	90.13	296	85.30
放射線治療	103	52.82	92	60.53	195	56.20
化學治療	55	28.21	36	23.68	91	26.22
荷爾蒙治療	1	0.51	0	0.00	1	0.29
免疫治療	1	0.51	0	0.00	1	0.29
標靶治療	3	1.54	1	0.66	4	1.15
緩和照護	10	5.13	2	1.32	12	3.46
未有首次治療申報紀錄	17	8.72	4	2.63	21	6.05

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

鼻咽

ICD-O-FT	**T-147**
ICD-O-3	**C11**
ICD-9	**147**
ICD-10	**C11**


民國107年，鼻咽惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.28%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.31%。發生率的排名於男性為第14位、女性為第19位；死亡率的排名於男性為第12位、女性為第19位。民國107年初次診斷為鼻咽惡性腫瘤者共計1,490人；當年死因為鼻咽惡性腫瘤者共計640人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,122	368
年齡中位數	52	52
粗率(每10萬人口)	9.58	3.10
年齡標準化率[2](每10萬人口)	6.42	2.02
年齡標準化率[3](每10萬人口)	6.97	2.22
性別比(年齡標準化率[3])	3.14	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	504	136
年齡中位數	58	63
粗率(每10萬人口)	4.30	1.15
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.62	0.62
年齡標準化率[3](每10萬人口)	2.87	0.69
性別比(年齡標準化率[3])	4.16	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,490位鼻咽惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,484位，證實率為99.60%，男性證實率為99.82%，女性為98.91%。

男、女性患者的組織形態分布，均以非角化鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之95.99%，女性個案之93.21%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
非角化鱗狀細胞癌	1,077	95.99	1,077	100.00	343	93.21	343	100.00
角化鱗狀細胞癌	14	1.25	14	100.00	9	2.45	9	100.00
唾液腺癌	6	0.53	6	100.00	3	0.82	3	100.00
其他特定上皮癌	3	0.27	3	100.00	3	0.81	3	100.00
非特定上皮癌	18	1.60	17	94.44	7	1.90	6	85.71
其他惡性腫瘤	4	0.36	3	75.00	3	0.82	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	18		18	100.00	7		7	100.00
總計 [2]	1,122	100.00	1,120	99.82	368	100.00	364	98.91

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,490位鼻咽惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占87.32%，其次為化學治療，占83.83%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	14	1.25	2	0.54	16	1.07
放射線治療	988	88.06	313	85.05	1,301	87.32
化學治療	946	84.31	303	82.34	1,249	83.83
免疫治療	7	0.62	3	0.82	10	0.67
標靶治療	15	1.34	5	1.36	20	1.34
緩和照護	59	5.26	23	6.25	82	5.50
未有首次治療申報紀錄	66	5.88	33	8.97	99	6.64

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

食道


ICD-O-FT	**T-150**
ICD-O-3	**C15**
ICD-9	**150**
ICD-10	**C15**

民國107年，食道惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.39%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.95%。發生率的排名於男性為第6位、女性為第25位；死亡率的排名於男性為第5位、女性為第20位。民國107年初次診斷為食道惡性腫瘤者共計2,778人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的7.11%；當年死因為食道惡性腫瘤者共計1,929人。


項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,579	199
年齡中位數	59	63
粗率(每10萬人口)	22.02	1.68
年齡標準化率[2](每10萬人口)	13.23	0.89
年齡標準化率[3](每10萬人口)	14.25	0.96
性別比(年齡標準化率[3])	14.84	1

項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,792	137
年齡中位數	59	66
粗率(每10萬人口)	15.30	1.15
年齡標準化率[2](每10萬人口)	9.07	0.59
年齡標準化率[3](每10萬人口)	9.81	0.66
性別比(年齡標準化率[3])	14.86	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,778位食道惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,753位，證實率為99.10%，男性證實率為99.22%，女性為97.49%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之92.75%，女性個案之84.42%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	2,392	92.75	2,387	99.79	168	84.42	168	100.00
腺癌	92	3.57	92	100.00	13	6.53	13	100.00
腺性鱗狀癌	16	0.62	16	100.00	2	1.01	2	100.00
神經內分泌癌	19	0.74	19	100.00	4	2.01	4	100.00
其他特定上皮癌	12	0.47	12	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	21	0.81	21	100.00	3	1.51	3	100.00
胃腸基質瘤	4	0.16	4	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性肉瘤	7	0.27	7	100.00	2	1.01	2	100.00
其他惡性腫瘤	16	0.62	1	6.25	7	3.52	2	28.57
惡性淋巴瘤 [1]	0		0	-	0		0	-
總計 [2]	2,579	100.00	2,559	99.22	199	100.00	194	97.49

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,778位食道惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占68.25%，放射線治療者次之，占62.85%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	788	30.55	71	35.68	859	30.92
放射線治療	1,638	63.51	108	54.27	1,746	62.85
化學治療	1,791	69.45	105	52.76	1,896	68.25
免疫治療	38	1.47	2	1.01	40	1.44
標靶治療	28	1.09	2	1.01	30	1.08
緩和照護	644	24.97	48	24.12	692	24.91
其他治療	1	0.04	0	0.00	1	0.04
未有首次治療申報紀錄	290	11.24	34	17.09	324	11.66

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胃

ICD-O-FT	**T-151**
ICD-O-3	**C16**
ICD-9	**151**
ICD-10	**C16**


民國107年，胃惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.27%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.71%。發生率的排名於男性為第7位、女性為第10位；死亡率的排名於男性為第6位、女性為第6位。民國107年初次診斷為胃惡性腫瘤者共計3,798人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的9.72%；當年死因為胃惡性腫瘤者共計2,299人。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,334	1,464
年齡中位數	68	69
粗率(每10萬人口)	19.93	12.33
年齡標準化率[2](每10萬人口)	10.65	5.88
年齡標準化率[3](每10萬人口)	12.18	6.76
性別比(年齡標準化率[3])	1.80	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,385	914
年齡中位數	74	74
粗率(每10萬人口)	11.82	7.70
年齡標準化率[2](每10萬人口)	5.92	3.46
年齡標準化率[3](每10萬人口)	7.01	4.06
性別比(年齡標準化率[3])	1.73	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

3,798位胃惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,748位，證實率為98.68%，男性證實率為98.71%，女性為98.63%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之88.99%，女性個案之85.86%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	2,077	88.99	2,074	99.86	1,257	85.86	1,257	100.00
腺性鱗狀癌	9	0.39	9	100.00	4	0.27	4	100.00
鱗狀細胞癌	27	1.16	27	100.00	2	0.14	2	100.00
神經內分泌癌	59	2.53	58	98.31	45	3.07	45	100.00
其他特定上皮癌	14	0.60	14	100.00	5	0.34	5	100.00
非特定上皮癌	25	1.07	22	88.00	24	1.64	23	95.83
胃腸基質瘤	100	4.28	90	90.00	108	7.38	104	96.30
其他惡性肉瘤	7	0.30	7	100.00	4	0.27	4	100.00
其他惡性腫瘤	16	0.69	3	18.75	15	1.02	0	0.00
惡性淋巴瘤[1]	101		100	99.01	82		82	100.00
瀰漫性大B細胞惡性淋巴瘤	61	2.61	60	98.36	52	3.55	52	100.00
與粘膜有關的淋巴樣組織淋巴瘤	31	1.33	31	100.00	27	1.84	27	100.00
總計[2]	2,334	100.00	2,304	98.71	1,464	100.00	1,444	98.63

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,798位胃惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占57.79%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,378	59.04	817	55.81	2,195	57.79
放射線治療	169	7.24	77	5.26	246	6.48
化學治療	1,100	47.13	616	42.08	1,716	45.18
免疫治療	38	1.63	16	1.09	54	1.42
標靶治療	103	4.41	100	6.83	203	5.34
緩和照護	562	24.08	402	27.46	964	25.38
未有首次治療申報紀錄	335	14.35	215	14.69	550	14.48

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

小腸

ICD-O-FT	**T-152**
ICD-O-3	**C17**
ICD-9	**152**
ICD-10	**C17**


民國107年，小腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.36%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.30%。發生率的排名於男性為第24位、女性為第28位；死亡率的排名於男性為第24位、女性為第29位。民國107年初次診斷為小腸惡性腫瘤者共計421人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的1.08%；當年死因為小腸惡性腫瘤者共計144人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	246	175
年齡中位數	65	64
粗率(每10萬人口)	2.10	1.47
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.21	0.79
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.35	0.88
性別比(年齡標準化率[3])	1.53	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	91	53
年齡中位數	70	74
粗率(每10萬人口)	0.78	0.45
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.41	0.21
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.47	0.24
性別比(年齡標準化率[3])	1.96	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

421位小腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理實者為415位，證實率為98.57%，男性證實率為97.97%，女性為99.43%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胃腸基質肉瘤最多，分別占男性個案之54.88%，女性個案之48.57%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	68	27.64	68	100.00	60	34.29	59	98.33
神經內分泌癌	23	9.35	22	95.65	22	12.57	22	100.00
其他特定上皮癌	5	2.03	5	100.00	1	0.57	1	100.00
非特定上皮癌	5	2.03	5	100.00	3	1.71	3	100.00
胃腸基質瘤	135	54.88	132	97.78	85	48.57	85	100.00
其他惡性肉瘤	7	2.85	7	100.00	3	1.71	3	100.00
其他惡性腫瘤	3	1.22	2	66.67	1	0.57	1	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	33		33	100.00	22		22	100.00
總計 [2]	246	100.00	241	97.97	175	100.00	174	99.43

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

421位小腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占72.21%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	181	73.58	123	70.29	304	72.21
放射線治療	5	2.03	7	4.00	12	2.85
化學治療	29	11.79	28	16.00	57	13.54
免疫治療	1	0.41	2	1.14	3	0.71
標靶治療	65	26.42	43	24.57	108	25.65
緩和照護	27	10.98	28	16.00	55	13.06
未有首次治療申報紀錄	35	14.23	25	14.29	60	14.25

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門


ICD-O-FT　T-153，T-154
ICD-O-3　C18 - C21
ICD-9　153，154
ICD-10　C18 - C21

民國107年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的14.23%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的11.94%。發生率的排名於男性為第1位、女性為第3位；死亡率的排名於男性為第3位、女性為第4位。民國107年初次診斷為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計16,525人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的42.30%；當年死因為結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計5,823人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	9,512	7,013
年齡中位數	66	67
粗率(每10萬人口)	81.21	59.05
年齡標準化率[2](每10萬人口)	45.27	29.50
年齡標準化率[3](每10萬人口)	51.17	33.55
性別比(年齡標準化率[3])	1.53	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,340	2,483
年齡中位數	72	76
粗率(每10萬人口)	28.52	20.91
年齡標準化率[2](每10萬人口)	14.57	9.13
年齡標準化率[3](每10萬人口)	17.19	10.85
性別比(年齡標準化率[3])	1.58	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

16,525位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為16,207位，證實率為98.08%，男性證實率為98.52%，女性為97.48%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之93.85%，女性個案之92.06%。

民國107年男、女性結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案分別為2,926位和1,679位，詳見本年報第132、133頁。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	8,927	93.85	8,916	99.88	6,456	92.06	6,438	99.72
神經內分泌癌	324	3.41	323	99.69	245	3.49	245	100.00
其他特定上皮癌	37	0.39	37	100.00	70	1.00	70	100.00
非特定上皮癌	72	0.76	56	77.78	80	1.14	54	67.50
胃腸基質瘤	21	0.22	20	95.24	13	0.19	13	100.00
其他惡性肉瘤	4	0.04	4	100.00	3	0.04	3	100.00
其他惡性腫瘤	127	1.34	15	11.81	146	2.08	13	8.90
惡性淋巴瘤 [1]	23		23	100.00	19		19	100.00
總計 [2]	9,512	100.00	9,371	98.52	7,013	100.00	6,836	97.48

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

16,525位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占77.17%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	7,362	77.40	5,390	76.86	12,752	77.17
放射線治療	1,289	13.55	741	10.57	2,030	12.28
化學治療	4,957	52.11	3,486	49.71	8,443	51.09
免疫治療	14	0.15	7	0.10	21	0.13
標靶治療	1,245	13.09	792	11.29	2,037	12.33
緩和照護	1,161	12.21	972	13.86	2,133	12.91
其他治療	0	0.00	1	0.01	1	0.01
未有首次治療申報紀錄	962	10.11	717	10.22	1,679	10.16

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結腸


ICD-O-FT	**T-153**
ICD-O-3	**C18**
ICD-9	**153**
ICD-10	**C18**

民國107年，結腸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的9.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的8.70%。民國107年初次診斷為結腸惡性腫瘤者共計10,549人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的27.00%；當年死因為結腸惡性腫瘤者共計4,245人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,788	4,761
年齡中位數	67	68
粗率(每10萬人口)	49.42	40.09
年齡標準化率[2](每10萬人口)	27.11	19.70
年齡標準化率[3](每10萬人口)	30.85	22.49
性別比(年齡標準化率[3])	1.37	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,398	1,847
年齡中位數	74	76
粗率(每10萬人口)	20.47	15.55
年齡標準化率[2](每10萬人口)	10.34	6.75
年齡標準化率[3](每10萬人口)	12.31	8.04
性別比(年齡標準化率[3])	1.53	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

10,549位結腸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為10,278位，證實率為97.43%，男性證實率為97.87%，女性為96.89%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之96.03，女性個案之94.56%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	5,558	96.03	5,548	99.82	4,502	94.56	4,490	99.73
神經內分泌癌	47	0.81	46	97.87	57	1.20	57	100.00
其他特定上皮癌	11	0.19	11	100.00	14	0.29	14	100.00
非特定上皮癌	57	0.98	43	75.44	61	1.28	40	65.57
胃腸基質瘤	4	0.07	4	100.00	1	0.02	1	100.00
其他惡性肉瘤	4	0.07	4	100.00	3	0.06	3	100.00
其他惡性腫瘤	107	1.85	9	8.41	123	2.58	8	6.50
惡性淋巴瘤 [1]	20		20	100.00	14		14	100.00
總計 [2]	5,788	100.00	5,665	97.87	4,761	100.00	4,613	96.89

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

10,549位結腸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占78.47%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	4,548	78.58	3,730	78.34	8,278	78.47
放射線治療	125	2.16	111	2.33	236	2.24
化學治療	2,841	49.08	2,319	48.71	5,160	48.91
免疫治療	8	0.14	5	0.11	13	0.12
標靶治療	751	12.98	562	11.80	1,313	12.45
緩和照護	702	12.13	694	14.58	1,396	13.23
未有首次治療申報紀錄	656	11.33	502	10.54	1,158	10.98

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

直腸、乙狀結腸連結部及肛門


ICD-O-FT	**T-154**
ICD-O-3	**C19 - C21**
ICD-9	**154**
ICD-10	**C19 - C21**

民國107年，直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的5.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的3.23%。民國107年初次診斷為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計5,976人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的15.30%；當年死因為直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤者共計1,578人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	3,724	2,252
年齡中位數	64	65
粗率(每10萬人口)	31.79	18.96
年齡標準化率[2](每10萬人口)	18.16	9.80
年齡標準化率[3](每10萬人口)	20.32	11.06
性別比(年齡標準化率[3])	1.84	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	942	636
年齡中位數	69	74
粗率(每10萬人口)	8.04	5.36
年齡標準化率[2](每10萬人口)	4.23	2.37
年齡標準化率[3](每10萬人口)	4.88	2.81
性別比(年齡標準化率[3])	1.74	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

5,976位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,929位，證實率為99.21%，男性證實率為99.52%，女性為98.71%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之90.47%、女性個案之86.77%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	3,369	90.47	3,368	99.97	1,954	86.77	1,948	99.69
神經內分泌癌	277	7.44	277	100.00	188	8.35	188	100.00
其他特定上皮癌	26	0.70	26	100.00	56	2.49	56	100.00
鱗狀細胞癌	19	0.51	19	100.00	50	2.22	50	100.00
非特定上皮癌	15	0.40	13	86.67	19	0.84	14	73.68
胃腸基質瘤	17	0.46	16	94.12	12	0.53	12	100.00
其他惡性腫瘤	20	0.54	6	30.00	23	1.02	5	21.74
惡性淋巴瘤 [1]	3		3	100.00	5		5	100.00
總計 [2]	3,724	100.00	3,706	99.52	2,252	100.00	2,223	98.71

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

5,976位直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占74.87%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,814	75.56	1,660	73.71	4,474	74.87
放射線治療	1,164	31.26	630	27.98	1,794	30.02
化學治療	2,116	56.82	1,167	51.82	3,283	54.94
免疫治療	6	0.16	2	0.09	8	0.13
標靶治療	494	13.27	230	10.21	724	12.12
緩和照護	459	12.33	278	12.34	737	12.33
其他治療	0	0.00	1	0.04	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	306	8.22	215	9.55	521	8.72

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肝及肝內膽管


ICD-O-FT T-155
ICD-O-3 C22
ICD-9 155
ICD-10 C22

民國107年，肝及肝內膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的9.77%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的16.85%。發生率的排名於男性為第3位、女性為第5位；死亡率的排名於男性為第2位、女性為第3位。民國107年初次診斷為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計11,342人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的29.03%；當年死因為肝及肝內膽管惡性腫瘤者共計8,222人。


項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	7,819	3,523
年齡中位數	64	71
粗率(每10萬人口)	66.76	29.66
年齡標準化率[2](每10萬人口)	38.03	13.79
年齡標準化率[3](每10萬人口)	42.33	16.02
性別比(年齡標準化率[3])	2.64	1

項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,576	2,646
年齡中位數	67	76
粗率(每10萬人口)	47.61	22.28
年齡標準化率[2](每10萬人口)	25.88	9.31
年齡標準化率[3](每10萬人口)	29.61	11.35
性別比(年齡標準化率[3])	2.61	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

11,342位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為5,619位，證實率為49.54%，男性證實率為50.62%，女性為47.15%。

男、女性患者的組織形態分布，均以肝細胞癌最多，分別占男性個案之88.73%，女性個案之83.00%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
肝細胞癌	6,938	88.73	3,201	46.14	2,924	83.00	1,172	40.08
膽管癌	661	8.45	564	85.33	477	13.54	388	81.34
合併肝細胞癌和膽管癌	132	1.69	128	96.97	48	1.36	45	93.75
肝母細胞瘤	3	0.04	3	100.00	6	0.17	6	100.00
其他特定上皮癌	19	0.24	19	100.00	15	0.43	15	100.00
非特定上皮癌	10	0.13	9	90.00	7	0.20	5	71.43
血管肉瘤	28	0.36	24	85.71	18	0.51	15	83.33
其他惡性肉瘤	8	0.10	8	100.00	14	0.40	13	92.86
其他惡性腫瘤	20	0.26	2	10.00	14	0.40	2	14.29
惡性淋巴瘤 [1]	10		10	100.00	3		3	100.00
總計 [2]	7,819	100.00	3,958	50.62	3,523	100.00	1,661	47.15

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

11,342位肝及肝內膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占26.21%，其次為TAE/TACE，占21.30%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,147	27.46	826	23.45	2,973	26.21
局部治療(如 PEIT/PAIT, RFA 等)	1,182	15.12	697	19.78	1,879	16.57
PEIT/PAIT	47	0.60	27	0.77	74	0.65
RFA	1,133	14.49	670	19.02	1,803	15.90
TAE/TACE	1,745	22.32	671	19.05	2,416	21.30
TAE	311	3.98	127	3.60	438	3.86
TACE	1,502	19.21	558	15.84	2,060	18.16
TAE, PEIT/PAIT, RFA 任二種以上	188	2.40	98	2.78	286	2.52
放射線治療	655	8.38	239	6.78	894	7.88
化學治療	557	7.12	234	6.64	791	6.97
免疫治療**	173	2.21	53	1.50	226	1.99
標靶治療	1,026	13.12	261	7.41	1,287	11.35
緩和照護	1,655	21.17	722	20.49	2,377	20.96
其他治療	2	0.03	1	0.03	3	0.03
未有首次治療申報紀錄	1,198	15.32	638	18.11	1,836	16.19

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。
免疫治療**：包含Thalidomide與其他Anti-cancer drugs。

膽囊及肝外膽管

ICD-O-FT	**T-156**
ICD-O-3	**C23 - C24**
ICD-9	**156**
ICD-10	**C23 - C24**


民國107年，膽囊及肝外膽管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.97%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.13%。發生率的排名於男性為第18位、女性為第18位；死亡率的排名於男性為第16位、女性為第15位。民國107年初次診斷為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計1,129人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的2.89%；當年死因為膽囊及肝外膽管惡性腫瘤者共計550人。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	580	549
年齡中位數	70	71
粗率(每10萬人口)	4.95	4.62
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.59	2.15
年齡標準化率[3](每10萬人口)	3.03	2.47
性別比(年齡標準化率[3])	1.23	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	278	272
年齡中位數	73	76
粗率(每10萬人口)	2.37	2.29
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.21	0.97
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.42	1.17
性別比(年齡標準化率[3])	1.21	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,129位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為951位，證實率為84.23%，男性證實率為85.17%，女性為83.24%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之83.79%，女性個案之82.51%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	486	83.79	437	89.92	453	82.51	409	90.29
腺性鱗狀癌	14	2.41	14	100.00	9	1.64	9	100.00
神經內分泌癌	11	1.90	11	100.00	13	2.37	13	100.00
其他特定上皮癌	16	2.76	16	100.00	17	3.10	17	100.00
非特定上皮癌	26	4.48	15	57.69	20	3.64	9	45.00
其他惡性肉瘤	1	0.17	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	26	4.48	0	0.00	37	6.74	0	0.00
惡性淋巴瘤	2		2	100.00	0		-	-
總計	580	100.00	494	85.17	549	100.00	457	83.24

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,129位膽囊及肝外膽管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占51.20%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	299	51.55	279	50.82	578	51.20
放射線治療	65	11.21	51	9.29	116	10.27
化學治療	197	33.97	178	32.42	375	33.22
免疫治療	1	0.17	2	0.36	3	0.27
標靶治療	1	0.17	3	0.55	4	0.35
緩和照護	158	27.24	153	27.87	311	27.55
其他治療	0	0.00	1	0.18	1	0.09
未有首次治療申報紀錄	108	18.62	95	17.30	203	17.98

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胰

ICD-O-FT	**T-157**
ICD-O-3	**C25**
ICD-9	**157**
ICD-10	**C25**


民國107年，胰惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.37%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.70%。發生率的排名於男性為第12位、女性為第13位；死亡率的排名於男性為第8位、女性為第5位。民國107年初次診斷為胰惡性腫瘤者共計2,750人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的7.04%；當年死因為胰惡性腫瘤者共計2,292人。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,481	1,269
年齡中位數	66	69
粗率(每10萬人口)	12.64	10.69
年齡標準化率[2](每10萬人口)	6.98	5.23
年齡標準化率[3](每10萬人口)	7.87	5.96
性別比(年齡標準化率[3])	1.32	1


項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,220	1,072
年齡中位數	68	73
粗率(每10萬人口)	10.42	9.03
年齡標準化率[2](每10萬人口)	5.58	4.07
年齡標準化率[3](每10萬人口)	6.36	4.76
性別比(年齡標準化率[3])	1.34	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,750位胰惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,184位，證實率為79.42%，男性證實率為80.49%，女性為78.17%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之69.01%，女性個案之64.70%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	1,022	69.01	996	97.46	821	64.70	804	97.93
腺泡細胞癌	7	0.47	7	100.00	5	0.39	5	100.00
神經內分泌癌	113	7.63	113	100.00	102	8.04	101	99.02
實性偽乳突瘤	2	0.14	2	100.00	24	1.89	24	100.00
其他特定上皮癌	7	0.47	7	100.00	8	0.63	8	100.00
非特定上皮癌	111	7.49	59	53.15	89	7.01	40	44.94
惡性肉瘤	2	0.14	2	100.00	2	0.16	2	100.00
其他惡性腫瘤	217	14.65	6	2.76	218	17.18	8	3.67
惡性淋巴瘤 [1]	2		2	100.00	2		2	100.00
總計 [2]	1,481	100.00	1,192	80.49	1,269	100.00	992	78.17

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,750位胰惡性腫瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占51.09%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	383	25.86	362	28.53	745	27.09
放射線治療	146	9.86	117	9.22	263	9.56
化學治療	793	53.54	612	48.23	1,405	51.09
免疫治療	7	0.47	2	0.16	9	0.33
標靶治療	39	2.63	24	1.89	63	2.29
緩和照護	621	41.93	535	42.16	1,156	42.04
其他治療	4	0.27	4	0.32	8	0.29
未有首次治療申報紀錄	257	17.35	206	16.23	463	16.84

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

後腹膜腔及腹膜


ICD-O-FT T-158
ICD-O-3 C48
ICD-9 158
ICD-10 C48

民國107年，後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.26%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.25%。發生率的排名於男性為第30位、女性為第24位；死亡率的排名於男性為第30位、女性為第24位。民國107年初次診斷為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計298人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的0.76%；當年死因為後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤者共計122人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	103	195
年齡中位數	62	63
粗率(每10萬人口)	0.88	1.64
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.65	0.99
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.67	1.06
性別比(年齡標準化率[3])	0.63	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	35	87
年齡中位數	69	68
粗率(每10萬人口)	0.30	0.73
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.16	0.35
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.18	0.40
性別比(年齡標準化率[3])	0.45	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

298位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為287位，證實率為96.31%，男性證實率為93.20%，女性為97.95%。

男性患者的組織形態分布，以脂肪肉瘤最多，占男性個案之36.89%，女性患者的組織形態分布，以漿液性腺癌最多，占女性個案之35.38%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
脂肪肉瘤	38	36.89	37	97.37	35	17.95	34	97.14
平滑肌肉瘤	8	7.77	8	100.00	20	10.26	20	100.00
周邊原始神經外胚層腫瘤	8	7.77	8	100.00	11	5.64	11	100.00
生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤	3	2.91	3	100.00	2	1.03	2	100.00
惡性間皮瘤	7	6.80	7	100.00	6	3.08	6	100.00
其他惡性肉瘤	17	16.50	16	94.12	18	9.23	17	94.44
漿液性腺癌	0	0.00	0	0.00	69	35.38	69	100.00
其他上皮癌	9	8.74	8	88.89	30	15.38	30	100.00
其他惡性腫瘤	13	12.62	9	69.23	4	2.05	2	50.00
惡性淋巴瘤 [1]	8		8	100.00	5		5	100.00
總計 [2]	103	100.00	96	93.20	195	100.00	191	97.95

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

298位後腹膜腔及腹膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占67.45%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	70	67.96	131	67.18	201	67.45
放射線治療	12	11.65	33	16.92	45	15.10
化學治療	21	20.39	113	57.95	134	44.97
免疫治療	0	0.00	2	1.03	2	0.67
標靶治療	9	8.74	28	14.36	37	12.42
緩和照護	11	10.68	29	14.87	40	13.42
未有首次治療申報紀錄	14	13.59	17	8.72	31	10.40

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位

ICD-O-FT	**T-159**
ICD-O-3	**C26**
ICD-9	**159**
ICD-10	**C26**


民國107年，消化器官不明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.02%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.48%。發生率的排名於男性為第36位、女性為第37位；死亡率的排名於男性為第20位、女性為第26位。民國107年初次診斷為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計23人，占消化器官及腹膜(ICD-O-3 C15 - C26，C48)個案數的0.06%；當年死因為消化器官不明部位惡性腫瘤者共計235人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	9	14
年齡中位數	70	71
粗率(每10萬人口)	0.08	0.12
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.04	0.06
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.05	0.07
性別比(年齡標準化率[3])	0.71	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	156	79
年齡中位數	72	73
粗率(每10萬人口)	1.33	0.67
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.67	0.30
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.79	0.35
性別比(年齡標準化率[3])	2.26	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

23位消化器官不明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為21位，證實率為91.30%，男性證實率為100.00%，女性為85.71%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之66.67%，女性個案之50.00%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	6	66.67	6	100.00	7	50.00	7	100.00
神經內分泌癌	1	11.11	1	100.00	1	7.14	1	100.00
其他特定上皮癌	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	100.00
非特定上皮癌	2	22.22	2	100.00	1	7.14	1	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	0	0.00	2	14.29	2	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	2	14.29	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	2		2	100.00	1		1	100.00
總計 [2]	9	100.00	9	100.00	14	100.00	12	85.71

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

23位消化器官不明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以緩和照護者最多，占43.48%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	0	0.00	1	7.14	1	4.35
化學治療	2	22.22	5	35.71	7	30.43
標靶治療	0	0.00	3	21.43	3	13.04
緩和照護	3	33.33	7	50.00	10	43.48
未有首次治療申報紀錄	5	55.56	3	21.43	8	34.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

鼻腔、副竇、中耳及內耳


ICD-O-FT T-160
ICD-O-3 C30 - C31
ICD-9 160
ICD-10 C30 - C31

民國107年，鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.20%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.12%。發生率的排名於男性為第27位、女性為第32位；死亡率的排名於男性為第29位、女性為第34位。民國107年初次診斷為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計227人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的1.33%；當年死因為鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤者共計58人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	159	68
年齡中位數	59	60
粗率(每10萬人口)	1.36	0.57
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.83	0.34
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.91	0.38
性別比(年齡標準化率[3])	2.39	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	40	18
年齡中位數	61	73
粗率(每10萬人口)	0.34	0.15
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.20	0.07
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.22	0.08
性別比(年齡標準化率[3])	2.75	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

227位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為226位，證實率為99.56%，男性證實率為99.37%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之52.83%，女性個案之42.65%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	84	52.83	84	100.00	29	42.65	29	100.00
腺癌	5	3.14	5	100.00	1	1.47	1	100.00
唾液腺癌	12	7.55	12	100.00	12	17.65	12	100.00
神經內分泌癌	9	5.66	9	100.00	3	4.41	3	100.00
鼻與鼻竇未分化上皮癌	5	3.14	5	100.00	3	4.41	3	100.00
其他特定上皮癌	2	1.26	2	100.00	0	0.00	0	0.00
非特定上皮癌	13	8.18	13	100.00	4	5.88	4	100.00
軟組織肉瘤	6	3.77	6	100.00	2	2.94	2	100.00
惡性黑色素瘤	5	3.14	5	100.00	7	10.29	7	100.00
其他惡性腫瘤	18	11.32	17	94.44	7	10.29	7	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	38		38	100.00	31		31	100.00
總計 [2]	159	100.00	158	99.37	68	100.00	68	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

227位鼻腔、副竇、中耳及內耳惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占60.35%，其次為手術治療，占59.47%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	95	59.75	40	58.82	135	59.47
放射線治療	103	64.78	34	50.00	137	60.35
化學治療	83	52.20	20	29.41	103	45.37
免疫治療	2	1.26	1	1.47	3	1.32
標靶治療	1	0.63	4	5.88	5	2.20
緩和照護	17	10.69	2	2.94	19	8.37
未有首次治療申報紀錄	17	10.69	12	17.65	29	12.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

喉

ICD-O-FT	**T-161**
ICD-O-3	**C32**
ICD-9	**161**
ICD-10	**C32**


民國107年，喉惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.68%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.42%。發生率的排名於男性為第16位、女性為第35位；死亡率的排名於男性為第18位、女性為第37位。民國107年初次診斷為喉惡性腫瘤者共計795人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的4.67%；當年死因為喉惡性腫瘤者共計207人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	757	38
年齡中位數	63	61
粗率(每10萬人口)	6.46	0.32
年齡標準化率[2](每10萬人口)	3.75	0.17
年齡標準化率[3](每10萬人口)	4.10	0.19
性別比(年齡標準化率[3])	21.58	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	198	9
年齡中位數	69	84
粗率(每10萬人口)	1.69	0.08
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.93	0.03
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.05	0.03
性別比(年齡標準化率[3])	35.00	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

795位喉惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為786位，證實率為98.87%，男性證實率為98.94%，女性為97.37%。

男、女性患者的組織形態分布，均以鱗狀細胞癌最多，分別占男性個案之96.70%，女性個案之86.84%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	732	96.70	732	100.00	33	86.84	33	100.00
神經內分泌癌	1	0.13	1	100.00	0	0.00	-	-
其他特定上皮癌	3	0.40	3	100.00	3	7.89	3	100.00
非特定上皮癌	11	1.45	10	90.91	1	2.63	1	100.00
軟組織肉瘤	2	0.26	2	100.00	0	0.00	-	-
其他惡性腫瘤	8	1.06	1	12.50	1	2.63	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	3		3	100.00	1		1	100.00
總計 [2]	757	100.00	749	98.94	38	100.00	37	97.37

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

795位喉惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占57.11%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	307	40.55	21	55.26	328	41.26
放射線治療	435	57.46	19	50.00	454	57.11
化學治療	254	33.55	6	15.79	260	32.70
免疫治療	5	0.66	1	2.63	6	0.75
標靶治療	41	5.42	1	2.63	42	5.28
緩和照護	29	3.83	1	2.63	30	3.77
未有首次治療申報紀錄	80	10.57	4	10.53	84	10.57

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管

ICD-O-FT	**T-162**
ICD-O-3	**C33 - C34**
ICD-9	**162**
ICD-10	**C33 - C34**


民國107年，肺、支氣管及氣管惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的13.21%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的19.24%。發生率的排名於男性為第2位、女性為第2位；死亡率的排名於男性為第1位、女性為第1位。民國107年初次診斷為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計15,345人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的90.06%；當年死因為肺、支氣管及氣管惡性腫瘤者共計9,388人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	8,424	6,921
年齡中位數	67	65
粗率(每10萬人口)	71.92	58.28
年齡標準化率[2](每10萬人口)	39.31	30.26
年齡標準化率[3](每10萬人口)	44.88	33.69
性別比(年齡標準化率[3])	1.33	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	5,913	3,475
年齡中位數	72	73
粗率(每10萬人口)	50.48	29.26
年齡標準化率[2](每10萬人口)	25.98	13.24
年齡標準化率[3](每10萬人口)	30.66	15.46
性別比(年齡標準化率[3])	1.98	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

15,345位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為14,859位，證實率為96.83%，男性證實率為96.27%，女性為97.51%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腺癌最多，分別占男性個案之58.05%，女性個案之88.11%。

民國107年男、女性肺、支氣管及氣管原位癌個案分別為183位和495位，詳見本年報第134、135頁。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,649	19.58	1,644	99.70	200	2.89	198	99.00
腺癌	4,890	58.05	4,863	99.45	6,098	88.11	6,079	99.69
腺性鱗狀癌	105	1.25	105	100.00	59	0.85	59	100.00
大細胞癌	102	1.21	102	100.00	60	0.87	59	98.33
小細胞癌	864	10.26	861	99.65	104	1.50	102	98.08
肉瘤樣癌	85	1.01	85	100.00	32	0.46	32	100.00
類癌腫瘤	52	0.62	50	96.15	53	0.77	52	98.11
唾液腺樣癌	13	0.15	13	100.00	8	0.12	8	100.00
其他特定上皮癌	13	0.15	13	100.00	3	0.04	3	100.00
非特定上皮癌	381	4.52	339	88.98	144	2.08	128	88.89
非小細胞癌, NOS	188	2.23	180	95.74	57	0.82	55	96.49
其他	193	2.29	159	82.38	87	1.26	73	83.91
惡性肉瘤	17	0.20	16	94.12	10	0.14	10	100.00
其他惡性腫瘤	253	3.00	19	7.51	150	2.17	19	12.67
惡性淋巴瘤 [1]	18		18	100.00	30		30	100.00
總計 [2]	8,424	100.00	8,110	96.27	6,921	100.00	6,749	97.51

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

15,345位肺、支氣管及氣管惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占36.62%，其次為化學治療，占32.83%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,348	27.87	3,271	47.26	5,619	36.62
放射線治療	2,265	26.89	1,005	14.52	3,270	21.31
化學治療	3,479	41.30	1,558	22.51	5,037	32.83
免疫治療	340	4.04	125	1.81	465	3.03
標靶治療	1,614	19.16	2,345	33.88	3,959	25.80
緩和照護	3,068	36.42	1,764	25.49	4,832	31.49
其他治療	16	0.19	11	0.16	27	0.18
未有首次治療申報紀錄	1,125	13.35	558	8.06	1,683	10.97

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胸膜

ICD-O-FT	**T-163**
ICD-O-3	**C38.4**
ICD-9	**163**
ICD-10	**C38.4**


民國107年，胸膜惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.08%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第32位、女性為第36位；死亡率的排名於男性為第35位、女性為第38位。民國107年初次診斷為胸膜惡性腫瘤者共計92人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的0.54%；當年死因為胸膜惡性腫瘤者共計13人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	68	24
年齡中位數	67	64
粗率(每10萬人口)	0.58	0.20
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.31	0.10
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.36	0.11
性別比(年齡標準化率[3])	3.27	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	12	1
年齡中位數	61	83
粗率(每10萬人口)	0.10	0.01
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.06	0.00
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.07	0.00
性別比(年齡標準化率[3])	17.24	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

92位胸膜惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為90位，證實率為97.83%，男性證實率為97.06%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性間皮瘤最多，分別占男性個案之97.06%，女性個案之95.83%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
惡性間皮瘤	66	97.06	65	98.48	23	95.83	23	100.00
惡性肉瘤	1	1.47	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	1	1.47	0	0.00	1	4.17	1	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	7		7	100.00	2		2	100.00
總計 [2]	68	100.00	66	97.06	24	100.00	24	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

92位胸膜惡性腫瘤個案接受治療之情形，化學治療者最多，占67.39%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	24	35.29	5	20.83	29	31.52
放射線治療	7	10.29	2	8.33	9	9.78
化學治療	48	70.59	14	58.33	62	67.39
免疫治療	2	2.94	0	0.00	2	2.17
標靶治療	3	4.41	4	16.67	7	7.61
緩和照護	22	32.35	9	37.50	31	33.70
未有首次治療申報紀錄	11	16.18	5	20.83	16	17.39

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

胸腺、心臟及縱膈


ICD-O-FT T-164
ICD-O-3 C37 - C38(C38.4除外)
ICD-9 164
ICD-10 C37 - C38(C38.4除外)

民國107年，胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.50%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.30%。發生率的排名於男性為第22位、女性為第22位；死亡率的排名於男性為第23位、女性為第27位。民國107年初次診斷為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計580人，占呼吸系統及胸腔內器官(ICD-O-3 C30 - C39)個案數的3.40%；當年死因為胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤者共計147人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	331	249
年齡中位數	54	58
粗率(每10萬人口)	2.83	2.10
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.98	1.34
年齡標準化率[3](每10萬人口)	2.12	1.44
性別比(年齡標準化率[3])	1.47	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	86	61
年齡中位數	64	65
粗率(每10萬人口)	0.73	0.51
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.44	0.28
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.49	0.31
性別比(年齡標準化率[3])	1.58	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

580位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為569位，證實率為98.10%，男性證實率為97.89%，女性為98.39%。

男、女性患者的組織形態分布，均以胸腺瘤最多，分別占男性個案之52.57%，女性個案之66.27%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
胸腺瘤	174	52.57	173	99.43	165	66.27	164	99.39
胸腺癌	113	34.14	112	99.12	68	27.31	68	100.00
生殖細胞瘤	19	5.74	18	94.74	1	0.40	0	0.00
非特定上皮癌	6	1.81	5	83.33	1	0.40	0	0.00
惡性肉瘤	12	3.63	12	100.00	12	4.82	11	91.67
其他惡性腫瘤	7	2.11	4	57.14	2	0.80	2	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	35		35	100.00	48		48	100.00
總計 [2]	331	100.00	324	97.89	249	100.00	245	98.39

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

580位胸腺、心臟及縱膈惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占74.14%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	227	68.58	203	81.53	430	74.14
放射線治療	127	38.37	96	38.55	223	38.45
化學治療	103	31.12	58	23.29	161	27.76
荷爾蒙治療	2	0.60	0	0.00	2	0.34
免疫治療	5	1.51	2	0.80	7	1.21
標靶治療	4	1.21	2	0.80	6	1.03
緩和照護	45	13.60	19	7.63	64	11.03
未有首次治療申報紀錄	28	8.46	13	5.22	41	7.07

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

骨、關節及關節軟骨


ICD-O-FT	**T-170**
ICD-O-3	**C40 - C41**
ICD-9	**170**
ICD-10	**C40 - C41**

民國107年，骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.14%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.17%。發生率的排名於男性為第28位、女性為第31位；死亡率的排名於男性為第25位、女性為第30位。民國107年初次診斷為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計159人；當年死因為骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤者共計81人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	95	64
年齡中位數	49	47
粗率(每10萬人口)	0.81	0.54
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.76	0.52
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.78	0.52
性別比(年齡標準化率[3])	1.50	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	55	26
年齡中位數	59	60
粗率(每10萬人口)	0.47	0.22
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.35	0.15
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.39	0.17
性別比(年齡標準化率[3])	2.29	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

159位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為155位，證實率為97.48%，男性證實率為98.95%，女性為95.31%。

男、女性患者的組織形態分布，均以骨肉瘤最多，分別占男性個案之43.16%，女性個案之39.06%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
骨肉瘤	41	43.16	41	100.00	25	39.06	25	100.00
軟骨肉瘤	18	18.95	17	94.44	8	12.50	8	100.00
惡性骨巨大細胞瘤	2	2.11	2	100.00	0	0.00	0	0.00
Ewing 氏肉瘤	6	6.32	6	100.00	6	9.38	6	100.00
脊索瘤	11	11.58	11	100.00	14	21.88	14	100.00
惡性成釉細胞瘤	5	5.26	5	100.00	0	0.00	0	0.00
血管肉瘤	2	2.11	2	100.00	0	0.00	0	0.00
纖維肉瘤	1	1.05	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性肉瘤	7	7.37	7	100.00	4	6.25	4	100.00
其他惡性腫瘤	2	2.11	2	100.00	7	10.94	4	57.14
惡性淋巴瘤 [1]	25		24	96.00	16		16	100.00
總計 [2]	95	100.00	94	98.95	64	100.00	61	95.31

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

159位骨、關節及關節軟骨惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占71.07%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	67	70.53	46	71.88	113	71.07
放射線治療	23	24.21	15	23.44	38	23.90
化學治療	43	45.26	24	37.50	67	42.14
免疫治療	2	2.11	0	0.00	2	1.26
標靶治療	2	2.11	2	3.13	4	2.52
緩和照護	8	8.42	7	10.94	15	9.43
未有首次治療申報紀錄	11	11.58	7	10.94	18	11.32

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

結締組織、軟組織及其他皮下組織


ICD-O-FT　T-171
ICD-O-3　C47，C49
ICD-9　171
ICD-10　C47，C49

民國107年，結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.54%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.50%。發生率的排名於男性為第21位、女性為第21位；死亡率的排名於男性為第21位、女性為第21位。民國107年初次診斷為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計632人；當年死因為結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤者共計244人。


項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	362	270
年齡中位數	58	58
粗率(每10萬人口)	3.09	2.27
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.16	1.56
年齡標準化率[3](每10萬人口)	2.34	1.66
性別比(年齡標準化率[3])	1.41	1

項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	126	118
年齡中位數	64	66
粗率(每10萬人口)	1.08	0.99
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.65	0.58
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.72	0.65
性別比(年齡標準化率[3])	1.11	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

632位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為623位，證實率為98.58%，男性證實率為98.34%，女性為98.89%。

男、女性患者的組織形態分布，均以脂肪肉瘤最多，分別占男性個案之24.31%，占女性個案之21.85%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤	53	14.64	53	100.00	32	11.85	31	96.88
脂肪肉瘤	88	24.31	88	100.00	59	21.85	59	100.00
平滑肌肉瘤	19	5.25	19	100.00	31	11.48	31	100.00
橫紋肌肉瘤	15	4.14	15	100.00	6	2.22	6	100.00
血管肉瘤	37	10.22	35	94.59	22	8.15	22	100.00
滑膜肉瘤	9	2.49	9	100.00	12	4.44	12	100.00
惡性周邊神經鞘瘤	29	8.01	29	100.00	29	10.74	28	96.55
周邊原始神經外胚層腫瘤	14	3.87	14	100.00	7	2.59	7	100.00
胃腸基質瘤	4	1.10	4	100.00	2	0.74	2	100.00
未分化肉瘤	45	12.43	45	100.00	38	14.07	38	100.00
其他惡性肉瘤	44	12.15	42	95.45	28	10.37	27	96.43
其他惡性腫瘤	5	1.38	3	60.00	4	1.48	4	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	21		21	100.00	11		11	100.00
總計 [2]	362	100.00	356	98.34	270	100.00	267	98.89

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

632位結締組織、軟組織及其他皮下組織惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占74.84%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	272	75.14	201	74.44	473	74.84
放射線治療	150	41.44	104	38.52	254	40.19
化學治療	83	22.93	71	26.30	154	24.37
荷爾蒙治療	0	0.00	1	0.37	1	0.16
免疫治療	2	0.55	0	0.00	2	0.32
標靶治療	19	5.25	14	5.19	33	5.22
緩和照護	42	11.60	32	11.85	74	11.71
未有首次治療申報紀錄	36	9.94	22	8.15	58	9.18

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚


ICD-O-FT T-173
ICD-O-3 C44
ICD-9 172，173
ICD-10 C43 - C44

民國107年，皮膚惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.49%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.57%。發生率的排名於男性為第8位、女性為第8位；死亡率的排名於男性為第19位、女性為第22位。民國107年初次診斷為皮膚惡性腫瘤者共計4,049人；當年死因為皮膚惡性腫瘤者共計280人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,153	1,896
年齡中位數	74	76
粗率(每10萬人口)	18.38	15.96
年齡標準化率[2](每10萬人口)	9.30	6.93
年齡標準化率[3](每10萬人口)	11.16	8.27
性別比(年齡標準化率[3])	1.35	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	166	114
年齡中位數	73	75
粗率(每10萬人口)	1.42	0.96
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.74	0.44
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.88	0.52
性別比(年齡標準化率[3])	1.69	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

4,049位皮膚惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,035位，證實率為99.65%，其中男性證實率為99.58%，女性證實率為99.74%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最為常見，分別占男性個案之47.14%，女性個案之57.81%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	1,015	47.14	1,013	99.80	1,096	57.81	1,096	100.00
鱗狀細胞癌	800	37.16	797	99.63	559	29.48	558	99.82
皮膚附件癌	70	3.25	69	98.57	51	2.69	51	100.00
惡性黑色素瘤	145	6.73	142	97.93	134	7.07	133	99.25
其他特定上皮癌	18	0.84	18	100.00	13	0.69	11	84.62
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	13	0.60	13	100.00	7	0.37	7	100.00
血管肉瘤	77	3.58	77	100.00	24	1.27	24	100.00
惡性神經鞘瘤	8	0.37	8	100.00	7	0.37	7	100.00
其他惡性肉瘤	7	0.33	7	100.00	1	0.05	1	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	0	0.00	4	0.21	3	75.00
惡性淋巴瘤 [1]	67		67	100.00	44		44	100.00
總計 [2]	2,153	100.00	2,144	99.58	1,896	100.00	1,891	99.74

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,049位皮膚惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.90%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,924	89.36	1,716	90.51	3,640	89.90
放射線治療	122	5.67	72	3.80	194	4.79
化學治療	49	2.28	18	0.95	67	1.65
免疫治療	18	0.84	12	0.63	30	0.74
標靶治療	7	0.33	1	0.05	8	0.20
緩和照護	46	2.14	26	1.37	72	1.78
未有首次治療申報紀錄	157	7.29	127	6.70	284	7.01

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，惡性黑色素瘤


ICD-O-FT T-173 (M-87203 - M-87903)
ICD-O-3 C44 (M-87203 - M-87903)
ICD-9 172
ICD-10 C43

民國107年，皮膚惡性黑色素瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.24%，當年因皮膚惡性黑色素瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.33%。民國107年初次診斷為皮膚惡性黑色素瘤者共計279人；當年死因為皮膚惡性黑色素瘤者共計162人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	145	134
年齡中位數	68	72
粗率(每10萬人口)	1.24	1.13
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.66	0.55
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.77	0.64
性別比(年齡標準化率[3])	1.20	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	90	72
年齡中位數	71	68
粗率(每10萬人口)	0.77	0.61
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.41	0.30
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.50	0.36
性別比(年齡標準化率[3])	1.39	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

首次療程

279位皮膚惡性黑色素瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占72.04%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	103	71.03	98	73.13	201	72.04
放射線治療	20	13.79	11	8.21	31	11.11
化學治療	16	11.03	4	2.99	20	7.17
免疫治療	15	10.34	10	7.46	25	8.96
標靶治療	5	3.45	1	0.75	6	2.15
緩和照護	16	11.03	6	4.48	22	7.89
未有首次治療申報紀錄	22	15.17	20	14.93	42	15.05

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

皮膚，非惡性黑色素瘤

ICD-O-FT **T-173 (M-87203 - M-87903 除外)**
ICD-O-3 **C44 (M-87203 - M-87903 除外)**
ICD-9 **173**
ICD-10 **C44**


民國107年，皮膚非惡性黑色素瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.25%，當年因皮膚非惡性黑色素瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.24%。民國107年初次診斷為皮膚非惡性黑色素瘤共計有3,770人；當年死因為皮膚非惡性黑色素瘤者共118人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,008	1,762
年齡中位數	74	76
粗率(每10萬人口)	17.14	14.84
年齡標準化率[2] (每10萬人口)	8.64	6.38
年齡標準化率[3] (每10萬人口)	10.40	7.63
性別比(年齡標準化率[3])	1.36	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	76	42
年齡中位數	78	85
粗率(每10萬人口)	0.65	0.35
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.32	0.13
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.38	0.16
性別比(年齡標準化率[3])	2.38	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

3,770位皮膚非惡性黑色素瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為3,760位，證實率為99.73%，男性證實率為99.70%，女性為99.77%。

男、女性患者的組織形態分布，均以基底細胞癌最多，分別占男性個案之50.55%，女性個案之62.20%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
基底細胞癌	1,015	50.55	1,013	99.80	1,096	62.20	1,096	100.00
鱗狀細胞癌	800	39.84	797	99.63	559	31.73	558	99.82
皮膚附件癌	70	3.49	69	98.57	51	2.89	51	100.00
其他特定上皮癌	18	0.90	18	100.00	13	0.74	11	84.62
纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤	13	0.65	13	100.00	7	0.40	7	100.00
血管肉瘤	77	3.83	77	100.00	24	1.36	24	100.00
惡性神經鞘瘤	8	0.40	8	100.00	7	0.40	7	100.00
其他惡性肉瘤	7	0.35	7	100.00	1	0.06	1	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	0	0.00	4	0.23	3	75.00
惡性淋巴瘤 [1]	67		67	100.00	44		44	100.00
總計 [2]	2,008	100.00	2,002	99.70	1,762	100.00	1,758	99.77

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

3,770位皮膚非惡性黑色素瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占91.22%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,821	90.69	1,618	91.83	3,439	91.22
放射線治療	102	5.08	61	3.46	163	4.32
化學治療	33	1.64	14	0.79	47	1.25
免疫治療	3	0.15	2	0.11	5	0.13
標靶治療	2	0.10	0	0.00	2	0.05
緩和照護	30	1.49	20	1.14	50	1.33
未有首次治療申報紀錄	135	6.72	107	6.07	242	6.42

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房


ICD-O-FT　T-174，T-175
ICD-O-3　C50
ICD-9　174，175
ICD-10　C50

民國107年，女性及男性乳房惡性腫瘤發生個案數分別占全部惡性腫瘤發生個案數的12.24%及0.05%，女性及男性乳房惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的4.96%及0.04%。發生率的排名於女性為第1位、男性為第33位；死亡率的排名於女性為第2位、男性為第34位。民國107年初次診斷為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為14,217人及60人；當年死因為女性及男性乳房惡性腫瘤者分別為2,418人及19人。


項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	60	14,217
年齡中位數	66	56
粗率(每10萬人口)	0.51	119.71
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.28	72.97
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.32	78.86
性別比(年齡標準化率[3])	1	246.44

項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	19	2,418
年齡中位數	75	60
粗率(每10萬人口)	0.16	20.36
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.08	11.24
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.10	12.34
性別比(年齡標準化率[3])	1	123.40

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



男性乳房年齡別發生率與死亡率，民國107年



女性乳房年齡別發生率與死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

14,217位女性乳房惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為14,166位，證實率為99.64%；60位男性乳房惡性腫瘤中，經細胞學或組織病理證實者為60位，證實率為100.00%。

女、男性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以「侵襲性癌，非特定型」最多，分別占女性個案之85.13%，男性個案之88.33%。

民國107年女性乳房原位癌個案2,771位，詳見本年報第136、137頁。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
侵襲性癌，非特定型	53	88.33	53	100.00	12,073	84.92	12,066	99.94
黏液性癌	1	1.67	1	100.00	469	3.30	469	100.00
髓質癌	0	0.00	-	-	30	0.21	30	100.00
侵襲性小葉癌	0	0.00	-	-	673	4.73	673	100.00
惡性葉狀腫瘤	0	0.00	-	-	68	0.48	68	100.00
乳房 Paget 氏病	0	0.00	-	-	18	0.13	18	100.00
侵襲性乳頭狀癌	1	1.67	1	100.00	261	1.84	261	100.00
化生性癌	0	0.00	-	-	91	0.64	91	100.00
其他特定上皮癌	2	3.33	2	100.00	137	0.96	137	100.00
非特定上皮癌	3	5.00	3	100.00	336	2.36	334	99.40
惡性肉瘤	0	0.00	-	-	11	0.08	11	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	50	0.35	8	16.00
惡性淋巴瘤 [1]	0		-	-	18		18	100.00
總計 [2]	60	100.00	60	100.00	14,217	100.00	14,166	99.64

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

14,277位女性及男性乳房惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占88.50%

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	53	88.33	12,582	88.50	12,635	88.50
放射線治療	13	21.67	8,001	56.28	8,014	56.13
化學治療	27	45.00	7,995	56.24	8,022	56.19
內分泌治療	47	78.33	10,224	71.91	10,271	71.94
標靶治療	6	10.00	2,597	18.27	2,603	18.23
緩和照護	1	1.67	597	4.20	598	4.19
其他治療	0	0.00	10	0.07	10	0.07
未有首次治療申報紀錄	1	1.67	486	3.42	487	3.41

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

子宮頸

ICD-O-FT	**T-180**
ICD-O-3	**C53**
ICD-9	**179，180**
ICD-10	**C53，C55**


民國107年，子宮頸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.23%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.34%。發生率的排名於女性為第9位；死亡率的排名於女性為第7位。民國107年初次診斷為子宮頸惡性腫瘤者共計1,433人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58) 個案數的24.04%；當年死因為子宮頸惡性腫瘤者共計653人。

項　　目	發生個案 女性
個案數(人)	1,433
年齡中位數	58
粗率(每10萬人口)	12.07
年齡標準化率[2](每10萬人口)	7.06
年齡標準化率[3](每10萬人口)	7.85


項　　目	死亡個案 女性
個案數(人)	653
年齡中位數	63
粗率(每10萬人口)	5.50
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.84
年齡標準化率[3](每10萬人口)	3.20

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,433位子宮頸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,417位，證實率為98.88%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占1,433位個案之70.90%。民國107年子宮頸原位癌個案2,889位，詳見本年報第138、139頁。

組織形態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	1,016	70.90	1,015	99.90
腺癌	300	20.94	300	100.00
神經內分泌癌	19	1.33	19	100.00
其他特定上皮癌	51	3.56	51	100.00
非特定上皮癌	22	1.54	21	95.45
混合性上皮與間質腫瘤	5	0.35	5	100.00
惡性肉瘤	2	0.14	1	50.00
其他惡性腫瘤	18	1.26	5	27.78
惡性淋巴瘤 [1]	1		1	100.00
總計 [2]	1,433	100.00	1,417	98.88

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,433位子宮頸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以放射線治療者最多，占57.64%。

申報治療方式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	609	42.50
放射線治療	826	57.64
化學治療	702	48.99
荷爾蒙治療	2	0.14
標靶治療	20	1.40
緩和照護	120	8.37
其他治療	4	0.28
未有首次治療申報紀錄	176	12.28

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

子宮體

ICD-O-FT	**T-182**
ICD-O-3	**C54**
ICD-9	**182**
ICD-10	**C54**


民國107年，子宮體惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.40%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.81%。發生率的排名於女性為第6位；死亡率的排名於女性為第11位。民國107年初次診斷為子宮體惡性腫瘤者共計2,787人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的46.75%；當年死因為子宮體惡性腫瘤者共計395人。

項　　目	發生個案 女性
個案數(人)	2,787
年齡中位數	55
粗率(每10萬人口)	23.47
年齡標準化率[2](每10萬人口)	14.37
年齡標準化率[3](每10萬人口)	15.48


項　　目	死亡個案 女性
個案數(人)	395
年齡中位數	62
粗率(每10萬人口)	3.33
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.83
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.99

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,787位子宮體惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,780位，證實率為99.75%。

組織形態分布，以子宮內膜癌最為常見，占2,787位個案之87.51%。

組織形態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
子宮內膜癌	2,439	87.51	2,439	100.00
子宮內膜樣癌	2,076	74.49	2,076	100.00
漿液性腺癌	115	4.13	115	100.00
明亮細胞癌	55	1.97	55	100.00
其他	193	6.93	193	100.00
惡性 Muller 氏混合性腫瘤	139	5.35	139	100.00
絨毛膜癌	2	0.07	2	100.00
其他特定上皮癌	4	0.14	4	100.00
非特定上皮癌	17	0.61	15	88.24
平滑肌肉瘤	91	3.27	91	100.00
子宮內膜基質肉瘤	57	2.05	57	100.00
其他惡性肉瘤	27	0.61	27	100.00
其他惡性腫瘤	11	0.39	6	54.55
惡性淋巴瘤 [1]	0		-	-
總計 [2]	2,787	100.00	2,780	99.75

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,787位子宮體惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.16% 。

申報治療方式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,485	89.16
放射線治療	838	30.07
化學治療	708	25.40
荷爾蒙治療	199	7.14
標靶治療	28	1.00
緩和照護	70	2.51
其他治療	13	0.47
未有首次治療申報紀錄	140	5.02

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

卵巢、輸卵管及寬韌帶


ICD-O-FT T-183
ICD-O-3 C56，C57.0 - C57.4
ICD-9 183
ICD-10 C56，C57.0 - C57.4

民國107年，卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.34%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.28%。發生率的排名於女性為第7位；死亡率的排名於女性為第8位。民國107年初次診斷為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計1,557人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的26.12%；當年死因為卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤者共計624人。


項　　目	發生個案
	女性
個案數(人)	1,557
年齡中位數	54
粗率(每10萬人口)	13.11
年齡標準化率[2](每10萬人口)	8.57
年齡標準化率[3](每10萬人口)	9.25

項　　目	死亡個案
	女性
個案數(人)	624
年齡中位數	61
粗率(每10萬人口)	5.25
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.87
年齡標準化率[3](每10萬人口)	3.18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,557位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,514位，證實率為97.24%。

組織形態分布，以漿液性腺癌最為常見，占1,557位個案之31.73%。

組織形態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿液性腺癌	494	31.73	493	99.80
黏液性腺癌	150	9.63	150	100.00
子宮內膜樣瘤	233	14.96	233	100.00
明亮細胞癌	288	18.50	288	100.00
混合細胞腺癌	53	3.40	53	100.00
非特定腺癌	72	4.62	71	98.61
生殖細胞瘤	63	4.05	63	100.00
性索間質腫瘤	75	4.82	75	100.00
其他特定上皮癌	34	2.18	34	100.00
非特定上皮癌	48	3.08	40	83.33
惡性肉瘤	6	0.39	6	100.00
其他惡性腫瘤	41	2.63	8	19.51
惡性淋巴瘤 [1]	1		1	100.00
總計 [2]	1,557	100.00	1,514	97.24

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,557位卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占87.15% 。

申報治療方式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	1,357	87.15
放射線治療	33	2.12
化學治療	1,161	74.57
荷爾蒙治療	17	1.09
標靶治療	191	12.27
緩和照護	101	6.49
未有首次治療申報紀錄	72	4.62

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官


ICD-O-FT　T-184
ICD-O-3　C51 - C52，C57.7 - C57.9
ICD-9　184
ICD-10　C51 - C52，C57.7 - C57.9

民國107年，陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.11%。發生率的排名於女性為第29位；死亡率的排名於女性為第28位。民國107年初次診斷為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計178人，占女性生殖器官(ICD-O-3 C51 - C58)個案數的2.99%；當年死因為陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤者共計53人。


項　　目	發生個案
	女性
個案數(人)	178
年齡中位數	66
粗率(每10萬人口)	1.50
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.77
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.87

項　　目	死亡個案
	女性
個案數(人)	53
年齡中位數	66
粗率(每10萬人口)	0.45
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.22
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.25

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

178位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為174位，證實率為97.75%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占178位個案之58.43%。

組織形態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	104	58.43	104	100.00
腺癌	25	14.04	25	100.00
神經內分泌癌	4	2.25	4	100.00
混合性上皮與間質腫瘤	1	0.56	1	100.00
絨毛膜癌	5	2.81	4	80.00
其他特定上皮癌	6	3.37	6	100.00
非特定上皮癌	5	2.81	4	80.00
惡性黑色素瘤	17	9.55	17	100.00
惡性肉瘤	6	3.37	6	100.00
其他惡性腫瘤	5	2.81	3	60.00
惡性淋巴瘤 [1]	0		-	-
總計 [2]	178	100.00	174	97.75

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

178位陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占55.06%。

申報治療方式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	98	55.06
放射線治療	62	34.83
化學治療	42	23.60
荷爾蒙治療	1	0.56
標靶治療	5	2.81
緩和照護	7	3.93
未有首次治療申報紀錄	29	16.29

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

攝護腺(前列腺)


ICD-O-FT	**T-185**
ICD-O-3	**C61**
ICD-9	**185**
ICD-10	**C61**

民國107年，攝護腺(前列腺)惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的5.72%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.82%。發生率的排名於男性為第5位；死亡率的排名於男性為第7位。民國107年初次診斷為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計6,644人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的94.42%；當年死因為攝護腺(前列腺)惡性腫瘤者共計1,377人。


項　　目	發生個案
	男性
個案數(人)	6,644
年齡中位數	72
粗率(每10萬人口)	56.72
年齡標準化率[2](每10萬人口)	29.34
年齡標準化率[3](每10萬人口)	34.69

項　　目	死亡個案
	男性
個案數(人)	1,377
年齡中位數	81
粗率(每10萬人口)	11.76
年齡標準化率[2](每10萬人口)	5.03
年齡標準化率[3](每10萬人口)	6.52

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織型態

6,644位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為6,562位，證實率為98.77%。

組織形態分布，以腺癌最多，占6,644位個案之98.24%。

組織形態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	6,527	98.24	6,515	99.82
泌尿上皮癌	2	0.03	2	100.00
鱗狀細胞癌	1	0.02	1	100.00
神經內分泌癌	12	0.18	12	100.00
其他特定上皮癌	1	0.02	1	100.00
非特定上皮癌	33	0.50	21	63.64
惡性肉瘤	2	0.03	2	100.00
其他惡性腫瘤	66	0.99	8	12.12
惡性淋巴瘤 [1]	2		2	100.00
總計 [2]	6,644	100.00	6,562	98.77

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

6,644位攝護腺(前列腺)惡性腫瘤個案接受治療之情形，以內分泌治療者最多，占55.09% 。

申報治療方式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療**	2,932	44.13
放射線治療	1,663	25.03
化學治療	195	2.93
內分泌治療	3,660	55.09
藥物	3,213	54.77
手術(睪丸切除術)	74	1.11
免疫治療	6	0.09
緩和照護	592	8.91
其他治療	13	0.20
未有首次治療申報紀錄***	1,146	17.25

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療**：包含prostatectomy, cryoprostatectomy, hyperthermia;

未有首次治療申報紀錄***：未申報有治療紀錄中包含226位(19.72%)是首次療程為不予治療或是積極監視(active surveillance)或觀察等待(watchful waiting)，以及538位(46.95%)僅接受TURP或雷射治療。

睪丸

ICD-O-FT	**T-186**
ICD-O-3	**C62**
ICD-9	**186**
ICD-10	**C62**


民國107年，睪丸惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.24%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.03%。發生率的排名於男性為第20位；死亡率的排名於男性為第33位。民國107年初次診斷為睪丸惡性腫瘤者共計277人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的3.94%；當年死因為睪丸惡性腫瘤者共計15人。

項　　目	發生個案
	男性
個案數(人)	277
年齡中位數	31
粗率(每10萬人口)	2.36
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.28
年齡標準化率[3](每10萬人口)	2.44


項　　目	死亡個案
	男性
個案數(人)	15
年齡中位數	36
粗率(每10萬人口)	0.13
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.11
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.11

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

277位睪丸惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為273位，證實率為98.56%。

組織形態分布，以精細胞瘤最多，占277位個案之50.54%。

組織形態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
精細胞瘤	140	50.54	140	100.00
卵黃囊瘤	9	3.25	9	100.00
胚胎性癌	13	4.69	12	92.31
混合性生殖細胞瘤	88	31.77	88	100.00
惡性畸胎瘤	8	2.89	8	100.00
絨毛膜癌	3	1.08	3	100.00
非特定生殖細胞瘤	4	1.44	4	100.00
性索基質腫瘤	2	0.72	2	100.00
其他惡性腫瘤	10	3.61	7	70.00
惡性淋巴瘤 [1]	24		24	100.00
總計 [2]	277	100.00	273	98.56

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

277位睪丸惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.14% 。

申報治療方式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	258	93.14
放射線治療	15	5.42
化學治療	83	29.96
荷爾蒙治療	2	0.72
緩和照護	11	3.97
未有首次治療申報紀錄	8	2.89

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

陰莖及其他男性生殖器官

ICD-O-FT	**T-187**
ICD-O-3	**C60，C63**
ICD-9	**187**
ICD-10	**C60，C63**


民國107年，陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.10%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.05%。發生率的排名於男性為第31位；死亡率的排名於男性為第32位。民國107年初次診斷為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計116人，占男性生殖器官(ICD-O-3 C60 – C63)個案數的1.65%；當年死因為陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤者共計24人。

項　　目	發生個案
	男性
個案數(人)	116
年齡中位數	68
粗率(每10萬人口)	0.99
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.53
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.60


項　　目	死亡個案
	男性
個案數(人)	24
年齡中位數	59
粗率(每10萬人口)	0.20
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.13
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.15

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

116位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者，合計有116位，證實率為100.00%。

組織形態分布，以鱗狀細胞癌最多，占116位個案之56.90%。

組織形態	男性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞癌	66	56.90	66	100.00
基底細胞癌	6	5.17	6	100.00
Paget 氏病	24	20.69	24	100.00
其他上皮癌	5	4.31	5	100.00
惡性黑色素瘤	1	0.86	1	100.00
惡性肉瘤	11	9.48	11	100.00
其他惡性腫瘤	3	2.59	3	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	1		1	100.00
總計 [2]	116	100.00	116	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

116位陰莖及其他男性生殖器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.03%。

申報治療方式*	男性	
	治療人數	百分比
手術治療	94	81.03
放射線治療	8	6.90
化學治療	11	9.48
免疫治療	2	1.72
緩和照護	3	2.59
其他治療	1	0.86
未有首次治療申報紀錄	14	12.07

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱

ICD-O-FT	**T-188**
ICD-O-3	**C67**
ICD-9	**188**
ICD-10	**C67**


民國107年，膀胱惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.93%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.05%。發生率的排名於男性為第11位、女性為第16位；死亡率的排行於男性為第11位、女性為第13位。民國107年初次診斷為膀胱惡性腫瘤者共計2,239人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64–C68)個案數的41.31%；當年死因為膀胱惡性腫瘤者共計1,001人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,568	671
年齡中位數	70	74
粗率(每10萬人口)	13.39	5.65
年齡標準化率[2](每10萬人口)	6.91	2.48
年齡標準化率[3](每10萬人口)	8.09	2.96
性別比(年齡標準化率[3])	2.73	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	659	342
年齡中位數	79	80
粗率(每10萬人口)	5.63	2.88
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.61	1.09
年齡標準化率[3](每10萬人口)	3.21	1.37
性別比(年齡標準化率[3])	2.34	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,239位膀胱惡性腫瘤個案之診斷依據，經細胞學或組織病理證實者為2,213位，證實率為98.84%，男性證實率為98.98%，女性為98.51%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之94.77%，女性個案之92.70%。

民國107男、女性膀胱原位癌個案分別為795位和285位，詳見本年報第140、141頁。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	1,486	94.77	1,483	99.80	622	92.70	620	99.68
腺癌	23	1.47	23	100.00	15	2.24	14	93.33
鱗狀細胞癌	4	0.26	4	100.00	6	0.89	6	100.00
神經內分泌癌	21	1.34	21	100.00	8	1.19	8	100.00
其他特定上皮癌	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-
非特定上皮癌	19	1.21	15	78.95	13	1.94	10	76.92
惡性肉瘤	1	0.06	1	100.00	1	0.15	1	100.00
其他惡性腫瘤	14	0.89	5	35.71	6	0.89	2	33.33
惡性淋巴瘤 [1]	1		1	100.00	6		6	100.00
總計 [2]	1,568	100.00	1,552	98.98	671	100.00	661	98.51

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

2,239位膀胱惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占89.28%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	1,420	90.56	579	86.29	1,999	89.28
TURBT	1,112	70.92	447	66.62	1,559	69.63
放射線治療	158	10.08	70	10.43	228	10.18
全身性化學治療	305	19.45	124	18.48	429	19.16
局部性化學治療***	754	48.09	251	37.41	1,005	44.89
全身性免疫治療	61	3.89	19	2.83	80	3.57
局部性免疫治療****	127	8.10	48	7.15	175	7.82
緩和照護	104	6.63	58	8.64	162	7.24
其他治療	1	0.06	0	0.00	1	0.04
未有首次治療申報紀錄	87	5.55	62	9.24	149	6.65

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注化療藥物。

局部性免疫治療****：膀胱灌注BCG。

腎

ICD-O-FT	**T-189.0**
ICD-O-3	**C64**
ICD-9	**189.0**
ICD-10	**C64**


民國107年，腎惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.27%，當年因此死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.31%。發生率的排名於男性為第15位、女性為第17位；死亡率的排行於男性為第14位、女性為第17位。民國107年初次診斷為腎惡性腫瘤者共計1,437人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64 - C68)個案數的27.18%；當年死因為腎惡性腫瘤者共計640人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,005	468
年齡中位數	60	61
粗率(每10萬人口)	8.58	3.94
年齡標準化率[2](每10萬人口)	5.33	2.40
年齡標準化率[3](每10萬人口)	5.80	2.60
性別比(年齡標準化率[3])	2.23	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	379	261
年齡中位數	71	75
粗率(每10萬人口)	3.24	2.20
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.70	0.96
年齡標準化率[3](每10萬人口)	2.00	1.15
性別比(年齡標準化率[3])	1.74	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,437位腎惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,392位，證實率為94.50%，其中男性證實率為95.32%，女性證實率為92.74%。

男、女性患者的組織形態分布，均以腎細胞癌最多，分別占男性個案之96.22%，女性個案之90.81%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腎細胞癌	967	96.22	939	97.10	425	90.81	404	95.06
亮細胞腺癌	611	60.80	610	99.84	253	54.06	251	99.21
乳突狀腎細胞癌	99	9.85	99	100.00	24	5.13	24	100.00
嫌色性腎細胞癌	65	6.47	65	100.00	55	11.75	55	100.00
其他與非特定腎細胞癌	192	19.10	165	85.94	93	19.87	74	79.57
腎母細胞瘤	3	0.30	3	100.00	6	1.28	6	100.00
其他特定上皮癌	5	0.50	4	80.00	10	2.14	10	100.00
非特定上皮癌	6	0.60	5	83.33	8	1.71	7	87.50
惡性肉瘤	4	0.40	4	100.00	6	1.28	6	100.00
其他惡性腫瘤	20	1.99	3	15.00	13	2.78	1	7.69
惡性淋巴瘤 [1]	3		3	100.00	5		5	100.00
總計 [2]	1,005	100.00	958	95.32	468	100.00	434	92.74

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,437位腎惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占81.40%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	820	81.59	379	80.98	1,199	81.40
放射線治療	30	2.99	17	3.63	47	3.19
化學治療	31	3.08	15	3.21	46	3.12
免疫治療	32	3.18	9	1.92	41	2.78
標靶治療	125	12.44	37	7.91	162	11.00
緩和照護	66	6.57	33	7.05	99	6.72
其他治療	2	0.20	0	0.00	2	0.14
未有首次治療申報紀錄	68	6.77	50	10.68	118	8.01

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腎盂及其他泌尿器官

ICD-O-FT	**T-189.1 - T-189.9**
ICD-O-3	**C65 - C66，C68**
ICD-9	**189.1-189.9**
ICD-10	**C65 - C66，C68**


民國107年，腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的1.47%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.23%。發生率的排名於男性為第17位、女性為第14位；死亡率的排行於男性為第15位、女性為第14位。民國107年初次診斷為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計1,708人，占泌尿器官(ICD-O-3 C64 - C68)個案數的31.51%；當年死因為腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤者共計598人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	750	958
年齡中位數	70	73
粗率(每10萬人口)	6.40	8.07
年齡標準化率[2](每10萬人口)	3.41	3.59
年齡標準化率[3](每10萬人口)	3.98	4.25
性別比(年齡標準化率[3])	0.94	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	289	309
年齡中位數	76	78
粗率(每10萬人口)	2.47	2.60
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.20	1.06
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.48	1.29
性別比(年齡標準化率[3])	1.15	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,708位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,643位，證實率為96.19%，男性證實率為97.20%，女性為95.41%。

男、女性患者的組織形態分布，均以泌尿上皮癌最多，分別占男性個案之93.33%，女性個案之93.84%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮癌	700	93.33	683	97.57	899	93.84	866	96.33
鱗狀細胞癌	12	1.60	12	100.00	7	0.73	7	100.00
腺癌	11	1.47	11	100.00	12	1.25	12	100.00
其他特定上皮癌	7	0.93	7	100.00	10	1.04	10	100.00
非特定上皮癌	9	1.20	9	100.00	15	1.57	14	93.33
惡性黑色素瘤	0	0.00	0	0.00	1	0.10	1	100.00
惡性肉瘤	1	0.13	1	100.00	2	0.21	2	100.00
其他惡性腫瘤	10	1.33	6	60.00	12	1.25	2	16.67
惡性淋巴瘤 [1]	.		.	.	1		1	100.00
總計 [2]	750	100.00	729	97.20	958	100.00	914	95.41

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

1,708位腎盂及其他泌尿器官惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占68.91%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	518	69.07	659	68.79	1,177	68.91
放射線治療	58	7.73	79	8.25	137	8.02
化學治療	260	34.67	291	30.38	551	32.26
荷爾蒙治療	1	0.13	1	0.10	2	0.12
免疫治療	38	5.07	50	5.22	88	5.15
標靶治療	5	0.67	1	0.10	6	0.35
緩和照護	89	11.87	119	12.42	208	12.18
未有首次治療申報紀錄	110	14.67	129	13.47	239	13.99

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

眼及淚腺

ICD-O-FT	**T-190**
ICD-O-3	**C69**
ICD-9	**190**
ICD-10	**C69**


民國107年，眼及淚腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.05%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.01%。發生率的排名於男性為第35位、女性為第34位；死亡率的排名於男性為第38位、女性為第36位。民國107年初次診斷為眼及淚腺惡性腫瘤者共計54人；當年死因為眼及淚腺惡性腫瘤者共計7人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	23	31
年齡中位數	58	51
粗率(每10萬人口)	0.20	0.26
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.27	0.30
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.23	0.27
性別比(年齡標準化率)	0.85	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	3	4
年齡中位數	75	40
粗率(每10萬人口)	0.03	0.03
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.01	0.04
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.02	0.04
性別比(年齡標準化率)	0.50	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

54位眼及淚腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為43位，證實率為79.63%，男性證實率為69.57%，女性為87.10%。

男、女性患者的組織形態分布，男性以視網膜母細胞瘤最多，占男性個案之39.13%，女性以惡性黑色素瘤最多，占女性個案之35.48%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
視網膜母細胞瘤	9	39.13	6	66.67	6	19.35	5	83.33
惡性黑色素瘤	4	17.39	1	25.00	11	35.48	9	81.82
鱗狀細胞癌	4	17.39	4	100.00	5	16.13	5	100.00
淚腺癌	1	4.35	1	100.00	5	16.13	5	100.00
其他特定上皮癌	1	4.35	1	100.00	1	3.23	1	100.00
非特定上皮癌	3	13.04	3	100.00	1	3.23	1	100.00
惡性肉瘤	1	4.35	0	0.00	1	3.23	1	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	.	0.00	1	3.23	.	.
惡性淋巴瘤 [1]	35		34	97.14	29		28	96.55
總計 [2]	23	100.00	16	69.57	31	100.00	27	87.10

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

54位眼及淚腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占70.37%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	18	78.26	20	64.52	38	70.37
放射線治療	7	30.43	12	38.71	19	35.19
化學治療	8	34.78	10	32.26	18	33.33
免疫治療	1	4.35	0	0.00	1	1.85
緩和照護	1	4.35	0	0.00	1	1.85
未有首次治療申報紀錄	2	8.70	4	12.90	6	11.11

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦

ICD-O-FT	**T-191**
ICD-O-3	**C71**
ICD-9	**191**
ICD-10	**C71**


民國107年，腦部惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.62%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的1.25%。發生率的排名於男性為第19位、女性為第20位；死亡率的排名於男性為第13位、女性為第12位。民國107年初次診斷為腦部惡性腫瘤者共計719人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71 – C72)個案數的90.21%；當年死因為腦部惡性腫瘤者共計612人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	407	312
年齡中位數	58	54
粗率(每10萬人口)	3.47	2.63
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.75	2.13
年齡標準化率[3](每10萬人口)	2.85	2.21
性別比(年齡標準化率)	1.29	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	333	279
年齡中位數	63	65
粗率(每10萬人口)	2.84	2.35
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.00	1.43
年齡標準化率[3](每10萬人口)	2.13	1.57
性別比(年齡標準化率)	1.36	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

719位腦部惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為624位，證實率為86.79%，男性證實率為86.98%，女性為86.54%。

男、女性患者的組織形態分布，均以神經膠母細胞瘤最多，分別占男性個案之51.60%，女性個案之46.79%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
瀰漫性星形細胞瘤	31	7.62	29	93.55	24	7.69	21	87.50
退行性星形細胞瘤	41	10.07	41	100.00	18	5.77	18	100.00
神經膠母細胞瘤	210	51.60	198	94.29	146	46.79	137	93.84
其他特定之星形細胞瘤	9	2.21	6	66.67	9	2.88	8	88.89
寡樹突膠質細胞瘤	24	5.90	24	100.00	30	9.62	30	100.00
室管膜瘤	13	3.19	12	92.31	8	2.56	8	100.00
非特定之神經膠質瘤	13	3.19	10	76.92	25	8.01	11	44.00
胚胎性瘤	11	2.70	11	100.00	15	4.81	15	100.00
神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤	2	0.49	1	50.00	5	1.60	5	100.00
生殖細胞瘤	18	4.42	11	61.11	9	2.88	8	88.89
脈絡叢癌	1	0.25	1	100.00	0	0.00	0	0.00
惡性肉瘤	9	2.21	8	88.89	8	2.56	8	100.00
其他特定之惡性瘤	0	0.00	0	0.00	1	0.32	1	100.00
其他惡性腫瘤	25	6.14	2	8.00	14	4.49	0	0.00
惡性淋巴瘤 [1]	42		40	95.24	41		40	97.56
總計 [2]	407	100.00	354	86.98	312	100.00	270	86.54

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

719位腦部惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占76.36%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	315	77.40	234	75.00	549	76.36
放射線治療	255	62.65	210	67.31	465	64.67
化學治療	234	57.49	172	55.13	406	56.47
免疫治療	1	0.25	0	0.00	1	0.14
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	1	0.25	1	0.32	2	0.28
標靶治療	8	1.97	8	2.56	16	2.23
緩和照護	41	10.07	40	12.82	81	11.27
其他治療	4	0.98	0	0.00	4	0.56
未有首次治療申報紀錄	32	7.86	19	6.09	51	7.09

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位


ICD-O-FT　T-192
ICD-O-3　C70，C72
ICD-9　192
ICD-10　C70，C72

民國107年，腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.07%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.04%。發生率的排名於男性為第34位、女性為第34位；死亡率的排名於男性為第36位、女性為第35位。民國107年初次診斷為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計78人，占中樞神經系統(ICD-O-3 C71 – C72)個案數的9.79%；當年死因為腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤者共計20人。


項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	40	38
年齡中位數	55	54
粗率(每10萬人口)	0.34	0.32
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.26	0.27
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.29	0.27
性別比(年齡標準化率)	1.07	1

項　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	8	12
年齡中位數	66	68
粗率(每10萬人口)	0.07	0.10
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.05	0.05
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.05	0.06
性別比(年齡標準化率)	0.83	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

78位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為72位，證實率為92.31%，男性證實率為85.00%，女性為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性腦膜瘤最多，分別占男性個案之50.00%，女性個案之42.11%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原始性神經外胚層腫瘤	0	0.00	0	0.00	3	7.89	3	100.00
星形細胞瘤	5	12.50	5	100.00	4	10.53	4	100.00
室管膜瘤	9	22.50	9	100.00	11	28.95	11	100.00
惡性腦膜瘤	20	50.00	14	70.00	16	42.11	16	100.00
惡性神經鞘瘤	2	5.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
生殖細胞瘤	1	2.50	1	100.00	0	0.00	0	0.00
惡性肉瘤	2	5.00	2	100.00	2	5.26	2	100.00
其他惡性腫瘤	1	2.50	1	100.00	2	5.26	2	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	4		4	100.00	3		2	66.67
總計 [2]	40	100.00	34	85.00	38	100.00	38	100.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

78位腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占79.49%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	30	75.00	32	84.21	62	79.49
放射線治療	17	42.50	16	42.11	33	42.31
化學治療	5	12.50	4	10.53	9	11.54
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	0	0.00	1	2.63	1	1.28
標靶治療	1	2.50	0	0.00	1	1.28
緩和照護	3	7.50	1	2.63	4	5.13
未有首次治療申報紀錄	5	12.50	3	7.89	8	10.26

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

甲狀腺

ICD-O-FT	**T-193**
ICD-O-3	**C73**
ICD-9	**193**
ICD-10	**C73**


民國107年，甲狀腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.83%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.39%。發生率的排名於男性為第13位、女性為第4位；死亡率的排名於男性為第26位、女性為第22位。民國107年初次診斷為甲狀腺惡性腫瘤者共計4,445人；當年死因為甲狀腺惡性腫瘤者共計192人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,143	3,302
年齡中位數	50	50
粗率(每10萬人口)	9.76	27.80
年齡標準化率[2](每10萬人口)	6.80	19.38
年齡標準化率[3](每10萬人口)	7.40	21.01
性別比(年齡標準化率)	0.35	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	73	119
年齡中位數	72	76
粗率(每10萬人口)	0.62	1.00
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.32	0.42
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.38	0.52
性別比(年齡標準化率)	0.73	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

4,445位甲狀腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,427位，證實率為99.60%，男性證實率為99.56%，女性為99.61%。

男、女性患者的組織形態分布，均以乳頭狀癌最多，分別占男性個案之89.15%、女性個案之92.07%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
乳頭狀癌	1,019	89.15	1,017	99.80	3,040	92.07	3,039	99.97
濾泡性癌	67	5.86	67	100.00	167	5.06	167	100.00
髓質癌	14	1.22	14	100.00	24	0.73	24	100.00
未分化癌	13	1.14	13	100.00	25	0.76	25	100.00
其他特定上皮癌	15	1.31	15	100.00	17	0.51	17	100.00
非特定上皮癌	7	0.61	7	100.00	11	0.33	10	90.91
惡性肉瘤	1	0.09	1	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	7	0.61	4	57.14	18	0.55	7	38.89
惡性淋巴瘤 [1]	8		8	100.00	10		10	100.00
總計 [2]	1,143	100.00	1,138	99.56	3,302	100.00	3,289	99.61

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

4,445位甲狀腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占95.84%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1,069	93.53	3,191	96.64	4,260	95.84
放射線治療	564	49.34	1,657	50.18	2,221	49.97
化學治療	11	0.96	17	0.51	28	0.63
荷爾蒙治療	830	72.62	2,536	76.80	3,366	75.73
免疫治療	1	0.09	1	0.03	2	0.04
標靶治療	7	0.61	7	0.21	14	0.31
緩和照護	15	1.31	21	0.64	36	0.81
其他治療	0	0.00	1	0.03	1	0.02
未有首次治療申報紀錄	40	3.50	76	2.30	116	2.61

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

其他內分泌腺

ICD-O-FT	**T-194**
ICD-O-3	**C74 - C75**
ICD-9	**194**
ICD-10	**C74 - C75**


民國107年，其他內分泌腺惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.15%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.10%。發生率的排名於男性為第29位、女性為第30位；死亡率的排名於男性為第31位、女性為第30位。民國107年初次診斷為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計171人；當年死因為其他內分泌腺惡性腫瘤者共計47人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	80	91
年齡中位數	36	51
粗率(每10萬人口)	0.68	0.77
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.78	0.68
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.74	0.67
性別比(年齡標準化率)	1.10	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	23	24
年齡中位數	64	64
粗率(每10萬人口)	0.20	0.20
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.16	0.16
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.17	0.17
性別比(年齡標準化率)	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

171位其他內分泌腺惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為163位，證實率為95.32%，男性證實率為92.50%，女性為97.80%。

男、女性患者的組織形態分布，均以惡性嗜鉻細胞瘤最多，分別占男性個案之31.25%，女性個案之52.75%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
神經母細胞瘤	8	10.00	8	100.00	7	7.69	7	100.00
腎上腺皮質癌	9	11.25	9	100.00	21	23.08	20	95.24
惡性嗜鉻細胞瘤	25	31.25	25	100.00	48	52.75	47	97.92
其他特定上皮癌	4	5.00	4	100.00	3	3.30	3	100.00
非特定上皮癌	5	6.25	4	80.00	4	4.40	4	100.00
惡性肉瘤	0	0.00	0	0.00	1	1.10	1	100.00
生殖細胞瘤	21	26.25	17	80.95	2	2.20	2	100.00
其他惡性腫瘤	8	10.00	7	87.50	5	5.49	5	100.00
惡性淋巴瘤 [1]	0		-	-	0		-	-
總計 [2]	80	100.00	74	92.50	91	100.00	89	97.80

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

171位其他內分泌腺惡性腫瘤個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占 78.36%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	58	72.50	76	83.52	134	78.36
放射線治療	26	32.50	16	17.58	42	24.56
化學治療	30	37.50	22	24.18	52	30.41
免疫治療	1	1.25	1	1.10	2	1.17
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	3	3.75	1	1.10	4	2.34
標靶治療	0	0.00	1	1.10	1	0.58
緩和照護	7	8.75	9	9.89	16	9.36
未有首次治療申報紀錄	4	5.00	6	6.59	10	5.85

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

不明原發部位

ICD-O-FT	**T-199**
ICD-O-3	**C80**
ICD-9	**199**
ICD-10	**C80**


民國107年，不明原發部位惡性腫瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.55%，當年因此惡性腫瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.76%。民國107年初次診斷為不明原發部位惡性腫瘤者共計643人；當年死因為不明原發部位惡性腫瘤者共計372人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	354	289
年齡中位數	67	76
粗率(每10萬人口)	3.02	2.43
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.65	1.04
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.87	1.24
性別比(年齡標準化率)	1.51	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	216	156
年齡中位數	67	75
粗率(每10萬人口)	1.84	1.31
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.01	0.59
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.14	0.70
性別比(年齡標準化率)	1.63	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

643位不明原發部位惡性腫瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為484位，證實率為75.27%，男性證實率為78.81%，女性為70.93%。

男、女性患者的組織形態分布，男性以非特定上皮癌最多，占男性個案之25.99%，女性以腺癌最多，占女性個案之29.76%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
腺癌	76	21.47	76	100.00	86	29.76	86	100.00
鱗狀細胞癌	52	14.69	52	100.00	18	6.23	18	100.00
未分化癌	2	0.56	2	100.00	1	0.35	1	100.00
小細胞癌	14	3.95	14	100.00	5	1.73	5	100.00
其他特定上皮癌	42	11.86	41	97.62	23	7.96	23	100.00
非特定上皮癌	92	25.99	77	83.70	63	21.80	56	88.89
惡性肉瘤	4	1.13	4	100.00	6	2.08	6	100.00
惡性黑色素瘤	2	0.56	2	100.00	0	0.00	0	0.00
其他惡性腫瘤	70	19.77	11	15.71	87	30.10	10	11.49
惡性淋巴瘤 [1]	23		23	100.00	20		20	100.00
總計 [2]	354	100.00	279	78.81	289	100.00	205	70.93

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 個案數的總計不包含惡性淋巴瘤個案數。

首次療程

643位不明原發部位惡性腫瘤個案接受治療之情形，在去除緩和照護及未申報有治療紀錄下，以化學治療者最多，占23.48%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	11	3.11	5	1.73	16	2.49
放射線治療	78	22.03	23	7.96	101	15.71
化學治療	101	28.53	50	17.30	151	23.48
荷爾蒙治療	1	0.28	3	1.04	4	0.62
免疫治療	3	0.85	1	0.35	4	0.62
標靶治療	8	2.26	12	4.15	20	3.11
緩和照護	132	37.29	96	33.22	228	35.46
未有首次治療申報紀錄	138	38.98	143	49.48	281	43.70

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

白血病


ICD-O-FT 見p.496附錄五
ICD-O-3 見p.496附錄五
ICD-9 204-208
ICD-10 C91 - C95

民國107年，白血病發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.20%，當年因白血病死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.25%。發生率的排名於男性為第9位、女性為第11位；死亡率的排名於男性為第9位、女性為第9位。民國107年初次診斷為白血病者共計2,550人；當年死因為白血病者共計1,096人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,455	1,095
年齡中位數	62	62
粗率(每10萬人口)	12.42	9.22
年齡標準化率[2](每10萬人口)	9.06	6.47
年齡標準化率[3](每10萬人口)	9.63	6.73
性別比(年齡標準化率)	1.43	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	636	460
年齡中位數	67	68
粗率(每10萬人口)	5.43	3.87
年齡標準化率[2](每10萬人口)	3.43	2.13
年齡標準化率[3](每10萬人口)	3.82	2.37
性別比(年齡標準化率)	1.61	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,550位白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,439位，證實率為95.65%，男性證實率為95.67%，女性為95.62%。

男、女性患者的組織形態分布，均以急性骨髓性白血病最多，分別占男性個案之32.99%，女性個案之34.61%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	480	32.99	477	99.38	379	34.61	375	98.94
急性淋巴性白血病	164	11.27	161	98.17	136	12.42	135	99.26
慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性	148	10.17	144	97.3	105	9.59	101	96.19
慢性淋巴性白血病	130	8.93	124	95.38	76	6.94	75	98.68
分化不明之急性白血病	7	0.48	7	100	14	1.28	13	92.86
骨髓增生性腫瘤	306	21.03	266	86.93	245	22.37	214	87.35
骨髓分化不良症候群	218	14.98	212	97.25	140	12.79	134	95.71
其他白血病	1	0.07	1	100	0	0.00	-	-
白血病，無法歸類	1	0.07	0	0	0	0.00	-	-
總計	1,455	100.00	1,392	95.67	1,095	100.00	1,047	95.62

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,550位白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占66.20%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.07	0	0.00	1	0.04
放射線治療	22	1.51	11	1.00	33	1.29
化學治療	955	65.64	733	66.94	1,688	66.20
類固醇治療	174	11.96	110	10.05	284	11.14
免疫治療	5	0.34	2	0.18	7	0.27
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	113	7.77	74	6.76	187	7.33
標靶治療	239	16.43	174	15.89	413	16.20
緩和照護	187	12.85	144	13.15	331	12.98
其他治療	146	10.03	120	10.96	266	10.43
未有首次治療申報紀錄	245	16.84	191	17.44	436	17.10

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性淋巴性白血病

ICD-O-FT **見 p.496 附錄五**


ICD-O-3 **見 p.496 附錄五**

民國 107 年，初次診斷為急性淋巴性白血病者共計 300 人，占白血病發生個案數的 11.76%。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	164	136
年齡中位數	21	34
粗率(每10萬人口)	1.40	1.15
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.07	1.68
年齡標準化率 [3](每10萬人口)	1.87	1.46
性別比(年齡標準化率)	1.28	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

300位急性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為296位，證實率為98.67%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性淋巴性白血病	164	100.00	161	98.17	136	100.00	135	99.26

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

300 位急性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占91.00%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	1	0.61	0	0.00	1	0.33
放射線治療	8	4.88	7	5.15	15	5.00
化學治療	152	92.68	121	88.97	273	91.00
類固醇治療	128	78.05	93	68.38	221	73.67
免疫治療	1	0.61	0	0.00	1	0.33
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	25	15.24	21	15.44	46	15.33
標靶治療	28	17.07	26	19.12	54	18.00
緩和照護	18	10.98	8	5.88	26	8.67
未有首次治療申報紀錄	6	3.66	10	7.35	16	5.33

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

慢性淋巴性白血病

ICD-O-FT **見 p.496 附錄五**


ICD-O-3 **見 p.496 附錄五**

民國 107 年，初次診斷為慢性淋巴性白血病者共計 206 人，占白血病發生個案數的 8.08%。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	130	76
年齡中位數	66	66
粗率(每10萬人口)	1.11	0.64
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.61	0.33
年齡標準化率 [3](每10萬人口)	0.69	0.37
性別比(年齡標準化率)	1.86	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

206 位慢性淋巴性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 199 位，證實率為 96.60%，男性證實率為 95.38%，女性為 98.68%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性淋巴性白血病	130	100.00	124	95.38	76	100.00	75	98.68

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

206 位慢性淋巴性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 45.15%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	3	2.31	0	0.00	3	1.46
化學治療	63	48.46	30	39.47	93	45.15
類固醇治療	36	27.69	10	13.16	46	22.33
標靶治療	29	22.31	16	21.05	45	21.84
緩和照護	16	12.31	7	9.21	23	11.17
其他治療	1	0.77	0	0.00	1	0.49
未有首次治療申報紀錄	53	40.77	40	52.63	93	45.15

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

急性骨髓性白血病

ICD-O-FT　見 p.496 附錄五


ICD-O-3　見 p.496 附錄五

民國 107 年，初次診斷為急性骨髓性白血病者共計 859 人，占白血病發生個案數的 33.69%。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	480	379
年齡中位數	63	63
粗率(每10萬人口)	4.10	3.19
年齡標準化率[2](每10萬人口)	2.83	2.02
年齡標準化率 [3](每10萬人口)	3.06	2.18
性別比(年齡標準化率)	1.40	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

859 位急性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 852 位，證實率為 99.19%，男性證實率為 99.38%，女性為 98.94%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
急性骨髓性白血病	480	100.00	477	99.38	379	100.00	375	98.94

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

859 位急性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占 78.58%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
放射線治療	10	2.08	2	0.53	12	1.40
化學治療	370	77.08	305	80.47	675	78.58
類固醇治療	3	0.63	3	0.79	6	0.70
免疫治療	3	0.63	1	0.26	4	0.47
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	70	14.58	44	11.61	114	13.27
標靶治療	17	3.54	18	4.75	35	4.07
緩和照護	72	15.00	68	17.94	140	16.30
其他治療	31	6.46	29	7.65	60	6.98
未有首次治療申報紀錄	68	14.17	50	13.19	118	13.74

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。


慢性骨髓性白血病

ICD-O-FT　　見 p.496 附錄五
ICD-O-3　　見 p.496 附錄五

民國 107 年，初次診斷為慢性骨髓性白血病(僅包含 BCR-ABL1 陽性)者共計 253 人，占白血病發生個案數的 9.92%。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	148	105
年齡中位數	51	51
粗率(每10萬人口)	1.26	0.88
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.93	0.61
年齡標準化率 [3](每10萬人口)	1.01	0.67
性別比(年齡標準化率)	1.51	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

253 位慢性骨髓性白血病個案中，經細胞學或組織病理證實者為 245 位，證實率為 96.84%，男性證實率為 97.30%，女性為 96.19%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
慢性骨髓性白血病	148	100.00	144	97.30	105	100.00	101	96.19

註：1. 慢性骨髓性白血病僅包含BCR-ABL1陽性。

2. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

253 位慢性骨髓性白血病個案接受治療之情形，以標靶治療者最多，占 96.05%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
化學治療	73	49.32	56	53.33	129	50.99
類固醇治療	1	0.68	0	0.00	1	0.40
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	2	1.35	1	0.95	3	1.19
標靶治療	142	95.95	101	96.19	243	96.05
緩和照護	9	6.08	3	2.86	12	4.74
其他治療	1	0.68	0	0.00	1	0.40
未有首次治療申報紀錄	5	3.38	3	2.86	8	3.16

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

淋巴結惡性淋巴瘤

ICD-O-FT　T-196　M-CODE見p.496附錄五


ICD-O-3　C77　M-CODE見p.496附錄五

民國107年，初次診斷為淋巴結惡性淋巴瘤者共計1,795人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	991	804
年齡中位數	63	63
粗率(每10萬人口)	8.46	6.77
年齡標準化率[2](每10萬人口)	5.44	3.94
年齡標準化率[3](每10萬人口)	6.00	4.38
性別比(年齡標準化率)	1.37	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,795位淋巴結惡性淋巴瘤個案之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,784位，證實率為99.39%，男性證實率為99.50%，女性為99.13%。其中221位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為221位，證實率為100.00%；1,508位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,508位，證實率為100.00%。

1,795位淋巴結惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之83.96%，女性個案之83.98%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	124	12.51	124	100.00	97	12.05	97	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	832	83.96	832	100.00	676	83.98	676	100.00
漿細胞瘤	0	0.00	-	-	1	0.12	1	100.00
組織細胞與樹突狀細胞瘤	1	0.10	1	100.00	1	0.12	1	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	34	3.43	29	85.29	30	3.73	23	76.67
總計	991	100.00	986	99.50	805	100.00	798	99.13

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

1,795 位淋巴結惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占78.29%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	22	2.22	15	1.86	37	2.06
放射線治療	112	11.30	78	9.69	190	10.58
化學治療	775	78.20	631	78.39	1,406	78.29
類固醇治療	649	65.49	507	62.98	1,156	64.37
免疫治療	9	0.91	4	0.50	13	0.72
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	30	3.03	19	2.36	49	2.73
標靶治療	527	53.18	452	56.15	979	54.51
緩和照護	100	10.09	87	10.81	187	10.41
其他治療	0	0.00	4	0.50	4	0.22
未有首次治療申報紀錄	143	14.43	112	13.91	255	14.20

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

淋巴結外惡性淋巴瘤


ICD-O-FT　T-140 - T-199 (T-196除外)　M-CODE見p.496附錄五

ICD-O-3　C00 - C80 (C77除外)　M-CODE見p.496附錄五

民國107年，初次診斷為淋巴結外惡性淋巴瘤者共計1,287人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	708	579
年齡中位數	63	64
粗率(每10萬人口)	6.04	4.88
年齡標準化率[2](每10萬人口)	3.76	2.90
年齡標準化率[3](每10萬人口)	4.14	3.18
性別比(年齡標準化率)	1.30	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,287位淋巴結外惡性淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,279位，證實率為99.38%，男性證實率為99.44%，女性為99.31%。其中16位何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為16位，證實率為100.00%；1,217位非何杰金氏淋巴瘤患者之診斷依據，經細胞學、血液學或組織病理證實者為1,215位，證實率為99.84%，男性證實率為99.85%，女性為99.81%。

1,287位淋巴結外惡性淋巴瘤患者的組織形態分佈，男、女性患者均以非何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之96.05%，女性個案之92.75 %。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
何杰金氏淋巴瘤	6	0.85	6	100.00	10	1.73	10	100.00
非何杰金氏淋巴瘤	680	96.05	679	99.85	537	92.75	536	99.81
組織細胞與樹突狀細胞瘤	7	0.99	7	100.00	15	2.59	15	100.00
惡性淋巴瘤，無法歸類	15	2.12	12	80.00	17	2.94	14	82.35
總計	708	100.00	704	99.44	579	100.00	575	99.31

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

1,287 位淋巴結外惡性淋巴瘤個案接受治療之情形，以荷爾蒙治療者最多，占 62.87%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	117	10.89	92	10.50	209	10.72
放射線治療	204	18.99	165	18.84	369	18.92
化學治療	644	59.96	502	57.31	1,146	58.77
類固醇治療	673	62.66	553	63.13	1,226	62.87
免疫治療	254	23.65	223	25.46	477	24.46
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	85	7.91	60	6.85	145	7.44
標靶治療	628	58.47	490	55.94	1,118	57.33
緩和照護	111	10.34	116	13.24	227	11.64
其他治療	34	3.17	29	3.31	63	3.23
未有首次治療申報紀錄	113	10.52	110	12.56	223	11.44

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

惡性淋巴瘤(ICD-O-3　M-CODE請見p.496附錄五)
申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國107年

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏淋巴瘤	非何杰金氏淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴增生性疾病與無法歸類之惡性淋巴瘤	總計
C77	淋巴結	221	1,508	1	66	1,796
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外）	0	1	0	0	1
C01-C02	舌	1	12	0	1	14
C03	主唾液腺	0	34	0	0	34
C05-C06	齒齦	0	3	0	0	3
C04	口底	0	1	0	0	1
C09-C10	口腔之其他及未詳細說明部位	0	6	0	1	7
C12-C13	口咽	1	85	0	2	88
C14	鼻咽	2	22	0	1	25
C11	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位	0	7	1	0	8
C16	胃	0	182	0	1	183
C17	小腸	1	54	0	0	55
C18	結腸	0	34	0	0	34
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	0	8	0	0	8
C22	肝及肝內膽管	0	12	0	1	13
C23-C24	膽囊及肝外膽管	0	2	0	0	2
C25	胰	0	3	0	1	4
C48	後腹膜腔及腹膜	0	13	0	0	13
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位	0	3	0	0	3
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳	0	67	2	0	69
C32	喉	0	3	1	0	4
C33-C34	肺、支氣管及氣管	1	45	0	2	48

惡性淋巴瘤(ICD-O-3　M-CODE請見p.496附錄五)
申報發生人數按原發部位及細胞形態分類，民國107年（續完）

ICD-O-3	原發部位別	何杰金氏淋巴瘤	非何杰金氏淋巴瘤	漿細胞瘤	其他淋巴增生性疾病與無法歸類之惡性淋巴瘤	總計
C38.4	胸膜	0	8	0	1	9
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈	9	73	0	1	83
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）	0	123	641	14	778
C40-C41	骨、關節與關節軟骨	0	21	16	4	41
C47, C49	結締組織皮下組織	0	27	1	4	32
C44	皮膚	0	106	1	4	111
C50	女性乳房	0	18	0	0	18
C53	子宮頸	0	1	0	0	1
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	0	1	0	0	1
C61	攝護腺	0	2	0	0	2
C62	睪丸	0	24	0	0	24
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官	0	1	0	0	1
C67	膀胱	0	7	0	0	7
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	1	8	0	0	9
C69	眼及淚腺	0	60	0	4	64
C71	腦	0	76	0	7	83
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位	0	6	0	1	7
C73	甲狀腺	0	18	0	0	18
C76	其他分界不明的部位	0	1	0	0	1
C80	不明原發部位	0	39	0	4	43
C00-C80	總計	237	2,725	664	120	3,746

何杰金氏淋巴瘤

ICD-O-FT	**見p.496附錄五**
ICD-O-3	**見p.496附錄五**
ICD-9	**201**
ICD-10	**C81**


民國107年，何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.20%，當年因何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.02%。發生率的排名於男性為第26位、女性為第26位；死亡率的排名於男性為第37位。民國107年初次診斷為何杰金氏淋巴瘤者共計237人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的6.33%；當年死因為何杰金氏淋巴瘤者共計8人。

項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	130	107
年齡中位數	31	32
粗率(每10萬人口)	1.11	0.90
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.11	0.89
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.13	0.94
性別比(年齡標準化率)	1.20	1


項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	8	-
年齡中位數	72	-
粗率(每10萬人口)	0.07	-
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.03	-
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.04	-
性別比(年齡標準化率)	-	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

237位何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為237位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以小節硬化性何杰金氏淋巴瘤最多，分別占男性個案之54.62%，女性個案之64.49%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
富淋巴球性何杰金氏淋巴瘤	4	3.08	4	100	7	6.54	7	100
淋巴球缺血性何杰金氏淋巴瘤	2	1.54	2	100	3	2.8	3	100
混合細胞性何杰金氏淋巴瘤	18	13.85	18	100	11	10.28	11	100
小節硬化性何杰金氏淋巴瘤	71	54.62	71	100	69	64.49	69	100
非特定何杰金氏淋巴瘤	35	26.92	35	100	17	15.89	17	100
總計	130	100	130	100	107	100	107	100

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

237位何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占93.67%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	3	2.31	2	1.87	5	2.11
放射線治療	35	26.92	34	31.78	69	29.11
化學治療	122	93.85	100	93.46	222	93.67
類固醇治療	44	33.85	29	27.10	73	30.80
免疫治療	2	1.54	0	0.00	2	0.84
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	2	1.54	3	2.80	5	2.11
標靶治療	4	3.08	3	2.80	7	2.95
緩和照護	1	0.77	2	1.87	3	1.27
其他治療	0	0.00	1	0.93	1	0.42
未有首次治療申報紀錄	5	3.85	5	4.67	10	4.22

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

非何杰金氏淋巴瘤


ICD-O-FT 見p.496附錄五
ICD-O-3 見p.496附錄五
ICD-9 200，202-203
ICD-10 C82 - C85

民國107年，非何杰金氏淋巴瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的2.35%，當年因非何杰金氏淋巴瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的2.41%。發生率的排名於男性為第10位、女性為第12位；死亡率的排名於男性為第10位、女性為第10位。民國107年初次診斷為非何杰金氏淋巴瘤者共計2,725人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE 請見p.496附錄五)個案數的72.74%；當年死因為非何杰金氏淋巴瘤者共計1,175人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	1,512	1,213
年齡中位數	64	65
粗率(每10萬人口)	12.91	10.21
年齡標準化率[2](每10萬人口)	7.74	5.58
年齡標準化率[3](每10萬人口)	8.64	6.25
性別比(年齡標準化率)	1.38	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	697	478
年齡中位數	71	76
粗率(每10萬人口)	5.95	4.02
年齡標準化率[2](每10萬人口)	3.21	1.77
年齡標準化率[3](每10萬人口)	3.75	2.11
性別比(年齡標準化率)	1.78	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,725位非何杰金氏淋巴瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,723位，證實率為99.93%，男性證實率為99.93%，女性為99.92%。

男、女性患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，均以B細胞淋巴樣瘤最多，分別占男性個案之83.93%，女性個案之88.29%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
B 細胞淋巴瘤	1,269	83.93	1,268	99.92	1,071	88.29	1,071	100.00
T/NK 細胞淋巴瘤	243	16.07	243	100.00	142	11.71	141	99.30
總計	1,512	100.00	1,511	99.93	1,213	100.00	1,212	99.92

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

2,725位非何杰金氏淋巴瘤個案接受治療之情形，以化學治療者最多，占72.18%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	127	8.40	92	7.58	219	8.04
放射線治療	228	15.08	158	13.03	386	14.17
化學治療	1,096	72.49	871	71.81	1,967	72.18
類固醇治療	982	64.95	768	63.31	1,750	64.22
免疫治療	7	0.46	5	0.41	12	0.44
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	46	3.04	24	1.98	70	2.57
標靶治療	867	57.34	702	57.87	1,569	57.58
緩和照護	142	9.39	123	10.14	265	9.72
其他治療	34	2.25	32	2.64	66	2.42
未有首次治療申報紀錄	205	13.56	180	14.84	385	14.13

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

漿細胞瘤


ICD-O-FT　　M-973
ICD-O-3　　M-97313 – M-97343
ICD-10　　C90

民國107年，漿細胞瘤發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的0.57%，當年因漿細胞瘤死亡人數占全部惡性腫瘤死亡人數的0.92%。發生率的排名於男性為第23位、女性為第23位；死亡率的排名於男性為第17位、女性為第18位。民國107年初次經顯微鏡檢診斷為漿細胞瘤者共計664人，占惡性淋巴瘤(ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五)個案數的17.73%；當年死因為漿細胞瘤者共計450人。


項　　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	366	298
年齡中位數	67	68
粗率(每10萬人口)	3.12	2.51
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.73	1.25
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.98	1.43
性別比(年齡標準化率)	1.38	1

項　　目	死亡個案	
	男性	女性
個案數(人)	248	202
年齡中位數	73	74
粗率(每10萬人口)	2.12	1.70
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.07	0.75
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.26	0.89
性別比(年齡標準化率)	1.42	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年



年齡別死亡率，民國107年

診斷依據與組織形態

664位漿細胞瘤個案中，經細胞學或組織病理證實者為635位，證實率為95.63%，男性證實率為96.72%，女性為94.30%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
漿細胞瘤	366	100.00	354	96.72	298	100.00	281	94.30

註：自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤（ICD-O-3 M-CODE請見p.496附錄五）從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

首次療程

664位漿細胞瘤個案接受治療之情形，以類固醇治療者最多，占78.01%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	5	1.37	0	0.00	5	0.75
放射線治療	47	12.84	47	15.77	94	14.16
化學治療	173	47.27	132	44.30	305	45.93
類固醇治療	274	74.86	244	81.88	518	78.01
免疫治療	252	68.85	222	74.50	474	71.39
骨髓/幹細胞移植或內分泌治療	67	18.31	52	17.45	119	17.92
標靶治療	271	74.04	224	75.17	495	74.55
緩和照護	62	16.94	67	22.48	129	19.43
未有首次治療申報紀錄	24	6.56	21	7.05	45	6.78

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

民國 107 年

原位癌發生率

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
C00-C14[1]	口腔、口咽及下咽	男 Male	111	0	0	0	0	0
		女 Female	17	0	0	0	0	0
		計 Total	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C11	鼻咽	男 Male	1	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0	0
		計 Total	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C15	食道	男 Male	147	0	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0	0
		計 Total	**154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C16	胃	男 Male	63	0	0	0	0	0
		女 Female	38	0	0	0	0	0
		計 Total	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C17	小腸	男 Male	2	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C18-C21[2]	結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門	男 Male	2,926	0	0	0	0	0
		女 Female	1,679	0	0	0	0	0
		計 Total	**4,605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C22	肝及肝內膽管	男 Male	1	0	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0	0
		計 Total	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C23-C24	膽囊及肝外膽管	男 Male	17	0	0	0	0	0
		女 Female	15	0	0	0	0	0
		計 Total	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C25	胰	男 Male	5	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0	0
		計 Total	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C30	鼻腔、副竇、中耳與內耳	男 Male	3	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0	0
		計 Total	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C32	喉	男 Male	39	0	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0	0
		計 Total	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C33-C34	肺、支氣管及氣管	男 Male	183	0	0	0	0	0
		女 Female	495	0	0	0	0	0
		計 Total	**678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

註：1. C00-C14：口腔、口咽及下咽原發部位代碼包含C00-C06、C09-C10、C12-C14，個案數包含High grade dysplasia

2. C18-C21：結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門個案數包含High grade dysplasia

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
0	0	2	2	10	16	17	21	17	12	8	3	3	0	C00-C14[1]
0	0	0	1	2	0	1	3	3	1	3	3	0	0	
0	**0**	**2**	**3**	**12**	**16**	**18**	**24**	**20**	**13**	**11**	**6**	**3**	**0**	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	C11
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	
0	0	0	1	8	16	28	37	27	18	5	3	2	2	C15
0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	1	0	
0	**0**	**0**	**1**	**11**	**16**	**30**	**37**	**27**	**18**	**5**	**4**	**3**	**2**	
0	0	0	0	0	2	5	7	6	7	7	9	7	13	C16
0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	6	12	5	4	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**8**	**10**	**9**	**9**	**13**	**21**	**12**	**17**	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	C17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	
4	1	9	56	70	170	316	445	577	543	286	198	140	111	C18-C21[2]
2	1	8	35	50	84	213	201	258	279	215	118	129	86	
6	**2**	**17**	**91**	**120**	**254**	**529**	**646**	**835**	**822**	**501**	**316**	**269**	**197**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	C22
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	
0	0	0	0	2	1	2	0	1	1	3	3	4	0	C23-C24
0	0	0	0	0	0	3	4	2	2	2	2	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**5**	**4**	**3**	**3**	**5**	**5**	**4**	**0**	
0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	C25
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	C30
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0	0	0	0	2	1	2	4	11	10	1	7	1	0	C32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	
0	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**2**	**4**	**11**	**11**	**1**	**8**	**2**	**0**	
0	5	3	10	11	22	27	30	27	32	9	5	2	0	C33-C34
1	0	8	11	40	67	92	93	69	73	19	13	7	2	
1	**5**	**11**	**21**	**51**	**89**	**119**	**123**	**96**	**105**	**28**	**18**	**9**	**2**	

台灣原位癌申報人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
C44	皮膚	男 Male	234	0	0	0	0	0
		女 Female	227	0	0	0	0	0
		計 Total	**461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C50	女性乳房	女 Female	2,771	0	0	0	0	1
C50	男性乳房	男 Male	6	0	0	0	0	0
C53	子宮頸	女 Female	2,889	0	0	0	0	0
C54	子宮體	女 Female	147	0	0	0	0	0
C56	卵巢、輸卵管及寬韌帶	女 Female	30	0	0	0	0	0
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官	女 Female	79	0	0	0	0	0
C61	攝護腺	男 Male	35	0	0	0	0	0
C62	睪丸	男 Male	0	0	0	0	0	0
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官	男 Male	17	0	0	0	0	0
C67[3]	膀胱	男 Male	795	0	0	0	0	0
		女 Female	285	0	0	0	0	0
		計 Total	**1,080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C64-C66, C68	腎、腎盂及其他泌尿器官	男 Male	131	0	0	0	0	0
		女 Female	163	0	0	0	0	0
		計 Total	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C69	眼及淚腺	男 Male	9	0	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0	0
		計 Total	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	總計	男 Male	4,726	0	0	0	0	0
		女 Female	8,864	0	0	0	0	1
		計 Total	**13,590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

註：3. C67： 膀胱癌個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
0	1	2	0	0	3	14	14	22	30	33	37	35	43	C44
0	1	0	5	6	5	4	15	20	25	26	37	39	44	
0	**2**	**2**	**5**	**6**	**8**	**18**	**29**	**42**	**55**	**59**	**74**	**74**	**87**	
14	18	44	89	268	592	473	412	352	319	89	65	21	14	C50
0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	1	C50
35	173	474	531	437	314	254	210	164	168	68	30	20	11	C53
1	9	11	16	30	29	32	12	2	3	0	1	0	1	C54
1	1	4	3	1	3	5	1	7	2	0	1	1	0	C56
3	1	2	0	2	3	7	10	16	11	9	4	8	3	C51-C52, C57.7-C57.9
0	0	0	0	0	1	0	0	5	7	7	8	5	2	C61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C62
0	1	0	0	3	0	0	1	3	3	2	1	1	2	C60,C63
0	5	3	8	17	32	44	87	120	144	92	96	79	68	C67[3]
0	0	4	4	2	7	13	25	43	57	33	44	38	15	
0	**5**	**7**	**12**	**19**	**39**	**57**	**112**	**163**	**201**	**125**	**140**	**117**	**83**	
0	0	1	1	3	2	5	7	21	18	17	29	15	12	C64-C66, C68
0	0	0	2	2	1	5	10	22	30	27	30	22	12	
0	**0**	**1**	**3**	**5**	**3**	**10**	**17**	**43**	**48**	**44**	**59**	**37**	**24**	
0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	2	1	C69
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**1**	**2**	**0**	**2**	**3**	**2**	
4	14	22	78	127	269	462	658	840	826	471	402	298	255	總計
57	204	555	698	844	1,107	1,108	1,002	962	974	500	364	293	195	
61	**218**	**577**	**776**	**971**	**1,376**	**1,570**	**1,660**	**1,802**	**1,800**	**971**	**766**	**591**	**450**	

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門，原位癌

ICD-O-FT　T-153，T-154

ICD-O-3　C18 - C21

民國107年，結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌發生個案數共計4,605人，每10萬人口粗發生率為19.52，每10萬人口年齡標準化發生率為11.09。其中男性發生個案數為2,926人，每10萬人口粗率為24.98，每10萬人口年齡標準化發生率為15.80；女性發生個案數為1,679人，每10萬人口粗率為14.14，每10萬人口年齡標準化發生率為8.32。


項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	2,926	1,679
年齡中位數	63	64
粗率(每10萬人口)	24.98	14.14
年齡標準化率[2](每10萬人口)	14.53	7.56
年齡標準化率[3](每10萬人口)	15.80	8.32
性別比(年齡標準化率[3])	1.90	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。

5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

4,605位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為4,605位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之98.67%，女性個案之98.69%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
原位腺癌	2,887	98.67	2,887	100.00	1,657	98.69	1,657	100.00
其他特定原位上皮癌	1	0.03	1	100.00	1	0.06	1	100.00
非特定原位上皮癌	38	1.30	38	100.00	21	1.25	21	100.00
總計	2,926	100.00	2,926	100.00	1,679	100.00	1,679	100.00

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia

首次療程

4,605位結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.07%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	2,731	93.34	1,555	92.61	4,286	93.07
放射線治療	1	0.03	0	0.00	1	0.02
化學治療	1	0.03	1	0.06	2	0.04
緩和照護	3	0.10	2	0.12	5	0.11
未有首次治療申報紀錄	192	6.56	122	7.27	314	6.82


申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

肺、支氣管及氣管，原位癌　ICD-O-FT　T-162
ICD-O-3　C33 – C34

民國107年，肺、支氣管及氣管原位癌發生個案數共計678人，每10萬人口粗發生率為2.87，每10萬人口年齡標準化發生率[3]為1.90。其中男性發生個案數為183人，每10萬人口粗率為1.56，每10萬人口年齡標準化發生率為1.07；女性發生個案數為495人，每10萬人口粗率為4.17，每10萬人口年齡標準化發生率為2.70。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	183	495
年齡中位數	56	56
粗率(每10萬人口)	1.56	4.17
年齡標準化率[2](每10萬人口)	1.00	2.53
年齡標準化率[3](每10萬人口)	1.07	2.70
性別比(年齡標準化率[3])	0.40	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

678位肺、支氣管及氣管原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為678位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以原位腺癌最多，分別占男性個案之98.91%，女性個案之100.00%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2	1.09	2	100.00	0	0.00	-	-
原位腺癌	181	98.91	181	100.00	495	100.00	495	100.00
總計	183	100.00	183	100.00	495	100.00	495	100.00

首次療程

678位肺、支氣管及氣管原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占98.97%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	180	98.36	491	99.19	671	98.97
未有首次治療申報紀錄	3	1.64	4	0.81	7	1.03


申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

乳房，原位癌　　ICD-O-FT　T-174，T-175
ICD-O-3　C50

民國107年，女性及男性乳房原位癌發生個案數分別為2,771人及6人，其中女性乳房原位癌每10萬人口粗率為23.33，每10萬人口年齡標準化率為15.77。男性乳房原位癌每10萬人口粗率為0.05，每10萬人口年齡標準化率為0.03。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	6	2,771
年齡中位數	66.5	53
粗率(每10萬人口)	0.05	23.33
年齡標準化率[2](每10萬人口)	0.03	14.89
年齡標準化率[3](每10萬人口)	0.03	15.77
性別比(年齡標準化率[3])	1	525.67

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 乳房原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,771位女性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,771位，證實率為100.00%；6位男性乳房原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為6位，證實率為100.00%。

男、女性患者的組織形態分布，均以管道內癌最多，分別占男性個案之66.67%，女性個案之90.29%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
管道內癌	4	66.67	4	100.00	2,502	90.29	2,502	100.00
小葉原位癌	0	0.00	-	-	86	3.10	86	100.00
乳頭狀原位癌	2	33.33	2	100.00	167	6.03	167	100.00
其他特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	10	0.36	10	100.00
非特定原位上皮癌	0	0.00	-	-	5	0.18	5	100.00
其他惡性腫瘤	0	0.00	-	-	1	0.04	1	100.00
總計	6	100.00	6	100.00	2,771	100.00	2,771	100.00

首次療程

2,771位乳房原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占93.88%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療	5	83.33	2,602	93.90	2,607	93.88
放射線治療	2	33.33	1,457	52.58	1,459	52.54
化學治療**	0	0.00	6	0.22	6	0.22
內分泌治療	4	66.67	1,822	65.75	1,826	65.75
緩和照護	0	0.00	2	0.07	2	0.07
其他治療	0	0.00	1	0.04	1	0.04
未有首次治療申報紀錄	1	16.67	101	3.64	102	3.67

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。


化學治療**：6例女性乳房原位癌個案中，5例進行輔助性化療(Adjuvant therapy)及1例進行前導性化療(Neoadjuvant therapy)。

子宮頸，原位癌　　ICD-O-FT　T-180
ICD-O-3　C53

民國107年，子宮頸原位癌發生個案數共計2,889人，每10萬人口粗發生率為24.43，每10萬人口年齡標準化發生率為19.98。

項　目	發生個案
	女性
個案數(人)	2,889
年齡中位數	42
粗率(每10萬人口)	24.43
年齡標準化率[1](每10萬人口)	17.86
年齡標準化率[2](每10萬人口)	19.98

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。
2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 子宮頸原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

2,889位子宮頸原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為2,889位，證實率為100.00%。

原位癌患者經細胞學或組織病理證實的組織形態分布，以鱗狀細胞原位癌最多，占子宮頸惡性腫瘤原位癌個案之94.36%。

組織形態	女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
鱗狀細胞原位癌	2,726	94.36	2,726	100.00
原位腺癌	88	3.05	88	100.00
其他原位上皮癌	75	2.60	75	100.00
總計	2,889	100.00	2,889	100.00

首次療程

2,889位子宮頸原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多，占92.66%。

申報治療方式*	女性	
	治療人數	百分比
手術治療	2,677	92.66
放射線治療	3	0.10
緩和照護	3	0.10
未有首次治療申報紀錄	205	7.10

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

膀胱，原位癌

ICD-O-FT T-188

ICD-O-3 C67


民國107年，膀胱原位癌發生個案數共計1,080人，每10萬人口粗發生率為4.58，每10萬人口年齡標準化發生率為2.69。其中男性發生個案數為795人，每10萬人口粗率為6.79，每10萬人口年齡標準化發生率為4.23；女性發生個案數為285人，每10萬人口粗率為2.40，每10萬人口年齡標準化發生率為1.33。

項　目	發生個案	
	男性	女性
個案數(人)	795	285
年齡中位數	68	68
粗率(每10萬人口)	6.79	2.40
年齡標準化率[2](每10萬人口)	3.72	1.16
年齡標準化率[3](每10萬人口)	4.23	1.33
性別比(年齡標準化率)	3.18	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 膀胱原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2，個案數為僅有原位癌之人數，不包含侵襲癌同時合併原位癌個案。



年齡別發生率，民國107年

診斷依據與組織形態

1,080位膀胱原位癌個案中，經細胞學或組織病理證實者為1,080位，證實率為100.00%。

男、女性癌患者的組織形態分布，均以非侵襲性乳突狀癌最多，分別占男性個案之92.83%，女性個案之89.82%。

組織形態	男性				女性			
	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比	個案數	各形態百分比	細胞或病理證實數	細胞或病理證實百分比
泌尿上皮原位癌	54	6.79	54	100.00	27	9.47	27	100.00
非侵襲性乳突狀癌	738	92.83	738	100.00	256	89.82	256	100.00
原位腺癌	1	0.13	1	100.00	1	0.35	1	100.00
非特定原位上皮癌	2	0.25	2	100.00	1	0.35	1	100.00
總計	795	100.00	795	100.00	285	100.00	285	100.00

首次療程

1,080位膀胱原位癌個案接受治療之情形，以手術治療者最多占95.56%。

申報治療方式*	男性		女性		總計	
	治療人數	百分比	治療人數	百分比	治療人數	百分比
手術治療**	756	95.09	276	96.84	1,032	95.56
TURBT	721	90.69	255	89.47	976	90.37
放射線治療	1	0.13	2	0.70	3	0.28
全身性化學治療	2	0.25	2	0.70	4	0.37
局部性化學治療***	518	65.16	189	66.32	707	65.46
全身性免疫治療	2	0.25	0	0.00	2	0.19
局部性免疫治療	75	9.43	32	11.23	107	9.91
緩和照護	4	0.50	0	0.00	4	0.37
未有首次治療申報紀錄	30	3.77	7	2.46	37	3.43

申報治療方式*：每名個案所接受之治療方式均分別計數。

手術治療**：包含Radical cystectomy, partial cystectomy 與 TURBT。

局部性化學治療***：膀胱灌注。

民國 107 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
C00-C80	**全癌症（總計）** **ALL SITES**	男 Male	61,779	23	73	72	65	127
		女 Female	54,352	20	67	44	46	124
		計 Total	**116,131**	**43**	**140**	**116**	**111**	**251**
C00-C14	**唇、口腔及咽** **LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX**	男 Male	8,717	0	1	0	2	7
		女 Female	1,290	0	1	1	1	1
		計 Total	**10,007**	**0**	**2**	**1**	**3**	**8**
C00-C14[2]	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	7,400	0	1	0	0	0
		女 Female	770	0	0	1	0	1
		計 Total	**8,170**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	口腔[3] ORAL CAVITY	男 Male	4,755	0	1	0	0	0
		女 Female	589	0	0	1	0	1
		計 Total	**5,344**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	口咽[3] OROPHARYNX	男 Male	1,478	0	0	0	0	0
		女 Female	139	0	0	0	0	0
		計 Total	**1,617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	下咽[3] HYPOPRAYNX	男 Male	1,167	0	0	0	0	0
		女 Female	42	0	0	0	0	0
		計 Total	**1,209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP（excludes skin of lip C44.0）	男 Male	256	0	0	0	0	0
		女 Female	31	0	0	0	0	1
		計 Total	**287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	1,897	0	1	0	0	0
		女 Female	338	0	0	0	0	0
		計 Total	**2,235**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
C03	齒齦 GUM	男 Male	721	0	0	0	0	0
		女 Female	100	0	0	0	0	0
		計 Total	**821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	229	0	0	0	0	0
		女 Female	21	0	0	0	0	0
		計 Total	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	2,305	0	0	0	0	0
		女 Female	143	0	0	1	0	0
		計 Total	**2,448**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	819	0	0	0	0	0
		女 Female	94	0	0	0	0	0
		計 Total	**913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

3. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
244	360	561	1,234	2,098	3,561	5,389	7,422	9,019	9,293	6,462	6,479	4,753	4,544	**C00-C80**
227	451	1,003	2,143	3,138	4,657	5,696	6,605	7,081	6,645	4,337	4,600	3,868	3,600	
471	**811**	**1,564**	**3,377**	**5,236**	**8,218**	**11,085**	**14,027**	**16,100**	**15,938**	**10,799**	**11,079**	**8,621**	**8,144**	
19	33	101	338	685	1,112	1,423	1,588	1,360	978	443	332	177	118	**C00-C14**
7	20	36	66	99	108	157	201	174	145	79	80	64	50	
26	**53**	**137**	**404**	**784**	**1,220**	**1,580**	**1,789**	**1,534**	**1,123**	**522**	**412**	**241**	**168**	
4	7	55	219	534	946	1,226	1,419	1,185	874	387	288	153	102	C00-C142
2	7	9	18	34	53	83	118	114	117	58	61	52	42	
6	**14**	**64**	**237**	**568**	**999**	**1,309**	**1,537**	**1,299**	**991**	**445**	**349**	**205**	**144**	
3	6	49	179	382	633	746	879	739	552	234	182	90	80	
2	7	7	14	26	33	63	77	82	92	49	54	47	34	
5	**13**	**56**	**193**	**408**	**666**	**809**	**956**	**821**	**644**	**283**	**236**	**137**	**114**	
1	1	6	20	99	176	280	305	240	167	78	59	40	6	
0	0	2	3	6	18	15	28	27	21	7	2	5	5	
1	**1**	**8**	**23**	**105**	**194**	**295**	**333**	**267**	**188**	**85**	**61**	**45**	**11**	
0	0	0	20	53	137	200	235	206	155	75	47	23	16	
0	0	0	1	2	2	5	13	5	4	2	5	0	3	
0	**0**	**0**	**21**	**55**	**139**	**205**	**248**	**211**	**159**	**77**	**52**	**23**	**19**	
0	1	3	8	18	29	40	52	40	24	22	11	4	4	C00
0	1	0	0	1	0	1	1	3	5	6	6	4	2	
0	**2**	**3**	**8**	**19**	**29**	**41**	**53**	**43**	**29**	**28**	**17**	**8**	**6**	
2	3	21	85	156	253	337	348	299	197	96	51	29	19	C01-C02
1	4	7	9	18	26	37	56	59	45	25	22	16	13	
3	**7**	**28**	**94**	**174**	**279**	**374**	**404**	**358**	**242**	**121**	**73**	**45**	**32**	
0	0	4	14	39	62	98	134	124	114	44	42	25	21	C03
0	1	0	1	3	2	11	11	7	19	10	15	12	8	
0	**1**	**4**	**15**	**42**	**64**	**109**	**145**	**131**	**133**	**54**	**57**	**37**	**29**	
0	0	1	3	10	38	48	46	40	21	8	5	5	4	C04
0	1	0	0	0	2	5	4	4	0	1	0	1	3	
0	**1**	**1**	**3**	**10**	**40**	**53**	**50**	**44**	**21**	**9**	**5**	**6**	**7**	
2	2	24	80	194	326	355	441	334	265	105	99	43	35	C05-C06
1	0	1	6	5	9	14	14	17	29	9	13	15	9	
3	**2**	**25**	**86**	**199**	**335**	**369**	**455**	**351**	**294**	**114**	**112**	**58**	**44**	
0	1	2	9	64	100	148	163	139	98	36	32	24	3	C09-C10
0	0	1	1	5	12	10	19	18	15	5	0	4	4	
0	**1**	**3**	**10**	**69**	**112**	**158**	**182**	**157**	**113**	**41**	**32**	**28**	**7**	

表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1–4	5–9	10–14	15–19
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	1,159	0	0	0	0	0
		女 Female	42	0	0	0	0	0
		計 Total	**1,201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	14	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0	0
		計 Total	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	195	0	0	0	1	2
		女 Female	152	0	1	0	1	0
		計 Total	**347**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,122	0	0	0	1	5
		女 Female	368	0	0	0	0	0
		計 Total	**1,490**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**
C15-C26, C48	**消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM**	男 Male	24,663	3	5	1	1	9
		女 Female	14,401	7	4	0	2	14
		計 Total	**39,064**	**10**	**9**	**1**	**3**	**23**
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	2,579	0	0	0	0	0
		女 Female	199	0	0	0	0	0
		計 Total	**2,778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C16	胃 STOMACH	男 Male	2,334	0	0	0	0	1
		女 Female	1,464	0	0	0	0	1
		計 Total	**3,798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	246	0	0	0	0	1
		女 Female	175	0	0	0	0	1
		計 Total	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	9,512	0	0	0	0	1
		女 Female	7,013	0	0	0	1	8
		計 Total	**16,525**	**0**	**0**	**0**	**1**	**9**
C18	結腸 COLON	男 Male	5,788	0	0	0	0	1
		女 Female	4,761	0	0	0	1	8
		計 Total	**10,549**	**0**	**0**	**0**	**1**	**9**
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	3,724	0	0	0	0	0
		女 Female	2,252	0	0	0	0	0
		計 Total	**5,976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
0	0	0	19	53	136	198	235	205	155	74	47	22	15	C12-C13
0	0	0	1	2	2	5	13	5	4	2	5	0	3	
0	**0**	**0**	**20**	**55**	**138**	**203**	**248**	**210**	**159**	**76**	**52**	**22**	**18**	
0	0	0	1	0	2	2	0	4	0	2	1	1	1	C14
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	
5	9	8	10	16	12	18	22	32	24	9	10	7	10	C07-C08
2	4	7	14	11	13	18	32	21	7	7	8	2	4	
7	**13**	**15**	**24**	**27**	**25**	**36**	**54**	**53**	**31**	**16**	**18**	**9**	**14**	
10	17	38	109	135	154	179	147	143	80	47	34	17	6	C11
3	9	20	34	54	42	56	51	39	21	14	11	10	4	
13	**26**	**58**	**143**	**189**	**196**	**235**	**198**	**182**	**101**	**61**	**45**	**27**	**10**	
24	58	132	325	709	1,361	2,289	3,213	3,930	3,884	2,508	2,459	1,881	1,871	**C15-C26,**
21	24	79	214	423	622	957	1,338	1,821	2,040	1,569	1,842	1,727	1,697	**C48**
45	**82**	**211**	**539**	**1,132**	**1,983**	**3,246**	**4,551**	**5,751**	**5,924**	**4,077**	**4,301**	**3,608**	**3,568**	
1	2	3	24	126	254	427	533	452	322	170	129	62	74	C15
1	0	0	1	9	9	15	36	42	24	24	10	8	20	
2	**2**	**3**	**25**	**135**	**263**	**442**	**569**	**494**	**346**	**194**	**139**	**70**	**94**	
1	4	9	24	35	85	145	247	384	323	269	254	238	315	C16
2	1	7	28	44	60	80	128	192	205	140	191	189	196	
3	**5**	**16**	**52**	**79**	**145**	**225**	**375**	**576**	**528**	**409**	**445**	**427**	**511**	
0	1	3	9	14	13	19	30	31	40	27	17	17	24	C17
0	1	1	5	10	14	16	21	23	18	17	18	16	14	
0	**2**	**4**	**14**	**24**	**27**	**35**	**51**	**54**	**58**	**44**	**35**	**33**	**38**	
20	26	75	153	292	503	757	1,069	1,463	1,507	958	1,025	827	836	C18-C21
9	11	56	132	275	406	603	714	847	915	641	761	800	834	
29	**37**	**131**	**285**	**567**	**909**	**1,360**	**1,783**	**2,310**	**2,422**	**1,599**	**1,786**	**1,627**	**1,670**	
12	14	34	78	150	276	405	626	865	908	618	664	545	592	C18
4	6	27	84	174	248	385	438	568	650	446	534	579	609	
16	**20**	**61**	**162**	**324**	**524**	**790**	**1,064**	**1,433**	**1,558**	**1,064**	**1,198**	**1,124**	**1,201**	
8	12	41	75	142	227	352	443	598	599	340	361	282	244	C19-C21
5	5	29	48	101	158	218	276	279	265	195	227	221	225	
13	**17**	**70**	**123**	**243**	**385**	**570**	**719**	**877**	**864**	**535**	**588**	**503**	**469**	

表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1|4	5|9	10|14	15|19
C22	肝及肝內膽管	男 Male	7,819	0	3	0	1	3
	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	女 Female	3,523	4	2	0	0	2
		計 Total	**11,342**	**4**	**5**	**0**	**1**	**5**
C23-C24	膽囊及肝外膽管	男 Male	580	0	0	0	0	0
	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE	女 Female	549	0	0	0	0	0
	DUCTS	**計 Total**	**1,129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C25	胰	男 Male	1,481	0	0	0	0	2
	PANCREAS	女 Female	1,269	0	0	0	1	2
		計 Total	**2,750**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**
C48	後腹膜腔及腹膜	男 Male	103	3	2	1	0	1
	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	女 Female	195	3	2	0	0	0
		計 Total	**298**	**6**	**4**	**1**	**0**	**1**
C26	消化器官之其他部位及與腹膜間分界不明部位	男 Male	9	0	0	0	0	0
		女 Female	14	0	0	0	0	0
	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	**計 Total**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C30-C39	**呼吸系統及胸腔內器官**	男 Male	9,739	1	1	0	2	8
	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC	女 Female	7,300	0	2	0	1	4
	ORGANS	**計 Total**	**17,039**	**1**	**3**	**0**	**3**	**12**
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳	男 Male	159	0	0	0	0	0
	NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES,	女 Female	68	0	0	0	0	1
	MIDDLE EAR AND INNER EAR	**計 Total**	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
C32	喉	男 Male	757	0	0	0	0	0
	LARYNX	女 Female	38	0	0	0	0	0
		計 Total	**795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C33-C34	肺、支氣管及氣管	男 Male	8,424	0	1	0	0	1
	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	女 Female	6,921	0	0	0	0	2
		計 Total	**15,345**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**
C38.4	胸膜	男 Male	68	0	0	0	0	0
	PLEURA	女 Female	24	0	0	0	0	0
		計 Total	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C37-C38.3,	胸腺、心臟及縱膈	男 Male	331	1	0	0	2	7
C38.8	THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	女 Female	249	0	2	0	1	1
		計 Total	**580**	**1**	**2**	**0**	**3**	**8**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
1	20	29	90	206	421	790	1,085	1,301	1,293	842	767	547	420	C22
3	4	3	22	38	70	127	253	437	582	500	586	496	394	
4	**24**	**32**	**112**	**244**	**491**	**917**	**1,338**	**1,738**	**1,875**	**1,342**	**1,353**	**1,043**	**814**	
0	0	1	2	6	14	38	51	62	109	70	94	65	68	C23-C24
0	0	1	4	13	12	28	39	71	86	69	83	60	83	
0	**0**	**2**	**6**	**19**	**26**	**66**	**90**	**133**	**195**	**139**	**177**	**125**	**151**	
0	3	7	17	24	67	105	191	223	277	158	164	118	125	C25
5	7	8	14	27	40	66	125	175	185	153	169	144	148	
5	**10**	**15**	**31**	**51**	**107**	**171**	**316**	**398**	**462**	**311**	**333**	**262**	**273**	
1	2	5	5	5	4	7	7	14	12	13	9	5	7	C48
1	0	2	8	7	11	20	22	32	24	22	21	13	7	
2	**2**	**7**	**13**	**12**	**15**	**27**	**29**	**46**	**36**	**35**	**30**	**18**	**14**	
0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	2	2	C26
0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	3	3	1	1	
0	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**3**	**0**	**2**	**2**	**4**	**3**	**3**	**3**	
16	21	36	139	230	424	765	1,139	1,457	1,562	1,150	1,169	844	775	C30-C39
3	20	53	151	231	382	672	932	1,147	1,151	773	742	594	442	
19	**41**	**89**	**290**	**461**	**806**	**1,437**	**2,071**	**2,604**	**2,713**	**1,923**	**1,911**	**1,438**	**1,217**	
0	1	2	13	8	18	20	21	25	16	11	10	8	6	C30-C31
1	0	1	7	7	6	5	6	5	7	9	6	3	4	
1	**1**	**3**	**20**	**15**	**24**	**25**	**27**	**30**	**23**	**20**	**16**	**11**	**10**	
0	0	1	5	26	55	79	125	141	126	73	61	37	28	C32
0	0	0	2	3	0	5	8	6	3	4	5	1	1	
0	**0**	**1**	**7**	**29**	**55**	**84**	**133**	**147**	**129**	**77**	**66**	**38**	**29**	
3	11	23	93	178	318	614	954	1,240	1,364	1,032	1,075	785	732	C33-C34
0	10	47	124	207	356	638	877	1,097	1,101	735	715	578	434	
3	**21**	**70**	**217**	**385**	**674**	**1,252**	**1,831**	**2,337**	**2,465**	**1,767**	**1,790**	**1,363**	**1,166**	
0	0	0	1	0	0	2	11	5	24	8	11	5	1	C38.4
0	0	0	2	0	0	1	3	7	2	2	3	2	2	
0	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**14**	**12**	**26**	**10**	**14**	**7**	**3**	
13	9	10	27	18	33	50	28	46	32	26	12	9	8	C37-38.3,
2	10	5	16	14	20	23	38	32	38	23	13	10	1	C38.8
15	**19**	**15**	**43**	**32**	**53**	**73**	**66**	**78**	**70**	**49**	**25**	**19**	**9**	

表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1–4	5–9	10–14	15–19
C42[4]	**白血病 LEUKEMIA**	男 Male	1,455	4	32	37	20	28
		女 Female	1,095	2	37	16	9	14
		計 Total	**2,550**	**6**	**69**	**53**	**29**	**42**
C40-C41	**骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE**	男 Male	95	0	1	3	10	5
		女 Female	64	0	1	2	5	7
		計 Total	**159**	**0**	**2**	**5**	**15**	**12**
C47, C49	**結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES**	男 Male	362	2	2	3	3	7
		女 Female	270	3	1	1	1	10
		計 Total	**632**	**5**	**3**	**4**	**4**	**17**
C44	**皮膚 SKIN**	男 Male	2,153	0	1	0	1	1
		女 Female	1,896	0	0	0	0	0
		計 Total	**4,049**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
C44[5]	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	145	0	0	0	0	0
		女 Female	134	0	0	0	0	0
		計 Total	**279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	2,008	0	1	0	1	1
		女 Female	1,762	0	0	0	0	0
		計 Total	**3,770**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
C50	**女性乳房 FEMALE BREAST**	女 Female	14,217	0	0	0	0	1
C50	**男性乳房 MALE BREAST**	男 Male	60	0	0	0	0	0
C51-C58	**女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS**	女 Female	5,961	0	0	3	7	17
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	6	0	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 白血病：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3　C44，　M-87203 - M-87903。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
36	31	36	52	52	97	112	118	143	166	125	150	112	104	**C42[4]**
19	13	34	50	56	71	83	94	120	127	97	89	86	78	
55	**44**	**70**	**102**	**108**	**168**	**195**	**212**	**263**	**293**	**222**	**239**	**198**	**182**	
5	4	4	7	5	4	12	5	10	8	6	4	2	0	**C40-C41**
4	0	3	2	5	7	0	11	3	8	0	1	1	4	
9	**4**	**7**	**9**	**10**	**11**	**12**	**16**	**13**	**16**	**6**	**5**	**3**	**4**	
13	13	13	18	24	28	34	28	35	40	25	29	24	21	**C47, C49**
4	10	7	23	17	12	24	34	28	31	19	18	12	15	
17	**23**	**20**	**41**	**41**	**40**	**58**	**62**	**63**	**71**	**44**	**47**	**36**	**36**	
3	11	7	27	40	65	97	168	188	277	222	315	325	405	**C44**
1	4	15	19	43	41	76	116	160	214	192	305	270	440	
4	**15**	**22**	**46**	**83**	**106**	**173**	**284**	**348**	**491**	**414**	**620**	**595**	**845**	
0	2	1	2	6	5	10	16	18	18	11	19	16	21	C44[5]
0	1	3	1	7	7	5	13	9	15	17	19	18	19	
0	**3**	**4**	**3**	**13**	**12**	**15**	**29**	**27**	**33**	**28**	**38**	**34**	**40**	
3	9	6	25	34	60	87	152	170	259	211	296	309	384	C44
1	3	12	18	36	34	71	103	151	199	175	286	252	421	
4	**12**	**18**	**43**	**70**	**94**	**158**	**255**	**321**	**458**	**386**	**582**	**561**	**805**	
16	80	290	775	1,348	2,111	2,044	2,059	1,983	1,526	718	628	395	243	**C50**
0	0	0	1	0	6	3	5	12	7	7	6	8	5	**C50**
29	80	180	376	448	688	906	958	788	571	306	243	183	178	**C51-C58**
0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	C55

表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1|4	5|9	10|14	15|19
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,433	0	0	0	0	0
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	2,787	0	0	0	0	1
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,557	0	0	3	7	16
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	178	0	0	0	0	0
C60-C63	**男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS**	男 Male	7,037	1	3	1	0	12
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	6,644	0	0	0	0	0
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	277	1	3	1	0	12
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	116	0	0	0	0	0
C64-C68	**泌尿器官 URINARY TRACT**	男 Male	3,323	2	2	0	0	0
		女 Female	2,097	2	3	1	1	2
		計 Total	**5,420**	**4**	**5**	**1**	**1**	**2**
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,568	0	0	0	0	0
		女 Female	671	0	0	0	0	0
		計 Total	**2,239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C64	腎 KIDNEY	男 Male	1,005	2	2	0	0	0
		女 Female	468	2	3	1	1	2
		計 Total	**1,473**	**4**	**5**	**1**	**1**	**2**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
1	26	52	128	125	129	155	152	170	146	79	88	84	98	C53
5	19	63	133	203	378	470	563	385	278	132	82	43	32	C54
21	34	64	107	112	171	264	224	207	129	80	52	41	25	C56, C57.0-C57.4
2	1	1	8	7	9	16	18	24	18	15	21	15	23	C51-C52, C57.7-C57.9
43	59	62	42	34	40	105	342	829	1,376	1,264	1,261	840	723	**C60-C63**
0	0	0	0	8	23	91	328	806	1,354	1,253	1,247	826	708	C61
42	59	61	42	23	15	7	3	4	1	1	1	1	0	C62
1	0	1	0	3	2	7	11	19	21	10	13	13	15	C60,C63
2	12	27	71	82	133	202	343	508	496	390	439	305	309	**C64-C68**
2	5	18	28	34	65	96	174	239	312	271	313	300	231	
4	**17**	**45**	**99**	**116**	**198**	**298**	**517**	**747**	**808**	**661**	**752**	**605**	**540**	
0	2	2	12	13	31	61	140	252	223	187	243	191	211	C67
0	0	5	5	6	8	30	49	72	99	75	101	118	103	
0	**2**	**7**	**17**	**19**	**39**	**91**	**189**	**324**	**322**	**262**	**344**	**309**	**314**	
2	7	25	52	58	90	100	133	157	146	97	69	31	34	C64
2	5	11	21	26	41	46	64	56	59	50	33	28	17	
4	**12**	**36**	**73**	**84**	**131**	**146**	**197**	**213**	**205**	**147**	**102**	**59**	**51**	

表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1|4	5|9	10|14	15|19
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	417	0	0	0	0	0
		女 Female	547	0	0	0	0	0
		計 Total	**964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C66	輸尿管 URETER	男 Male	295	0	0	0	0	0
		女 Female	379	0	0	0	0	0
		計 Total	**674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	23	0	0	0	0	0
		女 Female	22	0	0	0	0	0
		計 Total	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male	3	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0	0
		計 Total	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male	12	0	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0	0
		計 Total	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C69	**眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND**	男 Male	23	2	7	0	0	0
		女 Female	31	2	3	2	0	0
		計 Total	**54**	**4**	**10**	**2**	**0**	**0**
C70-C72	**中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM**	男 Male	447	2	9	16	9	10
		女 Female	350	1	8	14	9	7
		計 Total	**797**	**3**	**17**	**30**	**18**	**17**
C71	腦 BRAIN	男 Male	407	2	9	15	7	10
		女 Female	312	1	6	13	9	7
		計 Total	**719**	**3**	**15**	**28**	**16**	**17**
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	40	0	0	1	2	0
		女 Female	38	0	2	1	0	0
		計 Total	**78**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**
C73	**甲狀腺 THYROID GLAND**	男 Male	1,143	0	0	0	0	9
		女 Female	3,302	0	0	0	5	33
		計 Total	**4,445**	**0**	**0**	**0**	**5**	**42**
C74-C75	**其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS**	男 Male	80	5	4	2	4	8
		女 Female	91	2	4	2	1	1
		計 Total	**171**	**7**	**8**	**4**	**5**	**9**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
0	2	0	5	9	5	28	39	52	59	62	72	53	31	C65
0	0	1	2	0	10	9	29	64	82	84	106	96	64	
0	**2**	**1**	**7**	**9**	**15**	**37**	**68**	**116**	**141**	**146**	**178**	**149**	**95**	
0	0	0	2	2	7	10	29	42	62	40	46	25	30	C66
0	0	1	0	2	5	6	30	45	67	61	65	53	44	
0	**0**	**1**	**2**	**4**	**12**	**16**	**59**	**87**	**129**	**101**	**111**	**78**	**74**	
0	1	0	0	0	0	1	1	4	6	1	4	4	1	C68.0-C68.1
0	0	0	0	0	1	4	2	2	4	1	3	3	2	
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**3**	**6**	**10**	**2**	**7**	**7**	**3**	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	C68.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	4	1	2	C68.9
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	2	0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**2**	**9**	**3**	**2**	
0	0	0	0	0	1	0	3	5	1	1	2	1	0	**C69**
1	0	1	2	1	2	8	1	6	1	0	0	1	0	
1	**0**	**1**	**2**	**1**	**3**	**8**	**4**	**11**	**2**	**1**	**2**	**2**	**0**	
11	12	22	27	28	22	33	37	54	53	34	31	20	17	**C70-C72**
7	14	14	26	27	15	37	29	33	27	28	26	17	11	
18	**26**	**36**	**53**	**55**	**37**	**70**	**66**	**87**	**80**	**62**	**57**	**37**	**28**	
8	11	18	26	25	20	30	34	51	52	30	24	19	16	C71
6	11	11	22	26	15	32	24	27	24	27	24	16	11	
14	**22**	**29**	**48**	**51**	**35**	**62**	**58**	**78**	**76**	**57**	**48**	**35**	**27**	
3	1	4	1	3	2	3	3	3	1	4	7	1	1	C70, C72
1	3	3	4	1	0	5	5	6	3	1	2	1	0	
4	**4**	**7**	**5**	**4**	**2**	**8**	**8**	**9**	**4**	**5**	**9**	**2**	**1**	
16	54	72	119	126	154	146	147	124	81	43	26	23	3	**C73**
84	126	231	345	332	440	479	434	349	218	99	71	40	16	
100	**180**	**303**	**464**	**458**	**594**	**625**	**581**	**473**	**299**	**142**	**97**	**63**	**19**	
8	4	4	6	4	4	2	6	9	6	2	2	0	0	**C74-C75**
2	8	1	7	5	11	4	13	9	8	4	4	4	1	
10	**12**	**5**	**13**	**9**	**15**	**6**	**19**	**18**	**14**	**6**	**6**	**4**	**1**	

表一之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1|4	5|9	10|14	15|19
C76	**其他分界不明的部位** **OTHER AND ILL-DEFINED SITES**	男 Male	58	0	0	0	2	0
		女 Female	14	0	0	0	0	0
		計 Total	**72**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
C80	**不明原發部位** **UNKNOWN PRIMARY SITES**	男 Male	354	0	0	0	0	1
		女 Female	289	0	0	0	0	0
		計 Total	**643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA**	男 Male	2,065	1	5	9	11	21
		女 Female	1,681	1	3	2	4	13
		計 Total	**3,746**	**2**	**8**	**11**	**15**	**34**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+	ICD-O-3
0	1	1	0	3	6	6	8	8	9	6	5	2	1	**C76**
0	1	0	1	0	0	0	2	2	3	2	3	0	0	
0	**2**	**1**	**1**	**3**	**6**	**6**	**10**	**10**	**12**	**8**	**8**	**2**	**1**	
3	0	1	4	10	15	26	41	51	59	28	40	29	46	**C80**
0	0	2	5	3	8	13	29	25	23	24	36	42	79	
3	**0**	**3**	**9**	**13**	**23**	**39**	**70**	**76**	**82**	**52**	**76**	**71**	**125**	
45	47	43	58	66	89	134	231	296	289	208	209	158	145	
27	46	39	53	66	74	140	180	192	239	156	199	132	115	
72	**93**	**82**	**111**	**132**	**163**	**274**	**411**	**488**	**528**	**364**	**408**	**290**	**260**	

表一之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 107 年
【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
白血病與骨髓增生性腫瘤 **LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL**	男 Male	1,455	4	32	37	20	28
	女 Female	1,095	2	37	16	9	14
	計 Total	**2,550**	**6**	**69**	**53**	**29**	**42**
急性骨髓性白血病 **ACUTE MYELOID LEUKEMIA**	男 Male	480	2	5	7	5	9
	女 Female	379	0	6	2	3	4
	計 Total	**859**	**2**	**11**	**9**	**8**	**13**
急性骨髓性白血病合併基因變異 AML with recurrent genetic abnormalities	男 Male	145	0	1	2	3	7
	女 Female	122	0	4	0	3	1
	計 Total	**267**	**0**	**5**	**2**	**6**	**8**
急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現 AML with myelodysplasia-related changes	男 Male	50	0	0	0	0	0
	女 Female	36	0	0	0	0	0
	計 Total	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
急性骨髓性白血病，治療相關 Therapy-related myeloid neoplasms	男 Male	20	0	0	1	0	0
	女 Female	16	0	0	0	0	0
	計 Total	**36**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
急性骨髓性白血病，無法歸類 Acute myeloid leukemia, NOS	男 Male	163	0	1	4	1	0
	女 Female	132	0	1	0	0	1
	計 Total	**295**	**0**	**2**	**4**	**1**	**1**
其他急性骨髓性白血病 Other acute myeloid leukemia	男 Male	98	2	3	0	1	2
	女 Female	69	0	0	1	0	2
	計 Total	**167**	**2**	**3**	**1**	**1**	**4**
骨髓性肉瘤 Myeloid sarcoma	男 Male	3	0	0	0	0	0
	女 Female	2	0	0	1	0	0
	計 Total	**5**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
唐氏症相關骨髓性增生 Myeloid proliferations related to Down Syndrome	男 Male	0	0	0	0	0	0
	女 Female	1	0	1	0	0	0
	計 Total	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	男 Male	1	0	0	0	0	0
	女 Female	1	0	0	0	0	0
	計 Total	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
急性淋巴性白血病 **ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA**	男 Male	164	1	23	30	12	14
	女 Female	136	1	30	13	5	6
	計 Total	**300**	**2**	**53**	**43**	**17**	**20**

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
36	31	36	52	52	97	112	118	143	166	125	150	112	104
19	13	34	50	56	71	83	94	120	127	97	89	86	78
55	**44**	**70**	**102**	**108**	**168**	**195**	**212**	**263**	**293**	**222**	**239**	**198**	**182**
8	12	16	19	14	41	36	36	49	56	47	49	31	38
5	4	13	21	24	23	32	35	30	52	37	29	23	36
13	**16**	**29**	**40**	**38**	**64**	**68**	**71**	**79**	**108**	**84**	**78**	**54**	**74**
4	6	7	14	3	15	12	11	20	18	8	6	5	3
4	3	6	13	10	14	16	16	9	8	7	4	2	2
8	**9**	**13**	**27**	**13**	**29**	**28**	**27**	**29**	**26**	**15**	**10**	**7**	**5**
0	0	1	0	0	3	3	6	5	6	7	9	4	6
0	0	0	0	1	0	3	2	2	4	12	5	4	3
0	**0**	**1**	**0**	**1**	**3**	**6**	**8**	**7**	**10**	**19**	**14**	**8**	**9**
0	0	0	0	1	2	1	1	6	4	2	1	0	1
0	0	0	0	2	1	1	2	1	5	2	1	0	1
0	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**2**	**3**	**7**	**9**	**4**	**2**	**0**	**2**
1	3	2	4	4	15	11	10	10	19	17	24	17	20
0	0	3	3	8	4	4	11	11	24	6	16	12	28
1	**3**	**5**	**7**	**12**	**19**	**15**	**21**	**21**	**43**	**23**	**40**	**29**	**48**
3	3	5	1	5	6	9	8	8	9	12	8	5	8
1	1	4	5	3	4	8	2	7	11	10	3	5	2
4	**4**	**9**	**6**	**8**	**10**	**17**	**10**	**15**	**20**	**22**	**11**	**10**	**10**
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
16	7	3	5	9	9	2	6	4	13	2	4	4	0
9	1	3	6	9	8	7	8	9	10	3	1	3	4
25	**8**	**6**	**11**	**18**	**17**	**9**	**14**	**13**	**23**	**5**	**5**	**7**	**4**

表一之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
急性 B 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 B lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male	122	1	22	23	7	8
	女 Female	120	1	30	12	3	2
	計 Total	**242**	**2**	**52**	**35**	**10**	**10**
急性 T 淋巴性白血病 / 淋巴瘤 T lymphoblastic leukemia / lymphoma	男 Male	42	0	1	7	5	6
	女 Female	16	0	0	1	2	4
	計 Total	**58**	**0**	**1**	**8**	**7**	**10**
慢性骨髓性白血病 [6] **CHRONIC MYELOID LEUKEMIA**	男 Male	148	0	0	0	3	4
	女 Female	105	0	0	0	0	2
	計 Total	**253**	**0**	**0**	**0**	**3**	**6**
慢性淋巴性白血病 **CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA**	男 Male	130	0	0	0	0	0
	女 Female	76	0	0	0	0	0
	計 Total	**206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
分化不明之急性白血病 **ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE**	男 Male	7	0	0	0	0	0
	女 Female	14	0	0	0	1	0
	計 Total	**21**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
骨髓增生性腫瘤 **MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS**	男 Male	306	1	4	0	0	1
	女 Female	245	1	1	1	0	2
	計 Total	**551**	**2**	**5**	**1**	**0**	**3**
骨髓分化不良症候群 **MYELODYSPLASTIC SYNDROMES**	男 Male	218	0	0	0	0	0
	女 Female	140	0	0	0	0	0
	計 Total	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
急性雙表現型白血病 **ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA**	男 Male	0	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
其他白血病 **OTHER LEUKEMIA**	男 Male	1	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
白血病，無法歸類 **LEUKEMIA, NOS**	男 Male	1	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
10	4	2	2	8	6	1	6	3	12	1	2	4	0
7	1	3	5	8	8	7	6	7	10	3	1	3	3
17	**5**	**5**	**7**	**16**	**14**	**8**	**12**	**10**	**22**	**4**	**3**	**7**	**3**
6	3	1	3	1	3	1	0	1	1	1	2	0	0
2	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1
8	**3**	**1**	**4**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**2**	**0**	**1**
7	8	8	12	8	15	21	15	8	17	9	6	5	2
5	4	10	7	7	12	12	8	17	6	2	7	4	2
12	**12**	**18**	**19**	**15**	**27**	**33**	**23**	**25**	**23**	**11**	**13**	**9**	**4**
1	0	0	3	3	4	8	18	21	21	13	17	8	13
0	0	0	2	1	4	8	9	11	12	9	9	7	4
1	**0**	**0**	**5**	**4**	**8**	**16**	**27**	**32**	**33**	**22**	**26**	**15**	**17**
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	2	1	2	1
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**
4	2	4	10	16	18	29	29	39	31	28	30	33	27
0	3	7	14	13	15	18	24	34	25	23	24	24	16
4	**5**	**11**	**24**	**29**	**33**	**47**	**53**	**73**	**56**	**51**	**54**	**57**	**43**
0	0	5	2	2	10	15	14	22	26	25	43	31	23
0	1	1	0	2	9	5	7	17	21	21	18	23	15
0	**1**	**6**	**2**	**4**	**19**	**20**	**21**	**39**	**47**	**46**	**61**	**54**	**38**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**3**

表一之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA**	男 Male	2,065	1	5	9	11	21
	女 Female	1,681	1	3	2	4	13
	計 Total	**3,746**	**2**	**8**	**11**	**15**	**34**
何杰金氏淋巴瘤 **HODGKIN LYMPHOMA**	男 Male	130	0	1	3	6	12
	女 Female	107	0	0	0	2	8
	計 Total	**237**	**0**	**1**	**3**	**8**	**20**
非何杰金氏淋巴瘤 **NON-HODGKIN LYMPHOMA**	男 Male	1,512	0	3	5	5	7
	女 Female	1,213	0	1	1	2	3
	計 Total	**2,725**	**0**	**4**	**6**	**7**	**10**
B 細胞淋巴瘤 **B-cell lymphoid neoplasms**	男 Male	1,269	0	3	4	4	4
	女 Female	1,071	0	1	1	2	2
	計 Total	**2,340**	**0**	**4**	**5**	**6**	**6**
邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織） Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	男 Male	167	0	0	0	0	1
	女 Female	164	0	0	0	0	0
	計 Total	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤 MALT lymphoma of stomach（ICD-O-3 C16 & M-96993）	男 Male	31	0	0	0	0	0
	女 Female	27	0	0	0	0	0
	計 Total	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
淋巴性漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma	男 Male	21	0	0	0	0	0
	女 Female	21	0	0	0	0	0
	計 Total	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
濾泡型淋巴瘤 Follicular lymphoma	男 Male	170	0	0	1	0	0
	女 Female	192	0	0	0	0	0
	計 Total	**362**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
被套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma	男 Male	58	0	0	0	0	0
	女 Female	15	0	0	0	0	0
	計 Total	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma	男 Male	32	0	2	2	2	1
	女 Female	12	0	1	1	0	0
	計 Total	**44**	**0**	**3**	**3**	**2**	**1**
瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	男 Male	775	0	1	1	1	1
	女 Female	628	0	0	0	0	0
	計 Total	**1,403**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
45	47	43	58	66	89	134	231	296	289	208	209	158	145
27	46	39	53	66	74	140	180	192	239	156	199	132	115
72	**93**	**82**	**111**	**132**	**163**	**274**	**411**	**488**	**528**	**364**	**408**	**290**	**260**
20	20	9	10	5	6	6	7	9	4	4	4	2	2
16	22	13	13	7	5	4	6	3	2	3	1	2	0
36	**42**	**22**	**23**	**12**	**11**	**10**	**13**	**12**	**6**	**7**	**5**	**4**	**2**
22	25	30	46	48	68	98	177	225	222	151	150	122	108
10	21	24	35	56	55	108	134	147	180	109	140	98	89
32	**46**	**54**	**81**	**104**	**123**	**206**	**311**	**372**	**402**	**260**	**290**	**220**	**197**
13	18	23	39	37	63	88	147	190	191	127	122	100	96
9	18	20	33	53	48	86	117	130	158	97	128	88	80
22	**36**	**43**	**72**	**90**	**111**	**174**	**264**	**320**	**349**	**224**	**250**	**188**	**176**
0	3	6	8	4	8	8	26	32	28	9	17	9	8
3	2	5	5	10	11	16	20	24	26	10	15	12	5
3	**5**	**11**	**13**	**14**	**19**	**24**	**46**	**56**	**54**	**19**	**32**	**21**	**13**
0	0	1	0	0	3	2	4	7	4	2	2	3	3
0	0	1	1	2	1	2	4	5	8	0	2	1	0
0	**0**	**2**	**1**	**2**	**4**	**4**	**8**	**12**	**12**	**2**	**4**	**4**	**3**
0	0	0	0	1	1	0	5	3	3	3	1	4	0
0	0	0	0	1	1	3	0	5	2	3	2	2	2
0	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**	**5**	**8**	**5**	**6**	**3**	**6**	**2**
2	0	2	2	9	9	19	28	35	25	18	12	2	6
0	2	2	7	15	9	22	32	26	33	16	11	12	5
2	**2**	**4**	**9**	**24**	**18**	**41**	**60**	**61**	**58**	**34**	**23**	**14**	**11**
0	0	0	1	1	4	3	12	4	9	11	6	1	6
0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	2	3	0	2
0	**0**	**0**	**1**	**1**	**6**	**5**	**16**	**4**	**9**	**13**	**9**	**1**	**8**
2	2	2	2	1	3	2	1	1	4	2	2	1	0
1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	1	0	1	0
3	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**	**3**	**6**	**3**	**2**	**2**	**0**
3	9	12	22	20	37	53	75	110	117	81	81	82	69
2	4	11	16	24	22	39	58	72	95	65	97	59	64
5	**13**	**23**	**38**	**44**	**59**	**92**	**133**	**182**	**212**	**146**	**178**	**141**	**133**

表一之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修[1]】(續)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018 （CONTINUED）

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	男 Male	23	0	0	0	1	1
	女 Female	30	0	0	0	1	2
	計 Total	**53**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**
其他 B 細胞淋巴瘤 Other B-cell lymphomas	男 Male	23	0	0	0	0	0
	女 Female	9	0	0	0	1	0
	計 Total	**32**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
T/NK 細胞淋巴瘤 **T/NK-cell lymphoid neoplasms**	男 Male	243	0	0	1	1	3
	女 Female	142	0	0	0	0	1
	計 Total	**385**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**
結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他 Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	男 Male	40	0	0	0	0	0
	女 Female	22	0	0	0	0	0
	計 Total	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕈狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群） Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sëzary syndrome)	男 Male	34	0	0	0	0	0
	女 Female	22	0	0	0	0	0
	計 Total	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
腸病變 T 細胞淋巴瘤 Enteropathy-type T-cell lymphoma	男 Male	5	0	0	0	0	0
	女 Female	7	0	0	0	0	0
	計 Total	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
肝脾 T 細胞淋巴瘤 Hepatosplenic T-cell lymphoma	男 Male	1	0	0	0	0	0
	女 Female	0	0	0	0	0	0
	計 Total	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤 Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	男 Male	5	0	0	0	0	1
	女 Female	3	0	0	0	0	0
	計 Total	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類 Peripheral T-cell lymphoma, NOS	男 Male	73	0	0	0	1	0
	女 Female	47	0	0	0	0	1
	計 Total	**120**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	男 Male	38	0	0	0	0	0
	女 Female	20	0	0	0	0	0
	計 Total	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
分化不良大細胞淋巴瘤 Anaplastic large cell lymphoma	男 Male	30	0	0	1	0	1
	女 Female	9	0	0	0	0	0
	計 Total	**39**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
6	4	1	4	0	0	2	0	0	2	1	0	1	0
3	10	2	4	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0
9	**14**	**3**	**8**	**1**	**2**	**5**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**
0	0	0	0	1	1	1	0	5	3	2	3	0	7
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**2**	**3**	**2**	**9**
9	7	7	7	11	5	10	30	35	31	24	28	22	12
1	3	4	2	3	7	22	17	17	22	12	12	10	9
10	**10**	**11**	**9**	**14**	**12**	**32**	**47**	**52**	**53**	**36**	**40**	**32**	**21**
1	1	1	0	2	1	1	9	7	2	5	4	4	2
0	2	1	2	0	3	1	3	4	2	2	0	0	2
1	**3**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**12**	**11**	**4**	**7**	**4**	**4**	**4**
1	2	0	2	4	1	1	5	5	6	3	1	0	3
0	1	0	0	0	1	7	3	2	4	2	2	0	0
1	**3**	**0**	**2**	**4**	**2**	**8**	**8**	**7**	**10**	**5**	**3**	**0**	**3**
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**2**	**0**	**1**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
1	0	2	1	3	0	4	9	11	11	10	7	12	1
0	0	0	0	2	2	7	2	5	11	2	6	4	5
1	**0**	**2**	**1**	**5**	**2**	**11**	**11**	**16**	**22**	**12**	**13**	**16**	**6**
1	2	1	0	0	0	0	2	6	6	1	8	5	6
0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	4	3	3	1
1	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**4**	**9**	**8**	**5**	**11**	**8**	**7**
3	2	3	3	0	3	2	3	2	1	3	3	0	0
0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	1	1	0	1
3	**2**	**4**	**3**	**0**	**3**	**5**	**4**	**2**	**2**	**4**	**4**	**0**	**1**

表一之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】(續完)

LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2018 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	0	1 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病 Adult T-cell lymphoma / leukemia	男 Male	7	0	0	0	0	0
	女 Female	6	0	0	0	0	0
	計 Total	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
其他 T 細胞淋巴瘤 Other T-cell lymphoma	男 Male	10	0	0	0	0	1
	女 Female	6	0	0	0	0	0
	計 Total	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
漿細胞瘤 **Plasma cell neoplasm**	男 Male	366	0	0	0	0	1
	女 Female	298	0	0	0	0	2
	計 Total	**664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
組織細胞與樹突狀細胞瘤 **Histiocytic and dendritic cell neoplasms**	男 Male	8	1	1	1	0	0
	女 Female	16	1	2	1	0	0
	計 Total	**24**	**2**	**3**	**2**	**0**	**0**
惡性淋巴瘤，無法歸類 **Malignant lymphoma, NOS and others**	男 Male	49	0	0	0	0	1
	女 Female	47	0	0	0	0	0
	計 Total	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4	1	0
0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**1**	**3**	**0**	**4**	**2**	**0**
0	1	3	2	10	13	26	45	51	57	48	50	31	28
0	1	1	4	2	9	22	35	37	50	38	49	28	20
0	**2**	**4**	**6**	**12**	**22**	**48**	**80**	**88**	**107**	**86**	**99**	**59**	**48**
2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	2	1	1	2	2	0	1	0	0
2	**2**	**1**	**1**	**0**	**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**
1	0	1	0	3	1	3	2	11	6	5	5	3	7
1	1	0	0	1	3	5	4	3	5	6	8	4	6
2	**1**	**1**	**0**	**4**	**4**	**8**	**6**	**14**	**11**	**11**	**13**	**7**	**13**

表二之一　台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	**全癌症（總計）** **ALL SITES**
C00-C14	**唇、口腔及咽** **LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX**
C00-C14[4]	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
	口腔 [5] ORAL CAVITY
	口咽 [5] OROPHARYNX
	下咽 [5] HYPOPRAYNX
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP（excludes skin of lip C44.0）
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	口底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	口咽 OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	**消化器官及腹膜** **DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.分類，詳細部位分類請參考 p.498 附錄七的說明。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	
116,131	**492.31**	**278.79**	**309.84**	**61,779**	**527.44**	**304.75**	**341.30**	**54,352**	**457.66**	**257.60**	**284.66**	**C00-C80**
10,007	**42.42**	**26.01**	**28.03**	**8,717**	**74.42**	**46.74**	**50.30**	**1,290**	**10.86**	**6.41**	**7.04**	**C00-C14**
8,170	34.63	20.87	22.45	7,400	63.18	39.22	42.15	770	6.48	3.56	3.92	C00-C14[4]
5,344	22.65	13.71	14.78	4,755	40.60	25.35	27.28	589	4.96	2.70	2.99	
1,617	6.85	4.12	4.42	1,478	12.62	7.78	8.37	139	1.17	0.67	0.72	
1,209	5.13	3.04	3.25	1,167	9.96	6.09	6.51	42	0.35	0.19	0.21	
287	1.22	0.73	0.79	256	2.19	1.36	1.47	31	0.26	0.14	0.16	C00
2,235	9.47	5.82	6.25	1,897	16.20	10.25	10.99	338	2.85	1.62	1.76	C01-C02
821	3.48	1.98	2.16	721	6.16	3.66	3.97	100	0.84	0.41	0.48	C03
250	1.06	0.64	0.68	229	1.96	1.22	1.29	21	0.18	0.10	0.11	C04
2,448	10.38	6.31	6.80	2,305	19.68	12.30	13.25	143	1.20	0.65	0.72	C05-C06
913	3.87	2.33	2.49	819	6.99	4.31	4.63	94	0.79	0.45	0.48	C09-C10
1,201	5.09	3.02	3.23	1,159	9.90	6.04	6.46	42	0.35	0.19	0.21	C12-C13
15	0.06	0.04	0.04	14	0.12	0.07	0.08	1	0.01	0.00	0.00	C14
347	1.47	0.96	1.04	195	1.66	1.10	1.19	152	1.28	0.83	0.90	C07-C08
1,490	6.32	4.17	4.54	1,122	9.58	6.42	6.97	368	3.10	2.02	2.22	C11
39,064	**165.60**	**87.68**	**98.76**	**24,663**	**210.56**	**118.65**	**132.90**	**14,401**	**121.26**	**59.28**	**67.74**	**C15-C26, C48**

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一　台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	**呼吸系統及胸腔內器官** **RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS**
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	
2,778	11.78	6.85	7.37	2,579	22.02	13.23	14.25	199	1.68	0.89	0.96	C15
3,798	16.10	8.12	9.29	2,334	19.93	10.65	12.18	1,464	12.33	5.88	6.76	C16
421	1.78	0.99	1.11	246	2.10	1.21	1.35	175	1.47	0.79	0.88	C17
16,525	70.05	36.97	41.84	9,512	81.21	45.27	51.17	7,013	59.05	29.50	33.55	C18-C21
10,549	44.72	23.19	26.39	5,788	49.42	27.11	30.85	4,761	40.09	19.70	22.49	C18
5,976	25.33	13.78	15.44	3,724	31.79	18.16	20.32	2,252	18.96	9.80	11.06	C19-C21
11,342	48.08	25.45	28.63	7,819	66.76	38.03	42.33	3,523	29.66	13.79	16.02	C22
1,129	4.79	2.35	2.73	580	4.95	2.59	3.03	549	4.62	2.15	2.47	C23-C24
2,750	11.66	6.06	6.87	1,481	12.64	6.98	7.87	1,269	10.69	5.23	5.96	C25
298	1.26	0.83	0.88	103	0.88	0.65	0.67	195	1.64	0.99	1.06	C48
23	0.10	0.05	0.06	9	0.08	0.04	0.05	14	0.12	0.06	0.07	C26
17,039	**72.23**	**38.71**	**43.44**	**9,739**	**83.15**	**46.18**	**52.37**	**7,300**	**61.47**	**32.22**	**35.81**	**C30-C39**
227	0.96	0.58	0.64	159	1.36	0.83	0.91	68	0.57	0.34	0.38	C30-C31
795	3.37	1.89	2.06	757	6.46	3.75	4.10	38	0.32	0.17	0.19	C32
15,345	65.05	34.39	38.75	8,424	71.92	39.31	44.88	6,921	58.28	30.26	33.69	C33-C34
92	0.39	0.20	0.23	68	0.58	0.31	0.36	24	0.20	0.10	0.11	C38.4
580	2.46	1.66	1.77	331	2.83	1.98	2.12	249	2.10	1.34	1.44	C37-C38.3, C38.8

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一　台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C42[6]	**白血病** **LEUKEMIA**
C40-C41	**骨、關節及關節軟骨** **BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE**
C47, C49	**結締組織、軟組織及其他皮下組織** **CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES**
C44	**皮膚** **SKIN**
C44[7]	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	**女性乳房** **FEMALE BREAST**
C50	**男性乳房** **MALE BREAST**
C51-C58	**女性生殖器官** **FEMALE GENITAL ORGANS**
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	**男性生殖器官** **MALE GENITAL ORGANS**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 白血病：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

7. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3　C44，M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	
2,550	**10.81**	**7.73**	**8.12**	**1,455**	**12.42**	**9.06**	**9.63**	**1,095**	**9.22**	**6.47**	**6.73**	**C42[6]**
159	**0.67**	**0.64**	**0.65**	**95**	**0.81**	**0.76**	**0.78**	**64**	**0.54**	**0.52**	**0.52**	**C40-C41**
632	**2.68**	**1.85**	**1.98**	**362**	**3.09**	**2.16**	**2.34**	**270**	**2.27**	**1.56**	**1.66**	**C47, C49**
4,049	**17.16**	**8.04**	**9.60**	**2,153**	**18.38**	**9.30**	**11.16**	**1,896**	**15.96**	**6.93**	**8.27**	**C44**
279	1.18	0.60	0.70	145	1.24	0.66	0.77	134	1.13	0.55	0.64	C44[7]
3,770	15.98	7.43	8.90	2,008	17.14	8.64	10.40	1,762	14.84	6.38	7.63	C44
14,217	**119.71**	**72.97**	**78.86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,217**	**119.71**	**72.97**	**78.86**	**C50**
60	**0.51**	**0.28**	**0.32**	**60**	**0.51**	**0.28**	**0.32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**C50**
5,961	**50.19**	**30.80**	**33.48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,961**	**50.19**	**30.80**	**33.48**	**C51-C58**
6	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	6	0.05	0.03	0.03	C55
1,433	12.07	7.06	7.85	-	-	-	-	1,433	12.07	7.06	7.85	C53
2,787	23.47	14.37	15.48	-	-	-	-	2,787	23.47	14.37	15.48	C54
1,557	13.11	8.57	9.25	-	-	-	-	1,557	13.11	8.57	9.25	C56, C57.0-C57.4
178	1.50	0.77	0.87	-	-	-	-	178	1.50	0.77	0.87	C51-C52, C57.7-C57.9
7,037	**60.08**	**32.15**	**37.74**	**7,037**	**60.08**	**32.15**	**37.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**C60-C63**

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一　台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
C64-C68	**泌尿器官** **URINARY TRACT**
C67	膀胱 BLADDER
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	**眼及淚腺** **EYE AND LACRIMAL GLAND**
C70-C72	**中樞神經系統** **BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM**
C71	腦 BRAIN
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C73	**甲狀腺** **THYROID GLAND**
C74-C75	**其他內分泌腺** **OTHER ENDOCRINE GLANDS**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	
6,644	56.72	29.34	34.69	6,644	56.72	29.34	34.69	-	-	-	-	C61
277	2.36	2.28	2.44	277	2.36	2.28	2.44	-	-	-	-	C62
116	0.99	0.53	0.60	116	0.99	0.53	0.60	-	-	-	-	C60,C63
5,420	**22.98**	**11.88**	**13.62**	**3,323**	**28.37**	**15.65**	**17.88**	**2,097**	**17.66**	**8.47**	**9.81**	**C64-C68**
2,239	9.49	4.56	5.34	1,568	13.39	6.91	8.09	671	5.65	2.48	2.96	C67
1,473	6.24	3.81	4.14	1,005	8.58	5.33	5.80	468	3.94	2.40	2.60	C64
964	4.09	1.97	2.35	417	3.56	1.90	2.24	547	4.61	2.02	2.42	C65
674	2.86	1.40	1.62	295	2.52	1.34	1.54	379	3.19	1.44	1.69	C66
45	0.19	0.10	0.11	23	0.20	0.10	0.12	22	0.19	0.09	0.10	C68.0-C68.1
5	0.02	0.01	0.01	3	0.03	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.01	C68.8
20	0.08	0.04	0.05	12	0.10	0.05	0.06	8	0.07	0.02	0.04	C68.9
54	**0.23**	**0.29**	**0.25**	**23**	**0.20**	**0.27**	**0.23**	**31**	**0.26**	**0.30**	**0.27**	**C69**
797	**3.38**	**2.70**	**2.80**	**447**	**3.82**	**3.02**	**3.14**	**350**	**2.95**	**2.40**	**2.48**	**C70-C72**
719	3.05	2.43	2.52	407	3.47	2.75	2.85	312	2.63	2.13	2.21	C71
78	0.33	0.26	0.28	40	0.34	0.26	0.29	38	0.32	0.27	0.27	C70, C72
4,445	**18.84**	**13.15**	**14.27**	**1,143**	**9.76**	**6.80**	**7.40**	**3,302**	**27.80**	**19.38**	**21.01**	**C73**
171	**0.72**	**0.74**	**0.71**	**80**	**0.68**	**0.78**	**0.74**	**91**	**0.77**	**0.68**	**0.67**	**C74-C75**

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一　台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C76	**其他分界不明的部位** **OTHER AND ILL-DEFINED SITES**
C80	**不明原發部位** **UNKNOWN PRIMARY SITES**
	惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。

3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	
72	**0.31**	**0.19**	**0.21**	**58**	**0.50**	**0.33**	**0.35**	**14**	**0.12**	**0.07**	**0.07**	**C76**
643	**2.73**	**1.33**	**1.54**	**354**	**3.02**	**1.65**	**1.87**	**289**	**2.43**	**1.04**	**1.24**	**C80**
3,746	**15.88**	**9.45**	**10.47**	**2,065**	**17.63**	**10.93**	**12.11**	**1,681**	**14.15**	**8.10**	**8.99**	

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病與骨髓增生性腫瘤
LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL

急性骨髓性白血病
ACUTE MYELOID LEUKEMIA

急性骨髓性白血病合併基因變異
AML with recurrent genetic abnormalities

急性骨髓性白血病合併骨髓分化不良表現
AML with myelodysplasia-related changes

急性骨髓性白血病，治療相關
Therapy-related myeloid neoplasms

急性骨髓性白血病，無法歸類
Acute myeloid leukemia, NOS

其他急性骨髓性白血病
Other acute myeloid leukemia

骨髓性肉瘤
Myeloid sarcoma

唐氏症相關骨髓性增生
Myeloid proliferations related to Down Syndrome

芽球性胞漿性樹突狀細胞瘤
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm

急性淋巴性白血病
ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

急性 B 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤
B lymphoblastic leukemia / lymphoma

急性 T 細胞淋巴性白血病 / 淋巴瘤
T lymphoblastic leukemia / lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。
2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]
2,550	**10.81**	**7.73**	**8.12**	**1,455**	**12.42**	**9.06**	**9.63**	**1,095**	**9.22**	**6.47**	**6.73**
859	**3.64**	**2.41**	**2.60**	**480**	**4.10**	**2.83**	**3.06**	**379**	**3.19**	**2.02**	**2.18**
267	1.13	0.88	0.92	145	1.24	0.95	1.00	122	1.03	0.81	0.84
86	0.36	0.19	0.22	50	0.43	0.23	0.27	36	0.30	0.15	0.17
36	0.15	0.10	0.10	20	0.17	0.12	0.12	16	0.13	0.08	0.08
295	1.25	0.70	0.79	163	1.39	0.87	0.98	132	1.11	0.55	0.62
167	0.71	0.51	0.54	98	0.84	0.64	0.67	69	0.58	0.38	0.42
5	0.02	0.02	0.02	3	0.03	0.02	0.02	2	0.02	0.03	0.02
1	0.00	0.01	0.01	-	-	-	-	1	0.01	0.02	0.02
2	0.01	0.00	0.01	1	0.01	0.00	0.01	1	0.01	0.00	0.00
300	**1.27**	**1.88**	**1.67**	**164**	**1.40**	**2.07**	**1.87**	**136**	**1.15**	**1.68**	**1.46**
242	1.03	1.55	1.35	122	1.04	1.58	1.40	120	1.01	1.51	1.30
58	0.25	0.33	0.32	42	0.36	0.49	0.47	16	0.13	0.17	0.16

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS
慢性骨髓性白血病 [8] **CHRONIC MYELOID LEUKEMIA**
慢性淋巴性白血病 **CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA**
分化不明之急性白血病 **ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE**
骨髓增生性腫瘤 **MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS**
骨髓分化不良症候群 **MYELODYSPLASTIC SYNDROMES**
急性雙表現型白血病 **ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA**
其他白血病 **OTHER LEUKEMIA**
白血病，無法歸類 **LEUKEMIA, NOS**

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。
2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
8. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]
253	**1.07**	**0.77**	**0.84**	**148**	**1.26**	**0.93**	**1.01**	**105**	**0.88**	**0.61**	**0.67**
206	**0.87**	**0.46**	**0.52**	**130**	**1.11**	**0.61**	**0.69**	**76**	**0.64**	**0.33**	**0.37**
21	**0.09**	**0.05**	**0.06**	**7**	**0.06**	**0.04**	**0.04**	**14**	**0.12**	**0.07**	**0.08**
551	**2.34**	**1.38**	**1.53**	**306**	**2.61**	**1.59**	**1.77**	**245**	**2.06**	**1.19**	**1.32**
358	**1.52**	**0.76**	**0.89**	**218**	**1.86**	**0.98**	**1.18**	**140**	**1.18**	**0.56**	**0.65**
0	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**1**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS
惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA**
何杰金氏淋巴瘤 **HODGKIN LYMPHOMA**
非何杰金氏淋巴瘤 **NON-HODGKIN LYMPHOMA**
B 細胞淋巴瘤 **B-cell lymphoid neoplasms**
邊緣區淋巴瘤（脾、淋巴結、與黏膜相關淋巴組織） Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)
胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤 MALT lymphoma of stomach（ICD-O-3　C16 & M-96993）
淋巴性漿細胞性淋巴瘤 Lymphoplasmacytic lymphoma
濾泡型淋巴瘤 Follicular lymphoma
被套細胞淋巴瘤 Mantle cell lymphoma
Burkitt 氏淋巴瘤 Burkitt lymphoma
瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型) Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)
原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤 Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。
2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]
3,746	**15.88**	**9.45**	**10.47**	**2,065**	**17.63**	**10.93**	**12.11**	**1,681**	**14.15**	**8.10**	**8.99**
237	**1.00**	**1.00**	**1.04**	**130**	**1.11**	**1.11**	**1.13**	**107**	**0.90**	**0.89**	**0.94**
2,725	**11.55**	**6.61**	**7.38**	**1,512**	**12.91**	**7.74**	**8.64**	**1,213**	**10.21**	**5.58**	**6.25**
2,340	**9.92**	**5.64**	**6.30**	**1,269**	**10.83**	**6.45**	**7.18**	**1,071**	**9.02**	**4.91**	**5.50**
331	1.40	0.81	0.90	167	1.43	0.84	0.93	164	1.38	0.79	0.87
58	0.25	0.14	0.15	31	0.26	0.15	0.16	27	0.23	0.13	0.14
42	0.18	0.09	0.11	21	0.18	0.10	0.11	21	0.18	0.09	0.10
362	1.53	0.90	0.98	170	1.45	0.89	0.95	192	1.62	0.91	1.00
73	0.31	0.17	0.19	58	0.50	0.28	0.31	15	0.13	0.07	0.08
44	0.19	0.19	0.19	32	0.27	0.29	0.28	12	0.10	0.10	0.09
1,403	5.95	3.18	3.62	775	6.62	3.76	4.28	628	5.29	2.65	3.04
53	0.22	0.23	0.23	23	0.20	0.19	0.20	30	0.25	0.27	0.27

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】(續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

其他 B 細胞淋巴瘤
Other B-cell lymphomas

T/NK 細胞淋巴瘤
T/NK-cell lymphoid neoplasms

結節外 NK/T 細胞淋巴瘤，鼻型或其他
Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type

皮膚 T 細胞淋巴瘤（包含蕈狀肉芽腫 / Sezary 氏症候群）
Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sëzary syndrome)

腸病變 T 細胞淋巴瘤
Enteropathy-type T-cell lymphoma

肝脾 T 細胞淋巴瘤
Hepatosplenic T-cell lymphoma

皮下脂膜炎狀 T 細胞淋巴瘤
Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma

周邊 T 細胞淋巴瘤，無法歸類
Peripheral T-cell lymphoma, NOS

血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

分化不良大細胞淋巴瘤
Anaplastic large cell lymphoma

成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病
Adult T-cell lymphoma / leukemia

其他 T 細胞淋巴瘤
Other T-cell lymphoma

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。
2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率[2] ASR[2]	年齡標準化發生率[3] ASR[3]
32	0.14	0.07	0.08	23	0.20	0.10	0.11	9	0.08	0.05	0.05
385	**1.63**	**0.97**	**1.08**	**243**	**2.07**	**1.29**	**1.45**	**142**	**1.20**	**0.67**	**0.74**
62	0.26	0.16	0.17	40	0.34	0.20	0.23	22	0.19	0.12	0.13
56	0.24	0.15	0.16	34	0.29	0.19	0.20	22	0.19	0.11	0.12
12	0.05	0.03	0.03	5	0.04	0.03	0.03	7	0.06	0.03	0.03
1	0.00	0.00	0.00	1	0.01	0.01	0.00	-	-	-	-
8	0.03	0.03	0.04	5	0.04	0.04	0.04	3	0.03	0.02	0.02
120	0.51	0.28	0.32	73	0.62	0.36	0.42	47	0.40	0.21	0.23
58	0.25	0.12	0.15	38	0.32	0.17	0.20	20	0.17	0.08	0.09
39	0.17	0.13	0.14	30	0.26	0.21	0.23	9	0.08	0.04	0.05
13	0.06	0.03	0.04	7	0.06	0.04	0.04	6	0.05	0.03	0.03
16	0.07	0.04	0.05	10	0.09	0.05	0.06	6	0.05	0.03	0.03

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 107 年【依據 WHO 2017 年的分類編修 [1]】(續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018 (CONTINUED)

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS
漿細胞瘤 **Plasma cell neoplasm**
組織細胞與樹突狀細胞瘤 **Histiocytic and dendritic cell neoplasms**
惡性淋巴瘤，無法歸類 **Malignant lymphoma, NOS and others**

註：1. WHO 2017 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考 p.496 附錄五的說明。
2. 年齡標準化發生率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 年齡標準化發生率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化發生率 [2] ASR[2]	年齡標準化發生率 [3] ASR[3]
664	**2.81**	**1.48**	**1.68**	**366**	**3.12**	**1.73**	**1.98**	**298**	**2.51**	**1.25**	**1.43**
24	**0.10**	**0.14**	**0.12**	**8**	**0.07**	**0.11**	**0.09**	**16**	**0.13**	**0.16**	**0.15**
96	**0.41**	**0.22**	**0.25**	**49**	**0.42**	**0.24**	**0.27**	**47**	**0.40**	**0.20**	**0.23**

NOTE：

ASR[2]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR[3]：Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018

全癌症（總計） C00 - C80

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	6,274	1,273,375	492.71	256.18	288.32	7,035	1,395,197	504.23	265.70	293.13
新北市	9,812	1,954,968	501.90	300.46	336.69	9,470	2,040,749	464.05	264.00	293.08
桃園市	4,648	1,104,073	420.99	282.44	315.59	4,304	1,116,799	385.39	246.00	272.29
台中市	7,016	1,380,106	508.37	328.75	368.82	6,395	1,423,788	449.15	275.44	305.29
台南市	5,510	939,967	586.19	324.20	364.01	4,799	943,864	508.44	273.17	302.54
高雄市	7,782	1,371,957	567.22	323.14	359.38	6,694	1,401,576	477.61	263.12	290.37
基隆市	1,046	184,978	565.47	299.98	338.25	855	185,177	461.72	244.85	271.20
新竹市	962	219,846	437.58	295.81	334.71	990	225,789	438.46	280.20	310.09
嘉義市	749	130,416	574.32	341.01	376.49	679	138,206	491.30	274.29	302.87
新竹縣	1,183	284,385	415.99	263.10	297.66	1,051	272,625	385.51	253.94	277.20
宜蘭縣	1,324	230,027	575.58	310.22	349.97	999	225,194	443.62	235.53	260.76
苗栗縣	1,597	283,174	563.96	308.07	345.25	1,252	265,689	471.23	258.70	285.67
彰化縣	3,735	650,677	574.02	325.62	365.50	2,770	627,147	441.68	251.79	276.24
南投縣	1,380	254,549	542.14	288.20	320.00	1,014	242,482	418.18	217.15	240.51
雲林縣	2,266	355,578	637.27	325.39	365.19	1,473	330,444	445.76	226.86	251.30
嘉義縣	1,847	263,451	701.08	344.68	386.51	1,214	243,617	498.32	237.04	262.75
屏東縣	2,554	421,534	605.88	322.50	358.90	1,847	403,872	457.32	239.98	263.21
澎湖縣	255	53,807	473.92	265.31	292.33	163	50,633	321.92	166.43	184.01
花蓮縣	984	166,258	591.85	325.50	362.18	703	161,710	434.73	226.36	249.59
台東縣	650	112,845	576.01	314.10	347.31	476	106,074	448.74	239.06	262.66
金門縣	163	69,494	234.55	131.07	150.80	147	69,779	210.67	119.49	133.33
連江縣	27	7,448	362.51	229.76	256.65	16	5,608	285.31	173.93	197.54
北部	26,846	5,534,826	485.04	285.83	320.84	25,956	5,727,219	453.20	259.09	286.53
中部	14,397	2,640,910	545.15	322.50	361.45	11,652	2,623,861	444.08	257.41	284.19
南部	18,697	3,181,132	587.75	324.76	362.37	15,396	3,181,768	483.88	259.99	287.17
東部	1,634	279,103	585.45	320.69	355.98	1,179	267,784	440.28	231.31	254.69
金馬地區	190	76,942	246.94	140.23	160.52	163	75,387	216.22	122.98	137.49
直轄市	41,042	8,024,446	511.46	302.28	338.50	38,697	8,321,973	465.00	264.80	293.08
中央政府管轄市	2,757	535,240	515.10	309.75	347.52	2,524	549,172	459.60	266.53	294.69
縣轄市	2,501	790,308	316.46	188.08	210.66	2,188	801,548	272.97	150.82	168.17
鎮	4,074	859,540	473.97	256.62	289.18	3,177	830,944	382.34	208.52	230.25
鄉	11,390	1,503,379	757.63	396.65	442.60	7,760	1,372,382	565.44	302.83	331.91
山地鄉 [4]	413	106,239	388.75	260.48	288.59	309	97,552	316.75	204.42	222.87
總計*	61,779	11,712,913	527.44	304.75	341.30	54,352	11,876,019	457.66	257.60	284.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 15 名男性、6 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

口腔、口咽及下咽 C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	431	1,273,375	33.85	19.50	21.08	77	1,395,197	5.52	2.79	3.12
新北市	1,095	1,954,968	56.01	34.57	37.18	137	2,040,749	6.71	3.64	4.10
桃園市	570	1,104,073	51.63	35.61	37.83	52	1,116,799	4.66	2.86	3.18
台中市	905	1,380,106	65.57	43.89	47.17	79	1,423,788	5.55	3.30	3.66
台南市	541	939,967	57.56	35.23	37.97	51	943,864	5.40	2.91	3.16
高雄市	1,007	1,371,957	73.40	44.66	47.66	106	1,401,576	7.56	4.27	4.64
基隆市	112	184,978	60.55	33.44	35.36	8	185,177	4.32	3.00	3.15
新竹市	90	219,846	40.94	27.79	30.34	17	225,789	7.53	4.79	5.03
嘉義市	80	130,416	61.34	39.34	42.76	6	138,206	4.34	2.32	2.48
新竹縣	116	284,385	40.79	27.16	29.75	17	272,625	6.24	3.92	4.31
宜蘭縣	133	230,027	57.82	35.73	38.51	10	225,194	4.44	2.19	2.42
苗栗縣	174	283,174	61.45	39.01	41.83	18	265,689	6.77	3.95	4.11
彰化縣	618	650,677	94.98	60.02	64.38	31	627,147	4.94	2.54	2.82
南投縣	209	254,549	82.11	47.48	50.94	19	242,482	7.84	4.09	4.56
雲林縣	330	355,578	92.81	52.29	56.75	24	330,444	7.26	3.71	3.88
嘉義縣	274	263,451	104.00	58.57	63.62	11	243,617	4.52	2.29	2.38
屏東縣	380	421,534	90.15	53.55	57.48	51	403,872	12.63	6.07	6.75
澎湖縣	20	53,807	37.17	25.12	25.93	3	50,633	5.92	8.32	7.63
花蓮縣	179	166,258	107.66	63.22	67.64	21	161,710	12.99	5.65	6.57
台東縣	120	112,845	106.34	60.38	64.98	30	106,074	28.28	15.33	16.53
金門縣	13	69,494	18.71	10.85	11.64	2	69,779	2.87	1.31	1.64
連江縣	2	7,448	26.85	19.09	20.14	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	2,721	5,534,826	49.16	30.92	33.22	336	5,727,219	5.87	3.25	3.59
中部	2,062	2,640,910	78.08	49.51	53.28	153	2,623,861	5.83	3.27	3.60
南部	2,302	3,181,132	72.36	43.73	46.92	228	3,181,768	7.17	3.91	4.24
東部	299	279,103	107.13	61.91	66.39	51	267,784	19.05	9.46	10.49
金馬地區	15	76,942	19.50	11.57	12.37	2	75,387	2.65	1.22	1.53
直轄市	4,549	8,024,446	56.69	35.63	38.22	502	8,321,973	6.03	3.36	3.71
中央政府管轄市	282	535,240	52.69	32.93	35.47	31	549,172	5.64	3.52	3.71
縣轄市	300	790,308	37.96	24.46	26.15	38	801,548	4.74	2.69	2.89
鎮	498	859,540	57.94	34.83	37.68	35	830,944	4.21	2.11	2.34
鄉	1,770	1,503,379	117.73	68.60	73.81	164	1,372,382	11.95	6.13	6.65
山地鄉[4]	77	106,239	72.48	48.04	52.93	23	97,552	23.58	14.52	15.74
總計*	7,400	11,712,913	63.18	39.22	42.15	770	11,876,019	6.48	3.56	3.92

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	13	1,273,375	1.02	0.61	0.67	0	1,395,197	0.00	0.00	0.00
新北市	26	1,954,968	1.33	0.82	0.87	5	2,040,749	0.25	0.16	0.19
桃園市	21	1,104,073	1.90	1.42	1.51	1	1,116,799	0.09	0.06	0.05
台中市	30	1,380,106	2.17	1.47	1.61	3	1,423,788	0.21	0.13	0.16
台南市	25	939,967	2.66	1.58	1.70	1	943,864	0.11	0.06	0.06
高雄市	39	1,371,957	2.84	1.75	1.89	4	1,401,576	0.29	0.11	0.16
基隆市	2	184,978	1.08	0.57	0.53	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	2	219,846	0.91	0.68	0.83	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	2	130,416	1.53	0.93	0.89	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	2	284,385	0.70	0.45	0.50	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	4	230,027	1.74	1.12	1.43	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	4	283,174	1.41	0.91	0.91	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	22	650,677	3.38	1.91	2.14	1	627,147	0.16	0.09	0.10
南投縣	9	254,549	3.54	2.10	2.30	1	242,482	0.41	0.07	0.13
雲林縣	16	355,578	4.50	2.72	2.85	4	330,444	1.21	0.83	0.83
嘉義縣	15	263,451	5.69	3.31	3.56	1	243,617	0.41	0.20	0.20
屏東縣	12	421,534	2.85	1.67	1.82	7	403,872	1.73	0.72	0.81
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	1	50,633	1.97	0.34	0.40
花蓮縣	8	166,258	4.81	2.71	2.91	1	161,710	0.62	0.33	0.37
台東縣	4	112,845	3.54	2.04	2.16	1	106,074	0.94	0.50	0.54
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	74	5,534,826	1.34	0.87	0.94	6	5,727,219	0.10	0.07	0.07
中部	77	2,640,910	2.92	1.82	1.98	9	2,623,861	0.34	0.21	0.23
南部	93	3,181,132	2.92	1.76	1.89	14	3,181,768	0.44	0.18	0.21
東部	12	279,103	4.30	2.40	2.57	2	267,784	0.75	0.40	0.44
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	154	8,024,446	1.92	1.23	1.32	14	8,321,973	0.17	0.09	0.11
中央政府管轄市	6	535,240	1.12	0.73	0.76	0	549,172	0.00	0.00	0.00
縣轄市	5	790,308	0.63	0.32	0.34	3	801,548	0.37	0.18	0.20
鎮	20	859,540	2.33	1.47	1.58	3	830,944	0.36	0.16	0.17
鄉	71	1,503,379	4.72	2.71	2.96	11	1,372,382	0.80	0.42	0.46
山地鄉 [4]	4	106,239	3.77	2.20	2.44	1	97,552	1.03	0.65	0.60
總計	256	11,712,913	2.19	1.36	1.47	31	11,876,019	0.26	0.14	0.16

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	112	1,273,375	8.80	5.26	5.56	38	1,395,197	2.72	1.58	1.73
新北市	293	1,954,968	14.99	9.60	10.33	61	2,040,749	2.99	1.68	1.86
桃園市	147	1,104,073	13.31	9.27	9.83	19	1,116,799	1.70	1.14	1.21
台中市	237	1,380,106	17.17	11.64	12.43	39	1,423,788	2.74	1.60	1.78
台南市	157	939,967	16.70	10.48	11.29	24	943,864	2.54	1.41	1.54
高雄市	255	1,371,957	18.59	11.52	12.31	56	1,401,576	4.00	2.33	2.50
基隆市	27	184,978	14.60	7.83	8.27	3	185,177	1.62	1.17	1.14
新竹市	14	219,846	6.37	4.10	4.55	10	225,789	4.43	2.66	2.85
嘉義市	22	130,416	16.87	11.24	12.07	3	138,206	2.17	1.11	1.24
新竹縣	28	284,385	9.85	6.66	7.43	9	272,625	3.30	2.16	2.35
宜蘭縣	29	230,027	12.61	7.55	8.02	4	225,194	1.78	1.03	1.11
苗栗縣	48	283,174	16.95	10.36	11.14	7	265,689	2.63	1.55	1.63
彰化縣	144	650,677	22.13	14.35	15.51	16	627,147	2.55	1.25	1.45
南投縣	53	254,549	20.82	12.04	13.02	4	242,482	1.65	1.13	1.20
雲林縣	92	355,578	25.87	14.53	15.63	8	330,444	2.42	1.30	1.36
嘉義縣	63	263,451	23.91	13.69	14.75	4	243,617	1.64	0.84	0.86
屏東縣	100	421,534	23.72	14.65	15.54	20	403,872	4.95	2.38	2.58
澎湖縣	3	53,807	5.58	3.73	3.89	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	45	166,258	27.07	16.48	17.58	5	161,710	3.09	1.36	1.60
台東縣	27	112,845	23.93	14.35	14.88	8	106,074	7.54	4.34	4.63
金門縣	1	69,494	1.44	0.61	0.70	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	698	5,534,826	12.61	8.10	8.68	151	5,727,219	2.64	1.54	1.68
中部	526	2,640,910	19.92	12.79	13.75	67	2,623,861	2.55	1.42	1.57
南部	600	3,181,132	18.86	11.67	12.49	107	3,181,768	3.36	1.86	2.01
東部	72	279,103	25.80	15.56	16.43	13	267,784	4.85	2.52	2.78
金馬地區	1	76,942	1.30	0.55	0.63	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	1,201	8,024,446	14.97	9.61	10.28	237	8,321,973	2.85	1.65	1.80
中央政府管轄市	63	535,240	11.77	7.28	7.82	16	549,172	2.91	1.74	1.84
縣轄市	73	790,308	9.24	6.05	6.43	10	801,548	1.25	0.64	0.72
鎮	143	859,540	16.64	10.08	10.90	12	830,944	1.44	0.73	0.84
鄉	417	1,503,379	27.74	16.46	17.66	63	1,372,382	4.59	2.47	2.64
山地鄉 [4]	21	106,239	19.77	12.51	14.29	7	97,552	7.18	4.49	4.74
總計	1,897	11,712,913	16.20	10.25	10.99	338	11,876,019	2.85	1.62	1.76

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

齒齦 C03

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	49	1,273,375	3.85	2.09	2.30	8	1,395,197	0.57	0.22	0.27
新北市	112	1,954,968	5.73	3.39	3.69	18	2,040,749	0.88	0.44	0.53
桃園市	71	1,104,073	6.43	4.34	4.58	8	1,116,799	0.72	0.39	0.47
台中市	88	1,380,106	6.38	4.26	4.52	9	1,423,788	0.63	0.36	0.39
台南市	52	939,967	5.53	3.32	3.60	8	943,864	0.85	0.36	0.40
高雄市	92	1,371,957	6.71	3.82	4.09	13	1,401,576	0.93	0.52	0.58
基隆市	9	184,978	4.87	2.74	3.00	2	185,177	1.08	0.44	0.57
新竹市	9	219,846	4.09	2.34	2.83	1	225,789	0.44	0.27	0.33
嘉義市	9	130,416	6.90	4.22	4.59	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	6	284,385	2.11	1.37	1.56	4	272,625	1.47	0.77	0.92
宜蘭縣	10	230,027	4.35	2.74	2.98	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	12	283,174	4.24	2.50	2.70	2	265,689	0.75	0.41	0.44
彰化縣	51	650,677	7.84	4.69	5.13	5	627,147	0.80	0.40	0.43
南投縣	17	254,549	6.68	3.76	3.98	3	242,482	1.24	0.42	0.51
雲林縣	27	355,578	7.59	4.23	4.52	3	330,444	0.91	0.42	0.44
嘉義縣	30	263,451	11.39	5.77	6.33	1	243,617	0.41	0.20	0.20
屏東縣	47	421,534	11.15	6.26	6.93	6	403,872	1.49	0.67	0.77
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	13	166,258	7.82	4.30	4.74	3	161,710	1.86	0.86	0.97
台東縣	14	112,845	12.41	6.07	7.07	5	106,074	4.71	2.35	2.74
金門縣	2	69,494	2.88	2.05	2.24	1	69,779	1.43	0.41	0.75
連江縣	1	7,448	13.43	10.47	11.52	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	278	5,534,826	5.02	3.01	3.27	43	5,727,219	0.75	0.36	0.44
中部	183	2,640,910	6.93	4.32	4.62	20	2,623,861	0.76	0.39	0.43
南部	230	3,181,132	7.23	4.13	4.49	28	3,181,768	0.88	0.44	0.48
東部	27	279,103	9.67	4.99	5.66	8	267,784	2.99	1.46	1.68
金馬地區	3	76,942	3.90	2.83	3.09	1	75,387	1.33	0.39	0.70
直轄市	464	8,024,446	5.78	3.50	3.77	64	8,321,973	0.77	0.39	0.45
中央政府管轄市	27	535,240	5.04	2.91	3.28	3	549,172	0.55	0.29	0.37
縣轄市	20	790,308	2.53	1.52	1.69	3	801,548	0.37	0.18	0.19
鎮	36	859,540	4.19	2.40	2.69	6	830,944	0.72	0.30	0.36
鄉	174	1,503,379	11.57	6.39	6.95	24	1,372,382	1.75	0.79	0.89
山地鄉 [4]	10	106,239	9.41	6.08	6.94	4	97,552	4.10	2.49	2.83
總計	721	11,712,913	6.16	3.66	3.97	100	11,876,019	0.84	0.41	0.48

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

□底 C04

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人□數	每 10 萬人□粗發生率	每 10 萬人□年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人□年齡標準化發生率[3]	申報數	人□數	每 10 萬人□粗發生率	每 10 萬人□年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人□年齡標準化發生率[3]
台北市	17	1,273,375	1.34	0.77	0.82	2	1,395,197	0.14	0.08	0.09
新北市	33	1,954,968	1.69	1.00	1.11	3	2,040,749	0.15	0.09	0.10
桃園市	10	1,104,073	0.91	0.61	0.65	2	1,116,799	0.18	0.12	0.11
台中市	19	1,380,106	1.38	0.92	0.96	2	1,423,788	0.14	0.07	0.09
台南市	21	939,967	2.23	1.35	1.43	2	943,864	0.21	0.08	0.09
高雄市	36	1,371,957	2.62	1.67	1.77	3	1,401,576	0.21	0.11	0.12
基隆市	6	184,978	3.24	1.66	1.71	1	185,177	0.54	0.65	0.64
新竹市	5	219,846	2.27	1.49	1.65	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	2	130,416	1.53	0.59	0.80	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	2	284,385	0.70	0.50	0.52	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	6	230,027	2.61	1.67	1.64	1	225,194	0.44	0.22	0.26
苗栗縣	9	283,174	3.18	2.15	2.20	2	265,689	0.75	0.39	0.41
彰化縣	19	650,677	2.92	1.97	2.09	0	627,147	0.00	0.00	0.00
南投縣	6	254,549	2.36	1.50	1.53	1	242,482	0.41	0.23	0.21
雲林縣	9	355,578	2.53	1.56	1.62	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	7	263,451	2.66	1.40	1.46	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	11	421,534	2.61	1.46	1.61	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	8	166,258	4.81	2.83	2.92	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	3	112,845	2.66	1.76	1.96	2	106,074	1.89	1.13	1.14
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	88	5,534,826	1.59	0.99	1.05	11	5,727,219	0.19	0.13	0.13
中部	53	2,640,910	2.01	1.32	1.39	3	2,623,861	0.11	0.06	0.06
南部	77	3,181,132	2.42	1.46	1.56	5	3,181,768	0.16	0.07	0.08
東部	11	279,103	3.94	2.40	2.53	2	267,784	0.75	0.45	0.45
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	136	8,024,446	1.69	1.06	1.14	14	8,321,973	0.17	0.09	0.10
中央政府管轄市	13	535,240	2.43	1.40	1.54	1	549,172	0.18	0.23	0.23
縣轄市	13	790,308	1.64	1.09	1.13	1	801,548	0.12	0.10	0.10
鎮	16	859,540	1.86	1.14	1.21	1	830,944	0.12	0.07	0.07
鄉	51	1,503,379	3.39	2.09	2.18	4	1,372,382	0.29	0.14	0.15
山地鄉[4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	229	11,712,913	1.96	1.22	1.29	21	11,876,019	0.18	0.10	0.11

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人□為標準人□，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人□為標準人□。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	123	1,273,375	9.66	5.80	6.21	14	1,395,197	1.00	0.41	0.48
新北市	337	1,954,968	17.24	10.66	11.43	26	2,040,749	1.27	0.64	0.73
桃園市	167	1,104,073	15.13	10.39	11.11	10	1,116,799	0.90	0.54	0.61
台中市	267	1,380,106	19.35	13.00	14.05	11	1,423,788	0.77	0.45	0.52
台南市	155	939,967	16.49	9.90	10.74	5	943,864	0.53	0.34	0.39
高雄市	317	1,371,957	23.11	14.24	15.27	10	1,401,576	0.71	0.38	0.42
基隆市	32	184,978	17.30	9.92	10.55	1	185,177	0.54	0.32	0.34
新竹市	28	219,846	12.74	9.04	9.68	5	225,789	2.21	1.54	1.51
嘉義市	23	130,416	17.64	11.63	12.71	1	138,206	0.72	0.39	0.39
新竹縣	36	284,385	12.66	8.36	9.27	2	272,625	0.73	0.53	0.51
宜蘭縣	45	230,027	19.56	12.11	13.19	1	225,194	0.44	0.08	0.15
苗栗縣	60	283,174	21.19	13.63	14.94	4	265,689	1.51	0.86	0.89
彰化縣	219	650,677	33.66	21.51	22.95	6	627,147	0.96	0.51	0.55
南投縣	65	254,549	25.54	14.79	15.68	5	242,482	2.06	0.98	1.22
雲林縣	114	355,578	32.06	18.35	20.08	7	330,444	2.12	0.81	0.91
嘉義縣	100	263,451	37.96	21.18	23.25	2	243,617	0.82	0.26	0.31
屏東縣	114	421,534	27.04	15.97	17.26	14	403,872	3.47	1.82	2.01
澎湖縣	5	53,807	9.29	6.44	6.79	1	50,633	1.97	6.66	5.79
花蓮縣	54	166,258	32.48	18.78	20.19	8	161,710	4.95	2.00	2.30
台東縣	39	112,845	34.56	19.81	21.30	9	106,074	8.48	4.83	5.08
金門縣	4	69,494	5.76	3.68	4.07	1	69,779	1.43	0.90	0.90
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	828	5,534,826	14.96	9.49	10.21	63	5,727,219	1.10	0.57	0.64
中部	665	2,640,910	25.18	16.14	17.39	29	2,623,861	1.11	0.57	0.66
南部	714	3,181,132	22.44	13.57	14.67	33	3,181,768	1.04	0.63	0.68
東部	93	279,103	33.32	19.19	20.63	17	267,784	6.35	3.11	3.39
金馬地區	4	76,942	5.20	3.31	3.66	1	75,387	1.33	0.84	0.84
直轄市	1,366	8,024,446	17.02	10.77	11.57	76	8,321,973	0.91	0.48	0.55
中央政府管轄市	83	535,240	15.51	10.03	10.79	7	549,172	1.27	0.80	0.80
縣轄市	104	790,308	13.16	8.40	8.98	10	801,548	1.25	0.82	0.83
鎮	153	859,540	17.80	10.82	11.73	7	830,944	0.84	0.46	0.48
鄉	598	1,503,379	39.78	23.32	25.24	43	1,372,382	3.13	1.54	1.71
山地鄉 [4]	28	106,239	26.36	18.15	19.42	8	97,552	8.20	5.23	5.65
總計*	2,305	11,712,913	19.68	12.30	13.25	143	11,876,019	1.20	0.65	0.72

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

口咽 C09 - C10

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	56	1,273,375	4.40	2.30	2.59	11	1,395,197	0.79	0.36	0.39
新北市	121	1,954,968	6.19	3.77	4.10	16	2,040,749	0.78	0.42	0.46
桃園市	63	1,104,073	5.71	3.96	4.12	7	1,116,799	0.63	0.36	0.41
台中市	92	1,380,106	6.67	4.34	4.74	12	1,423,788	0.84	0.57	0.59
台南市	46	939,967	4.89	3.30	3.47	8	943,864	0.85	0.50	0.51
高雄市	122	1,371,957	8.89	5.32	5.68	14	1,401,576	1.00	0.60	0.64
基隆市	12	184,978	6.49	3.48	3.85	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	18	219,846	8.19	5.60	6.09	1	225,789	0.44	0.32	0.34
嘉義市	8	130,416	6.13	4.00	4.69	2	138,206	1.45	0.82	0.85
新竹縣	16	284,385	5.63	3.85	4.04	1	272,625	0.37	0.22	0.26
宜蘭縣	15	230,027	6.52	4.32	4.55	1	225,194	0.44	0.10	0.12
苗栗縣	18	283,174	6.36	4.19	4.39	3	265,689	1.13	0.74	0.75
彰化縣	66	650,677	10.14	6.39	6.71	3	627,147	0.48	0.29	0.30
南投縣	21	254,549	8.25	5.04	5.35	4	242,482	1.65	1.00	1.01
雲林縣	28	355,578	7.87	4.41	4.88	2	330,444	0.61	0.35	0.33
嘉義縣	25	263,451	9.49	5.47	5.92	3	243,617	1.23	0.78	0.80
屏東縣	45	421,534	10.68	6.34	6.70	1	403,872	0.25	0.13	0.12
澎湖縣	6	53,807	11.15	7.75	7.58	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	23	166,258	13.83	8.41	8.92	2	161,710	1.24	0.61	0.70
台東縣	15	112,845	13.29	7.33	8.00	3	106,074	2.83	1.18	1.36
金門縣	2	69,494	2.88	1.29	1.33	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	1	7,448	13.43	8.62	8.62	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	319	5,534,826	5.76	3.58	3.86	40	5,727,219	0.70	0.37	0.41
中部	207	2,640,910	7.84	4.87	5.24	21	2,623,861	0.80	0.53	0.54
南部	252	3,181,132	7.92	4.85	5.16	28	3,181,768	0.88	0.52	0.54
東部	38	279,103	13.62	7.93	8.51	5	267,784	1.87	0.84	0.97
金馬地區	3	76,942	3.90	1.96	2.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	500	8,024,446	6.23	3.86	4.17	68	8,321,973	0.82	0.47	0.50
中央政府管轄市	38	535,240	7.10	4.40	4.90	3	549,172	0.55	0.32	0.34
縣轄市	38	790,308	4.81	3.09	3.34	6	801,548	0.75	0.40	0.42
鎮	41	859,540	4.77	2.95	3.10	5	830,944	0.60	0.32	0.36
鄉	202	1,503,379	13.44	7.94	8.41	12	1,372,382	0.87	0.53	0.53
山地鄉[4]	4	106,239	3.77	2.42	2.56	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	819	11,712,913	6.99	4.31	4.63	94	11,876,019	0.79	0.45	0.48

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	59	1,273,375	4.63	2.60	2.85	4	1,395,197	0.29	0.14	0.16
新北市	169	1,954,968	8.64	5.22	5.53	7	2,040,749	0.34	0.18	0.19
桃園市	91	1,104,073	8.24	5.62	6.02	5	1,116,799	0.45	0.25	0.31
台中市	171	1,380,106	12.39	8.21	8.80	3	1,423,788	0.21	0.12	0.13
台南市	84	939,967	8.94	5.22	5.65	3	943,864	0.32	0.17	0.17
高雄市	146	1,371,957	10.64	6.34	6.65	6	1,401,576	0.43	0.22	0.24
基隆市	24	184,978	12.97	7.24	7.44	1	185,177	0.54	0.42	0.46
新竹市	14	219,846	6.37	4.53	4.71	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	14	130,416	10.73	6.73	7.01	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	26	284,385	9.14	5.97	6.42	1	272,625	0.37	0.22	0.26
宜蘭縣	24	230,027	10.43	6.22	6.71	3	225,194	1.33	0.76	0.80
苗栗縣	21	283,174	7.42	4.74	5.01	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	96	650,677	14.75	9.09	9.75	0	627,147	0.00	0.00	0.00
南投縣	38	254,549	14.93	8.24	9.09	1	242,482	0.41	0.26	0.28
雲林縣	43	355,578	12.09	6.44	7.06	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	34	263,451	12.91	7.75	8.35	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	51	421,534	12.10	7.20	7.61	3	403,872	0.74	0.34	0.45
澎湖縣	5	53,807	9.29	6.04	6.42	1	50,633	1.97	1.33	1.43
花蓮縣	28	166,258	16.84	9.70	10.38	2	161,710	1.24	0.49	0.63
台東縣	17	112,845	15.06	8.52	9.14	2	106,074	1.89	1.00	1.03
金門縣	4	69,494	5.76	3.23	3.30	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	428	5,534,826	7.73	4.80	5.12	21	5,727,219	0.37	0.20	0.22
中部	348	2,640,910	13.18	8.18	8.83	4	2,623,861	0.15	0.09	0.10
南部	334	3,181,132	10.50	6.24	6.62	13	3,181,768	0.41	0.21	0.23
東部	45	279,103	16.12	9.23	9.88	4	267,784	1.49	0.68	0.78
金馬地區	4	76,942	5.20	2.92	2.98	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	720	8,024,446	8.97	5.54	5.91	28	8,321,973	0.34	0.18	0.20
中央政府管轄市	52	535,240	9.72	6.18	6.39	1	549,172	0.18	0.13	0.14
縣轄市	47	790,308	5.95	3.99	4.24	5	801,548	0.62	0.38	0.42
鎮	87	859,540	10.12	5.82	6.33	1	830,944	0.12	0.06	0.07
鄉	253	1,503,379	16.83	9.55	10.24	7	1,372,382	0.51	0.24	0.28
山地鄉 [4]	10	106,239	9.41	6.67	7.29	3	97,552	3.08	1.65	1.92
總計	1,159	11,712,913	9.90	6.04	6.46	42	11,876,019	0.35	0.19	0.21

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	2	1,273,375	0.16	0.07	0.09	0	1,395,197	0.00	0.00	0.00
新北市	4	1,954,968	0.20	0.11	0.12	1	2,040,749	0.05	0.03	0.02
桃園市	0	1,104,073	0.00	0.00	0.00	0	1,116,799	0.00	0.00	0.00
台中市	1	1,380,106	0.07	0.05	0.06	0	1,423,788	0.00	0.00	0.00
台南市	1	939,967	0.11	0.09	0.09	0	943,864	0.00	0.00	0.00
高雄市	0	1,371,957	0.00	0.00	0.00	0	1,401,576	0.00	0.00	0.00
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	284,385	0.00	0.00	0.00	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	2	283,174	0.71	0.52	0.55	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	1	650,677	0.15	0.10	0.11	0	627,147	0.00	0.00	0.00
南投縣	0	254,549	0.00	0.00	0.00	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	1	355,578	0.28	0.06	0.12	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	263,451	0.00	0.00	0.00	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	0	421,534	0.00	0.00	0.00	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	1	53,807	1.86	1.16	1.25	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	1	112,845	0.89	0.51	0.47	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	8	5,534,826	0.14	0.09	0.09	1	5,727,219	0.02	0.01	0.01
中部	3	2,640,910	0.11	0.07	0.08	0	2,623,861	0.00	0.00	0.00
南部	2	3,181,132	0.06	0.04	0.05	0	3,181,768	0.00	0.00	0.00
東部	1	279,103	0.36	0.20	0.19	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	8	8,024,446	0.10	0.06	0.06	1	8,321,973	0.01	0.01	0.01
中央政府管轄市	0	535,240	0.00	0.00	0.00	0	549,172	0.00	0.00	0.00
縣轄市	0	790,308	0.00	0.00	0.00	0	801,548	0.00	0.00	0.00
鎮	2	859,540	0.23	0.14	0.15	0	830,944	0.00	0.00	0.00
鄉	4	1,503,379	0.27	0.15	0.17	0	1,372,382	0.00	0.00	0.00
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	14	11,712,913	0.12	0.07	0.08	1	11,876,019	0.01	0.00	0.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	25	1,273,375	1.96	1.03	1.15	13	1,395,197	0.93	0.53	0.59
新北市	36	1,954,968	1.84	1.18	1.31	18	2,040,749	0.88	0.53	0.61
桃園市	12	1,104,073	1.09	0.83	0.87	18	1,116,799	1.61	1.06	1.16
台中市	18	1,380,106	1.30	0.92	0.95	20	1,423,788	1.40	1.18	1.16
台南市	15	939,967	1.60	1.16	1.22	17	943,864	1.80	1.15	1.27
高雄市	23	1,371,957	1.68	1.08	1.15	22	1,401,576	1.57	1.02	1.08
基隆市	3	184,978	1.62	0.82	0.81	2	185,177	1.08	0.34	0.51
新竹市	2	219,846	0.91	0.64	0.65	4	225,789	1.77	1.02	1.15
嘉義市	1	130,416	0.77	0.48	0.44	3	138,206	2.17	1.38	1.45
新竹縣	6	284,385	2.11	1.62	1.80	2	272,625	0.73	0.47	0.57
宜蘭縣	3	230,027	1.30	0.98	1.13	2	225,194	0.89	0.58	0.61
苗栗縣	5	283,174	1.77	1.18	1.27	3	265,689	1.13	0.37	0.46
彰化縣	11	650,677	1.69	1.07	1.23	10	627,147	1.59	1.06	1.17
南投縣	4	254,549	1.57	0.98	1.15	5	242,482	2.06	1.40	1.54
雲林縣	7	355,578	1.97	1.26	1.33	2	330,444	0.61	0.34	0.39
嘉義縣	8	263,451	3.04	1.55	1.68	3	243,617	1.23	0.93	0.94
屏東縣	7	421,534	1.66	1.03	1.17	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	1	50,633	1.97	1.26	1.16
花蓮縣	5	166,258	3.01	2.92	2.90	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	4	112,845	3.54	2.23	2.52	6	106,074	5.66	3.03	3.38
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	1	69,779	1.43	1.13	1.36
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	92	5,534,826	1.66	1.08	1.18	62	5,727,219	1.08	0.65	0.73
中部	40	2,640,910	1.51	1.01	1.10	37	2,623,861	1.41	1.07	1.10
南部	54	3,181,132	1.70	1.10	1.17	46	3,181,768	1.45	0.94	1.01
東部	9	279,103	3.22	2.64	2.75	6	267,784	2.24	1.21	1.35
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	1	75,387	1.33	1.04	1.25
直轄市	129	8,024,446	1.61	1.05	1.14	108	8,321,973	1.30	0.87	0.93
中央政府管轄市	6	535,240	1.12	0.70	0.70	9	549,172	1.64	0.88	1.01
縣轄市	10	790,308	1.27	0.90	0.95	8	801,548	1.00	0.66	0.71
鎮	11	859,540	1.28	0.86	0.94	14	830,944	1.68	1.14	1.33
鄉	39	1,503,379	2.59	1.68	1.88	13	1,372,382	0.95	0.53	0.56
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	1	97,552	1.03	0.53	0.61
總計	195	11,712,913	1.66	1.10	1.19	152	11,876,019	1.28	0.83	0.90

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

鼻咽 C11

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	108	1,273,375	8.48	5.67	6.10	35	1,395,197	2.51	1.60	1.79
新北市	206	1,954,968	10.54	6.97	7.52	78	2,040,749	3.82	2.44	2.69
桃園市	98	1,104,073	8.88	6.30	6.83	32	1,116,799	2.87	1.87	2.10
台中市	138	1,380,106	10.00	7.09	7.66	50	1,423,788	3.51	2.35	2.56
台南市	88	939,967	9.36	6.18	6.64	21	943,864	2.22	1.38	1.53
高雄市	136	1,371,957	9.91	6.47	7.04	54	1,401,576	3.85	2.50	2.73
基隆市	23	184,978	12.43	7.66	8.05	5	185,177	2.70	1.82	2.05
新竹市	14	219,846	6.37	4.71	5.43	4	225,789	1.77	1.24	1.34
嘉義市	10	130,416	7.67	4.79	5.24	5	138,206	3.62	2.35	2.53
新竹縣	22	284,385	7.74	5.15	5.67	2	272,625	0.73	0.50	0.54
宜蘭縣	19	230,027	8.26	5.83	6.50	8	225,194	3.55	3.13	3.28
苗栗縣	35	283,174	12.36	8.33	9.34	8	265,689	3.01	1.97	2.30
彰化縣	50	650,677	7.68	5.08	5.47	15	627,147	2.39	1.46	1.57
南投縣	20	254,549	7.86	5.48	6.01	10	242,482	4.12	2.32	2.41
雲林縣	35	355,578	9.84	6.30	6.82	6	330,444	1.82	1.14	1.26
嘉義縣	30	263,451	11.39	7.42	8.08	11	243,617	4.52	2.75	2.90
屏東縣	48	421,534	11.39	7.05	7.85	17	403,872	4.21	2.68	3.01
澎湖縣	5	53,807	9.29	5.77	6.29	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	15	166,258	9.02	7.45	7.96	3	161,710	1.86	1.20	1.28
台東縣	15	112,845	13.29	8.22	8.66	3	106,074	2.83	1.76	1.87
金門縣	4	69,494	5.76	3.89	4.34	1	69,779	1.43	1.17	1.28
連江縣	1	7,448	13.43	6.39	5.91	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	525	5,534,826	9.49	6.41	6.96	172	5,727,219	3.00	1.98	2.19
中部	243	2,640,910	9.20	6.32	6.84	81	2,623,861	3.09	2.03	2.20
南部	317	3,181,132	9.97	6.44	7.01	108	3,181,768	3.39	2.18	2.39
東部	30	279,103	10.75	7.74	8.22	6	267,784	2.24	1.41	1.51
金馬地區	5	76,942	6.50	4.12	4.48	1	75,387	1.33	1.07	1.18
直轄市	774	8,024,446	9.65	6.51	7.04	270	8,321,973	3.24	2.10	2.31
中央政府管轄市	47	535,240	8.78	5.98	6.53	14	549,172	2.55	1.70	1.86
縣轄市	37	790,308	4.68	3.26	3.61	9	801,548	1.12	0.84	0.93
鎮	55	859,540	6.40	4.15	4.44	16	830,944	1.93	1.35	1.46
鄉	207	1,503,379	13.77	8.96	9.83	59	1,372,382	4.30	2.69	2.91
山地鄉[4]	16	106,239	15.06	11.28	12.15	11	97,552	11.28	8.25	8.98
總計*	1,122	11,712,913	9.58	6.42	6.97	368	11,876,019	3.10	2.02	2.22

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

食道 C15

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	175	1,273,375	13.74	7.50	8.02	26	1,395,197	1.86	0.88	0.99
新北市	380	1,954,968	19.44	11.66	12.60	31	2,040,749	1.52	0.77	0.86
桃園市	191	1,104,073	17.30	11.73	12.61	12	1,116,799	1.07	0.64	0.73
台中市	342	1,380,106	24.78	16.23	17.62	21	1,423,788	1.47	0.87	0.96
台南市	189	939,967	20.11	11.78	12.66	9	943,864	0.95	0.48	0.50
高雄市	321	1,371,957	23.40	13.49	14.47	26	1,401,576	1.86	0.93	1.04
基隆市	55	184,978	29.73	17.02	18.68	6	185,177	3.24	1.55	1.56
新竹市	29	219,846	13.19	8.66	10.01	1	225,789	0.44	0.34	0.34
嘉義市	17	130,416	13.04	7.94	8.00	2	138,206	1.45	0.39	0.46
新竹縣	59	284,385	20.75	13.55	14.71	4	272,625	1.47	1.26	1.28
宜蘭縣	73	230,027	31.74	18.48	19.97	9	225,194	4.00	2.25	2.34
苗栗縣	85	283,174	30.02	17.85	19.32	4	265,689	1.51	0.92	0.97
彰化縣	154	650,677	23.67	14.33	15.44	7	627,147	1.12	0.56	0.59
南投縣	78	254,549	30.64	17.62	19.07	7	242,482	2.89	1.70	1.78
雲林縣	95	355,578	26.72	15.79	16.76	3	330,444	0.91	0.51	0.53
嘉義縣	76	263,451	28.85	16.29	17.70	3	243,617	1.23	0.47	0.50
屏東縣	128	421,534	30.37	17.70	18.55	9	403,872	2.23	0.95	1.03
澎湖縣	15	53,807	27.88	16.39	16.40	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	56	166,258	33.68	19.28	20.68	10	161,710	6.18	3.43	3.47
台東縣	45	112,845	39.88	22.23	23.88	8	106,074	7.54	4.47	4.47
金門縣	13	69,494	18.71	9.42	11.34	1	69,779	1.43	0.35	0.42
連江縣	3	7,448	40.28	28.88	32.56	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	1,047	5,534,826	18.92	11.51	12.45	93	5,727,219	1.62	0.88	0.96
中部	669	2,640,910	25.33	15.74	16.99	38	2,623,861	1.45	0.83	0.89
南部	746	3,181,132	23.45	13.59	14.50	49	3,181,768	1.54	0.73	0.80
東部	101	279,103	36.19	20.52	22.02	18	267,784	6.72	3.82	3.84
金馬地區	16	76,942	20.79	11.21	13.31	1	75,387	1.33	0.33	0.39
直轄市	1,598	8,024,446	19.91	12.08	13.02	125	8,321,973	1.50	0.79	0.88
中央政府管轄市	101	535,240	18.87	11.45	12.55	9	549,172	1.64	0.86	0.88
縣轄市	88	790,308	11.13	7.11	7.60	12	801,548	1.50	0.92	0.94
鎮	159	859,540	18.50	10.85	11.74	10	830,944	1.20	0.69	0.71
鄉	633	1,503,379	42.11	23.72	25.41	43	1,372,382	3.13	1.68	1.75
山地鄉 [4]	22	106,239	20.71	12.94	13.45	7	97,552	7.18	3.87	4.29
總計	2,579	11,712,913	22.02	13.23	14.25	199	11,876,019	1.68	0.89	0.96

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

胃 C16

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	313	1,273,375	24.58	11.42	13.25	238	1,395,197	17.06	7.30	8.38
新北市	422	1,954,968	21.59	12.31	14.03	279	2,040,749	13.67	6.99	8.10
桃園市	194	1,104,073	17.57	10.99	12.35	98	1,116,799	8.78	4.97	5.75
台中市	256	1,380,106	18.55	11.22	12.96	161	1,423,788	11.31	6.26	7.17
台南市	184	939,967	19.58	9.97	11.39	122	943,864	12.93	5.84	6.66
高雄市	245	1,371,957	17.86	9.62	10.90	171	1,401,576	12.20	5.88	6.75
基隆市	52	184,978	28.11	13.79	15.79	26	185,177	14.04	6.70	7.64
新竹市	42	219,846	19.10	11.21	13.48	22	225,789	9.74	4.99	6.02
嘉義市	27	130,416	20.70	11.82	13.24	16	138,206	11.58	6.03	6.63
新竹縣	44	284,385	15.47	8.49	10.08	19	272,625	6.97	4.50	4.90
宜蘭縣	79	230,027	34.34	17.58	19.86	40	225,194	17.76	6.85	8.09
苗栗縣	55	283,174	19.42	9.02	10.68	26	265,689	9.79	3.78	4.53
彰化縣	92	650,677	14.14	7.35	8.47	65	627,147	10.36	5.18	5.79
南投縣	39	254,549	15.32	8.07	8.86	28	242,482	11.55	4.18	4.92
雲林縣	61	355,578	17.16	8.49	9.59	35	330,444	10.59	3.75	4.33
嘉義縣	55	263,451	20.88	8.44	9.73	34	243,617	13.96	4.99	5.86
屏東縣	74	421,534	17.55	8.44	9.63	42	403,872	10.40	4.30	4.94
澎湖縣	8	53,807	14.87	8.87	9.08	6	50,633	11.85	3.00	3.91
花蓮縣	44	166,258	26.46	12.70	14.66	18	161,710	11.13	4.97	6.14
台東縣	38	112,845	33.67	17.18	19.15	6	106,074	5.66	2.89	3.10
金門縣	5	69,494	7.19	3.27	3.72	12	69,779	17.20	8.72	10.44
連江縣	5	7,448	67.13	36.31	41.25	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	1,201	5,534,826	21.70	11.83	13.59	748	5,727,219	13.06	6.35	7.35
中部	448	2,640,910	16.96	9.38	10.72	289	2,623,861	11.01	5.41	6.17
南部	593	3,181,132	18.64	9.53	10.83	391	3,181,768	12.29	5.55	6.37
東部	82	279,103	29.38	14.60	16.57	24	267,784	8.96	4.14	4.92
金馬地區	10	76,942	13.00	6.21	6.92	12	75,387	15.92	8.11	9.71
直轄市	1,614	8,024,446	20.11	11.07	12.65	1,069	8,321,973	12.85	6.34	7.30
中央政府管轄市	121	535,240	22.61	12.36	14.29	64	549,172	11.65	5.84	6.70
縣轄市	91	790,308	11.51	6.29	7.00	54	801,548	6.74	3.05	3.63
鎮	110	859,540	12.80	5.99	7.17	82	830,944	9.87	4.16	4.81
鄉	398	1,503,379	26.47	12.78	14.46	195	1,372,382	14.21	5.99	6.85
山地鄉 [4]	34	106,239	32.00	20.90	23.48	12	97,552	12.30	6.54	8.15
總計	2,334	11,712,913	19.93	10.65	12.18	1,464	11,876,019	12.33	5.88	6.76

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

小腸 C17

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	22	1,273,375	1.73	0.97	1.18	17	1,395,197	1.22	0.65	0.67
新北市	43	1,954,968	2.20	1.33	1.46	24	2,040,749	1.18	0.65	0.73
桃園市	26	1,104,073	2.35	1.55	1.76	10	1,116,799	0.90	0.55	0.65
台中市	28	1,380,106	2.03	1.37	1.49	29	1,423,788	2.04	1.11	1.29
台南市	24	939,967	2.55	1.40	1.51	20	943,864	2.12	1.01	1.16
高雄市	24	1,371,957	1.75	0.98	1.11	23	1,401,576	1.64	0.94	1.02
基隆市	4	184,978	2.16	1.35	1.42	1	185,177	0.54	0.14	0.17
新竹市	6	219,846	2.73	2.05	2.19	3	225,789	1.33	0.93	0.97
嘉義市	4	130,416	3.07	1.86	2.05	2	138,206	1.45	0.76	0.94
新竹縣	8	284,385	2.81	1.87	2.05	3	272,625	1.10	0.80	0.91
宜蘭縣	3	230,027	1.30	0.74	0.88	3	225,194	1.33	0.29	0.49
苗栗縣	7	283,174	2.47	1.30	1.43	3	265,689	1.13	0.59	0.67
彰化縣	9	650,677	1.38	0.68	0.80	11	627,147	1.75	1.01	1.06
南投縣	7	254,549	2.75	1.22	1.38	3	242,482	1.24	0.52	0.59
雲林縣	13	355,578	3.66	1.85	2.05	8	330,444	2.42	1.05	1.18
嘉義縣	9	263,451	3.42	1.67	1.92	4	243,617	1.64	0.94	1.12
屏東縣	4	421,534	0.95	0.42	0.49	6	403,872	1.49	0.74	0.85
澎湖縣	2	53,807	3.72	1.60	1.61	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	166,258	1.20	0.50	0.51	3	161,710	1.86	0.92	0.92
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	2	106,074	1.89	1.37	1.50
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	119	5,534,826	2.15	1.28	1.44	64	5,727,219	1.12	0.62	0.70
中部	57	2,640,910	2.16	1.28	1.42	51	2,623,861	1.94	1.01	1.13
南部	67	3,181,132	2.11	1.13	1.26	55	3,181,768	1.73	0.90	1.01
東部	2	279,103	0.72	0.30	0.31	5	267,784	1.87	1.09	1.14
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	167	8,024,446	2.08	1.23	1.39	123	8,321,973	1.48	0.81	0.90
中央政府管轄市	14	535,240	2.62	1.78	1.91	6	549,172	1.09	0.60	0.67
縣轄市	12	790,308	1.52	0.88	1.00	9	801,548	1.12	0.70	0.74
鎮	19	859,540	2.21	1.02	1.15	7	830,944	0.84	0.37	0.45
鄉	33	1,503,379	2.20	1.14	1.28	30	1,372,382	2.19	1.08	1.21
山地鄉 [4]	3	106,239	2.82	2.25	2.30	1	97,552	1.03	0.79	0.95
總計*	246	11,712,913	2.10	1.21	1.35	175	11,876,019	1.47	0.79	0.88

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門 C18 - C21

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	953	1,273,375	74.84	37.78	42.80	839	1,395,197	60.13	26.55	30.28
新北市	1,485	1,954,968	75.96	44.12	49.49	1,106	2,040,749	54.20	28.14	32.35
桃園市	734	1,104,073	66.48	42.91	48.52	561	1,116,799	50.23	29.59	34.05
台中市	1,135	1,380,106	82.24	51.70	58.82	832	1,423,788	58.44	33.30	37.79
台南市	894	939,967	95.11	51.77	58.31	682	943,864	72.26	34.48	39.40
高雄市	1,267	1,371,957	92.35	50.28	56.93	935	1,401,576	66.71	32.77	37.16
基隆市	157	184,978	84.87	43.44	48.78	112	185,177	60.48	30.30	34.14
新竹市	149	219,846	67.77	45.15	51.12	131	225,789	58.02	33.63	38.34
嘉義市	160	130,416	122.68	69.65	77.33	111	138,206	80.31	40.19	45.11
新竹縣	171	284,385	60.13	35.67	41.06	130	272,625	47.68	27.72	30.85
宜蘭縣	180	230,027	78.25	41.26	46.00	117	225,194	51.96	24.37	27.66
苗栗縣	243	283,174	85.81	46.01	51.68	186	265,689	70.01	32.43	36.74
彰化縣	571	650,677	87.75	48.78	55.20	375	627,147	59.79	29.07	32.92
南投縣	193	254,549	75.82	37.14	42.45	131	242,482	54.02	24.25	27.67
雲林縣	318	355,578	89.43	42.91	49.31	211	330,444	63.85	25.70	29.71
嘉義縣	251	263,451	95.27	43.54	49.44	147	243,617	60.34	25.15	28.29
屏東縣	365	421,534	86.59	43.14	49.03	230	403,872	56.95	26.40	29.44
澎湖縣	41	53,807	76.20	37.79	44.72	35	50,633	69.12	28.12	33.08
花蓮縣	123	166,258	73.98	38.94	43.30	81	161,710	50.09	23.71	26.14
台東縣	91	112,845	80.64	43.07	48.31	38	106,074	35.82	18.33	20.45
金門縣	24	69,494	34.54	19.29	22.39	22	69,779	31.53	13.99	15.89
連江縣	3	7,448	40.28	23.63	26.12	1	5,608	17.83	4.00	4.80
北部	4,072	5,534,826	73.57	41.88	47.20	3,182	5,727,219	55.56	28.27	32.31
中部	2,217	2,640,910	83.95	47.98	54.53	1,549	2,623,861	59.04	30.34	34.44
南部	2,978	3,181,132	93.61	49.64	56.11	2,140	3,181,768	67.26	32.02	36.26
東部	214	279,103	76.67	40.63	45.36	119	267,784	44.44	21.58	23.88
金馬地區	27	76,942	35.09	19.83	22.95	23	75,387	30.51	13.32	15.15
直轄市	6,468	8,024,446	80.60	46.07	52.05	4,955	8,321,973	59.54	30.45	34.77
中央政府管轄市	466	535,240	87.06	50.79	56.99	354	549,172	64.46	34.03	38.46
縣轄市	404	790,308	51.12	29.39	32.93	299	801,548	37.30	18.41	21.28
鎮	583	859,540	67.83	34.84	39.91	472	830,944	56.80	26.99	30.54
鄉	1,587	1,503,379	105.56	52.48	59.46	933	1,372,382	67.98	30.68	34.36
山地鄉 [4]	42	106,239	39.53	27.36	30.66	22	97,552	22.55	14.57	15.98
總計*	9,512	11,712,913	81.21	45.27	51.17	7,013	11,876,019	59.05	29.50	33.55

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 4 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

結腸 C18

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	595	1,273,375	46.73	22.78	26.17	595	1,395,197	42.65	18.57	21.22
新北市	940	1,954,968	48.08	27.63	31.19	753	2,040,749	36.90	18.96	21.98
桃園市	448	1,104,073	40.58	26.00	29.50	398	1,116,799	35.64	20.82	24.07
台中市	682	1,380,106	49.42	30.76	35.42	561	1,423,788	39.40	22.17	25.26
台南市	551	939,967	58.62	31.36	35.69	443	943,864	46.93	21.63	24.93
高雄市	754	1,371,957	54.96	29.37	33.67	600	1,401,576	42.81	20.82	23.60
基隆市	97	184,978	52.44	26.62	29.70	82	185,177	44.28	22.44	25.40
新竹市	93	219,846	42.30	27.36	31.45	98	225,789	43.40	24.83	28.12
嘉義市	103	130,416	78.98	43.56	48.84	78	138,206	56.44	27.19	30.44
新竹縣	105	284,385	36.92	21.37	24.81	94	272,625	34.48	19.89	22.04
宜蘭縣	122	230,027	53.04	27.46	30.52	79	225,194	35.08	14.94	17.38
苗栗縣	143	283,174	50.50	27.47	30.68	135	265,689	50.81	22.63	25.96
彰化縣	362	650,677	55.63	30.57	34.62	265	627,147	42.25	20.65	23.21
南投縣	110	254,549	43.21	21.00	24.07	81	242,482	33.40	14.67	16.78
雲林縣	187	355,578	52.59	25.38	29.03	142	330,444	42.97	16.79	19.32
嘉義縣	132	263,451	50.10	22.41	25.42	98	243,617	40.23	16.54	18.57
屏東縣	195	421,534	46.26	22.50	25.78	142	403,872	35.16	16.20	18.14
澎湖縣	28	53,807	52.04	25.71	30.95	23	50,633	45.42	18.47	21.47
花蓮縣	71	166,258	42.70	21.98	24.03	54	161,710	33.39	15.41	17.17
台東縣	50	112,845	44.31	23.12	26.30	24	106,074	22.63	11.63	13.13
金門縣	16	69,494	23.02	12.51	14.50	15	69,779	21.50	9.19	10.43
連江縣	2	7,448	26.85	13.16	14.61	1	5,608	17.83	4.00	4.80
北部	2,543	5,534,826	45.95	25.76	29.21	2,234	5,727,219	39.01	19.55	22.47
中部	1,341	2,640,910	50.78	28.70	32.80	1,049	2,623,861	39.98	20.25	22.98
南部	1,763	3,181,132	55.42	28.80	32.87	1,384	3,181,768	43.50	20.31	23.06
東部	121	279,103	43.35	22.50	25.01	78	267,784	29.13	13.90	15.55
金馬地區	18	76,942	23.39	12.68	14.66	16	75,387	21.22	8.86	10.08
直轄市	3,970	8,024,446	49.47	27.83	31.76	3,350	8,321,973	40.25	20.28	23.26
中央政府管轄市	293	535,240	54.74	31.33	35.37	258	549,172	46.98	24.47	27.61
縣轄市	240	790,308	30.37	17.07	19.20	213	801,548	26.57	12.76	14.82
鎮	373	859,540	43.40	21.82	25.19	333	830,944	40.07	18.37	20.86
鄉	910	1,503,379	60.53	29.99	33.87	607	1,372,382	44.23	19.87	22.23
山地鄉 [4]	17	106,239	16.00	10.87	11.56	11	97,552	11.28	7.54	8.29
總計*	5,788	11,712,913	49.42	27.11	30.85	4,761	11,876,019	40.09	19.70	22.49

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	358	1,273,375	28.11	15.00	16.63	244	1,395,197	17.49	7.98	9.07
新北市	545	1,954,968	27.88	16.49	18.30	353	2,040,749	17.30	9.17	10.37
桃園市	286	1,104,073	25.90	16.91	19.02	163	1,116,799	14.60	8.77	9.98
台中市	453	1,380,106	32.82	20.93	23.40	271	1,423,788	19.03	11.13	12.53
台南市	343	939,967	36.49	20.40	22.61	239	943,864	25.32	12.86	14.47
高雄市	513	1,371,957	37.39	20.91	23.26	335	1,401,576	23.90	11.96	13.56
基隆市	60	184,978	32.44	16.82	19.07	30	185,177	16.20	7.86	8.75
新竹市	56	219,846	25.47	17.79	19.67	33	225,789	14.62	8.80	10.22
嘉義市	57	130,416	43.71	26.10	28.49	33	138,206	23.88	13.00	14.67
新竹縣	66	284,385	23.21	14.30	16.25	36	272,625	13.20	7.83	8.81
宜蘭縣	58	230,027	25.21	13.80	15.48	38	225,194	16.87	9.43	10.28
苗栗縣	100	283,174	35.31	18.55	21.00	51	265,689	19.20	9.80	10.79
彰化縣	209	650,677	32.12	18.21	20.58	110	627,147	17.54	8.42	9.71
南投縣	83	254,549	32.61	16.14	18.38	50	242,482	20.62	9.58	10.89
雲林縣	131	355,578	36.84	17.53	20.28	69	330,444	20.88	8.91	10.39
嘉義縣	119	263,451	45.17	21.13	24.01	49	243,617	20.11	8.61	9.72
屏東縣	170	421,534	40.33	20.65	23.24	88	403,872	21.79	10.20	11.30
澎湖縣	13	53,807	24.16	12.08	13.77	12	50,633	23.70	9.66	11.61
花蓮縣	52	166,258	31.28	16.96	19.28	27	161,710	16.70	8.31	8.97
台東縣	41	112,845	36.33	19.95	22.01	14	106,074	13.20	6.70	7.33
金門縣	8	69,494	11.51	6.78	7.89	7	69,779	10.03	4.80	5.45
連江縣	1	7,448	13.43	10.47	11.52	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	1,529	5,534,826	27.63	16.12	17.99	948	5,727,219	16.55	8.72	9.84
中部	876	2,640,910	33.17	19.28	21.73	500	2,623,861	19.06	10.10	11.46
南部	1,215	3,181,132	38.19	20.84	23.23	756	3,181,768	23.76	11.71	13.20
東部	93	279,103	33.32	18.13	20.35	41	267,784	15.31	7.68	8.33
金馬地區	9	76,942	11.70	7.15	8.28	7	75,387	9.29	4.46	5.07
直轄市	2,498	8,024,446	31.13	18.24	20.29	1,605	8,321,973	19.29	10.17	11.50
中央政府管轄市	173	535,240	32.32	19.47	21.62	96	549,172	17.48	9.56	10.85
縣轄市	164	790,308	20.75	12.32	13.74	86	801,548	10.73	5.65	6.46
鎮	210	859,540	24.43	13.01	14.72	139	830,944	16.73	8.61	9.69
鄉	677	1,503,379	45.03	22.49	25.59	326	1,372,382	23.75	10.81	12.13
山地鄉 [4]	25	106,239	23.53	16.48	19.10	11	97,552	11.28	7.03	7.69
總計*	3,724	11,712,913	31.79	18.16	20.32	2,252	11,876,019	18.96	9.80	11.06

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	641	1,273,375	50.34	25.42	28.48	300	1,395,197	21.50	8.87	10.43
新北市	1,122	1,954,968	57.39	33.87	37.66	440	2,040,749	21.56	10.54	12.45
桃園市	547	1,104,073	49.54	33.08	36.34	216	1,116,799	19.34	11.34	13.12
台中市	812	1,380,106	58.84	37.33	42.03	397	1,423,788	27.88	14.83	17.50
台南市	833	939,967	88.62	48.64	54.08	374	943,864	39.62	17.79	20.42
高雄市	1,076	1,371,957	78.43	43.95	48.73	557	1,401,576	39.74	18.30	21.32
基隆市	130	184,978	70.28	37.51	41.81	53	185,177	28.62	12.53	14.33
新竹市	98	219,846	44.58	30.10	33.71	68	225,789	30.12	15.57	18.59
嘉義市	106	130,416	81.28	48.32	52.83	65	138,206	47.03	22.25	25.34
新竹縣	127	284,385	44.66	27.64	31.34	51	272,625	18.71	10.92	12.32
宜蘭縣	195	230,027	84.77	45.38	50.69	90	225,194	39.97	17.07	19.19
苗栗縣	209	283,174	73.81	40.81	45.08	97	265,689	36.51	14.51	16.93
彰化縣	475	650,677	73.00	41.02	45.53	191	627,147	30.46	13.33	15.42
南投縣	152	254,549	59.71	30.74	33.89	82	242,482	33.82	13.55	15.47
雲林縣	385	355,578	108.27	55.34	61.63	144	330,444	43.58	17.86	20.05
嘉義縣	308	263,451	116.91	55.40	61.86	133	243,617	54.59	19.18	22.21
屏東縣	350	421,534	83.03	44.76	48.81	151	403,872	37.39	16.11	18.37
澎湖縣	44	53,807	81.77	47.72	51.64	17	50,633	33.57	14.85	17.37
花蓮縣	113	166,258	67.97	36.18	40.73	45	161,710	27.83	11.86	13.62
台東縣	71	112,845	62.92	33.29	36.49	39	106,074	36.77	16.59	18.10
金門縣	20	69,494	28.78	15.20	16.71	11	69,779	15.76	8.79	9.62
連江縣	3	7,448	40.28	22.77	24.22	2	5,608	35.66	19.58	24.23
北部	3,069	5,534,826	55.45	32.27	35.92	1,315	5,727,219	22.96	10.99	12.83
中部	1,824	2,640,910	69.07	40.11	44.84	814	2,623,861	31.02	14.61	16.93
南部	2,717	3,181,132	85.41	46.66	51.70	1,297	3,181,768	40.76	18.02	20.84
東部	184	279,103	65.93	34.99	38.99	84	267,784	31.37	13.75	15.41
金馬地區	23	76,942	29.89	16.04	17.57	13	75,387	17.24	9.57	10.65
直轄市	5,031	8,024,446	62.70	36.50	40.65	2,284	8,321,973	27.45	13.23	15.47
中央政府管轄市	334	535,240	62.40	37.32	41.44	186	549,172	33.87	16.15	18.74
縣轄市	283	790,308	35.81	21.64	23.66	160	801,548	19.96	9.20	10.84
鎮	530	859,540	61.66	33.22	36.98	247	830,944	29.73	13.37	15.05
鄉	1,639	1,503,379	109.02	55.89	62.07	646	1,372,382	47.07	19.10	21.67
山地鄉[4]	58	106,239	54.59	35.93	39.61	35	97,552	35.88	21.55	23.78
總計*	7,819	11,712,913	66.76	38.03	42.33	3,523	11,876,019	29.66	13.79	16.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	46	1,273,375	3.61	1.56	1.87	69	1,395,197	4.95	1.99	2.33
新北市	93	1,954,968	4.76	2.70	3.16	92	2,040,749	4.51	2.21	2.57
桃園市	51	1,104,073	4.62	2.77	3.11	46	1,116,799	4.12	2.22	2.71
台中市	60	1,380,106	4.35	2.68	3.14	65	1,423,788	4.57	2.52	2.82
台南市	60	939,967	6.38	2.99	3.62	56	943,864	5.93	2.68	3.08
高雄市	71	1,371,957	5.18	2.67	3.12	74	1,401,576	5.28	2.42	2.80
基隆市	8	184,978	4.32	2.17	2.63	7	185,177	3.78	1.37	1.68
新竹市	2	219,846	0.91	0.43	0.59	7	225,789	3.10	1.61	1.71
嘉義市	4	130,416	3.07	1.70	1.88	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	14	284,385	4.92	2.88	3.25	11	272,625	4.03	2.43	2.60
宜蘭縣	19	230,027	8.26	4.38	4.88	6	225,194	2.66	1.45	1.59
苗栗縣	17	283,174	6.00	2.62	3.30	9	265,689	3.39	1.30	1.50
彰化縣	41	650,677	6.30	3.28	3.80	24	627,147	3.83	1.49	1.77
南投縣	11	254,549	4.32	2.08	2.45	10	242,482	4.12	1.71	1.82
雲林縣	26	355,578	7.31	3.29	3.76	14	330,444	4.24	1.79	2.02
嘉義縣	15	263,451	5.69	2.50	2.98	16	243,617	6.57	2.54	3.03
屏東縣	25	421,534	5.93	2.84	3.28	21	403,872	5.20	2.34	2.69
澎湖縣	3	53,807	5.58	2.52	2.94	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	8	166,258	4.81	2.28	2.71	16	161,710	9.89	5.45	5.93
台東縣	3	112,845	2.66	1.28	1.57	6	106,074	5.66	2.22	2.68
金門縣	3	69,494	4.32	2.19	2.63	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	250	5,534,826	4.52	2.41	2.81	247	5,727,219	4.31	2.01	2.34
中部	138	2,640,910	5.23	2.85	3.32	113	2,623,861	4.31	2.09	2.35
南部	178	3,181,132	5.60	2.74	3.23	167	3,181,768	5.25	2.33	2.69
東部	11	279,103	3.94	1.88	2.25	22	267,784	8.22	4.19	4.67
金馬地區	3	76,942	3.90	2.00	2.41	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	381	8,024,446	4.75	2.55	3.00	402	8,321,973	4.83	2.31	2.68
中央政府管轄市	14	535,240	2.62	1.38	1.66	14	549,172	2.55	1.10	1.25
縣轄市	23	790,308	2.91	1.74	1.95	23	801,548	2.87	1.41	1.70
鎮	40	859,540	4.65	2.12	2.53	29	830,944	3.49	1.51	1.68
鄉	122	1,503,379	8.12	3.73	4.34	81	1,372,382	5.90	2.54	2.85
山地鄉 [4]	3	106,239	2.82	1.84	2.21	7	97,552	7.18	4.97	5.29
總計	580	11,712,913	4.95	2.59	3.03	549	11,876,019	4.62	2.15	2.47

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

胰 C25

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	178	1,273,375	13.98	6.62	7.63	183	1,395,197	13.12	5.58	6.49
新北市	250	1,954,968	12.79	7.29	8.27	211	2,040,749	10.34	5.28	6.03
桃園市	121	1,104,073	10.96	7.11	7.80	111	1,116,799	9.94	5.95	6.70
台中市	145	1,380,106	10.51	6.61	7.48	138	1,423,788	9.69	5.33	6.10
台南市	142	939,967	15.11	8.08	9.11	94	943,864	9.96	5.00	5.58
高雄市	185	1,371,957	13.48	7.44	8.15	151	1,401,576	10.77	5.48	6.01
基隆市	24	184,978	12.97	6.19	7.25	24	185,177	12.96	4.96	5.89
新竹市	32	219,846	14.56	9.42	10.71	20	225,789	8.86	4.63	5.47
嘉義市	12	130,416	9.20	5.81	6.66	24	138,206	17.37	8.51	9.86
新竹縣	36	284,385	12.66	7.52	8.53	24	272,625	8.80	5.20	6.06
宜蘭縣	36	230,027	15.65	7.68	9.26	22	225,194	9.77	3.69	4.35
苗栗縣	33	283,174	11.65	5.86	6.74	29	265,689	10.92	5.23	5.80
彰化縣	102	650,677	15.68	8.61	9.61	69	627,147	11.00	4.82	5.61
南投縣	19	254,549	7.46	3.59	4.07	17	242,482	7.01	3.48	3.92
雲林縣	41	355,578	11.53	5.96	6.63	36	330,444	10.89	5.08	5.62
嘉義縣	36	263,451	13.66	6.44	7.25	27	243,617	11.08	3.61	4.32
屏東縣	55	421,534	13.05	6.44	7.22	29	403,872	7.18	3.00	3.47
澎湖縣	3	53,807	5.58	3.30	3.13	4	50,633	7.90	4.06	4.45
花蓮縣	19	166,258	11.43	6.33	7.12	35	161,710	21.64	9.18	11.14
台東縣	7	112,845	6.20	3.22	3.66	19	106,074	17.91	8.31	9.49
金門縣	4	69,494	5.76	3.23	3.30	2	69,779	2.87	1.25	1.32
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	710	5,534,826	12.83	7.12	8.10	624	5,727,219	10.90	5.40	6.21
中部	307	2,640,910	11.62	6.67	7.49	260	2,623,861	9.91	4.90	5.59
南部	433	3,181,132	13.61	7.28	8.10	329	3,181,768	10.34	5.00	5.59
東部	26	279,103	9.32	5.07	5.71	54	267,784	20.17	8.80	10.44
金馬地區	4	76,942	5.20	2.92	2.98	2	75,387	2.65	1.16	1.23
直轄市	1,021	8,024,446	12.72	7.18	8.07	888	8,321,973	10.67	5.42	6.15
中央政府管轄市	68	535,240	12.70	7.24	8.32	68	549,172	12.38	5.83	6.85
縣轄市	55	790,308	6.96	3.90	4.34	55	801,548	6.86	3.19	3.78
鎮	100	859,540	11.63	6.00	6.78	68	830,944	8.18	3.44	4.02
鄉	236	1,503,379	15.70	7.88	8.90	190	1,372,382	13.84	6.05	6.88
山地鄉 [4]	7	106,239	6.59	4.97	5.32	7	97,552	7.18	3.92	4.43
總計*	1,481	11,712,913	12.64	6.98	7.87	1,269	11,876,019	10.69	5.23	5.96

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	10	1,273,375	0.79	0.57	0.55	38	1,395,197	2.72	1.26	1.47
新北市	22	1,954,968	1.13	0.80	0.89	54	2,040,749	2.65	1.68	1.77
桃園市	11	1,104,073	1.00	0.84	0.89	14	1,116,799	1.25	1.11	1.02
台中市	10	1,380,106	0.72	0.52	0.56	16	1,423,788	1.12	0.70	0.78
台南市	5	939,967	0.53	0.31	0.37	10	943,864	1.06	0.85	0.78
高雄市	14	1,371,957	1.02	1.11	1.01	15	1,401,576	1.07	0.62	0.67
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	3	185,177	1.62	0.69	0.79
新竹市	1	219,846	0.45	0.32	0.34	5	225,789	2.21	1.38	1.60
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	1	138,206	0.72	0.52	0.58
新竹縣	1	284,385	0.35	0.30	0.33	7	272,625	2.57	1.78	1.85
宜蘭縣	4	230,027	1.74	0.79	0.87	4	225,194	1.78	0.80	0.95
苗栗縣	4	283,174	1.41	0.50	0.61	2	265,689	0.75	0.14	0.22
彰化縣	5	650,677	0.77	0.40	0.45	9	627,147	1.44	0.96	1.01
南投縣	0	254,549	0.00	0.00	0.00	3	242,482	1.24	0.76	0.84
雲林縣	2	355,578	0.56	0.39	0.37	5	330,444	1.51	0.83	0.87
嘉義縣	3	263,451	1.14	0.41	0.55	3	243,617	1.23	0.49	0.65
屏東縣	6	421,534	1.42	1.49	1.27	2	403,872	0.50	0.20	0.25
澎湖縣	3	53,807	5.58	3.27	3.55	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	3	161,710	1.86	0.92	0.92
台東縣	1	112,845	0.89	0.35	0.52	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	1	69,494	1.44	0.61	0.70	1	69,779	1.43	0.71	0.66
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	53	5,534,826	0.96	0.68	0.73	127	5,727,219	2.22	1.32	1.42
中部	17	2,640,910	0.64	0.41	0.45	33	2,623,861	1.26	0.79	0.85
南部	31	3,181,132	0.97	0.87	0.84	31	3,181,768	0.97	0.62	0.65
東部	1	279,103	0.36	0.14	0.21	3	267,784	1.12	0.55	0.55
金馬地區	1	76,942	1.30	0.55	0.63	1	75,387	1.33	0.66	0.61
直轄市	72	8,024,446	0.90	0.71	0.73	147	8,321,973	1.77	1.10	1.16
中央政府管轄市	1	535,240	0.19	0.12	0.13	9	549,172	1.64	0.92	1.06
縣轄市	10	790,308	1.27	0.77	0.85	8	801,548	1.00	0.50	0.55
鎮	6	859,540	0.70	0.64	0.59	12	830,944	1.44	0.72	0.81
鄉	14	1,503,379	0.93	0.42	0.47	19	1,372,382	1.38	0.82	0.89
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	103	11,712,913	0.88	0.65	0.67	195	11,876,019	1.64	0.99	1.06

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 C26

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	1	1,273,375	0.08	0.02	0.02	0	1,395,197	0.00	0.00	0.00
新北市	2	1,954,968	0.10	0.07	0.08	2	2,040,749	0.10	0.05	0.06
桃園市	2	1,104,073	0.18	0.11	0.16	1	1,116,799	0.09	0.06	0.06
台中市	2	1,380,106	0.14	0.08	0.12	4	1,423,788	0.28	0.15	0.20
台南市	0	939,967	0.00	0.00	0.00	0	943,864	0.00	0.00	0.00
高雄市	0	1,371,957	0.00	0.00	0.00	1	1,401,576	0.07	0.02	0.04
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	284,385	0.00	0.00	0.00	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	0	283,174	0.00	0.00	0.00	1	265,689	0.38	0.11	0.17
彰化縣	0	650,677	0.00	0.00	0.00	2	627,147	0.32	0.19	0.18
南投縣	1	254,549	0.39	0.12	0.14	2	242,482	0.82	0.45	0.49
雲林縣	1	355,578	0.28	0.15	0.15	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	263,451	0.00	0.00	0.00	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	0	421,534	0.00	0.00	0.00	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	1	106,074	0.94	0.50	0.54
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	5	5,534,826	0.09	0.05	0.06	4	5,727,219	0.07	0.03	0.04
中部	4	2,640,910	0.15	0.08	0.09	8	2,623,861	0.30	0.17	0.19
南部	0	3,181,132	0.00	0.00	0.00	1	3,181,768	0.03	0.01	0.02
東部	0	279,103	0.00	0.00	0.00	1	267,784	0.37	0.20	0.22
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	7	8,024,446	0.09	0.05	0.06	8	8,321,973	0.10	0.05	0.06
中央政府管轄市	0	535,240	0.00	0.00	0.00	0	549,172	0.00	0.00	0.00
縣轄市	0	790,308	0.00	0.00	0.00	0	801,548	0.00	0.00	0.00
鎮	1	859,540	0.12	0.04	0.05	3	830,944	0.36	0.17	0.20
鄉	1	1,503,379	0.07	0.04	0.04	3	1,372,382	0.22	0.12	0.12
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	9	11,712,913	0.08	0.04	0.05	14	11,876,019	0.12	0.06	0.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	22	1,273,375	1.73	1.06	1.22	5	1,395,197	0.36	0.26	0.29
新北市	22	1,954,968	1.13	0.69	0.74	18	2,040,749	0.88	0.54	0.61
桃園市	13	1,104,073	1.18	0.83	0.85	5	1,116,799	0.45	0.29	0.34
台中市	22	1,380,106	1.59	1.07	1.19	8	1,423,788	0.56	0.38	0.40
台南市	14	939,967	1.49	0.80	0.91	5	943,864	0.53	0.36	0.40
高雄市	23	1,371,957	1.68	0.99	1.07	7	1,401,576	0.50	0.32	0.34
基隆市	3	184,978	1.62	0.77	0.84	4	185,177	2.16	1.23	1.31
新竹市	5	219,846	2.27	1.62	1.71	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	1	130,416	0.77	0.48	0.44	1	138,206	0.72	0.24	0.36
新竹縣	5	284,385	1.76	1.23	1.37	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	3	230,027	1.30	0.58	0.71	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	2	283,174	0.71	0.35	0.43	1	265,689	0.38	0.23	0.21
彰化縣	5	650,677	0.77	0.42	0.42	2	627,147	0.32	0.12	0.14
南投縣	2	254,549	0.79	0.51	0.57	1	242,482	0.41	0.22	0.25
雲林縣	1	355,578	0.28	0.15	0.15	4	330,444	1.21	0.77	0.81
嘉義縣	4	263,451	1.52	0.91	1.03	3	243,617	1.23	0.64	0.74
屏東縣	8	421,534	1.90	1.07	1.23	3	403,872	0.74	0.34	0.45
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	166,258	1.20	0.57	0.69	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	2	112,845	1.77	1.27	1.27	1	106,074	0.94	0.22	0.27
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	75	5,534,826	1.36	0.85	0.94	33	5,727,219	0.58	0.36	0.40
中部	30	2,640,910	1.14	0.71	0.77	15	2,623,861	0.57	0.35	0.38
南部	50	3,181,132	1.57	0.90	0.99	19	3,181,768	0.60	0.35	0.40
東部	4	279,103	1.43	0.88	0.95	1	267,784	0.37	0.09	0.11
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	116	8,024,446	1.45	0.90	0.99	48	8,321,973	0.58	0.36	0.40
中央政府管轄市	9	535,240	1.68	1.05	1.11	5	549,172	0.91	0.51	0.56
縣轄市	4	790,308	0.51	0.33	0.36	4	801,548	0.50	0.25	0.28
鎮	9	859,540	1.05	0.68	0.76	2	830,944	0.24	0.13	0.14
鄉	21	1,503,379	1.40	0.75	0.84	9	1,372,382	0.66	0.33	0.38
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	159	11,712,913	1.36	0.83	0.91	68	11,876,019	0.57	0.34	0.38

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

喉 C32

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	63	1,273,375	4.95	2.44	2.76	3	1,395,197	0.22	0.11	0.13
新北市	137	1,954,968	7.01	4.05	4.50	8	2,040,749	0.39	0.21	0.23
桃園市	47	1,104,073	4.26	2.93	3.18	3	1,116,799	0.27	0.18	0.20
台中市	72	1,380,106	5.22	3.50	3.74	6	1,423,788	0.42	0.23	0.26
台南市	58	939,967	6.17	3.33	3.73	2	943,864	0.21	0.13	0.14
高雄市	113	1,371,957	8.24	4.70	5.10	6	1,401,576	0.43	0.20	0.22
基隆市	22	184,978	11.89	6.64	6.97	1	185,177	0.54	0.27	0.25
新竹市	13	219,846	5.91	3.97	4.19	2	225,789	0.89	0.60	0.62
嘉義市	11	130,416	8.43	5.23	5.64	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	10	284,385	3.52	2.48	2.62	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	15	230,027	6.52	3.38	3.81	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	21	283,174	7.42	4.34	4.48	1	265,689	0.38	0.11	0.17
彰化縣	40	650,677	6.15	3.28	3.70	0	627,147	0.00	0.00	0.00
南投縣	20	254,549	7.86	4.04	4.43	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	26	355,578	7.31	4.03	4.39	1	330,444	0.30	0.07	0.11
嘉義縣	22	263,451	8.35	4.49	4.67	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	43	421,534	10.20	5.36	5.88	5	403,872	1.24	0.74	0.81
澎湖縣	2	53,807	3.72	2.37	2.42	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	12	166,258	7.22	3.74	4.14	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	7	112,845	6.20	3.41	3.75	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	2	69,494	2.88	1.36	1.44	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	328	5,534,826	5.93	3.49	3.82	18	5,727,219	0.31	0.18	0.20
中部	158	2,640,910	5.98	3.62	3.94	7	2,623,861	0.27	0.14	0.16
南部	249	3,181,132	7.83	4.35	4.74	13	3,181,768	0.41	0.22	0.24
東部	19	279,103	6.81	3.62	3.99	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	2	76,942	2.60	1.24	1.32	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	490	8,024,446	6.11	3.61	3.97	28	8,321,973	0.34	0.18	0.20
中央政府管轄市	46	535,240	8.59	5.31	5.64	3	549,172	0.55	0.32	0.33
縣轄市	30	790,308	3.80	2.34	2.59	0	801,548	0.00	0.00	0.00
鎮	56	859,540	6.52	3.55	3.81	1	830,944	0.12	0.10	0.10
鄉	134	1,503,379	8.91	4.68	5.09	6	1,372,382	0.44	0.20	0.24
山地鄉 [4]	3	106,239	2.82	2.01	1.96	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計*	757	11,712,913	6.46	3.75	4.10	38	11,876,019	0.32	0.17	0.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	893	1,273,375	70.13	34.57	39.54	978	1,395,197	70.10	33.51	37.31
新北市	1,377	1,954,968	70.44	40.39	46.11	1,246	2,040,749	61.06	32.18	36.08
桃園市	683	1,104,073	61.86	39.87	46.08	554	1,116,799	49.61	30.21	33.32
台中市	928	1,380,106	67.24	42.02	47.62	791	1,423,788	55.56	32.25	36.01
台南市	743	939,967	79.05	41.40	46.93	621	943,864	65.79	32.76	36.49
高雄市	951	1,371,957	69.32	37.69	42.53	760	1,401,576	54.22	27.06	30.07
基隆市	141	184,978	76.23	38.12	43.88	119	185,177	64.26	30.75	34.15
新竹市	151	219,846	68.68	44.93	51.74	116	225,789	51.38	31.65	34.88
嘉義市	112	130,416	85.88	46.71	53.86	83	138,206	60.06	30.50	34.37
新竹縣	172	284,385	60.48	36.18	42.00	135	272,625	49.52	30.91	34.13
宜蘭縣	190	230,027	82.60	39.63	46.04	142	225,194	63.06	31.57	35.52
苗栗縣	210	283,174	74.16	37.41	43.09	153	265,689	57.59	29.43	32.64
彰化縣	507	650,677	77.92	40.75	46.88	388	627,147	61.87	32.47	36.01
南投縣	187	254,549	73.46	36.19	40.46	99	242,482	40.83	19.42	21.47
雲林縣	311	355,578	87.46	41.17	47.50	181	330,444	54.77	24.82	27.89
嘉義縣	279	263,451	105.90	46.69	53.73	155	243,617	63.62	26.39	29.62
屏東縣	325	421,534	77.10	38.30	43.26	199	403,872	49.27	23.42	25.79
澎湖縣	29	53,807	53.90	29.59	33.26	28	50,633	55.30	27.98	30.16
花蓮縣	127	166,258	76.39	39.61	45.70	87	161,710	53.80	25.77	28.78
台東縣	87	112,845	77.10	37.73	43.47	66	106,074	62.22	28.37	32.41
金門縣	15	69,494	21.58	10.62	12.70	15	69,779	21.50	11.79	13.65
連江縣	4	7,448	53.71	34.00	40.95	2	5,608	35.66	20.93	23.21
北部	3,817	5,534,826	68.96	38.53	44.19	3,443	5,727,219	60.12	31.84	35.45
中部	1,933	2,640,910	73.19	41.05	46.80	1,459	2,623,861	55.61	29.93	33.31
南部	2,439	3,181,132	76.67	39.94	45.29	1,846	3,181,768	58.02	28.36	31.54
東部	214	279,103	76.67	38.80	44.75	153	267,784	57.14	26.83	30.27
金馬地區	19	76,942	24.69	12.69	15.11	17	75,387	22.55	12.27	14.15
直轄市	5,575	8,024,446	69.48	39.16	44.58	4,950	8,321,973	59.48	31.34	34.93
中央政府管轄市	404	535,240	75.48	42.86	49.37	318	549,172	57.91	31.06	34.53
縣轄市	325	790,308	41.12	23.44	26.70	293	801,548	36.55	19.00	21.38
鎮	593	859,540	68.99	33.07	38.99	420	830,944	50.54	25.62	28.62
鄉	1,525	1,503,379	101.44	49.14	55.82	937	1,372,382	68.28	32.63	36.15
山地鄉 [4]	48	106,239	45.18	28.59	31.91	39	97,552	39.98	22.43	25.52
總計*	8,424	11,712,913	71.92	39.31	44.88	6,921	11,876,019	58.28	30.26	33.69

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名男性、3 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

性別 / 地區	男 申報數	男 人口數	男 每 10 萬人口粗發生率	男 每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	男 每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	女 申報數	女 人口數	女 每 10 萬人口粗發生率	女 每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	女 每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	8	1,273,375	0.63	0.31	0.35	2	1,395,197	0.14	0.06	0.08
新北市	10	1,954,968	0.51	0.28	0.33	3	2,040,749	0.15	0.06	0.08
桃園市	3	1,104,073	0.27	0.19	0.18	3	1,116,799	0.27	0.17	0.18
台中市	7	1,380,106	0.51	0.32	0.32	1	1,423,788	0.07	0.04	0.04
台南市	5	939,967	0.53	0.33	0.35	1	943,864	0.11	0.06	0.06
高雄市	14	1,371,957	1.02	0.51	0.59	9	1,401,576	0.64	0.34	0.37
基隆市	5	184,978	2.70	1.52	1.86	1	185,177	0.54	0.12	0.22
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	2	225,789	0.89	0.57	0.59
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	3	284,385	1.05	0.43	0.67	1	272,625	0.37	0.14	0.21
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	1	225,194	0.44	0.24	0.24
苗栗縣	0	283,174	0.00	0.00	0.00	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	4	650,677	0.61	0.30	0.35	0	627,147	0.00	0.00	0.00
南投縣	2	254,549	0.79	0.43	0.48	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	0	355,578	0.00	0.00	0.00	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	263,451	0.00	0.00	0.00	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	4	421,534	0.95	0.45	0.51	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	1	53,807	1.86	0.45	0.82	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	166,258	1.20	0.64	0.80	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	29	5,534,826	0.52	0.29	0.34	13	5,727,219	0.23	0.11	0.12
中部	13	2,640,910	0.49	0.28	0.31	1	2,623,861	0.04	0.02	0.02
南部	24	3,181,132	0.75	0.38	0.44	10	3,181,768	0.31	0.16	0.18
東部	2	279,103	0.72	0.38	0.47	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	47	8,024,446	0.59	0.33	0.36	19	8,321,973	0.23	0.12	0.13
中央政府管轄市	5	535,240	0.93	0.56	0.69	3	549,172	0.55	0.25	0.29
縣轄市	2	790,308	0.25	0.15	0.16	0	801,548	0.00	0.00	0.00
鎮	4	859,540	0.47	0.15	0.24	0	830,944	0.00	0.00	0.00
鄉	10	1,503,379	0.67	0.31	0.36	2	1,372,382	0.15	0.06	0.07
山地鄉 [4]	1	106,239	0.94	0.93	1.03	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	68	11,712,913	0.58	0.31	0.36	24	11,876,019	0.20	0.10	0.11

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3，C38.8

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	51	1,273,375	4.01	2.55	2.86	38	1,395,197	2.72	2.00	2.09
新北市	69	1,954,968	3.53	2.40	2.54	42	2,040,749	2.06	1.21	1.32
桃園市	21	1,104,073	1.90	1.67	1.76	22	1,116,799	1.97	1.39	1.51
台中市	34	1,380,106	2.46	1.70	1.84	22	1,423,788	1.55	1.03	1.10
台南市	29	939,967	3.09	2.17	2.24	24	943,864	2.54	1.49	1.65
高雄市	36	1,371,957	2.62	1.88	1.87	31	1,401,576	2.21	1.35	1.42
基隆市	3	184,978	1.62	1.04	1.37	3	185,177	1.62	1.42	1.53
新竹市	5	219,846	2.27	1.85	1.94	5	225,789	2.21	1.33	1.46
嘉義市	5	130,416	3.83	3.23	3.52	5	138,206	3.62	2.00	2.17
新竹縣	13	284,385	4.57	3.36	3.63	7	272,625	2.57	1.75	1.93
宜蘭縣	6	230,027	2.61	1.71	1.88	2	225,194	0.89	0.54	0.54
苗栗縣	4	283,174	1.41	1.02	1.13	7	265,689	2.63	1.52	1.64
彰化縣	14	650,677	2.15	1.64	1.74	13	627,147	2.07	1.33	1.45
南投縣	8	254,549	3.14	1.87	2.12	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	6	355,578	1.69	1.02	1.07	7	330,444	2.12	1.47	1.59
嘉義縣	6	263,451	2.28	1.23	1.37	8	243,617	3.28	1.62	1.70
屏東縣	12	421,534	2.85	1.61	1.77	10	403,872	2.48	2.14	1.98
澎湖縣	1	53,807	1.86	1.52	1.93	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	166,258	1.20	0.84	0.87	2	161,710	1.24	0.82	0.85
台東縣	3	112,845	2.66	2.11	2.12	1	106,074	0.94	0.27	0.41
金門縣	3	69,494	4.32	3.27	3.48	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	172	5,534,826	3.11	2.19	2.38	126	5,727,219	2.20	1.45	1.55
中部	62	2,640,910	2.35	1.62	1.75	42	2,623,861	1.60	1.05	1.13
南部	89	3,181,132	2.80	1.94	2.01	78	3,181,768	2.45	1.50	1.58
東部	5	279,103	1.79	1.33	1.35	3	267,784	1.12	0.61	0.68
金馬地區	3	76,942	3.90	2.99	3.18	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	240	8,024,446	2.99	2.10	2.23	179	8,321,973	2.15	1.38	1.49
中央政府管轄市	13	535,240	2.43	1.88	2.10	13	549,172	2.37	1.49	1.62
縣轄市	8	790,308	1.01	0.75	0.82	10	801,548	1.25	0.74	0.84
鎮	34	859,540	3.96	2.73	2.94	20	830,944	2.41	1.53	1.59
鄉	36	1,503,379	2.39	1.52	1.66	27	1,372,382	1.97	1.32	1.35
山地鄉 [4]	2	106,239	1.88	1.15	1.24	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	331	11,712,913	2.83	1.98	2.12	249	11,876,019	2.10	1.34	1.44

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	154	1,273,375	12.09	7.80	8.30	145	1,395,197	10.39	6.91	7.06
新北市	236	1,954,968	12.07	9.12	9.74	188	2,040,749	9.21	6.57	6.71
桃園市	131	1,104,073	11.87	9.70	10.31	102	1,116,799	9.13	7.63	7.82
台中市	179	1,380,106	12.97	9.44	10.46	139	1,423,788	9.76	6.70	7.24
台南市	123	939,967	13.09	8.53	9.31	74	943,864	7.84	5.72	5.92
高雄市	155	1,371,957	11.30	8.38	8.85	127	1,401,576	9.06	6.18	6.54
基隆市	29	184,978	15.68	9.59	10.57	18	185,177	9.72	7.82	7.76
新竹市	36	219,846	16.38	14.79	15.19	24	225,789	10.63	8.26	8.82
嘉義市	20	130,416	15.34	14.90	14.11	13	138,206	9.41	5.84	6.22
新竹縣	31	284,385	10.90	8.86	9.41	21	272,625	7.70	6.09	6.29
宜蘭縣	40	230,027	17.39	11.90	12.85	29	225,194	12.88	7.14	7.97
苗栗縣	33	283,174	11.65	8.51	8.79	21	265,689	7.90	5.10	5.31
彰化縣	66	650,677	10.14	6.92	7.60	44	627,147	7.02	6.32	6.01
南投縣	36	254,549	14.14	12.84	12.61	17	242,482	7.01	3.11	3.70
雲林縣	38	355,578	10.69	9.33	9.24	30	330,444	9.08	4.59	5.28
嘉義縣	39	263,451	14.80	9.84	10.39	33	243,617	13.55	8.05	8.45
屏東縣	55	421,534	13.05	9.30	9.66	43	403,872	10.65	5.85	6.45
澎湖縣	5	53,807	9.29	5.60	6.10	1	50,633	1.97	1.66	1.66
花蓮縣	29	166,258	17.44	12.00	12.60	16	161,710	9.89	6.08	6.35
台東縣	15	112,845	13.29	10.54	10.67	6	106,074	5.66	4.18	4.20
金門縣	5	69,494	7.19	8.25	8.00	4	69,779	5.73	3.02	3.21
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	690	5,534,826	12.47	9.24	9.81	548	5,727,219	9.57	6.96	7.17
中部	319	2,640,910	12.08	8.82	9.50	230	2,623,861	8.77	5.99	6.31
南部	397	3,181,132	12.48	8.85	9.36	291	3,181,768	9.15	6.07	6.42
東部	44	279,103	15.76	11.38	11.80	22	267,784	8.22	5.34	5.51
金馬地區	5	76,942	6.50	7.40	7.20	4	75,387	5.31	2.80	2.98
直轄市	978	8,024,446	12.19	8.79	9.44	775	8,321,973	9.31	6.65	6.91
中央政府管轄市	85	535,240	15.88	13.12	13.43	55	549,172	10.02	7.49	7.79
縣轄市	78	790,308	9.87	6.78	7.49	43	801,548	5.36	3.66	3.79
鎮	106	859,540	12.33	10.03	10.19	82	830,944	9.87	6.71	6.97
鄉	208	1,503,379	13.84	10.02	10.42	140	1,372,382	10.20	6.31	6.67
山地鄉 [4]	8	106,239	7.53	6.50	6.26	6	97,552	6.15	3.38	3.60
總計	1,455	11,712,913	12.42	9.06	9.63	1,095	11,876,019	9.22	6.47	6.73

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

急性骨髓性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	41	1,273,375	3.22	1.96	2.19	44	1,395,197	3.15	1.99	2.12
新北市	77	1,954,968	3.94	2.57	2.80	65	2,040,749	3.19	2.05	2.17
桃園市	48	1,104,073	4.35	3.37	3.62	33	1,116,799	2.95	2.21	2.34
台中市	67	1,380,106	4.85	3.47	3.92	53	1,423,788	3.72	2.29	2.56
台南市	43	939,967	4.57	2.80	3.10	28	943,864	2.97	1.94	2.08
高雄市	45	1,371,957	3.28	2.42	2.56	38	1,401,576	2.71	1.66	1.80
基隆市	11	184,978	5.95	3.19	3.74	7	185,177	3.78	2.07	2.46
新竹市	12	219,846	5.46	4.45	4.74	7	225,789	3.10	2.44	2.66
嘉義市	5	130,416	3.83	6.01	5.04	4	138,206	2.89	1.30	1.47
新竹縣	11	284,385	3.87	3.04	3.31	6	272,625	2.20	1.61	1.80
宜蘭縣	13	230,027	5.65	3.89	4.52	16	225,194	7.10	4.34	4.63
苗栗縣	8	283,174	2.83	1.47	1.61	6	265,689	2.26	0.90	1.07
彰化縣	19	650,677	2.92	2.50	2.65	14	627,147	2.23	1.93	1.89
南投縣	15	254,549	5.89	4.38	4.47	6	242,482	2.47	1.14	1.37
雲林縣	18	355,578	5.06	3.03	3.26	14	330,444	4.24	2.16	2.43
嘉義縣	15	263,451	5.69	3.56	3.86	14	243,617	5.75	3.05	3.43
屏東縣	14	421,534	3.32	2.81	2.70	11	403,872	2.72	1.52	1.69
澎湖縣	1	53,807	1.86	1.27	1.40	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	12	166,258	7.22	4.54	4.74	6	161,710	3.71	1.89	2.06
台東縣	4	112,845	3.54	2.30	2.43	4	106,074	3.77	1.66	1.82
金門縣	1	69,494	1.44	1.16	1.47	3	69,779	4.30	1.85	1.93
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	221	5,534,826	3.99	2.68	2.94	184	5,727,219	3.21	2.13	2.28
中部	119	2,640,910	4.51	3.19	3.50	87	2,623,861	3.32	2.06	2.23
南部	123	3,181,132	3.87	2.81	2.93	95	3,181,768	2.99	1.79	1.95
東部	16	279,103	5.73	3.64	3.80	10	267,784	3.73	1.80	1.96
金馬地區	1	76,942	1.30	1.04	1.32	3	75,387	3.98	1.72	1.80
直轄市	321	8,024,446	4.00	2.70	2.96	261	8,321,973	3.14	2.02	2.17
中央政府管轄市	28	535,240	5.23	4.28	4.37	18	549,172	3.28	2.07	2.32
縣轄市	27	790,308	3.42	2.27	2.48	15	801,548	1.87	0.89	1.01
鎮	32	859,540	3.72	2.71	2.84	28	830,944	3.37	2.17	2.27
鄉	72	1,503,379	4.79	3.49	3.70	57	1,372,382	4.15	2.56	2.77
山地鄉 [4]	4	106,239	3.77	3.81	3.43	1	97,552	1.03	0.70	0.70
總計	480	11,712,913	4.10	2.83	3.06	379	11,876,019	3.19	2.02	2.18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

急性淋巴性白血病　M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	19	1,273,375	1.49	1.93	1.78	24	1,395,197	1.72	2.31	2.01
新北市	29	1,954,968	1.48	2.23	2.00	16	2,040,749	0.78	1.41	1.16
桃園市	20	1,104,073	1.81	2.41	2.22	17	1,116,799	1.52	2.47	2.10
台中市	17	1,380,106	1.23	1.47	1.37	18	1,423,788	1.26	1.62	1.49
台南市	12	939,967	1.28	1.61	1.57	13	943,864	1.38	1.63	1.45
高雄市	15	1,371,957	1.09	1.88	1.63	17	1,401,576	1.21	1.49	1.37
基隆市	1	184,978	0.54	1.53	1.33	2	185,177	1.08	0.74	0.82
新竹市	7	219,846	3.18	4.86	4.30	3	225,789	1.33	1.74	1.64
嘉義市	2	130,416	1.53	2.81	2.23	2	138,206	1.45	0.79	0.91
新竹縣	5	284,385	1.76	2.31	2.14	2	272,625	0.73	1.32	1.10
宜蘭縣	2	230,027	0.87	1.59	1.26	2	225,194	0.89	0.44	0.57
苗栗縣	5	283,174	1.77	3.15	2.82	2	265,689	0.75	1.45	1.16
彰化縣	8	650,677	1.23	1.13	1.15	8	627,147	1.28	2.85	2.25
南投縣	4	254,549	1.57	3.36	2.90	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	6	355,578	1.69	4.28	3.62	2	330,444	0.61	0.43	0.52
嘉義縣	1	263,451	0.38	0.31	0.37	2	243,617	0.82	2.20	1.83
屏東縣	7	421,534	1.66	2.41	2.25	3	403,872	0.74	0.30	0.33
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	166,258	1.20	2.98	2.59	2	161,710	1.24	1.95	1.78
台東縣	2	112,845	1.77	3.99	3.23	1	106,074	0.94	1.99	1.90
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	88	5,534,826	1.59	2.32	2.10	68	5,727,219	1.19	1.82	1.56
中部	35	2,640,910	1.33	1.82	1.66	28	2,623,861	1.07	1.66	1.45
南部	37	3,181,132	1.16	1.76	1.60	37	3,181,768	1.16	1.37	1.25
東部	4	279,103	1.43	3.35	2.82	3	267,784	1.12	1.99	1.85
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	112	8,024,446	1.40	1.94	1.77	105	8,321,973	1.26	1.81	1.58
中央政府管轄市	10	535,240	1.87	3.32	2.85	7	549,172	1.27	1.24	1.24
縣轄市	7	790,308	0.89	1.35	1.25	5	801,548	0.62	1.30	1.07
鎮	15	859,540	1.75	3.15	2.75	9	830,944	1.08	1.81	1.57
鄉	20	1,503,379	1.33	2.12	1.90	10	1,372,382	0.73	1.11	0.94
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	1	97,552	1.03	0.70	0.70
總計	164	11,712,913	1.40	2.07	1.87	136	11,876,019	1.15	1.68	1.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

慢性骨髓性白血病, BCR-ABL1 陽性 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	17	1,273,375	1.34	0.91	0.95	12	1,395,197	0.86	0.51	0.55
新北市	21	1,954,968	1.07	0.82	0.86	23	2,040,749	1.13	0.78	0.83
桃園市	13	1,104,073	1.18	0.90	1.01	8	1,116,799	0.72	0.66	0.69
台中市	18	1,380,106	1.30	1.01	1.11	13	1,423,788	0.91	0.53	0.60
台南市	13	939,967	1.38	1.00	1.06	7	943,864	0.74	0.63	0.72
高雄市	9	1,371,957	0.66	0.46	0.51	14	1,401,576	1.00	0.70	0.79
基隆市	5	184,978	2.70	1.57	1.78	2	185,177	1.08	0.90	0.89
新竹市	6	219,846	2.73	2.18	2.34	2	225,789	0.89	0.65	0.68
嘉義市	4	130,416	3.07	2.67	2.71	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	3	284,385	1.05	1.01	1.09	3	272,625	1.10	0.81	0.87
宜蘭縣	6	230,027	2.61	1.87	2.01	2	225,194	0.89	0.51	0.56
苗栗縣	1	283,174	0.35	0.21	0.19	1	265,689	0.38	0.27	0.33
彰化縣	9	650,677	1.38	0.98	1.09	3	627,147	0.48	0.26	0.31
南投縣	1	254,549	0.39	0.84	0.80	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	3	355,578	0.84	0.54	0.66	2	330,444	0.61	0.40	0.41
嘉義縣	4	263,451	1.52	1.29	1.45	5	243,617	2.05	1.43	1.49
屏東縣	9	421,534	2.14	1.16	1.31	4	403,872	0.99	0.83	0.93
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	166,258	1.20	0.70	0.70	3	161,710	1.86	0.82	0.89
台東縣	4	112,845	3.54	2.46	2.72	1	106,074	0.94	0.52	0.48
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	72	5,534,826	1.30	0.97	1.04	53	5,727,219	0.93	0.67	0.71
中部	31	2,640,910	1.17	0.91	1.00	18	2,623,861	0.69	0.39	0.44
南部	39	3,181,132	1.23	0.86	0.93	30	3,181,768	0.94	0.71	0.79
東部	6	279,103	2.15	1.41	1.52	4	267,784	1.49	0.70	0.72
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	91	8,024,446	1.13	0.84	0.91	77	8,321,973	0.93	0.65	0.71
中央政府管轄市	15	535,240	2.80	2.09	2.24	4	549,172	0.73	0.59	0.60
縣轄市	8	790,308	1.01	0.64	0.72	5	801,548	0.62	0.38	0.39
鎮	9	859,540	1.05	0.96	1.01	5	830,944	0.60	0.33	0.37
鄉	25	1,503,379	1.66	1.13	1.25	14	1,372,382	1.02	0.72	0.79
山地鄉[4]	1	106,239	0.94	0.58	0.62	1	97,552	1.03	0.65	0.60
總計	148	11,712,913	1.26	0.93	1.01	105	11,876,019	0.88	0.61	0.67

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

慢性淋巴性白血病 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	20	1,273,375	1.57	0.76	0.86	21	1,395,197	1.51	0.69	0.77
新北市	26	1,954,968	1.33	0.81	0.91	13	2,040,749	0.64	0.33	0.37
桃園市	8	1,104,073	0.72	0.51	0.56	5	1,116,799	0.45	0.27	0.31
台中市	11	1,380,106	0.80	0.55	0.57	7	1,423,788	0.49	0.27	0.33
台南市	11	939,967	1.17	0.58	0.69	6	943,864	0.64	0.38	0.42
高雄市	13	1,371,957	0.95	0.49	0.54	7	1,401,576	0.50	0.28	0.28
基隆市	2	184,978	1.08	0.57	0.53	1	185,177	0.54	0.27	0.25
新竹市	1	219,846	0.45	0.28	0.32	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	3	130,416	2.30	1.17	1.33	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	4	284,385	1.41	0.71	0.85	1	272,625	0.37	0.26	0.28
宜蘭縣	3	230,027	1.30	0.70	0.79	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	1	283,174	0.35	0.21	0.19	2	265,689	0.75	0.18	0.30
彰化縣	8	650,677	1.23	0.59	0.73	2	627,147	0.32	0.08	0.13
南投縣	1	254,549	0.39	0.13	0.20	1	242,482	0.41	0.20	0.23
雲林縣	2	355,578	0.56	0.24	0.26	2	330,444	0.61	0.38	0.43
嘉義縣	5	263,451	1.90	0.73	0.85	2	243,617	0.82	0.12	0.14
屏東縣	3	421,534	0.71	0.40	0.44	5	403,872	1.24	0.64	0.65
澎湖縣	2	53,807	3.72	2.74	3.02	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	4	166,258	2.41	1.14	1.33	1	161,710	0.62	0.13	0.24
台東縣	1	112,845	0.89	0.26	0.31	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	1	69,494	1.44	0.44	0.79	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	65	5,534,826	1.17	0.68	0.76	43	5,727,219	0.75	0.39	0.44
中部	22	2,640,910	0.83	0.48	0.54	12	2,623,861	0.46	0.22	0.27
南部	37	3,181,132	1.16	0.59	0.67	20	3,181,768	0.63	0.34	0.35
東部	5	279,103	1.79	0.78	0.92	1	267,784	0.37	0.08	0.14
金馬地區	1	76,942	1.30	0.41	0.74	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	89	8,024,446	1.11	0.64	0.71	59	8,321,973	0.71	0.38	0.42
中央政府管轄市	6	535,240	1.12	0.63	0.67	1	549,172	0.18	0.11	0.10
縣轄市	11	790,308	1.39	0.81	0.89	2	801,548	0.25	0.07	0.10
鎮	6	859,540	0.70	0.25	0.34	3	830,944	0.36	0.14	0.18
鄉	18	1,503,379	1.20	0.54	0.63	11	1,372,382	0.80	0.37	0.40
山地鄉[4]	1	106,239	0.94	0.95	0.98	1	97,552	1.03	0.65	0.60
總計	130	11,712,913	1.11	0.61	0.69	76	11,876,019	0.64	0.33	0.37

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

骨髓增生性腫瘤　M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	36	1,273,375	2.83	1.45	1.56	21	1,395,197	1.51	0.74	0.83
新北市	43	1,954,968	2.20	1.51	1.72	45	2,040,749	2.21	1.27	1.39
桃園市	31	1,104,073	2.81	1.87	2.15	28	1,116,799	2.51	1.48	1.77
台中市	38	1,380,106	2.75	1.70	1.99	30	1,423,788	2.11	1.31	1.43
台南市	24	939,967	2.55	1.49	1.63	9	943,864	0.95	0.46	0.51
高雄市	41	1,371,957	2.99	1.87	2.06	30	1,401,576	2.14	1.39	1.50
基隆市	9	184,978	4.87	2.37	2.79	5	185,177	2.70	3.57	3.09
新竹市	9	219,846	4.09	2.69	3.18	8	225,789	3.54	2.69	2.80
嘉義市	2	130,416	1.53	0.74	0.75	5	138,206	3.62	3.05	2.98
新竹縣	6	284,385	2.11	1.22	1.43	8	272,625	2.93	1.83	1.99
宜蘭縣	6	230,027	2.61	1.51	1.62	4	225,194	1.78	0.87	1.09
苗栗縣	9	283,174	3.18	1.84	2.12	6	265,689	2.26	1.41	1.49
彰化縣	13	650,677	2.00	1.02	1.15	10	627,147	1.59	0.57	0.76
南投縣	6	254,549	2.36	2.50	2.32	8	242,482	3.30	1.43	1.69
雲林縣	5	355,578	1.41	0.72	0.82	5	330,444	1.51	0.95	1.05
嘉義縣	7	263,451	2.66	2.78	2.42	7	243,617	2.87	0.95	1.13
屏東縣	10	421,534	2.37	1.24	1.43	13	403,872	3.22	1.71	1.94
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	5	166,258	3.01	1.34	1.78	2	161,710	1.24	0.65	0.73
台東縣	4	112,845	3.54	1.53	1.99	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	2	69,494	2.88	5.57	4.55	1	69,779	1.43	1.17	1.28
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	149	5,534,826	2.69	1.64	1.86	125	5,727,219	2.18	1.29	1.42
中部	62	2,640,910	2.35	1.40	1.58	53	2,623,861	2.02	1.10	1.26
南部	84	3,181,132	2.64	1.63	1.76	64	3,181,768	2.01	1.18	1.29
東部	9	279,103	3.22	1.41	1.86	2	267,784	0.75	0.39	0.44
金馬地區	2	76,942	2.60	4.97	4.06	1	75,387	1.33	1.07	1.18
直轄市	213	8,024,446	2.65	1.63	1.83	163	8,321,973	1.96	1.13	1.26
中央政府管轄市	20	535,240	3.74	2.14	2.49	18	549,172	3.28	2.94	2.85
縣轄市	12	790,308	1.52	0.90	1.07	12	801,548	1.50	0.75	0.91
鎮	22	859,540	2.56	1.71	1.77	24	830,944	2.89	1.59	1.79
鄉	39	1,503,379	2.59	1.61	1.68	28	1,372,382	2.04	0.88	1.03
山地鄉 [4]	1	106,239	0.94	0.47	0.54	1	97,552	1.03	0.31	0.55
總計	306	11,712,913	2.61	1.59	1.77	245	11,876,019	2.06	1.19	1.32

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

骨髓分化不良症候群 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	20	1,273,375	1.57	0.73	0.90	21	1,395,197	1.51	0.60	0.70
新北市	39	1,954,968	1.99	1.13	1.40	24	2,040,749	1.18	0.70	0.74
桃園市	10	1,104,073	0.91	0.57	0.69	11	1,116,799	0.98	0.54	0.62
台中市	26	1,380,106	1.88	1.16	1.38	18	1,423,788	1.26	0.68	0.83
台南市	18	939,967	1.91	0.92	1.08	7	943,864	0.74	0.34	0.37
高雄市	31	1,371,957	2.26	1.17	1.47	20	1,401,576	1.43	0.62	0.75
基隆市	1	184,978	0.54	0.37	0.41	1	185,177	0.54	0.27	0.25
新竹市	1	219,846	0.45	0.34	0.31	4	225,789	1.77	0.73	1.04
嘉義市	4	130,416	3.07	1.50	2.04	1	138,206	0.72	0.46	0.50
新竹縣	2	284,385	0.70	0.57	0.60	1	272,625	0.37	0.26	0.26
宜蘭縣	9	230,027	3.91	2.19	2.48	5	225,194	2.22	0.99	1.12
苗栗縣	9	283,174	3.18	1.62	1.85	4	265,689	1.51	0.87	0.97
彰化縣	9	650,677	1.38	0.70	0.83	6	627,147	0.96	0.53	0.57
南投縣	9	254,549	3.54	1.63	1.93	2	242,482	0.82	0.33	0.41
雲林縣	4	355,578	1.12	0.51	0.63	5	330,444	1.51	0.25	0.43
嘉義縣	7	263,451	2.66	1.16	1.43	3	243,617	1.23	0.32	0.43
屏東縣	12	421,534	2.85	1.28	1.53	4	403,872	0.99	0.43	0.51
澎湖縣	2	53,807	3.72	1.59	1.69	1	50,633	1.97	1.66	1.66
花蓮縣	4	166,258	2.41	1.29	1.45	2	161,710	1.24	0.64	0.66
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	1	69,494	1.44	1.08	1.19	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	91	5,534,826	1.64	0.89	1.07	71	5,727,219	1.24	0.63	0.71
中部	48	2,640,910	1.82	0.99	1.18	31	2,623,861	1.18	0.52	0.64
南部	74	3,181,132	2.33	1.13	1.38	36	3,181,768	1.13	0.50	0.58
東部	4	279,103	1.43	0.78	0.87	2	267,784	0.75	0.39	0.40
金馬地區	1	76,942	1.30	0.98	1.08	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	144	8,024,446	1.79	0.97	1.18	101	8,321,973	1.21	0.60	0.69
中央政府管轄市	6	535,240	1.12	0.66	0.81	6	549,172	1.09	0.48	0.59
縣轄市	13	790,308	1.64	0.81	1.07	4	801,548	0.50	0.28	0.32
鎮	21	859,540	2.44	1.20	1.44	12	830,944	1.44	0.61	0.73
鄉	34	1,503,379	2.26	1.14	1.27	17	1,372,382	1.24	0.54	0.62
山地鄉 [4]	1	106,239	0.94	0.69	0.69	1	97,552	1.03	0.37	0.45
總計	218	11,712,913	1.86	0.98	1.18	140	11,876,019	1.18	0.56	0.65

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	6	1,273,375	0.47	0.51	0.52	10	1,395,197	0.72	0.72	0.69
新北市	17	1,954,968	0.87	0.76	0.79	10	2,040,749	0.49	0.41	0.43
桃園市	8	1,104,073	0.72	0.64	0.68	3	1,116,799	0.27	0.28	0.28
台中市	18	1,380,106	1.30	1.20	1.22	8	1,423,788	0.56	0.42	0.45
台南市	4	939,967	0.43	0.38	0.41	8	943,864	0.85	0.81	0.84
高雄市	10	1,371,957	0.73	0.67	0.64	4	1,401,576	0.29	0.52	0.48
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	1	185,177	0.54	0.94	0.89
新竹市	1	219,846	0.45	0.30	0.36	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	2	130,416	1.53	0.69	0.88	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	2	284,385	0.70	0.87	0.79	4	272,625	1.47	0.81	0.90
宜蘭縣	2	230,027	0.87	1.36	1.34	2	225,194	0.89	1.18	1.17
苗栗縣	2	283,174	0.71	1.51	1.37	2	265,689	0.75	1.05	1.03
彰化縣	5	650,677	0.77	0.62	0.66	2	627,147	0.32	0.26	0.28
南投縣	8	254,549	3.14	2.60	2.65	2	242,482	0.82	1.56	1.48
雲林縣	1	355,578	0.28	0.06	0.12	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	2	263,451	0.76	0.62	0.74	1	243,617	0.41	0.34	0.34
屏東縣	3	421,534	0.71	0.83	0.81	5	403,872	1.24	0.97	1.02
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	1	50,633	1.97	1.07	1.07
花蓮縣	4	166,258	2.41	3.07	3.05	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	1	69,779	1.43	0.41	0.75
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	38	5,534,826	0.69	0.69	0.71	32	5,727,219	0.56	0.54	0.54
中部	32	2,640,910	1.21	1.04	1.07	12	2,623,861	0.46	0.42	0.43
南部	21	3,181,132	0.66	0.59	0.60	19	3,181,768	0.60	0.64	0.63
東部	4	279,103	1.43	1.82	1.81	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	1	75,387	1.33	0.39	0.70
直轄市	63	8,024,446	0.79	0.71	0.73	43	8,321,973	0.52	0.51	0.50
中央政府管轄市	3	535,240	0.56	0.32	0.40	1	549,172	0.18	0.29	0.28
縣轄市	5	790,308	0.63	0.64	0.63	5	801,548	0.62	0.54	0.57
鎮	6	859,540	0.70	0.62	0.64	6	830,944	0.72	0.81	0.80
鄉	18	1,503,379	1.20	1.54	1.51	9	1,372,382	0.66	0.50	0.52
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	1	97,552	1.03	0.70	0.70
總計	95	11,712,913	0.81	0.76	0.78	64	11,876,019	0.54	0.52	0.52

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47，C49

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	48	1,273,375	3.77	2.59	2.76	37	1,395,197	2.65	1.38	1.61
新北市	68	1,954,968	3.48	2.39	2.60	50	2,040,749	2.45	1.65	1.77
桃園市	26	1,104,073	2.35	1.77	1.89	32	1,116,799	2.87	2.30	2.36
台中市	32	1,380,106	2.32	1.69	1.92	36	1,423,788	2.53	1.73	1.86
台南市	27	939,967	2.87	2.01	2.10	19	943,864	2.01	2.00	1.93
高雄市	32	1,371,957	2.33	1.39	1.60	24	1,401,576	1.71	1.27	1.27
基隆市	4	184,978	2.16	1.27	1.57	4	185,177	2.16	1.68	1.63
新竹市	5	219,846	2.27	1.83	2.09	10	225,789	4.43	3.06	3.31
嘉義市	4	130,416	3.07	2.37	2.48	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	9	284,385	3.16	2.99	2.89	5	272,625	1.83	1.16	1.28
宜蘭縣	8	230,027	3.48	2.33	2.52	6	225,194	2.66	1.73	1.92
苗栗縣	13	283,174	4.59	2.71	3.20	3	265,689	1.13	0.76	0.84
彰化縣	30	650,677	4.61	3.44	3.60	19	627,147	3.03	2.03	2.16
南投縣	10	254,549	3.93	2.37	2.52	5	242,482	2.06	1.10	1.28
雲林縣	12	355,578	3.37	2.38	2.66	1	330,444	0.30	0.19	0.17
嘉義縣	5	263,451	1.90	2.09	2.13	7	243,617	2.87	1.76	1.90
屏東縣	20	421,534	4.74	2.96	3.31	6	403,872	1.49	0.81	0.98
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	2	166,258	1.20	0.94	1.12	3	161,710	1.86	0.80	0.91
台東縣	5	112,845	4.43	4.62	4.70	3	106,074	2.83	1.29	1.43
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	2	7,448	26.85	12.32	18.50	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	181	5,534,826	3.27	2.31	2.49	147	5,727,219	2.57	1.71	1.84
中部	84	2,640,910	3.18	2.27	2.46	61	2,623,861	2.32	1.55	1.67
南部	88	3,181,132	2.77	1.84	2.01	56	3,181,768	1.76	1.41	1.42
東部	7	279,103	2.51	2.41	2.56	6	267,784	2.24	0.99	1.12
金馬地區	2	76,942	2.60	0.96	1.38	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	233	8,024,446	2.90	2.01	2.19	198	8,321,973	2.38	1.68	1.77
中央政府管轄市	13	535,240	2.43	1.77	1.99	14	549,172	2.55	1.81	1.89
縣轄市	24	790,308	3.04	2.35	2.47	11	801,548	1.37	0.77	0.90
鎮	32	859,540	3.72	2.64	2.83	15	830,944	1.81	1.23	1.29
鄉	60	1,503,379	3.99	2.81	3.02	32	1,372,382	2.33	1.34	1.49
山地鄉[4]	4	106,239	3.77	2.76	3.08	2	97,552	2.05	2.31	2.32
總計	362	11,712,913	3.09	2.16	2.34	270	11,876,019	2.27	1.56	1.66

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

皮膚 C44

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	186	1,273,375	14.61	6.61	7.89	150	1,395,197	10.75	4.34	5.10
新北市	272	1,954,968	13.91	7.68	9.12	242	2,040,749	11.86	5.72	6.92
桃園市	129	1,104,073	11.68	6.95	8.46	134	1,116,799	12.00	6.67	8.01
台中市	208	1,380,106	15.07	8.94	10.55	163	1,423,788	11.45	5.97	7.20
台南市	236	939,967	25.11	12.33	14.85	251	943,864	26.59	10.46	12.58
高雄市	351	1,371,957	25.58	13.44	15.67	267	1,401,576	19.05	8.55	10.09
基隆市	28	184,978	15.14	7.16	9.01	20	185,177	10.80	4.87	5.64
新竹市	24	219,846	10.92	6.71	7.86	20	225,789	8.86	4.51	5.25
嘉義市	30	130,416	23.00	11.63	13.78	21	138,206	15.19	6.45	7.73
新竹縣	33	284,385	11.60	6.29	7.57	18	272,625	6.60	3.20	3.64
宜蘭縣	37	230,027	16.09	7.87	9.50	35	225,194	15.54	5.80	6.90
苗栗縣	45	283,174	15.89	7.13	8.39	38	265,689	14.30	6.26	7.26
彰化縣	144	650,677	22.13	10.23	12.78	123	627,147	19.61	8.14	9.45
南投縣	61	254,549	23.96	10.33	12.34	49	242,482	20.21	7.18	8.55
雲林縣	79	355,578	22.22	9.45	11.41	76	330,444	23.00	7.30	8.67
嘉義縣	75	263,451	28.47	9.95	12.61	91	243,617	37.35	10.52	13.02
屏東縣	127	421,534	30.13	12.38	15.57	125	403,872	30.95	11.80	14.06
澎湖縣	17	53,807	31.59	16.78	18.60	8	50,633	15.80	4.59	5.97
花蓮縣	45	166,258	27.07	11.94	14.11	33	161,710	20.41	8.39	9.20
台東縣	23	112,845	20.38	10.29	11.90	29	106,074	27.34	9.52	11.73
金門縣	3	69,494	4.32	1.80	2.43	2	69,779	2.87	1.25	1.32
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	754	5,534,826	13.62	7.10	8.50	657	5,727,219	11.47	5.28	6.28
中部	492	2,640,910	18.63	9.55	11.53	411	2,623,861	15.66	6.83	8.13
南部	836	3,181,132	26.28	12.71	15.20	763	3,181,768	23.98	9.65	11.56
東部	68	279,103	24.36	11.28	13.22	62	267,784	23.15	8.88	10.26
金馬地區	3	76,942	3.90	1.67	2.25	2	75,387	2.65	1.16	1.23
直轄市	1,382	8,024,446	17.22	9.18	10.91	1,207	8,321,973	14.50	6.68	8.00
中央政府管轄市	82	535,240	15.32	8.15	9.83	61	549,172	11.11	5.10	5.99
縣轄市	120	790,308	15.18	7.62	9.29	123	801,548	15.35	6.91	8.10
鎮	187	859,540	21.76	10.32	12.25	157	830,944	18.89	7.23	8.54
鄉	382	1,503,379	25.41	10.26	12.71	347	1,372,382	25.28	8.65	10.28
山地鄉 [4]	9	106,239	8.47	5.67	6.57	11	97,552	11.28	6.09	6.68
總計*	2,153	11,712,913	18.38	9.30	11.16	1,896	11,876,019	15.96	6.93	8.27

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	14	1,273,375	1.10	0.61	0.67	19	1,395,197	1.36	0.54	0.63
新北市	17	1,954,968	0.87	0.51	0.59	23	2,040,749	1.13	0.57	0.69
桃園市	15	1,104,073	1.36	0.70	0.85	17	1,116,799	1.52	0.93	1.06
台中市	20	1,380,106	1.45	0.92	1.08	13	1,423,788	0.91	0.56	0.62
台南市	9	939,967	0.96	0.51	0.61	12	943,864	1.27	0.69	0.77
高雄市	14	1,371,957	1.02	0.54	0.64	14	1,401,576	1.00	0.44	0.55
基隆市	4	184,978	2.16	1.01	1.27	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	4	219,846	1.82	1.21	1.38	2	225,789	0.89	0.56	0.56
嘉義市	2	130,416	1.53	0.87	0.93	1	138,206	0.72	0.39	0.39
新竹縣	4	284,385	1.41	0.78	0.88	2	272,625	0.73	0.20	0.29
宜蘭縣	3	230,027	1.30	0.60	0.66	4	225,194	1.78	0.95	1.09
苗栗縣	4	283,174	1.41	0.80	0.88	2	265,689	0.75	0.27	0.35
彰化縣	4	650,677	0.61	0.29	0.37	8	627,147	1.28	0.38	0.53
南投縣	8	254,549	3.14	1.28	1.54	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	2	355,578	0.56	0.13	0.23	5	330,444	1.51	0.78	0.86
嘉義縣	4	263,451	1.52	0.72	0.81	5	243,617	2.05	0.90	1.04
屏東縣	9	421,534	2.14	1.04	1.22	3	403,872	0.74	0.18	0.27
澎湖縣	3	53,807	5.58	2.97	3.18	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	166,258	0.60	0.33	0.33	2	161,710	1.24	0.31	0.37
台東縣	3	112,845	2.66	1.49	1.62	2	106,074	1.89	1.10	1.20
金門縣	1	69,494	1.44	0.68	0.82	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	65	5,534,826	1.17	0.63	0.72	69	5,727,219	1.20	0.59	0.69
中部	34	2,640,910	1.29	0.68	0.82	26	2,623,861	0.99	0.51	0.60
南部	41	3,181,132	1.29	0.67	0.78	35	3,181,768	1.10	0.50	0.60
東部	4	279,103	1.43	0.82	0.88	4	267,784	1.49	0.62	0.70
金馬地區	1	76,942	1.30	0.63	0.75	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	89	8,024,446	1.11	0.62	0.72	98	8,321,973	1.18	0.60	0.70
中央政府管轄市	10	535,240	1.87	1.05	1.22	3	549,172	0.55	0.29	0.29
縣轄市	9	790,308	1.14	0.60	0.69	4	801,548	0.50	0.19	0.25
鎮	6	859,540	0.70	0.31	0.36	6	830,944	0.72	0.24	0.29
鄉	31	1,503,379	2.06	0.96	1.12	23	1,372,382	1.68	0.68	0.82
山地鄉 [4]	1	106,239	0.94	0.58	0.54	1	97,552	1.03	0.66	0.72
總計	145	11,712,913	1.24	0.66	0.77	134	11,876,019	1.13	0.55	0.64

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

皮膚，非惡性黑色素瘤 C44 （M-87203 - M-87903 除外）

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	172	1,273,375	13.51	6.01	7.22	131	1,395,197	9.39	3.80	4.48
新北市	255	1,954,968	13.04	7.17	8.54	219	2,040,749	10.73	5.15	6.23
桃園市	114	1,104,073	10.33	6.25	7.61	117	1,116,799	10.48	5.74	6.95
台中市	188	1,380,106	13.62	8.02	9.47	150	1,423,788	10.54	5.41	6.58
台南市	227	939,967	24.15	11.82	14.24	239	943,864	25.32	9.77	11.81
高雄市	337	1,371,957	24.56	12.89	15.03	253	1,401,576	18.05	8.10	9.54
基隆市	24	184,978	12.97	6.15	7.73	20	185,177	10.80	4.87	5.64
新竹市	20	219,846	9.10	5.50	6.48	18	225,789	7.97	3.95	4.69
嘉義市	28	130,416	21.47	10.77	12.85	20	138,206	14.47	6.06	7.34
新竹縣	29	284,385	10.20	5.51	6.68	16	272,625	5.87	3.00	3.34
宜蘭縣	34	230,027	14.78	7.26	8.84	31	225,194	13.77	4.84	5.81
苗栗縣	41	283,174	14.48	6.33	7.51	36	265,689	13.55	5.99	6.91
彰化縣	140	650,677	21.52	9.95	12.41	115	627,147	18.34	7.76	8.93
南投縣	53	254,549	20.82	9.05	10.80	49	242,482	20.21	7.18	8.55
雲林縣	77	355,578	21.65	9.32	11.18	71	330,444	21.49	6.52	7.81
嘉義縣	71	263,451	26.95	9.23	11.81	86	243,617	35.30	9.62	11.97
屏東縣	118	421,534	27.99	11.34	14.36	122	403,872	30.21	11.62	13.79
澎湖縣	14	53,807	26.02	13.82	15.42	8	50,633	15.80	4.59	5.97
花蓮縣	44	166,258	26.46	11.62	13.78	31	161,710	19.17	8.08	8.83
台東縣	20	112,845	17.72	8.80	10.28	27	106,074	25.45	8.42	10.52
金門縣	2	69,494	2.88	1.12	1.61	2	69,779	2.87	1.25	1.32
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	689	5,534,826	12.45	6.47	7.77	588	5,727,219	10.27	4.69	5.58
中部	458	2,640,910	17.34	8.87	10.71	385	2,623,861	14.67	6.32	7.53
南部	795	3,181,132	24.99	12.04	14.42	728	3,181,768	22.88	9.15	10.97
東部	64	279,103	22.93	10.46	12.34	58	267,784	21.66	8.26	9.56
金馬地區	2	76,942	2.60	1.04	1.50	2	75,387	2.65	1.16	1.23
直轄市	1,293	8,024,446	16.11	8.56	10.19	1,109	8,321,973	13.33	6.08	7.30
中央政府管轄市	72	535,240	13.45	7.10	8.61	58	549,172	10.56	4.80	5.69
縣轄市	111	790,308	14.05	7.02	8.61	119	801,548	14.85	6.72	7.85
鎮	181	859,540	21.06	10.01	11.88	151	830,944	18.17	6.99	8.25
鄉	351	1,503,379	23.35	9.30	11.60	324	1,372,382	23.61	7.96	9.47
山地鄉[4]	8	106,239	7.53	5.09	6.03	10	97,552	10.25	5.42	5.97
總計*	2,008	11,712,913	17.14	8.64	10.40	1,762	11,876,019	14.84	6.38	7.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

女性乳房 C50；男性乳房 C50

性別 / 地區	女性乳房					男性乳房				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	2,144	1,395,197	153.67	88.37	95.61	8	1,273,375	0.63	0.27	0.35
新北市	2,741	2,040,749	134.31	79.95	86.43	9	1,954,968	0.46	0.26	0.32
桃園市	1,158	1,116,799	103.69	68.21	73.91	3	1,104,073	0.27	0.22	0.22
台中市	1,743	1,423,788	122.42	78.57	85.22	3	1,380,106	0.22	0.14	0.14
台南市	1,128	943,864	119.51	71.50	77.26	6	939,967	0.64	0.32	0.35
高雄市	1,672	1,401,576	119.29	71.12	76.81	10	1,371,957	0.73	0.38	0.45
基隆市	207	185,177	111.78	63.61	69.48	0	184,978	0.00	0.00	0.00
新竹市	258	225,789	114.27	75.64	82.34	3	219,846	1.36	0.96	1.09
嘉義市	154	138,206	111.43	68.92	74.97	2	130,416	1.53	1.00	1.02
新竹縣	290	272,625	106.37	71.71	76.84	2	284,385	0.70	0.32	0.44
宜蘭縣	228	225,194	101.25	59.84	64.96	1	230,027	0.43	0.14	0.16
苗栗縣	294	265,689	110.66	69.89	74.66	0	283,174	0.00	0.00	0.00
彰化縣	649	627,147	103.48	65.97	70.89	4	650,677	0.61	0.34	0.35
南投縣	259	242,482	106.81	64.93	70.53	3	254,549	1.18	0.63	0.69
雲林縣	309	330,444	93.51	58.65	63.54	2	355,578	0.56	0.33	0.33
嘉義縣	225	243,617	92.36	54.50	58.60	0	263,451	0.00	0.00	0.00
屏東縣	419	403,872	103.75	60.02	64.27	3	421,534	0.71	0.37	0.38
澎湖縣	25	50,633	49.37	31.46	34.73	0	53,807	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	165	161,710	102.03	57.54	61.76	0	166,258	0.00	0.00	0.00
台東縣	105	106,074	98.99	60.98	65.96	1	112,845	0.89	0.58	0.64
金門縣	37	69,779	53.02	33.23	36.56	0	69,494	0.00	0.00	0.00
連江縣	5	5,608	89.16	54.27	61.20	0	7,448	0.00	0.00	0.00
北部	7,320	5,727,219	127.81	77.54	83.88	26	5,534,826	0.47	0.26	0.31
中部	2,960	2,623,861	112.81	71.72	77.57	12	2,640,910	0.45	0.27	0.28
南部	3,623	3,181,768	113.87	67.93	73.32	21	3,181,132	0.66	0.34	0.38
東部	270	267,784	100.83	58.81	63.29	1	279,103	0.36	0.24	0.26
金馬地區	42	75,387	55.71	34.61	38.14	0	76,942	0.00	0.00	0.00
直轄市	10,586	8,321,973	127.21	77.20	83.53	39	8,024,446	0.49	0.27	0.31
中央政府管轄市	619	549,172	112.72	69.62	75.88	5	535,240	0.93	0.64	0.68
縣轄市	485	801,548	60.51	36.50	39.41	1	790,308	0.13	0.08	0.08
鎮	650	830,944	78.22	47.20	51.14	2	859,540	0.23	0.13	0.13
鄉	1,875	1,372,382	136.62	85.24	91.52	13	1,503,379	0.86	0.42	0.47
山地鄉 [4]	55	97,552	56.38	37.34	40.05	0	106,239	0.00	0.00	0.00
總計*	14,217	11,876,019	119.71	72.97	78.86	60	11,712,913	0.51	0.28	0.32

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 2 名女性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

子宮，非特定部位 C55；子宮頸 C53

性別 / 地區	子宮，非特定部位					子宮頸				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	0	1,395,197	0.00	0.00	0.00	156	1,395,197	11.18	6.11	6.81
新北市	1	2,040,749	0.05	0.03	0.02	245	2,040,749	12.01	6.92	7.89
桃園市	0	1,116,799	0.00	0.00	0.00	145	1,116,799	12.98	8.56	9.50
台中市	1	1,423,788	0.07	0.04	0.05	171	1,423,788	12.01	7.54	8.33
台南市	0	943,864	0.00	0.00	0.00	114	943,864	12.08	6.67	7.35
高雄市	2	1,401,576	0.14	0.09	0.10	195	1,401,576	13.91	8.01	8.87
基隆市	0	185,177	0.00	0.00	0.00	24	185,177	12.96	6.79	7.59
新竹市	1	225,789	0.44	0.29	0.32	25	225,789	11.07	6.63	7.48
嘉義市	0	138,206	0.00	0.00	0.00	9	138,206	6.51	3.89	4.06
新竹縣	0	272,625	0.00	0.00	0.00	31	272,625	11.37	7.69	8.50
宜蘭縣	0	225,194	0.00	0.00	0.00	25	225,194	11.10	6.28	6.87
苗栗縣	0	265,689	0.00	0.00	0.00	37	265,689	13.93	8.76	9.81
彰化縣	0	627,147	0.00	0.00	0.00	58	627,147	9.25	5.61	6.19
南投縣	0	242,482	0.00	0.00	0.00	28	242,482	11.55	6.17	6.91
雲林縣	0	330,444	0.00	0.00	0.00	33	330,444	9.99	5.62	6.09
嘉義縣	0	243,617	0.00	0.00	0.00	29	243,617	11.90	6.52	7.16
屏東縣	1	403,872	0.25	0.13	0.12	62	403,872	15.35	8.61	9.71
澎湖縣	0	50,633	0.00	0.00	0.00	5	50,633	9.87	3.93	4.55
花蓮縣	0	161,710	0.00	0.00	0.00	24	161,710	14.84	8.60	9.36
台東縣	0	106,074	0.00	0.00	0.00	14	106,074	13.20	7.64	8.16
金門縣	0	69,779	0.00	0.00	0.00	3	69,779	4.30	1.66	2.07
連江縣	0	5,608	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	2	5,727,219	0.03	0.02	0.02	688	5,727,219	12.01	7.10	7.95
中部	1	2,623,861	0.04	0.03	0.03	290	2,623,861	11.05	6.69	7.38
南部	3	3,181,768	0.09	0.06	0.06	414	3,181,768	13.01	7.30	8.08
東部	0	267,784	0.00	0.00	0.00	38	267,784	14.19	8.23	8.89
金馬地區	0	75,387	0.00	0.00	0.00	3	75,387	3.98	1.55	1.92
直轄市	4	8,321,973	0.05	0.03	0.03	1,026	8,321,973	12.33	7.25	8.08
中央政府管轄市	1	549,172	0.18	0.13	0.14	58	549,172	10.56	6.10	6.76
縣轄市	0	801,548	0.00	0.00	0.00	47	801,548	5.86	3.26	3.68
鎮	0	830,944	0.00	0.00	0.00	68	830,944	8.18	4.58	5.26
鄉	1	1,372,382	0.07	0.04	0.04	234	1,372,382	17.05	10.07	10.98
山地鄉 [4]	0	97,552	0.00	0.00	0.00	16	97,552	16.40	11.28	12.10
總計	6	11,876,019	0.05	0.03	0.03	1,433	11,876,019	12.07	7.06	7.85

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

性別 / 地區	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	398	1,395,197	28.53	16.44	17.78	193	1,395,197	13.83	8.42	9.05
新北市	555	2,040,749	27.20	15.95	17.24	288	2,040,749	14.11	9.06	9.73
桃園市	244	1,116,799	21.85	14.36	15.46	141	1,116,799	12.63	8.51	9.22
台中市	325	1,423,788	22.83	14.63	15.80	200	1,423,788	14.05	9.46	10.23
台南市	250	943,864	26.49	15.84	17.01	119	943,864	12.61	7.70	8.29
高雄市	292	1,401,576	20.83	12.32	13.32	176	1,401,576	12.56	8.15	8.83
基隆市	44	185,177	23.76	13.61	14.75	21	185,177	11.34	6.09	6.59
新竹市	63	225,789	27.90	18.77	20.37	27	225,789	11.96	9.09	9.88
嘉義市	26	138,206	18.81	11.81	12.83	17	138,206	12.30	8.62	8.94
新竹縣	59	272,625	21.64	14.74	15.85	29	272,625	10.64	8.39	9.15
宜蘭縣	48	225,194	21.31	12.86	13.78	20	225,194	8.88	5.94	6.55
苗栗縣	57	265,689	21.45	14.22	15.10	47	265,689	17.69	10.90	12.14
彰化縣	129	627,147	20.57	13.86	14.88	85	627,147	13.55	9.33	10.01
南投縣	56	242,482	23.09	14.12	15.39	20	242,482	8.25	6.44	6.66
雲林縣	66	330,444	19.97	12.59	13.50	40	330,444	12.10	8.81	9.53
嘉義縣	41	243,617	16.83	11.33	12.04	41	243,617	16.83	10.13	11.22
屏東縣	71	403,872	17.58	10.67	11.45	55	403,872	13.62	8.03	8.78
澎湖縣	5	50,633	9.87	6.92	6.89	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	38	161,710	23.50	13.78	14.97	22	161,710	13.60	9.44	10.11
台東縣	18	106,074	16.97	10.34	10.69	13	106,074	12.26	8.98	9.17
金門縣	2	69,779	2.87	1.76	1.85	3	69,779	4.30	6.04	5.83
連江縣	0	5,608	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	1,468	5,727,219	25.63	15.54	16.76	766	5,727,219	13.37	8.66	9.36
中部	576	2,623,861	21.95	14.10	15.20	345	2,623,861	13.15	9.06	9.75
南部	685	3,181,768	21.53	12.96	13.94	408	3,181,768	12.82	8.06	8.73
東部	56	267,784	20.91	12.40	13.25	35	267,784	13.07	9.23	9.72
金馬地區	2	75,387	2.65	1.63	1.72	3	75,387	3.98	5.48	5.30
直轄市	2,064	8,321,973	24.80	14.99	16.18	1,117	8,321,973	13.42	8.64	9.32
中央政府管轄市	133	549,172	24.22	14.95	16.18	65	549,172	11.84	7.98	8.55
縣轄市	102	801,548	12.73	7.94	8.53	63	801,548	7.86	5.27	5.71
鎮	138	830,944	16.61	10.59	11.44	111	830,944	13.36	9.66	10.42
鄉	350	1,372,382	25.50	16.38	17.51	201	1,372,382	14.65	9.54	10.34
山地鄉 [4]	18	97,552	18.45	12.93	13.94	6	97,552	6.15	4.72	5.05
總計	2,787	11,876,019	23.47	14.37	15.48	1,557	11,876,019	13.11	8.57	9.25

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52，C57.7 - C57.9 ；攝護腺 C61

性別 / 地區	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	23	1,395,197	1.65	0.82	0.92	979	1,273,375	76.88	34.67	40.69
新北市	27	2,040,749	1.32	0.69	0.77	1,115	1,954,968	57.03	31.65	37.52
桃園市	17	1,116,799	1.52	0.89	1.00	438	1,104,073	39.67	25.34	30.36
台中市	18	1,423,788	1.26	0.82	0.90	768	1,380,106	55.65	33.96	40.00
台南市	18	943,864	1.91	1.00	1.13	550	939,967	58.51	28.99	34.44
高雄市	19	1,401,576	1.36	0.69	0.77	746	1,371,957	54.37	27.85	32.71
基隆市	4	185,177	2.16	1.01	1.18	105	184,978	56.76	27.80	33.65
新竹市	3	225,789	1.33	0.63	0.86	113	219,846	51.40	32.55	38.73
嘉義市	0	138,206	0.00	0.00	0.00	49	130,416	37.57	20.30	23.52
新竹縣	0	272,625	0.00	0.00	0.00	123	284,385	43.25	24.97	29.54
宜蘭縣	7	225,194	3.11	1.12	1.44	125	230,027	54.34	23.49	28.78
苗栗縣	7	265,689	2.63	1.25	1.40	191	283,174	67.45	30.48	36.35
彰化縣	15	627,147	2.39	1.17	1.33	380	650,677	58.40	28.23	33.86
南投縣	3	242,482	1.24	0.41	0.51	136	254,549	53.43	23.69	28.10
雲林縣	5	330,444	1.51	0.62	0.67	248	355,578	69.75	30.21	35.57
嘉義縣	6	243,617	2.46	0.75	0.89	173	263,451	65.67	27.75	32.51
屏東縣	3	403,872	0.74	0.39	0.45	218	421,534	51.72	24.03	28.14
澎湖縣	0	50,633	0.00	0.00	0.00	27	53,807	50.18	23.96	28.23
花蓮縣	2	161,710	1.24	0.79	0.83	90	166,258	54.13	25.95	30.10
台東縣	1	106,074	0.94	0.73	0.73	54	112,845	47.85	20.19	25.19
金門縣	0	69,779	0.00	0.00	0.00	15	69,494	21.58	11.56	14.14
連江縣	0	5,608	0.00	0.00	0.00	1	7,448	13.43	5.65	6.50
北部	88	5,727,219	1.54	0.78	0.90	3,189	5,534,826	57.62	30.56	36.26
中部	41	2,623,861	1.56	0.85	0.95	1,532	2,640,910	58.01	30.71	36.28
南部	46	3,181,768	1.45	0.71	0.80	1,763	3,181,132	55.42	27.28	32.11
東部	3	267,784	1.12	0.77	0.79	144	279,103	51.59	23.70	28.20
金馬地區	0	75,387	0.00	0.00	0.00	16	76,942	20.79	11.14	13.61
直轄市	122	8,321,973	1.47	0.80	0.89	4,596	8,024,446	57.27	30.80	36.39
中央政府管轄市	7	549,172	1.27	0.61	0.74	267	535,240	49.88	27.49	32.73
縣轄市	14	801,548	1.75	0.81	0.96	274	790,308	34.67	18.02	21.87
鎮	11	830,944	1.32	0.72	0.80	405	859,540	47.12	21.04	25.34
鄉	24	1,372,382	1.75	0.71	0.82	1,102	1,503,379	73.30	32.76	38.49
山地鄉 [4]	1	97,552	1.03	0.88	0.88	43	106,239	40.47	26.72	30.54
總計	178	11,876,019	1.50	0.77	0.87	6,644	11,712,913	56.72	29.34	34.69

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

性別 / 地區	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	25	1,273,375	1.96	2.20	2.30	13	1,273,375	1.02	0.55	0.56
新北市	45	1,954,968	2.30	2.25	2.36	17	1,954,968	0.87	0.47	0.57
桃園市	28	1,104,073	2.54	2.41	2.53	8	1,104,073	0.72	0.48	0.57
台中市	45	1,380,106	3.26	2.98	3.14	14	1,380,106	1.01	0.60	0.69
台南市	26	939,967	2.77	2.55	2.80	13	939,967	1.38	0.64	0.79
高雄市	31	1,371,957	2.26	2.05	2.25	20	1,371,957	1.46	0.74	0.86
基隆市	8	184,978	4.32	4.52	4.68	0	184,978	0.00	0.00	0.00
新竹市	8	219,846	3.64	3.38	3.73	2	219,846	0.91	0.34	0.41
嘉義市	2	130,416	1.53	1.70	1.70	3	130,416	2.30	1.19	1.20
新竹縣	10	284,385	3.52	3.48	3.72	2	284,385	0.70	0.57	0.60
宜蘭縣	6	230,027	2.61	2.69	2.78	2	230,027	0.87	0.58	0.68
苗栗縣	7	283,174	2.47	2.33	2.57	5	283,174	1.77	0.61	0.76
彰化縣	16	650,677	2.46	2.30	2.51	6	650,677	0.92	0.58	0.58
南投縣	4	254,549	1.57	1.00	1.27	4	254,549	1.57	1.01	1.23
雲林縣	2	355,578	0.56	0.28	0.37	1	355,578	0.28	0.17	0.18
嘉義縣	3	263,451	1.14	2.05	1.99	2	263,451	0.76	0.37	0.38
屏東縣	4	421,534	0.95	0.78	0.93	4	421,534	0.95	0.38	0.49
澎湖縣	1	53,807	1.86	1.89	1.86	0	53,807	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	3	166,258	1.80	1.90	2.02	0	166,258	0.00	0.00	0.00
台東縣	1	112,845	0.89	0.63	0.63	0	112,845	0.00	0.00	0.00
金門縣	2	69,494	2.88	2.34	2.89	0	69,494	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	7,448	0.00	0.00	0.00
北部	137	5,534,826	2.48	2.48	2.62	49	5,534,826	0.89	0.48	0.55
中部	67	2,640,910	2.54	2.31	2.49	25	2,640,910	0.95	0.55	0.61
南部	67	3,181,132	2.11	1.99	2.18	42	3,181,132	1.32	0.63	0.74
東部	4	279,103	1.43	1.41	1.49	0	279,103	0.00	0.00	0.00
金馬地區	2	76,942	2.60	2.10	2.59	0	76,942	0.00	0.00	0.00
直轄市	200	8,024,446	2.49	2.40	2.55	85	8,024,446	1.06	0.57	0.66
中央政府管轄市	18	535,240	3.36	3.36	3.56	5	535,240	0.93	0.42	0.46
縣轄市	11	790,308	1.39	1.35	1.42	3	790,308	0.38	0.27	0.31
鎮	22	859,540	2.56	2.37	2.65	12	859,540	1.40	0.84	0.90
鄉	26	1,503,379	1.73	1.71	1.85	11	1,503,379	0.73	0.30	0.36
山地鄉 [4]	2	106,239	1.88	1.49	1.77	1	106,239	0.94	0.46	0.83
總計	277	11,712,913	2.36	2.28	2.44	116	11,712,913	0.99	0.53	0.60

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

膀胱 C67

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	156	1,273,375	12.25	5.37	6.38	69	1,395,197	4.95	1.90	2.25
新北市	246	1,954,968	12.58	6.90	8.18	109	2,040,749	5.34	2.54	3.10
桃園市	112	1,104,073	10.14	6.32	7.56	39	1,116,799	3.49	2.05	2.49
台中市	158	1,380,106	11.45	6.92	8.00	77	1,423,788	5.41	2.85	3.38
台南市	165	939,967	17.55	8.80	10.21	83	943,864	8.79	3.52	4.15
高雄市	199	1,371,957	14.50	7.51	8.63	81	1,401,576	5.78	2.50	3.02
基隆市	42	184,978	22.71	10.60	12.51	9	185,177	4.86	2.59	2.99
新竹市	10	219,846	4.55	2.92	3.62	8	225,789	3.54	1.67	2.14
嘉義市	22	130,416	16.87	8.39	9.85	13	138,206	9.41	3.72	4.64
新竹縣	31	284,385	10.90	6.24	7.24	18	272,625	6.60	3.32	3.92
宜蘭縣	50	230,027	21.74	10.28	12.33	10	225,194	4.44	1.71	1.97
苗栗縣	39	283,174	13.77	5.98	7.26	20	265,689	7.53	3.21	3.74
彰化縣	87	650,677	13.37	6.84	7.94	31	627,147	4.94	1.93	2.35
南投縣	39	254,549	15.32	6.42	7.62	10	242,482	4.12	2.05	2.31
雲林縣	54	355,578	15.19	7.04	8.10	19	330,444	5.75	1.99	2.39
嘉義縣	48	263,451	18.22	7.63	8.69	27	243,617	11.08	4.12	4.74
屏東縣	61	421,534	14.47	6.84	7.91	27	403,872	6.69	2.64	3.00
澎湖縣	5	53,807	9.29	4.37	5.22	3	50,633	5.92	2.68	2.81
花蓮縣	25	166,258	15.04	7.22	8.67	8	161,710	4.95	2.02	2.37
台東縣	13	112,845	11.52	5.55	5.79	7	106,074	6.60	2.30	2.94
金門縣	5	69,494	7.19	2.64	4.05	2	69,779	2.87	0.71	0.85
連江縣	1	7,448	13.43	7.51	8.11	1	5,608	17.83	12.90	14.19
北部	686	5,534,826	12.39	6.50	7.73	282	5,727,219	4.92	2.26	2.71
中部	338	2,640,910	12.80	6.85	7.94	137	2,623,861	5.22	2.36	2.80
南部	500	3,181,132	15.72	7.77	8.96	234	3,181,768	7.35	2.99	3.54
東部	38	279,103	13.62	6.53	7.47	15	267,784	5.60	2.14	2.61
金馬地區	6	76,942	7.80	3.17	4.54	3	75,387	3.98	1.69	1.92
直轄市	1,036	8,024,446	12.91	6.91	8.09	458	8,321,973	5.50	2.52	3.02
中央政府管轄市	74	535,240	13.83	7.28	8.67	30	549,172	5.46	2.47	3.03
縣轄市	69	790,308	8.73	4.36	5.19	20	801,548	2.50	1.14	1.35
鎮	114	859,540	13.26	6.38	7.43	46	830,944	5.54	2.15	2.48
鄉	275	1,503,379	18.29	8.31	9.68	117	1,372,382	8.53	3.30	3.86
山地鄉 [4]	4	106,239	3.77	2.34	2.76	1	97,552	1.03	0.83	0.91
總計	1,568	11,712,913	13.39	6.91	8.09	671	11,876,019	5.65	2.48	2.96

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

腎 C64

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	141	1,273,375	11.07	6.14	6.74	60	1,395,197	4.30	2.53	2.75
新北市	201	1,954,968	10.28	6.39	7.00	87	2,040,749	4.26	2.51	2.80
桃園市	79	1,104,073	7.16	4.96	5.41	50	1,116,799	4.48	2.80	3.12
台中市	107	1,380,106	7.75	5.23	5.75	51	1,423,788	3.58	2.41	2.57
台南市	85	939,967	9.04	5.60	6.16	40	943,864	4.24	2.51	2.82
高雄市	105	1,371,957	7.65	4.47	4.97	45	1,401,576	3.21	2.02	2.15
基隆市	18	184,978	9.73	5.78	6.24	8	185,177	4.32	2.08	2.29
新竹市	27	219,846	12.28	9.09	9.61	12	225,789	5.31	3.40	3.65
嘉義市	14	130,416	10.73	6.75	7.22	7	138,206	5.06	3.07	3.46
新竹縣	17	284,385	5.98	4.62	4.78	10	272,625	3.67	3.29	3.17
宜蘭縣	26	230,027	11.30	6.59	6.89	18	225,194	7.99	3.72	4.20
苗栗縣	28	283,174	9.89	6.71	6.73	12	265,689	4.52	2.47	2.70
彰化縣	41	650,677	6.30	4.04	4.50	20	627,147	3.19	2.11	2.17
南投縣	19	254,549	7.46	4.54	4.97	9	242,482	3.71	1.53	1.71
雲林縣	26	355,578	7.31	4.28	4.68	7	330,444	2.12	1.03	1.22
嘉義縣	16	263,451	6.07	3.69	4.21	6	243,617	2.46	1.45	1.65
屏東縣	28	421,534	6.64	3.50	3.77	13	403,872	3.22	3.27	2.87
澎湖縣	4	53,807	7.43	4.34	4.63	2	50,633	3.95	2.73	2.73
花蓮縣	14	166,258	8.42	5.06	5.44	5	161,710	3.09	1.89	2.16
台東縣	3	112,845	2.66	1.54	1.50	4	106,074	3.77	1.95	2.03
金門縣	6	69,494	8.63	6.05	6.55	2	69,779	2.87	1.34	1.38
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	537	5,534,826	9.70	6.11	6.61	257	5,727,219	4.49	2.65	2.91
中部	193	2,640,910	7.31	4.71	5.17	87	2,623,861	3.32	2.11	2.26
南部	252	3,181,132	7.92	4.66	5.13	113	3,181,768	3.55	2.29	2.43
東部	17	279,103	6.09	3.59	3.80	9	267,784	3.36	1.91	2.11
金馬地區	6	76,942	7.80	5.47	5.93	2	75,387	2.65	1.25	1.29
直轄市	718	8,024,446	8.95	5.55	6.10	333	8,321,973	4.00	2.43	2.66
中央政府管轄市	59	535,240	11.02	7.42	7.93	27	549,172	4.92	2.84	3.11
縣轄市	33	790,308	4.18	2.62	2.95	15	801,548	1.87	1.19	1.25
鎮	73	859,540	8.49	5.49	5.81	30	830,944	3.61	2.11	2.18
鄉	122	1,503,379	8.12	4.93	5.24	63	1,372,382	4.59	3.01	3.06
山地鄉 [4]	7	106,239	6.59	4.10	4.04	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	1,005	11,712,913	8.58	5.33	5.80	468	11,876,019	3.94	2.40	2.60

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

腎盂 C65

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	49	1,273,375	3.85	1.82	2.17	45	1,395,197	3.23	1.22	1.44
新北市	44	1,954,968	2.25	1.29	1.50	65	2,040,749	3.19	1.52	1.84
桃園市	28	1,104,073	2.54	1.72	2.03	25	1,116,799	2.24	1.35	1.56
台中市	49	1,380,106	3.55	2.21	2.48	72	1,423,788	5.06	2.57	3.10
台南市	54	939,967	5.74	2.88	3.43	79	943,864	8.37	3.55	4.23
高雄市	61	1,371,957	4.45	2.36	2.78	80	1,401,576	5.71	2.59	2.98
基隆市	6	184,978	3.24	1.71	1.90	10	185,177	5.40	2.37	2.77
新竹市	7	219,846	3.18	1.84	2.39	9	225,789	3.99	1.81	2.53
嘉義市	2	130,416	1.53	0.90	0.90	6	138,206	4.34	1.98	2.35
新竹縣	7	284,385	2.46	1.18	1.48	10	272,625	3.67	2.11	2.57
宜蘭縣	4	230,027	1.74	0.98	1.10	11	225,194	4.88	2.28	2.57
苗栗縣	10	283,174	3.53	1.80	2.09	13	265,689	4.89	1.99	2.42
彰化縣	19	650,677	2.92	1.37	1.74	28	627,147	4.46	1.55	1.99
南投縣	9	254,549	3.54	1.44	1.75	21	242,482	8.66	2.76	3.67
雲林縣	21	355,578	5.91	2.79	3.32	19	330,444	5.75	1.72	2.04
嘉義縣	14	263,451	5.31	2.54	2.84	21	243,617	8.62	2.99	3.46
屏東縣	23	421,534	5.46	2.44	3.00	26	403,872	6.44	2.53	2.93
澎湖縣	2	53,807	3.72	1.22	1.96	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	6	166,258	3.61	1.98	2.25	5	161,710	3.09	1.31	1.49
台東縣	1	112,845	0.89	0.51	0.47	2	106,074	1.89	0.97	1.09
金門縣	1	69,494	1.44	0.61	0.70	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	155	5,534,826	2.80	1.54	1.82	188	5,727,219	3.28	1.52	1.82
中部	98	2,640,910	3.71	2.02	2.37	140	2,623,861	5.34	2.22	2.73
南部	156	3,181,132	4.90	2.46	2.91	212	3,181,768	6.66	2.82	3.30
東部	7	279,103	2.51	1.38	1.52	7	267,784	2.61	1.17	1.33
金馬地區	1	76,942	1.30	0.55	0.63	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	285	8,024,446	3.55	1.97	2.31	366	8,321,973	4.40	2.04	2.42
中央政府管轄市	15	535,240	2.80	1.53	1.79	25	549,172	4.55	2.06	2.56
縣轄市	17	790,308	2.15	1.24	1.44	17	801,548	2.12	0.81	1.05
鎮	29	859,540	3.37	1.52	1.87	32	830,944	3.85	1.41	1.71
鄉	71	1,503,379	4.72	2.17	2.59	107	1,372,382	7.80	2.90	3.46
山地鄉 [4]	1	106,239	0.94	0.69	0.69	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	417	11,712,913	3.56	1.90	2.24	547	11,876,019	4.61	2.02	2.42

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

輸尿管 C66

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	19	1,273,375	1.49	0.68	0.75	43	1,395,197	3.08	1.23	1.43
新北市	29	1,954,968	1.48	0.87	0.99	52	2,040,749	2.55	1.23	1.49
桃園市	17	1,104,073	1.54	0.97	1.22	14	1,116,799	1.25	0.77	0.86
台中市	29	1,380,106	2.10	1.31	1.53	47	1,423,788	3.30	1.76	2.06
台南市	50	939,967	5.32	2.66	3.07	43	943,864	4.56	2.08	2.34
高雄市	48	1,371,957	3.50	1.84	2.04	50	1,401,576	3.57	1.59	1.88
基隆市	3	184,978	1.62	0.69	0.95	4	185,177	2.16	0.91	0.95
新竹市	3	219,846	1.36	0.75	0.86	4	225,789	1.77	0.90	1.17
嘉義市	5	130,416	3.83	1.94	2.40	8	138,206	5.79	2.53	2.92
新竹縣	2	284,385	0.70	0.31	0.47	5	272,625	1.83	1.00	1.17
宜蘭縣	9	230,027	3.91	1.72	2.11	5	225,194	2.22	0.78	0.94
苗栗縣	9	283,174	3.18	1.76	1.93	7	265,689	2.63	0.63	0.89
彰化縣	17	650,677	2.61	1.41	1.58	19	627,147	3.03	1.52	1.66
南投縣	10	254,549	3.93	1.93	2.14	18	242,482	7.42	2.61	3.17
雲林縣	9	355,578	2.53	1.13	1.34	11	330,444	3.33	1.35	1.48
嘉義縣	12	263,451	4.55	1.82	2.07	16	243,617	6.57	2.09	2.46
屏東縣	18	421,534	4.27	2.16	2.35	23	403,872	5.69	2.35	2.71
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	3	166,258	1.80	0.83	0.84	4	161,710	2.47	0.92	1.03
台東縣	2	112,845	1.77	0.98	1.16	6	106,074	5.66	1.95	2.55
金門縣	1	69,494	1.44	0.61	0.70	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	91	5,534,826	1.64	0.90	1.05	134	5,727,219	2.34	1.07	1.28
中部	65	2,640,910	2.46	1.37	1.58	95	2,623,861	3.62	1.73	1.99
南部	133	3,181,132	4.18	2.10	2.37	140	3,181,768	4.40	1.89	2.20
東部	5	279,103	1.79	0.92	0.99	10	267,784	3.73	1.34	1.65
金馬地區	1	76,942	1.30	0.55	0.63	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	192	8,024,446	2.39	1.31	1.50	249	8,321,973	2.99	1.42	1.66
中央政府管轄市	11	535,240	2.06	1.07	1.33	16	549,172	2.91	1.34	1.55
縣轄市	8	790,308	1.01	0.59	0.63	16	801,548	2.00	0.92	1.13
鎮	17	859,540	1.98	1.07	1.18	20	830,944	2.41	0.77	0.99
鄉	67	1,503,379	4.46	2.05	2.35	78	1,372,382	5.68	2.27	2.56
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	295	11,712,913	2.52	1.34	1.54	379	11,876,019	3.19	1.44	1.69

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	1	1,273,375	0.08	0.10	0.10	2	1,395,197	0.14	0.05	0.05
新北市	4	1,954,968	0.20	0.11	0.11	0	2,040,749	0.00	0.00	0.00
桃園市	3	1,104,073	0.27	0.17	0.20	3	1,116,799	0.27	0.16	0.18
台中市	2	1,380,106	0.14	0.07	0.10	5	1,423,788	0.35	0.20	0.24
台南市	2	939,967	0.21	0.10	0.13	4	943,864	0.42	0.21	0.22
高雄市	3	1,371,957	0.22	0.12	0.14	4	1,401,576	0.29	0.13	0.17
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	1	138,206	0.72	0.39	0.39
新竹縣	0	284,385	0.00	0.00	0.00	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	2	230,027	0.87	0.28	0.38	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	1	283,174	0.35	0.21	0.19	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	2	650,677	0.31	0.10	0.16	1	627,147	0.16	0.05	0.07
南投縣	0	254,549	0.00	0.00	0.00	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	1	355,578	0.28	0.17	0.18	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	1	263,451	0.38	0.12	0.18	1	243,617	0.41	0.24	0.22
屏東縣	0	421,534	0.00	0.00	0.00	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	166,258	0.60	0.33	0.33	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	1	106,074	0.94	0.18	0.33
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	11	5,534,826	0.20	0.12	0.12	5	5,727,219	0.09	0.04	0.05
中部	5	2,640,910	0.19	0.09	0.12	6	2,623,861	0.23	0.12	0.14
南部	6	3,181,132	0.19	0.09	0.11	10	3,181,768	0.31	0.15	0.17
東部	1	279,103	0.36	0.20	0.20	1	267,784	0.37	0.08	0.14
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	15	8,024,446	0.19	0.11	0.12	18	8,321,973	0.22	0.11	0.12
中央政府管轄市	0	535,240	0.00	0.00	0.00	1	549,172	0.18	0.10	0.10
縣轄市	1	790,308	0.13	0.08	0.07	1	801,548	0.12	0.03	0.06
鎮	2	859,540	0.23	0.12	0.14	1	830,944	0.12	0.07	0.07
鄉	5	1,503,379	0.33	0.12	0.15	1	1,372,382	0.07	0.02	0.03
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	23	11,712,913	0.20	0.10	0.12	22	11,876,019	0.19	0.09	0.10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	1	1,273,375	0.08	0.05	0.06	0	1,395,197	0.00	0.00	0.00
新北市	0	1,954,968	0.00	0.00	0.00	0	2,040,749	0.00	0.00	0.00
桃園市	0	1,104,073	0.00	0.00	0.00	0	1,116,799	0.00	0.00	0.00
台中市	0	1,380,106	0.00	0.00	0.00	0	1,423,788	0.00	0.00	0.00
台南市	0	939,967	0.00	0.00	0.00	2	943,864	0.21	0.08	0.09
高雄市	0	1,371,957	0.00	0.00	0.00	0	1,401,576	0.00	0.00	0.00
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	1	284,385	0.35	0.16	0.23	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	0	283,174	0.00	0.00	0.00	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	0	650,677	0.00	0.00	0.00	0	627,147	0.00	0.00	0.00
南投縣	0	254,549	0.00	0.00	0.00	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	1	355,578	0.28	0.17	0.18	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	263,451	0.00	0.00	0.00	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	0	421,534	0.00	0.00	0.00	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	2	5,534,826	0.04	0.02	0.03	0	5,727,219	0.00	0.00	0.00
中部	1	2,640,910	0.04	0.03	0.03	0	2,623,861	0.00	0.00	0.00
南部	0	3,181,132	0.00	0.00	0.00	2	3,181,768	0.06	0.02	0.03
東部	0	279,103	0.00	0.00	0.00	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	1	8,024,446	0.01	0.01	0.01	2	8,321,973	0.02	0.01	0.01
中央政府管轄市	0	535,240	0.00	0.00	0.00	0	549,172	0.00	0.00	0.00
縣轄市	0	790,308	0.00	0.00	0.00	0	801,548	0.00	0.00	0.00
鎮	2	859,540	0.23	0.12	0.15	0	830,944	0.00	0.00	0.00
鄉	0	1,503,379	0.00	0.00	0.00	0	1,372,382	0.00	0.00	0.00
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	3	11,712,913	0.03	0.02	0.02	2	11,876,019	0.02	0.01	0.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位 C68.9

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	2	1,273,375	0.16	0.07	0.09	0	1,395,197	0.00	0.00	0.00
新北市	0	1,954,968	0.00	0.00	0.00	0	2,040,749	0.00	0.00	0.00
桃園市	0	1,104,073	0.00	0.00	0.00	0	1,116,799	0.00	0.00	0.00
台中市	4	1,380,106	0.29	0.16	0.21	4	1,423,788	0.28	0.14	0.19
台南市	2	939,967	0.21	0.09	0.11	0	943,864	0.00	0.00	0.00
高雄市	1	1,371,957	0.07	0.05	0.05	0	1,401,576	0.00	0.00	0.00
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	0	185,177	0.00	0.00	0.00
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	284,385	0.00	0.00	0.00	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	0	283,174	0.00	0.00	0.00	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	1	650,677	0.15	0.06	0.09	1	627,147	0.16	0.03	0.06
南投縣	1	254,549	0.39	0.13	0.20	3	242,482	1.24	0.30	0.47
雲林縣	0	355,578	0.00	0.00	0.00	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	263,451	0.00	0.00	0.00	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	0	421,534	0.00	0.00	0.00	0	403,872	0.00	0.00	0.00
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	1	69,494	1.44	0.68	0.63	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	2	5,534,826	0.04	0.02	0.03	0	5,727,219	0.00	0.00	0.00
中部	6	2,640,910	0.23	0.10	0.14	8	2,623,861	0.30	0.11	0.16
南部	3	3,181,132	0.09	0.05	0.05	0	3,181,768	0.00	0.00	0.00
東部	0	279,103	0.00	0.00	0.00	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	1	76,942	1.30	0.61	0.57	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	9	8,024,446	0.11	0.06	0.07	4	8,321,973	0.05	0.02	0.03
中央政府管轄市	0	535,240	0.00	0.00	0.00	0	549,172	0.00	0.00	0.00
縣轄市	1	790,308	0.13	0.06	0.08	1	801,548	0.12	0.04	0.07
鎮	1	859,540	0.12	0.07	0.06	3	830,944	0.36	0.08	0.13
鄉	1	1,503,379	0.07	0.02	0.03	0	1,372,382	0.00	0.00	0.00
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	12	11,712,913	0.10	0.05	0.06	8	11,876,019	0.07	0.02	0.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	0	1,273,375	0.00	0.00	0.00	3	1,395,197	0.22	0.13	0.13
新北市	6	1,954,968	0.31	0.54	0.42	6	2,040,749	0.29	0.28	0.28
桃園市	2	1,104,073	0.18	0.25	0.23	4	1,116,799	0.36	0.46	0.43
台中市	2	1,380,106	0.14	0.21	0.17	4	1,423,788	0.28	0.29	0.26
台南市	2	939,967	0.21	0.37	0.28	2	943,864	0.21	0.40	0.32
高雄市	4	1,371,957	0.29	0.34	0.30	2	1,401,576	0.14	0.46	0.34
基隆市	0	184,978	0.00	0.00	0.00	2	185,177	1.08	0.59	0.59
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	2	138,206	1.45	0.83	0.80
新竹縣	1	284,385	0.35	0.20	0.23	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	1	283,174	0.35	0.21	0.21	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	1	650,677	0.15	0.41	0.30	3	627,147	0.48	0.32	0.35
南投縣	1	254,549	0.39	1.47	1.08	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	1	355,578	0.28	0.06	0.12	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	0	263,451	0.00	0.00	0.00	2	243,617	0.82	0.33	0.39
屏東縣	1	421,534	0.24	0.13	0.12	1	403,872	0.25	0.95	0.70
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	166,258	0.60	0.33	0.31	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	10	5,534,826	0.18	0.24	0.20	15	5,727,219	0.26	0.25	0.25
中部	5	2,640,910	0.19	0.33	0.27	7	2,623,861	0.27	0.24	0.23
南部	7	3,181,132	0.22	0.29	0.24	9	3,181,768	0.28	0.50	0.39
東部	1	279,103	0.36	0.20	0.19	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	16	8,024,446	0.20	0.29	0.24	21	8,321,973	0.25	0.32	0.28
中央政府管轄市	0	535,240	0.00	0.00	0.00	4	549,172	0.73	0.43	0.42
縣轄市	1	790,308	0.13	0.08	0.07	1	801,548	0.12	0.08	0.07
鎮	5	859,540	0.58	0.90	0.73	1	830,944	0.12	0.08	0.09
鄉	1	1,503,379	0.07	0.04	0.03	4	1,372,382	0.29	0.36	0.32
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	23	11,712,913	0.20	0.27	0.23	31	11,876,019	0.26	0.30	0.27

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

腦 C71

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	44	1,273,375	3.46	2.49	2.60	29	1,395,197	2.08	1.62	1.62
新北市	74	1,954,968	3.79	2.58	2.79	63	2,040,749	3.09	2.42	2.52
桃園市	32	1,104,073	2.90	2.71	2.68	33	1,116,799	2.95	2.09	2.39
台中市	48	1,380,106	3.48	3.27	3.18	41	1,423,788	2.88	2.69	2.74
台南市	40	939,967	4.26	2.89	3.08	29	943,864	3.07	2.04	2.19
高雄市	56	1,371,957	4.08	3.81	3.79	26	1,401,576	1.86	1.59	1.59
基隆市	2	184,978	1.08	0.78	0.82	3	185,177	1.62	0.96	1.03
新竹市	6	219,846	2.73	2.57	2.60	4	225,789	1.77	2.62	2.37
嘉義市	6	130,416	4.60	3.22	3.39	6	138,206	4.34	2.94	3.04
新竹縣	7	284,385	2.46	2.03	2.15	10	272,625	3.67	3.40	3.31
宜蘭縣	4	230,027	1.74	2.49	2.36	4	225,194	1.78	3.02	2.65
苗栗縣	13	283,174	4.59	2.43	2.78	7	265,689	2.63	2.13	2.18
彰化縣	14	650,677	2.15	1.70	1.80	18	627,147	2.87	2.29	2.47
南投縣	15	254,549	5.89	4.82	4.92	6	242,482	2.47	1.18	1.33
雲林縣	10	355,578	2.81	1.50	1.70	7	330,444	2.12	1.60	1.76
嘉義縣	12	263,451	4.55	2.49	2.82	9	243,617	3.69	3.39	3.36
屏東縣	19	421,534	4.51	2.91	3.22	12	403,872	2.97	2.51	2.58
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	1	50,633	1.97	1.50	1.65
花蓮縣	3	166,258	1.80	1.95	2.07	2	161,710	1.24	0.67	0.76
台東縣	1	112,845	0.89	0.81	1.03	2	106,074	1.89	0.64	0.79
金門縣	1	69,494	1.44	0.70	1.05	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	182	5,534,826	3.29	2.53	2.65	153	5,727,219	2.67	2.19	2.25
中部	87	2,640,910	3.29	2.84	2.85	72	2,623,861	2.74	2.34	2.44
南部	133	3,181,132	4.18	3.25	3.37	83	3,181,768	2.61	2.01	2.07
東部	4	279,103	1.43	1.48	1.64	4	267,784	1.49	0.66	0.78
金馬地區	1	76,942	1.30	0.65	0.98	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	294	8,024,446	3.66	2.98	3.05	221	8,321,973	2.66	2.12	2.21
中央政府管轄市	14	535,240	2.62	2.17	2.22	13	549,172	2.37	2.34	2.25
縣轄市	15	790,308	1.90	1.31	1.52	7	801,548	0.87	0.56	0.61
鎮	17	859,540	1.98	1.56	1.61	26	830,944	3.13	2.94	2.97
鄉	67	1,503,379	4.46	3.16	3.38	45	1,372,382	3.28	2.70	2.74
山地鄉 [4]	4	106,239	3.77	2.62	2.88	1	97,552	1.03	1.02	1.05
總計	407	11,712,913	3.47	2.75	2.85	312	11,876,019	2.63	2.13	2.21

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 C70，C72

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	5	1,273,375	0.39	0.28	0.31	2	1,395,197	0.14	0.22	0.19
新北市	5	1,954,968	0.26	0.16	0.19	6	2,040,749	0.29	0.16	0.19
桃園市	3	1,104,073	0.27	0.19	0.20	3	1,116,799	0.27	0.18	0.22
台中市	6	1,380,106	0.43	0.45	0.47	7	1,423,788	0.49	0.49	0.47
台南市	2	939,967	0.21	0.12	0.15	1	943,864	0.11	0.06	0.06
高雄市	5	1,371,957	0.36	0.22	0.27	4	1,401,576	0.29	0.15	0.16
基隆市	2	184,978	1.08	0.63	0.74	1	185,177	0.54	0.25	0.25
新竹市	0	219,846	0.00	0.00	0.00	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	4	138,206	2.89	2.48	2.69
新竹縣	1	284,385	0.35	0.41	0.42	1	272,625	0.37	0.27	0.25
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	1	225,194	0.44	0.12	0.19
苗栗縣	1	283,174	0.35	0.18	0.20	1	265,689	0.38	0.34	0.42
彰化縣	2	650,677	0.31	0.21	0.23	1	627,147	0.16	0.18	0.18
南投縣	2	254,549	0.79	0.68	0.86	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	1	355,578	0.28	0.22	0.24	1	330,444	0.30	0.22	0.23
嘉義縣	1	263,451	0.38	0.31	0.37	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	3	421,534	0.71	0.41	0.50	2	403,872	0.50	1.07	0.84
澎湖縣	0	53,807	0.00	0.00	0.00	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	1	112,845	0.89	2.29	1.99	1	106,074	0.94	0.76	0.84
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	2	69,779	2.87	1.98	2.11
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	17	5,534,826	0.31	0.22	0.24	15	5,727,219	0.26	0.18	0.20
中部	11	2,640,910	0.42	0.38	0.41	9	2,623,861	0.34	0.34	0.33
南部	11	3,181,132	0.35	0.21	0.26	11	3,181,768	0.35	0.31	0.29
東部	1	279,103	0.36	0.90	0.79	1	267,784	0.37	0.30	0.33
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	2	75,387	2.65	1.85	1.97
直轄市	26	8,024,446	0.32	0.25	0.27	23	8,321,973	0.28	0.22	0.22
中央政府管轄市	2	535,240	0.37	0.23	0.28	5	549,172	0.91	0.72	0.77
縣轄市	3	790,308	0.38	0.36	0.37	2	801,548	0.25	0.45	0.36
鎮	2	859,540	0.23	0.23	0.26	3	830,944	0.36	0.24	0.27
鄉	7	1,503,379	0.47	0.34	0.39	5	1,372,382	0.36	0.28	0.31
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	40	11,712,913	0.34	0.26	0.29	38	11,876,019	0.32	0.27	0.27

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	158	1,273,375	12.41	9.05	9.69	372	1,395,197	26.66	18.43	20.01
新北市	202	1,954,968	10.33	7.25	7.97	578	2,040,749	28.32	19.15	20.98
桃園市	78	1,104,073	7.06	5.13	5.55	225	1,116,799	20.15	14.14	15.52
台中市	121	1,380,106	8.77	6.33	6.91	400	1,423,788	28.09	19.61	21.23
台南市	92	939,967	9.79	6.37	6.93	267	943,864	28.29	19.60	21.31
高雄市	146	1,371,957	10.64	7.02	7.52	442	1,401,576	31.54	21.51	22.99
基隆市	16	184,978	8.65	5.87	6.44	56	185,177	30.24	19.51	21.72
新竹市	36	219,846	16.38	11.74	13.10	81	225,789	35.87	27.78	30.04
嘉義市	5	130,416	3.83	2.55	2.80	40	138,206	28.94	20.75	22.33
新竹縣	32	284,385	11.25	8.37	9.33	81	272,625	29.71	22.31	24.42
宜蘭縣	15	230,027	6.52	5.06	5.73	63	225,194	27.98	19.93	21.54
苗栗縣	30	283,174	10.59	7.31	8.10	81	265,689	30.49	22.10	24.09
彰化縣	81	650,677	12.45	8.76	9.49	194	627,147	30.93	22.83	24.51
南投縣	16	254,549	6.29	3.92	4.23	57	242,482	23.51	16.35	17.18
雲林縣	29	355,578	8.16	5.27	5.72	108	330,444	32.68	23.77	25.39
嘉義縣	20	263,451	7.59	5.77	6.32	59	243,617	24.22	18.39	19.53
屏東縣	42	421,534	9.96	6.62	7.30	115	403,872	28.47	19.59	21.34
澎湖縣	3	53,807	5.58	3.02	3.30	14	50,633	27.65	17.13	18.69
花蓮縣	10	166,258	6.01	3.97	4.27	29	161,710	17.93	11.25	12.79
台東縣	5	112,845	4.43	2.93	2.99	25	106,074	23.57	16.68	17.92
金門縣	5	69,494	7.19	4.32	5.28	13	69,779	18.63	13.24	14.62
連江縣	1	7,448	13.43	25.71	24.29	2	5,608	35.66	26.57	30.26
北部	567	5,534,826	10.24	7.30	7.97	1,537	5,727,219	26.84	18.65	20.37
中部	247	2,640,910	9.35	6.54	7.11	759	2,623,861	28.93	20.55	22.11
南部	308	3,181,132	9.68	6.43	6.96	937	3,181,768	29.45	20.37	21.94
東部	15	279,103	5.37	3.53	3.73	54	267,784	20.17	13.41	14.83
金馬地區	6	76,942	7.80	6.27	7.03	15	75,387	19.90	14.12	15.68
直轄市	797	8,024,446	9.93	6.94	7.52	2,284	8,321,973	27.45	18.87	20.48
中央政府管轄市	57	535,240	10.65	7.44	8.24	177	549,172	32.23	23.16	25.28
縣轄市	48	790,308	6.07	4.36	4.74	142	801,548	17.72	12.00	12.89
鎮	66	859,540	7.68	5.40	5.97	221	830,944	26.60	19.31	20.95
鄉	175	1,503,379	11.64	7.92	8.67	478	1,372,382	34.83	25.48	27.49
山地鄉 [4]	1	106,239	0.94	0.47	0.54	11	97,552	11.28	9.37	9.42
總計	1,143	11,712,913	9.76	6.80	7.40	3,302	11,876,019	27.80	19.38	21.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	12	1,273,375	0.94	1.02	0.94	15	1,395,197	1.08	1.03	0.93
新北市	16	1,954,968	0.82	0.87	0.81	21	2,040,749	1.03	0.80	0.83
桃園市	8	1,104,073	0.72	0.81	0.84	3	1,116,799	0.27	0.27	0.28
台中市	7	1,380,106	0.51	0.61	0.57	8	1,423,788	0.56	0.50	0.52
台南市	8	939,967	0.85	0.82	0.76	9	943,864	0.95	0.55	0.62
高雄市	7	1,371,957	0.51	0.56	0.56	8	1,401,576	0.57	0.31	0.38
基隆市	1	184,978	0.54	0.28	0.28	4	185,177	2.16	1.17	1.15
新竹市	2	219,846	0.91	1.23	1.04	7	225,789	3.10	3.42	2.99
嘉義市	0	130,416	0.00	0.00	0.00	1	138,206	0.72	0.16	0.29
新竹縣	5	284,385	1.76	1.94	2.00	2	272,625	0.73	0.91	0.91
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	2	283,174	0.71	0.69	0.70	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	1	650,677	0.15	0.09	0.09	6	627,147	0.96	1.17	1.06
南投縣	1	254,549	0.39	0.60	0.57	3	242,482	1.24	0.80	0.85
雲林縣	1	355,578	0.28	0.22	0.24	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	3	263,451	1.14	2.72	2.25	1	243,617	0.41	0.34	0.37
屏東縣	5	421,534	1.19	1.65	1.46	2	403,872	0.50	1.15	0.89
澎湖縣	1	53,807	1.86	1.81	1.86	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	0	112,845	0.00	0.00	0.00	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	1	69,779	1.43	0.71	0.66
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	46	5,534,826	0.83	0.92	0.88	52	5,727,219	0.91	0.84	0.81
中部	10	2,640,910	0.38	0.45	0.42	17	2,623,861	0.65	0.62	0.61
南部	24	3,181,132	0.75	0.92	0.85	21	3,181,768	0.66	0.45	0.48
東部	0	279,103	0.00	0.00	0.00	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	1	75,387	1.33	0.66	0.61
直轄市	58	8,024,446	0.72	0.79	0.75	64	8,321,973	0.77	0.62	0.64
中央政府管轄市	3	535,240	0.56	0.74	0.64	12	549,172	2.19	2.10	1.89
縣轄市	2	790,308	0.25	0.32	0.31	2	801,548	0.25	0.31	0.31
鎮	7	859,540	0.81	1.07	1.01	5	830,944	0.60	0.74	0.63
鄉	10	1,503,379	0.67	0.84	0.78	8	1,372,382	0.58	0.68	0.63
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	1	97,552	1.03	0.66	0.72
總計	80	11,712,913	0.68	0.78	0.74	91	11,876,019	0.77	0.68	0.67

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	3	1,273,375	0.24	0.11	0.15	0	1,395,197	0.00	0.00	0.00
新北市	12	1,954,968	0.61	0.40	0.43	3	2,040,749	0.15	0.08	0.08
桃園市	3	1,104,073	0.27	0.17	0.18	0	1,116,799	0.00	0.00	0.00
台中市	11	1,380,106	0.80	0.52	0.60	5	1,423,788	0.35	0.24	0.27
台南市	4	939,967	0.43	0.40	0.40	0	943,864	0.00	0.00	0.00
高雄市	5	1,371,957	0.36	0.24	0.25	0	1,401,576	0.00	0.00	0.00
基隆市	1	184,978	0.54	0.28	0.28	1	185,177	0.54	0.27	0.25
新竹市	1	219,846	0.45	0.20	0.36	1	225,789	0.44	0.18	0.27
嘉義市	1	130,416	0.77	0.45	0.45	0	138,206	0.00	0.00	0.00
新竹縣	0	284,385	0.00	0.00	0.00	0	272,625	0.00	0.00	0.00
宜蘭縣	0	230,027	0.00	0.00	0.00	0	225,194	0.00	0.00	0.00
苗栗縣	2	283,174	0.71	0.50	0.50	0	265,689	0.00	0.00	0.00
彰化縣	5	650,677	0.77	0.55	0.56	2	627,147	0.32	0.19	0.20
南投縣	1	254,549	0.39	0.21	0.21	0	242,482	0.00	0.00	0.00
雲林縣	0	355,578	0.00	0.00	0.00	0	330,444	0.00	0.00	0.00
嘉義縣	3	263,451	1.14	1.32	1.29	0	243,617	0.00	0.00	0.00
屏東縣	3	421,534	0.71	0.35	0.37	2	403,872	0.50	0.19	0.25
澎湖縣	1	53,807	1.86	1.27	1.40	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	0	166,258	0.00	0.00	0.00	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	1	112,845	0.89	0.51	0.55	0	106,074	0.00	0.00	0.00
金門縣	1	69,494	1.44	0.88	0.88	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	22	5,534,826	0.40	0.24	0.27	5	5,727,219	0.09	0.05	0.05
中部	17	2,640,910	0.64	0.41	0.45	7	2,623,861	0.27	0.17	0.19
南部	17	3,181,132	0.53	0.41	0.42	2	3,181,768	0.06	0.03	0.03
東部	1	279,103	0.36	0.21	0.23	0	267,784	0.00	0.00	0.00
金馬地區	1	76,942	1.30	0.80	0.80	0	75,387	0.00	0.00	0.00
直轄市	38	8,024,446	0.47	0.31	0.34	8	8,321,973	0.10	0.06	0.07
中央政府管轄市	3	535,240	0.56	0.29	0.35	2	549,172	0.36	0.17	0.20
縣轄市	2	790,308	0.25	0.17	0.18	1	801,548	0.12	0.08	0.09
鎮	6	859,540	0.70	0.49	0.49	0	830,944	0.00	0.00	0.00
鄉	9	1,503,379	0.60	0.44	0.45	3	1,372,382	0.22	0.09	0.11
山地鄉 [4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	0	97,552	0.00	0.00	0.00
總計	58	11,712,913	0.50	0.33	0.35	14	11,876,019	0.12	0.07	0.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

不明原發部位 C80

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	38	1,273,375	2.98	1.39	1.59	44	1,395,197	3.15	1.17	1.41
新北市	58	1,954,968	2.97	1.75	1.99	39	2,040,749	1.91	0.92	1.05
桃園市	21	1,104,073	1.90	1.18	1.28	23	1,116,799	2.06	1.10	1.31
台中市	35	1,380,106	2.54	1.55	1.75	34	1,423,788	2.39	1.17	1.43
台南市	34	939,967	3.62	1.89	2.13	21	943,864	2.22	0.88	1.04
高雄市	51	1,371,957	3.72	1.95	2.22	35	1,401,576	2.50	1.07	1.29
基隆市	6	184,978	3.24	1.18	1.77	7	185,177	3.78	1.58	1.93
新竹市	10	219,846	4.55	2.90	3.14	4	225,789	1.77	0.62	0.80
嘉義市	6	130,416	4.60	2.64	2.81	4	138,206	2.89	1.31	1.57
新竹縣	8	284,385	2.81	1.67	1.87	4	272,625	1.47	0.80	1.02
宜蘭縣	1	230,027	0.43	0.30	0.33	5	225,194	2.22	0.94	1.03
苗栗縣	8	283,174	2.83	1.39	1.54	7	265,689	2.63	1.13	1.41
彰化縣	14	650,677	2.15	1.26	1.41	12	627,147	1.91	0.61	0.75
南投縣	7	254,549	2.75	1.66	1.85	6	242,482	2.47	0.88	0.95
雲林縣	14	355,578	3.94	2.00	2.25	16	330,444	4.84	1.77	2.06
嘉義縣	8	263,451	3.04	1.57	1.71	5	243,617	2.05	0.61	0.76
屏東縣	19	421,534	4.51	2.17	2.50	14	403,872	3.47	1.18	1.52
澎湖縣	1	53,807	1.86	0.76	1.14	1	50,633	1.97	1.26	1.16
花蓮縣	7	166,258	4.21	1.98	2.31	4	161,710	2.47	1.40	1.70
台東縣	7	112,845	6.20	3.19	3.81	3	106,074	2.83	1.19	1.36
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	1	69,779	1.43	0.35	0.42
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	150	5,534,826	2.71	1.50	1.70	133	5,727,219	2.32	1.04	1.23
中部	70	2,640,910	2.65	1.54	1.72	68	2,623,861	2.59	1.08	1.29
南部	119	3,181,132	3.74	1.93	2.18	80	3,181,768	2.51	1.00	1.20
東部	14	279,103	5.02	2.48	2.93	7	267,784	2.61	1.32	1.57
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	1	75,387	1.33	0.33	0.39
直轄市	237	8,024,446	2.95	1.64	1.86	196	8,321,973	2.36	1.05	1.25
中央政府管轄市	22	535,240	4.11	2.16	2.52	15	549,172	2.73	1.16	1.42
縣轄市	22	790,308	2.78	1.61	1.85	17	801,548	2.12	1.00	1.22
鎮	19	859,540	2.21	1.13	1.23	22	830,944	2.65	0.98	1.16
鄉	53	1,503,379	3.53	1.80	2.05	39	1,372,382	2.84	1.02	1.23
山地鄉 [4]	5	106,239	4.71	3.40	3.91	1	97,552	1.03	0.65	0.60
總計*	354	11,712,913	3.02	1.65	1.87	289	11,876,019	2.43	1.04	1.24

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

5. 總計*：其中包含 1 名男性戶籍地為其他國家或不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	286	1,273,375	22.46	13.41	14.51	234	1,395,197	16.77	8.75	9.82
新北市	364	1,954,968	18.62	12.08	13.37	305	2,040,749	14.95	8.32	9.37
桃園市	167	1,104,073	15.13	11.03	12.05	147	1,116,799	13.16	8.70	9.53
台中市	256	1,380,106	18.55	12.72	14.28	195	1,423,788	13.70	8.75	9.72
台南市	161	939,967	17.13	9.91	11.08	129	943,864	13.67	7.60	8.57
高雄市	229	1,371,957	16.69	10.10	11.30	191	1,401,576	13.63	7.87	8.67
基隆市	33	184,978	17.84	10.37	11.35	32	185,177	17.28	8.99	10.39
新竹市	29	219,846	13.19	8.84	10.37	22	225,789	9.74	6.64	7.38
嘉義市	26	130,416	19.94	13.03	14.06	22	138,206	15.92	10.73	10.96
新竹縣	52	284,385	18.29	12.10	13.63	40	272,625	14.67	10.43	11.54
宜蘭縣	34	230,027	14.78	8.04	9.13	26	225,194	11.55	6.13	6.81
苗栗縣	53	283,174	18.72	10.03	11.19	50	265,689	18.82	9.91	11.21
彰化縣	101	650,677	15.52	9.16	10.20	98	627,147	15.63	8.76	9.71
南投縣	45	254,549	17.68	8.39	9.74	25	242,482	10.31	5.65	6.14
雲林縣	57	355,578	16.03	7.92	8.97	44	330,444	13.32	6.17	7.03
嘉義縣	34	263,451	12.91	6.48	7.40	35	243,617	14.37	7.20	7.90
屏東縣	64	421,534	15.18	8.64	9.67	45	403,872	11.14	5.84	6.47
澎湖縣	11	53,807	20.44	13.99	14.29	3	50,633	5.92	3.91	4.33
花蓮縣	32	166,258	19.25	10.83	12.30	19	161,710	11.75	7.60	8.03
台東縣	23	112,845	20.38	12.95	13.92	10	106,074	9.43	5.11	5.55
金門縣	7	69,494	10.07	5.86	6.74	6	69,779	8.60	4.57	5.41
連江縣	1	7,448	13.43	7.51	8.11	3	5,608	53.50	35.68	39.64
北部	1,018	5,534,826	18.39	11.76	12.95	856	5,727,219	14.95	8.53	9.52
中部	459	2,640,910	17.38	10.72	12.01	362	2,623,861	13.80	8.13	9.01
南部	525	3,181,132	16.50	9.72	10.82	425	3,181,768	13.36	7.55	8.34
東部	55	279,103	19.71	11.61	12.86	29	267,784	10.83	6.60	7.02
金馬地區	8	76,942	10.40	6.05	6.92	9	75,387	11.94	6.71	7.79
直轄市	1,463	8,024,446	18.23	11.67	12.90	1,201	8,321,973	14.43	8.35	9.30
中央政府管轄市	88	535,240	16.44	10.42	11.59	76	549,172	13.84	8.44	9.29
縣轄市	81	790,308	10.25	6.49	7.04	71	801,548	8.86	4.99	5.60
鎮	131	859,540	15.24	8.27	9.46	91	830,944	10.95	5.52	6.10
鄉	302	1,503,379	20.09	10.97	12.24	242	1,372,382	17.63	10.00	11.03
山地鄉 [4]	8	106,239	7.53	5.07	6.46	13	97,552	13.33	10.30	11.12
總計	2,065	11,712,913	17.63	10.93	12.11	1,681	11,876,019	14.15	8.10	8.99

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	22	1,273,375	1.73	1.93	1.95	20	1,395,197	1.43	1.50	1.59
新北市	21	1,954,968	1.07	1.14	1.18	13	2,040,749	0.64	0.64	0.66
桃園市	10	1,104,073	0.91	0.77	0.82	9	1,116,799	0.81	0.71	0.77
台中市	18	1,380,106	1.30	1.24	1.27	17	1,423,788	1.19	1.06	1.14
台南市	9	939,967	0.96	0.91	0.97	8	943,864	0.85	0.87	0.94
高雄市	13	1,371,957	0.95	0.96	1.00	18	1,401,576	1.28	1.26	1.32
基隆市	3	184,978	1.62	1.35	1.45	1	185,177	0.54	0.53	0.67
新竹市	1	219,846	0.45	0.56	0.58	0	225,789	0.00	0.00	0.00
嘉義市	1	130,416	0.77	1.23	1.18	2	138,206	1.45	1.41	1.54
新竹縣	4	284,385	1.41	1.83	1.81	2	272,625	0.73	0.95	1.01
宜蘭縣	2	230,027	0.87	0.94	0.94	1	225,194	0.44	0.27	0.30
苗栗縣	6	283,174	2.12	1.53	1.61	1	265,689	0.38	0.60	0.56
彰化縣	7	650,677	1.08	1.16	1.19	3	627,147	0.48	0.62	0.61
南投縣	2	254,549	0.79	0.42	0.47	2	242,482	0.82	0.84	0.83
雲林縣	2	355,578	0.56	0.33	0.33	2	330,444	0.61	0.61	0.62
嘉義縣	1	263,451	0.38	0.31	0.37	2	243,617	0.82	1.15	1.12
屏東縣	5	421,534	1.19	1.13	1.11	4	403,872	0.99	0.90	0.94
澎湖縣	1	53,807	1.86	2.80	2.64	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	1	166,258	0.60	0.67	0.69	0	161,710	0.00	0.00	0.00
台東縣	1	112,845	0.89	0.52	0.52	1	106,074	0.94	0.94	1.19
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	1	69,779	1.43	1.17	1.28
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	0	5,608	0.00	0.00	0.00
北部	69	5,534,826	1.25	1.26	1.29	47	5,727,219	0.82	0.82	0.87
中部	29	2,640,910	1.10	1.03	1.06	24	2,623,861	0.91	0.87	0.92
南部	30	3,181,132	0.94	0.97	1.00	34	3,181,768	1.07	1.09	1.15
東部	2	279,103	0.72	0.61	0.62	1	267,784	0.37	0.37	0.47
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	1	75,387	1.33	1.07	1.18
直轄市	93	8,024,446	1.16	1.15	1.19	85	8,321,973	1.02	0.98	1.04
中央政府管轄市	5	535,240	0.93	1.03	1.06	3	549,172	0.55	0.53	0.61
縣轄市	8	790,308	1.01	0.91	0.94	3	801,548	0.37	0.35	0.38
鎮	8	859,540	0.93	0.59	0.67	2	830,944	0.24	0.33	0.32
鄉	16	1,503,379	1.06	1.36	1.31	14	1,372,382	1.02	1.19	1.22
山地鄉[4]	0	106,239	0.00	0.00	0.00	3	97,552	3.08	4.31	4.22
總計	130	11,712,913	1.11	1.11	1.13	107	11,876,019	0.90	0.89	0.94

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]
台北市	197	1,273,375	15.47	8.58	9.40	162	1,395,197	11.61	5.66	6.36
新北市	272	1,954,968	13.91	8.70	9.66	241	2,040,749	11.81	6.41	7.27
桃園市	126	1,104,073	11.41	8.38	9.16	101	1,116,799	9.04	5.78	6.37
台中市	188	1,380,106	13.62	9.05	10.17	133	1,423,788	9.34	5.60	6.35
台南市	126	939,967	13.40	7.53	8.44	95	943,864	10.07	5.40	6.07
高雄市	170	1,371,957	12.39	7.30	8.21	135	1,401,576	9.63	4.87	5.48
基隆市	23	184,978	12.43	7.11	7.67	25	185,177	13.50	6.94	7.93
新竹市	20	219,846	9.10	5.78	6.92	19	225,789	8.41	5.77	6.44
嘉義市	20	130,416	15.34	9.36	10.43	14	138,206	10.13	7.18	7.17
新竹縣	37	284,385	13.01	8.16	9.15	30	272,625	11.00	7.50	8.33
宜蘭縣	21	230,027	9.13	4.81	5.46	20	225,194	8.88	4.80	5.30
苗栗縣	32	283,174	11.30	5.83	6.60	34	265,689	12.80	6.33	7.31
彰化縣	75	650,677	11.53	6.38	7.22	72	627,147	11.48	6.51	7.20
南投縣	34	254,549	13.36	6.41	7.42	15	242,482	6.19	2.89	3.30
雲林縣	41	355,578	11.53	5.71	6.52	29	330,444	8.78	4.01	4.57
嘉義縣	26	263,451	9.87	4.90	5.60	22	243,617	9.03	4.44	4.83
屏東縣	47	421,534	11.15	5.98	6.86	37	403,872	9.16	4.65	5.16
澎湖縣	7	53,807	13.01	8.51	8.86	3	50,633	5.92	3.91	4.33
花蓮縣	25	166,258	15.04	8.17	9.59	13	161,710	8.04	5.79	6.02
台東縣	17	112,845	15.06	10.08	10.75	6	106,074	5.66	2.93	3.05
金門縣	7	69,494	10.07	5.86	6.74	5	69,779	7.17	3.40	4.13
連江縣	1	7,448	13.43	7.51	8.11	2	5,608	35.66	26.11	30.79
北部	728	5,534,826	13.15	8.16	9.02	632	5,727,219	11.04	6.08	6.82
中部	338	2,640,910	12.80	7.61	8.60	249	2,623,861	9.49	5.33	6.00
南部	396	3,181,132	12.45	7.07	7.94	306	3,181,768	9.62	5.04	5.61
東部	42	279,103	15.05	8.84	9.95	19	267,784	7.10	4.65	4.84
金馬地區	8	76,942	10.40	6.05	6.92	7	75,387	9.29	4.97	5.99
直轄市	1,079	8,024,446	13.45	8.34	9.26	867	8,321,973	10.42	5.70	6.40
中央政府管轄市	63	535,240	11.77	7.16	8.06	58	549,172	10.56	6.51	7.13
縣轄市	60	790,308	7.59	4.62	5.06	52	801,548	6.49	3.68	4.15
鎮	93	859,540	10.82	5.93	6.77	68	830,944	8.18	3.97	4.44
鄉	217	1,503,379	14.43	7.35	8.38	168	1,372,382	12.24	6.81	7.51
山地鄉[4]	5	106,239	4.71	2.93	3.62	7	97,552	7.18	4.18	4.89
總計	1,512	11,712,913	12.91	7.74	8.64	1,213	11,876,019	10.21	5.58	6.25

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率[2]係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率[3]係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉[4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

漿細胞瘤 M-CODE 範圍請見附錄五

性別 / 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]	申報數	人口數	每 10 萬人口粗發生率	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [2]	每 10 萬人口年齡標準化發生率 [3]
台北市	55	1,273,375	4.32	2.14	2.40	45	1,395,197	3.23	1.39	1.64
新北市	59	1,954,968	3.02	1.74	2.03	44	2,040,749	2.16	1.07	1.21
桃園市	26	1,104,073	2.35	1.56	1.74	28	1,116,799	2.51	1.53	1.72
台中市	39	1,380,106	2.83	1.74	2.09	36	1,423,788	2.53	1.47	1.63
台南市	23	939,967	2.45	1.32	1.50	23	943,864	2.44	1.21	1.42
高雄市	43	1,371,957	3.13	1.75	1.97	31	1,401,576	2.21	1.23	1.37
基隆市	5	184,978	2.70	1.21	1.50	4	185,177	2.16	0.91	1.00
新竹市	7	219,846	3.18	2.16	2.56	2	225,789	0.89	0.59	0.66
嘉義市	4	130,416	3.07	1.96	2.01	6	138,206	4.34	2.13	2.25
新竹縣	11	284,385	3.87	2.12	2.66	6	272,625	2.20	1.39	1.53
宜蘭縣	10	230,027	4.35	2.04	2.50	3	225,194	1.33	0.68	0.79
苗栗縣	13	283,174	4.59	2.33	2.58	13	265,689	4.89	2.43	2.70
彰化縣	19	650,677	2.92	1.62	1.79	22	627,147	3.51	1.60	1.85
南投縣	9	254,549	3.54	1.56	1.85	5	242,482	2.06	1.36	1.35
雲林縣	13	355,578	3.66	1.79	2.01	8	330,444	2.42	0.89	1.07
嘉義縣	6	263,451	2.28	1.05	1.19	11	243,617	4.52	1.61	1.95
屏東縣	12	421,534	2.85	1.53	1.70	4	403,872	0.99	0.29	0.37
澎湖縣	2	53,807	3.72	2.19	2.19	0	50,633	0.00	0.00	0.00
花蓮縣	6	166,258	3.61	1.99	2.01	5	161,710	3.09	1.41	1.57
台東縣	4	112,845	3.54	2.01	2.13	1	106,074	0.94	0.22	0.27
金門縣	0	69,494	0.00	0.00	0.00	0	69,779	0.00	0.00	0.00
連江縣	0	7,448	0.00	0.00	0.00	1	5,608	17.83	9.57	8.85
北部	186	5,534,826	3.36	1.87	2.16	145	5,727,219	2.53	1.27	1.46
中部	80	2,640,910	3.03	1.70	1.97	71	2,623,861	2.71	1.41	1.59
南部	90	3,181,132	2.83	1.55	1.73	75	3,181,768	2.36	1.15	1.32
東部	10	279,103	3.58	2.02	2.08	6	267,784	2.24	0.94	1.05
金馬地區	0	76,942	0.00	0.00	0.00	1	75,387	1.33	0.66	0.61
直轄市	245	8,024,446	3.05	1.74	2.00	207	8,321,973	2.49	1.29	1.47
中央政府管轄市	16	535,240	2.99	1.73	2.00	12	549,172	2.19	1.11	1.20
縣轄市	13	790,308	1.64	0.95	1.04	12	801,548	1.50	0.73	0.82
鎮	28	859,540	3.26	1.68	1.92	17	830,944	2.05	0.94	1.04
鄉	64	1,503,379	4.26	2.10	2.37	50	1,372,382	3.64	1.61	1.85
山地鄉 [4]	3	106,239	2.82	2.14	2.84	3	97,552	3.08	1.82	2.00
總計	366	11,712,913	3.12	1.73	1.98	298	11,876,019	2.51	1.25	1.43

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 3.年齡標準化率 [2] 係使用 1976 年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率 [3] 係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 山地鄉 [4]：包含 6 個直轄市山地原住民區與 24 個隸屬於縣的山地鄉，共 30 個，請見表三最後註釋。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 107 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2018 (CONTINUED)

註：

2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率[2]：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 每 10 萬人口年齡標準化發生率[3]：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 北部地區：包含新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
5. 中部地區：包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣。
6. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。
7. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
8. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
9. 直轄市：舊稱「院轄市」，人口聚集達 125 萬人以上得設直轄市，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。
10. 中央政府管轄市：隸屬中央政府管轄，舊稱「省轄市」，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設中央政府管轄市，包含基隆市、新竹市、嘉義市。
11. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
12. 鎮：隸屬於縣。
13. 鄉：隸屬於縣。
14. 山地鄉[4]：包含：

新北市－烏來區；
桃園市－復興區；
台中市－和平區；
高雄市－茂林區、桃源區、那瑪夏區；
宜蘭縣－大同鄉、南澳鄉；
新竹縣－尖石鄉、五峰鄉；
苗栗縣－泰安鄉；
南投縣－信義鄉、仁愛鄉；
嘉義縣－阿里山鄉；
屏東縣－三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
花蓮縣－秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；
台東縣－海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉。

表四之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 107 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	**全癌症（總計）** **ALL SITES**	**116,131**
C00-C14	**唇、口腔及咽** **LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX**	**10,007**
C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,170
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP（excludes skin of lip C44.0）	287
C01-C02	舌 TONGUE	2,235
C03	齒齦 GUM	821
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	250
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,448
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	913
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,201
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	347
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,490
C15-C26, C48	**消化器官及腹膜** **DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM**	**39,064**
C15	食道 ESOPHAGUS	2,778
C16	胃 STOMACH	3,798
C17	小腸 SMALL INTESTINE	421

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理 Histology	細胞病理 Cytology	顯微鏡檢方式不詳 Unknown Method	病理診斷百分比 MV%[2]	實驗診斷/腫瘤標記 Laboratory Test/Marker Study	直接察看 Surgical Exploration/ Endoscopy	影像檢查 Imaging Techniques	臨床病狀 Clinical diagnosis	不詳 Unknown	
106,200	**1,606**	**9**	**92.84**	**197**	**42**	**7,662**	**405**	**10**	**C00-C80**
9,932	**14**	**0**	**99.39**	**0**	**4**	**38**	**19**	**0**	**C00-C14**
8,111	5	0	99.34	0	4	35	15	0	C00-C14[3]
287	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C00
2,227	0	0	99.64	0	2	5	1	0	C01-C02
820	0	0	99.88	0	0	1	0	0	C03
250	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C04
2,441	0	0	99.71	0	1	3	3	0	C05-C06
899	1	0	98.58	0	0	4	9	0	C09-C10
1,174	4	0	98.08	0	1	21	1	0	C12-C13
13	0	0	86.67	0	0	1	1	0	C14
340	6	0	99.71	0	0	0	1	0	C07-C08
1,481	3	0	99.60	0	0	3	3	0	C11
31,869	**311**	**5**	**82.39**	**40**	**25**	**6,632**	**176**	**6**	**C15-C26, C48**
2,753	0	0	99.10	0	1	17	6	1	C15
3,746	2	0	98.68	0	2	30	17	1	C16
415	0	0	98.57	0	1	4	0	1	C17

表四之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 107 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	16,525
C18	結腸 COLON	10,549
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	5,976
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,342
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,129
C25	胰 PANCREAS	2,750
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	298
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	23
C30-C39	**呼吸系統及胸腔內器官** **RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS**	**17,039**
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	227
C32	喉 LARYNX	795
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	15,345
C38.4	胸膜 PLEURA	92
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	580
C42[4]	**白血病** **LEUKEMIA**	**2,550**
C40-C41	**骨、關節及關節軟骨** **BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE**	**159**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢方式不詳	病理診斷百分比	實驗診斷/腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV%[2]	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
16,199	6	2	98.08	3	9	264	39	3	C18-C21
10,271	6	1	97.43	1	7	229	31	3	C18
5,928	0	1	99.21	2	2	35	8	0	C19-C21
5,464	153	2	49.54	26	5	5,615	77	0	C22
941	10	0	84.23	1	3	167	7	0	C23-C24
2,055	128	1	79.42	10	4	525	27	0	C25
277	10	0	96.31	0	0	8	3	0	C48
19	2	0	91.30	0	0	2	0	0	C26
15,603	**926**	**1**	**97.01**	**6**	**2**	**431**	**69**	**1**	**C30-C39**
226	0	0	99.56	0	0	0	1	0	C30-C31
785	1	0	98.87	0	1	8	0	0	C32
13,937	921	1	96.83	5	1	414	65	1	C33-C34
88	2	0	97.83	1	0	1	0	0	C38.4
567	2	0	98.10	0	0	8	3	0	C37-C38.3, C38.8
2,437	**2**	**0**	**95.65**	**79**	**0**	**1**	**31**	**0**	**C42[4]**
155	**0**	**0**	**97.48**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**C40-C41**

表四之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 107 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	**結締組織、軟組織及其他皮下組織** **CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES**	**632**
C44	**皮膚** **SKIN**	**4,049**
C44[5]	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	279
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,770
C50	**女性乳房** **FEMALE BREAST**	**14,217**
C50	**男性乳房** **MALE BREAST**	**60**
C51-C58	**女性生殖器官** **FEMALE GENITAL ORGANS**	**5,961**
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	6
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,433
C54	子宮體 CORPUS UTERI	2,787
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,557
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	178
C60-C63	**男性生殖器官** **MALE GENITAL ORGANS**	**7,037**
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	6,644
C62	睪丸 TESTIS	277
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	116
C64-C68	**泌尿器官** **URINARY TRACT**	**5,420**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3　C44，　M-87203 0 M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢方式不詳	病理診斷百分比	實驗診斷/腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV%[2]	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
621	**2**	**0**	**98.58**	**0**	**1**	**7**	**1**	**0**	**C47, C49**
4,035	**0**	**0**	**99.65**	**0**	**1**	**2**	**11**	**0**	**C44**
275	0	0	98.57	0	0	1	3	0	C44[5]
3,760	0	0	99.73	0	1	1	8	0	C44
14,152	**14**	**0**	**99.64**	**0**	**0**	**34**	**14**	**3**	**C50**
60	**0**	**0**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**C50**
5,827	**63**	**0**	**98.81**	**3**	**0**	**56**	**12**	**0**	**C51-C58**
5	0	0	83.33	0	0	0	1	0	C55
1,403	14	0	98.88	0	0	14	2	0	C53
2,777	3	0	99.75	0	0	7	0	0	C54
1,469	45	0	97.24	2	0	33	8	0	C56, C57.0-C57.4
173	1	0	97.75	1	0	2	1	0	C51-C52, C57.7-C57.9
6,949	**2**	**0**	**98.78**	**27**	**0**	**50**	**9**	**0**	**C60-C63**
6,560	2	0	98.77	27	0	46	9	0	C61
273	0	0	98.56	0	0	4	0	0	C62
116	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C60,C63
5,161	**85**	**2**	**96.83**	**6**	**2**	**143**	**21**	**0**	**C64-C68**

表四之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 107 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,239
C64	腎 KIDNEY	1,473
C65	腎盂 RENAL PELVIS	964
C66	輸尿管 URETER	674
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	45
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	5
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	20
C69	**眼及淚腺** **EYE AND LACRIMAL GLAND**	**54**
C70-C72	**中樞神經系統** **BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM**	**797**
C71	腦 BRAIN	719
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	78
C73	**甲狀腺** **THYROID GLAND**	**4,445**
C74-C75	**其他內分泌腺** **OTHER ENDOCRINE GLANDS**	**171**
C76	**其他分界不明的部位** **OTHER AND ILL-DEFINED SITES**	**72**
C80	**不明原發部位** **UNKNOWN PRIMARY SITES**	**643**
	惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA（M-CODE 範圍請見附錄五）**	**3,746**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢方式不詳	病理診斷百分比	實驗診斷/腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV%[2]	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
2,184	28	1	98.84	0	0	20	6	0	C67
1,388	3	1	94.50	0	2	69	10	0	C64
893	25	0	95.23	4	0	39	3	0	C65
632	24	0	97.33	1	0	15	2	0	C66
45	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.0-C68.1
5	0	0	100.00	0	0	0	0	0	C68.8
14	5	0	95.00	1	0	0	0	0	C68.9
43	**0**	**0**	**79.63**	**0**	**6**	**4**	**1**	**0**	**C69**
694	**2**	**0**	**87.33**	**1**	**0**	**87**	**13**	**0**	**C70-C72**
622	2	0	86.79	0	0	84	11	0	C71
72	0	0	92.31	1	0	3	2	0	C70, C72
4,357	**70**	**0**	**99.60**	**2**	**0**	**10**	**6**	**0**	**C73**
163	**0**	**0**	**95.32**	**0**	**1**	**7**	**0**	**0**	**C74-C75**
63	**7**	**0**	**97.22**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**C76**
392	**91**	**1**	**75.27**	**4**	**0**	**139**	**16**	**0**	**C80**
3,680	**17**	**0**	**98.69**	**29**	**0**	**15**	**5**	**0**	

表四之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 107 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
白血病與骨髓增生性腫瘤 **LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL**	**2,550**
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	859
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	300
慢性骨髓性白血病 [6] CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	253
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	206
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	21
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	551
骨髓分化不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES	358
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	1
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	1
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	2,550

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

6. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢方式不詳	病理診斷百分比	實驗診斷/腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV%[2]	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
2,437	**2**	**0**	**95.65**	**79**	**0**	**1**	**31**	**0**
851	1	0	99.19	4	0	0	3	0
296	0	0	98.67	4	0	0	0	0
245	0	0	96.84	8	0	0	0	0
199	0	0	96.60	6	0	1	0	0
20	0	0	95.24	1	0	0	0	0
480	0	0	87.11	51	0	0	20	0
345	1	0	96.65	5	0	0	7	0
1	0	0	100.00	0	0	0	0	0
0	0	0	0.00	0	0	0	1	0
2,437	2	0	95.65	79	0	1	31	0

表四之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 107 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018 （CONTINUED）

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER
惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA**	**3,746**
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	237
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	2,725
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,340
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	385
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	664
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	24
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	96

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢方式不詳	病理診斷百分比	實驗診斷/腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV%[2]	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
3,680	**17**	**0**	**98.69**	**29**	**0**	**15**	**5**	**0**
237	0	0	100.00	0	0	0	0	0
2,708	15	0	99.93	1	0	1	0	0
2,325	14	0	99.96	0	0	1	0	0
383	1	0	99.74	1	0	0	0	0
635	0	0	95.63	26	0	2	1	0
24	0	0	100.00	0	0	0	0	0
76	2	0	81.25	2	0	12	4	0

表五之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 107 年

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery	
C00-C80	**全癌症（總計）** **ALL SITES**	**116,131**	**67,649**	**(58.25)**
C00-C14	**唇、口腔及咽** **LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX**	**10,007**	**5,577**	**(55.73)**
C00-C14[3]	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,170	5,265	(64.44)
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP（excludes skin of lip C44.0）	287	254	(88.50)
C01-C02	舌 TONGUE	2,235	1,729	(77.36)
C03	齒齦 GUM	821	641	(78.08)
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	250	191	(76.40)
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,448	1,895	(77.41)
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	913	274	(30.01)
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,201	278	(23.15)
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15	3	(20.00)
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	347	296	(85.30)
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,490	16	(1.07)
C15-C26, C48	**消化器官及腹膜** **DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM**	**39,064**	**20,607**	**(52.75)**
C15	食道 ESOPHAGUS	2,778	859	(30.92)
C16	胃 STOMACH	3,798	2,195	(57.79)
C17	小腸 SMALL INTESTINE	421	304	(72.21)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申報治療方法[2] METHODS OF CANCER TREATMENT															
放射治療 Radiotherapy		化學治療[8] Chemotherapy		荷爾蒙/類固醇治療 Hormone/ Steroid therapy		免疫治療[8] Immunotherapy		骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure		標靶治療 Targeted therapy		緩和照護 Palliative care		其他治療 Other treatment		未有首次治療申報紀錄 No therapy record	
30,795	**(26.52)**	**45,749**	**(39.39)**	**20,210**	**(17.40)**	**1,954**	**(1.68)**	**481**	**(0.41)**	**14,031**	**(12.08)**	**16,562**	**(14.26)**	**427**	**(0.37)**	**11,551**	**(9.95)**
5,479	**(54.75)**	**5,201**	**(51.97)**	**1**	**(0.01)**	**95**	**(0.95)**	**-**	**-**	**519**	**(5.19)**	**589**	**(5.89)**	**4**	**(0.04)**	**729**	**(7.28)**
3,983	(48.75)	3,861	(47.26)	-	-	84	(1.03)	-	-	495	(6.06)	495	(6.06)	4	(0.05)	609	(7.45)
57	(19.86)	48	(16.72)	-	-	-	-	-	-	2	(0.70)	6	(2.09)	1	(0.35)	14	(4.88)
940	(42.06)	885	(39.60)	-	-	14	(0.63)	-	-	97	(4.34)	91	(4.07)	1	(0.04)	141	(6.31)
418	(50.91)	385	(46.89)	-	-	7	(0.85)	-	-	40	(4.87)	41	(4.99)	1	(0.12)	68	(8.28)
97	(38.80)	92	(36.80)	-	-	3	(1.20)	-	-	14	(5.60)	18	(7.20)	1	(0.40)	24	(9.60)
977	(39.91)	920	(37.58)	-	-	16	(0.65)	-	-	87	(3.55)	101	(4.13)	-	-	165	(6.74)
631	(69.11)	637	(69.77)	-	-	14	(1.53)	-	-	99	(10.84)	87	(9.53)	-	-	87	(9.53)
855	(71.19)	886	(73.77)	-	-	30	(2.50)	-	-	154	(12.82)	150	(12.49)	-	-	104	(8.66)
8	(53.33)	8	(53.33)	-	-	-	-	-	-	2	(13.33)	1	(6.67)	-	-	6	(40.00)
195	(56.20)	91	(26.22)	1	(0.29)	1	(0.29)	-	-	4	(1.15)	12	(3.46)	-	-	21	(6.05)
1,301	(87.32)	1,249	(83.83)	-	-	10	(0.67)	-	-	20	(1.34)	82	(5.50)	-	-	99	(6.64)
5,353	**(13.70)**	**16,820**	**(43.06)**	**4**	**(0.01)**	**358**	**(0.92)**	**1**	**(0.00)**	**3,786**	**(9.69)**	**7,738**	**(19.81)**	**14**	**(0.04)**	**5,170**	**(13.23)**
1,746	(62.85)	1,896	(68.25)	1	(0.04)	40	(1.44)	-	-	30	(1.08)	692	(24.91)	1	(0.04)	324	(11.66)
246	(6.48)	1,716	(45.18)	-	-	54	(1.42)	-	-	204	(5.37)	964	(25.38)	-	-	551	(14.51)
12	(2.85)	57	(13.54)	-	-	3	(0.71)	-	-	108	(25.65)	55	(13.06)	-	-	62	(14.73)

表五之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 107 年 (續)

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	16,525	12,752 (77.17)
C18	結腸 COLON	10,549	8,278 (78.47)
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	5,976	4,474 (74.87)
C22[4]	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,342	2,973 (26.21)
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,129	578 (51.20)
C25	胰 PANCREAS	2,750	745 (27.09)
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	298	201 (67.45)
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	23	- -
C30-C39	**呼吸系統及胸腔內器官** **RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS**	**17,039**	**6,541 (38.39)**
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	227	135 (59.47)
C32	喉 LARYNX	795	328 (41.26)
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	15,345	5,619 (36.62)
C38.4	胸膜 PLEURA	92	29 (31.52)
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	580	430 (74.14)
C42[5]	**白血病** **LEUKEMIA**	**2,550**	**1 (0.04)**
C40-C41	**骨、關節及關節軟骨** **BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE**	**159**	**113 (71.07)**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

4. 肝及肝內膽管的詳細治療方法分類，請見本年報第 39 頁首次療程的內文說明。

5. 白血病：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申報治療方法[2] METHODS OF CANCER TREATMENT																					
放射治療 Radiotherapy		化學治療[8] Chemotherapy		荷爾蒙/類固醇治療 Hormone/ Steroid therapy		免疫治療[8] Immunotherapy		骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure		標靶治療 Targeted therapy		緩和照護 Palliative care		其他治療 Other treatment		未有首次治療申報紀錄 No therapy record	
2,030	(12.28)	8,443	(51.09)	2	(0.01)	21	(0.13)	-	-	2,038	(12.33)	2,133	(12.91)	1	(0.01)	1,679	(10.16)
236	(2.24)	5,160	(48.91)	2	(0.02)	13	(0.12)	-	-	1,314	(12.46)	1,396	(13.23)	-	-	1,158	(10.98)
1,794	(30.02)	3,283	(54.94)	-	-	8	(0.13)	-	-	724	(12.12)	737	(12.33)	1	(0.02)	521	(8.72)
894	(7.88)	2,787	(24.57)	-	-	226	(1.99)	-	-	1,296	(11.43)	2,377	(20.96)	3	(0.03)	1,837	(16.20)
116	(10.27)	375	(33.22)	-	-	3	(0.27)	-	-	4	(0.35)	311	(27.55)	1	(0.09)	203	(17.98)
263	(9.56)	1,405	(51.09)	-	-	9	(0.33)	-	-	65	(2.36)	1,156	(42.04)	8	(0.29)	475	(17.27)
45	(15.10)	134	(44.97)	1	(0.34)	2	(0.67)	1	(0.34)	38	(12.75)	40	(13.42)	-	-	31	(10.40)
1	(4.35)	7	(30.43)	-	-	-	-	-	-	3	(13.04)	10	(43.48)	-	-	8	(34.78)
4,093	**(24.02)**	**5,623**	**(33.00)**	**2**	**(0.01)**	**483**	**(2.83)**	**-**	**-**	**4,044**	**(23.73)**	**4,976**	**(29.20)**	**27**	**(0.16)**	**1,854**	**(10.88)**
137	(60.35)	103	(45.37)	-	-	3	(1.32)	-	-	5	(2.20)	19	(8.37)	-	-	29	(12.78)
454	(57.11)	260	(32.70)	-	-	6	(0.75)	-	-	42	(5.28)	30	(3.77)	-	-	84	(10.57)
3,270	(21.31)	5,037	(32.83)	-	-	465	(3.03)	-	-	3,984	(25.96)	4,832	(31.49)	27	(0.18)	1,684	(10.97)
9	(9.78)	62	(67.39)	-	-	2	(2.17)	-	-	7	(7.61)	31	(33.70)	-	-	16	(17.39)
223	(38.45)	161	(27.76)	2	(0.34)	7	(1.21)	-	-	6	(1.03)	64	(11.03)	-	-	41	(7.07)
33	**(1.29)**	**1,688**	**(66.20)**	**284**	**(11.14)**	**7**	**(0.27)**	**188**	**(7.37)**	**425**	**(16.67)**	**331**	**(12.98)**	**266**	**(10.43)**	**436**	**(17.10)**
38	**(23.90)**	**67**	**(42.14)**	**-**	**-**	**2**	**(1.26)**	**-**	**-**	**4**	**(2.52)**	**15**	**(9.43)**	**-**	**-**	**18**	**(11.32)**

表五之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 107 年 (續)

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery	
C47, C49	**結締組織、軟組織及其他皮下組織** **CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES**	**632**	**473**	**(74.84)**
C44	**皮膚** **SKIN**	**4,049**	**3,640**	**(89.90)**
C44[6]	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	279	201	(72.04)
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,770	3,439	(91.22)
C50[7]	**女性乳房** **FEMALE BREAST**	**14,217**	**12,582**	**(88.50)**
C50[7]	**男性乳房** **MALE BREAST**	**60**	**53**	**(88.33)**
C51-C58	**女性生殖器官** **FEMALE GENITAL ORGANS**	**5,961**	**4,551**	**(76.35)**
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	6	2	(33.33)
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,433	609	(42.50)
C54	子宮體 CORPUS UTERI	2,787	2,485	(89.16)
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,557	1,357	(87.15)
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	178	98	(55.06)
C60-C63	**男性生殖器官** **MALE GENITAL ORGANS**	**7,037**	**3,822**	**(54.31)**
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	6,644	3,470	(52.23)
C62	睪丸 TESTIS	277	258	(93.14)
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	116	94	(81.03)
C64-C68	**泌尿器官** **URINARY TRACT**	**5,420**	**4,375**	**(80.72)**

註 : 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤 : ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3　C44，　M-87203 - M-87903。

7. 乳房「荷爾蒙/類固醇治療」項目即為「內分泌治療」。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申報治療方法[2] METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療 Radiotherapy		化學治療[8] Chemotherapy		荷爾蒙/類固醇治療 Hormone/ Steroid therapy		免疫治療[8] Immunotherapy		骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure		標靶治療 Targeted therapy		緩和照護 Palliative care		其他治療 Other treatment		未有首次治療申報紀錄 No therapy record	
254	**(40.19)**	**154**	**(24.37)**	**1**	**(0.16)**	**2**	**(0.32)**	**-**	**-**	**33**	**(5.22)**	**74**	**(11.71)**	**-**	**-**	**58**	**(9.18)**
194	**(4.79)**	**67**	**(1.65)**	**-**	**-**	**30**	**(0.74)**	**-**	**-**	**8**	**(0.20)**	**72**	**(1.78)**	**-**	**-**	**284**	**(7.01)**
31	(11.11)	20	(7.17)	-	-	25	(8.96)	-	-	6	(2.15)	22	(7.89)	-	-	42	(15.05)
163	(4.32)	47	(1.25)	-	-	5	(0.13)	-	-	2	(0.05)	50	(1.33)	-	-	242	(6.42)
8,001	**(56.28)**	**7,995**	**(56.24)**	**10,224**	**(71.91)**	**-**	**-**	**15**	**(0.11)**	**2,614**	**(18.39)**	**597**	**(4.20)**	**10**	**(0.07)**	**486**	**(3.42)**
13	**(21.67)**	**27**	**(45.00)**	**47**	**(78.33)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**(10.00)**	**1**	**(1.67)**	**-**	**-**	**1**	**(1.67)**
1,760	**(29.53)**	**2,618**	**(43.92)**	**219**	**(3.67)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**248**	**(4.16)**	**299**	**(5.02)**	**17**	**(0.29)**	**418**	**(7.01)**
1	(16.67)	5	(83.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(16.67)	-	-	1	(16.67)
826	(57.64)	702	(48.99)	2	(0.14)	-	-	-	-	21	(1.47)	120	(8.37)	4	(0.28)	176	(12.28)
838	(30.07)	708	(25.40)	199	(7.14)	-	-	-	-	28	(1.00)	70	(2.51)	13	(0.47)	140	(5.02)
33	(2.12)	1,161	(74.57)	17	(1.09)	-	-	-	-	194	(12.46)	101	(6.49)	-	-	72	(4.62)
62	(34.83)	42	(23.60)	1	(0.56)	-	-	-	-	5	(2.81)	7	(3.93)	-	-	29	(16.29)
1,686	**(23.96)**	**289**	**(4.11)**	**3,669**	**(52.14)**	**8**	**(0.11)**	**75**	**(1.07)**	**-**	**-**	**606**	**(8.61)**	**14**	**(0.20)**	**630**	**(8.95)**
1,663	(25.03)	195	(2.93)	3,667	(55.19)	6	(0.09)	75	(1.13)	-	-	592	(8.91)	13	(0.20)	608	(9.15)
15	(5.42)	83	(29.96)	2	(0.72)	-	-	-	-	-	-	11	(3.97)	-	-	8	(2.89)
8	(6.90)	11	(9.48)	-	-	2	(1.72)	-	-	-	-	3	(2.59)	1	(0.86)	14	(12.07)
412	**(7.60)**	**1,933**	**(35.66)**	**2**	**(0.04)**	**381**	**(7.03)**	**-**	**-**	**172**	**(3.17)**	**469**	**(8.65)**	**3**	**(0.06)**	**506**	**(9.34)**

表五之一　台灣癌症申報發生人數按原發部位及治療方法分類，民國 107 年 (續完)

METHODS OF CANCER TREATMENT IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery
C67	膀胱 BLADDER	2,239	1,999 (89.28)
C64	腎 KIDNEY	1,473	1,199 (81.40)
C65	腎盂 RENAL PELVIS	964	653 (67.74)
C66	輸尿管 URETER	674	483 (71.66)
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	45	36 (80.00)
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	5	1 (20.00)
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	20	4 (20.00)
C69	**眼及淚腺** **EYE AND LACRIMAL GLAND**	**54**	**38 (70.37)**
C70-C72	**中樞神經系統** **BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM**	**797**	**611 (76.66)**
C71	腦 BRAIN	719	549 (76.36)
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES SPINAL CORD AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	78	62 (79.49)
C73	**甲狀腺** **THYROID GLAND**	**4,445**	**4,260 (95.84)**
C74-C75	**其他內分泌腺** **OTHER ENDOCRINE GLANDS**	**171**	**134 (78.36)**
C76	**其他分界不明的部位** **OTHER AND ILL-DEFINED SITES**	**72**	**6 (8.33)**
C80	**不明原發部位** **UNKNOWN PRIMARY SITES**	**643**	**16 (2.49)**
	惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA**	**3,746**	**246 (6.57)**

註 : 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤 : ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

8. 化學治療、免疫治療包含局部治療個案。若個案同時接受全身性與局部性治療者，則計數一次。

申報治療方法[2] METHODS OF CANCER TREATMENT																			
放射治療 Radiotherapy		化學治療[8] Chemotherapy		荷爾蒙/類固醇治療 Hormone/ Steroid therapy		免疫治療[8] Immunotherapy		骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure		標靶治療 Targeted therapy		緩和照護 Palliative care		其他治療 Other treatment		未有首次治療申報紀錄 No therapy record	
228	(10.18)	1,336	(59.67)	-	-	252	(11.26)	-	-	1	(0.04)	162	(7.24)	1	(0.04)	149	(6.65)
47	(3.19)	46	(3.12)	-	-	41	(2.78)	-	-	165	(11.20)	99	(6.72)	2	(0.14)	118	(8.01)
68	(7.05)	307	(31.85)	1	(0.10)	57	(5.91)	-	-	4	(0.41)	132	(13.69)	-	-	130	(13.49)
58	(8.61)	214	(31.75)	-	-	26	(3.86)	-	-	2	(0.30)	65	(9.64)	-	-	96	(14.24)
11	(24.44)	23	(51.11)	1	(2.22)	4	(8.89)	-	-	-	-	4	(8.89)	-	-	3	(6.67)
-	-	1	(20.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(40.00)	-	-	1	(20.00)
-	-	6	(30.00)	-	-	1	(5.00)	-	-	-	-	5	(25.00)	-	-	9	(45.00)
19	**(35.19)**	**18**	**(33.33)**	**-**	**-**	**1**	**(1.85)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**(1.85)**	**-**	**-**	**6**	**(11.11)**
498	**(62.48)**	**415**	**(52.07)**	**-**	**-**	**1**	**(0.13)**	**3**	**(0.38)**	**17**	**(2.13)**	**85**	**(10.66)**	**4**	**(0.50)**	**59**	**(7.40)**
465	(64.67)	406	(56.47)	-	-	1	(0.14)	2	(0.28)	16	(2.23)	81	(11.27)	4	(0.56)	51	(7.09)
33	(42.31)	9	(11.54)	-	-	-	-	1	(1.28)	1	(1.28)	4	(5.13)	-	-	8	(10.26)
2,221	**(49.97)**	**28**	**(0.63)**	**3,367**	**(75.75)**	**2**	**(0.04)**	**-**	**-**	**14**	**(0.31)**	**36**	**(0.81)**	**1**	**(0.02)**	**116**	**(2.61)**
42	**(24.56)**	**52**	**(30.41)**	**-**	**-**	**2**	**(1.17)**	**4**	**(2.34)**	**1**	**(0.58)**	**16**	**(9.36)**	**-**	**-**	**10**	**(5.85)**
39	**(54.17)**	**49**	**(68.06)**	**-**	**-**	**1**	**(1.39)**	**-**	**-**	**4**	**(5.56)**	**14**	**(19.44)**	**-**	**-**	**8**	**(11.11)**
101	**(15.71)**	**151**	**(23.48)**	**4**	**(0.62)**	**4**	**(0.62)**	**-**	**-**	**20**	**(3.11)**	**228**	**(35.46)**	**-**	**-**	**281**	**(43.70)**
559	**(14.92)**	**2,552**	**(68.13)**	**2,386**	**(63.69)**	**490**	**(13.08)**	**195**	**(5.21)**	**2,116**	**(56.49)**	**414**	**(11.05)**	**67**	**(1.79)**	**478**	**(12.76)**

表五之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 107 年

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery	
白血病與骨髓增生性腫瘤 **LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASM, TOTAL**	**2,550**	**1**	**(0.04)**
急性骨髓性白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA	859	-	-
急性淋巴性白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA	300	1	(0.33)
慢性骨髓性白血病 [9] CHRONIC MYELOID LEUKEMIA	253	-	-
慢性淋巴性白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA	206	-	-
分化不明之急性白血病 ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE	21	-	-
骨髓增生性腫瘤 MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	551	-	-
骨髓分化不良症候群 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES	358	-	-
急性雙表現型白血病 ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA	0	-	-
其他白血病 OTHER LEUKEMIA	1	-	-
白血病，無法歸類 LEUKEMIA, NOS	1	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

9. 慢性骨髓性白血病僅包含 BCR-ABL1 陽性。

申報治療方法[2] METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療 Radiotherapy		化學治療 Chemotherapy		類固醇治療 Steroid therapy		免疫治療 Immunotherapy		骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure		標靶治療 Targeted therapy		緩和照護 Palliative care		其他治療 Other treatment		未有首次治療申報紀錄 No therapy record	
33	**(1.29)**	**1,688**	**(66.20)**	**284**	**(11.14)**	**7**	**(0.27)**	**188**	**(7.37)**	**425**	**(16.67)**	**331**	**(12.98)**	**266**	**(10.43)**	**436**	**(17.10)**
12	(1.40)	675	(78.58)	6	(0.70)	4	(0.47)	114	(13.27)	47	(5.47)	140	(16.30)	60	(6.98)	118	(13.74)
15	(5.00)	273	(91.00)	221	(73.67)	1	(0.33)	46	(15.33)	54	(18.00)	26	(8.67)	-	-	16	(5.33)
-	-	129	(50.99)	1	(0.40)	-	-	4	(1.58)	243	(96.05)	12	(4.74)	1	(0.40)	8	(3.16)
3	(1.46)	93	(45.15)	46	(22.33)	-	-	-	-	45	(21.84)	23	(11.17)	1	(0.49)	93	(45.15)
-	-	12	(57.14)	4	(19.05)	-	-	2	(9.52)	3	(14.29)	2	(9.52)	-	-	8	(38.10)
1	(0.18)	335	(60.80)	2	(0.36)	1	(0.18)	4	(0.73)	28	(5.08)	35	(6.35)	197	(35.75)	87	(15.79)
2	(0.56)	170	(47.49)	4	(1.12)	1	(0.28)	18	(5.03)	5	(1.40)	93	(25.98)	7	(1.96)	105	(29.33)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(100.00)

表五之二　台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按治療方法分類，民國 107 年 (續完)

METHODS OF CANCER TREATMENT OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2018 (CONTINUED)

白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	個案數 CASE NUMBER	手術治療 Surgery	
惡性淋巴瘤 **MALIGNANT LYMPHOMA**	**3,746**	**246**	**(6.57)**
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA	237	5	(2.11)
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA	2,725	219	(8.04)
B 細胞淋巴瘤 B-cell lymphoid neoplasms	2,340	208	(8.89)
T/NK 細胞淋巴瘤 T/NK-cell lymphoid neoplasms	385	11	(2.86)
漿細胞瘤 Plasma cell neoplasm	664	5	(0.75)
組織細胞與樹突狀細胞瘤 Histiocytic and dendritic cell neoplasms	24	10	(41.67)
惡性淋巴瘤，無法歸類 Malignant lymphoma, NOS and others	96	7	(7.29)

註 : 1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤 : ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 每名個案所接受之治療方式均分別計數，（ ）內為該治療方式佔該個案數之百分比。

申報治療方法[2] METHODS OF CANCER TREATMENT																	
放射治療 Radiotherapy		化學治療 Chemotherapy		類固醇治療 Steroid therapy		免疫治療 Immunotherapy		骨髓/幹細胞移植或內分泌治療 Hematologic transplant/ Endocrine procedure		標靶治療 Targeted therapy		緩和照護 Palliative care		其他治療 Other treatment		未有首次治療申報紀錄 No therapy record	
559	**(14.92)**	**2,552**	**(68.13)**	**2,386**	**(63.69)**	**490**	**(13.08)**	**195**	**(5.21)**	**2,116**	**(56.49)**	**414**	**(11.05)**	**67**	**(1.79)**	**478**	**(12.76)**
69	(29.11)	222	(93.67)	73	(30.80)	2	(0.84)	5	(2.11)	7	(2.95)	3	(1.27)	1	(0.42)	10	(4.22)
386	(14.17)	1,967	(72.18)	1,752	(64.29)	12	(0.44)	71	(2.61)	1,579	(57.94)	265	(9.72)	66	(2.42)	385	(14.13)
325	(13.89)	1,699	(72.61)	1,528	(65.30)	8	(0.34)	44	(1.88)	1,564	(66.84)	224	(9.57)	39	(1.67)	325	(13.89)
61	(15.84)	268	(69.61)	224	(58.18)	4	(1.04)	27	(7.01)	15	(3.90)	41	(10.65)	27	(7.01)	60	(15.58)
94	(14.16)	305	(45.93)	520	(78.31)	474	(71.39)	119	(17.92)	504	(75.90)	129	(19.43)	-	-	45	(6.78)
3	(12.50)	13	(54.17)	9	(37.50)	1	(4.17)	-	-	1	(4.17)	-	-	-	-	2	(8.33)
7	(7.29)	45	(46.88)	32	(33.33)	1	(1.04)	-	-	25	(26.04)	17	(17.71)	-	-	36	(37.50)

表六　台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 107 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2018

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-999)[4] 白血病	(M-980-999)[4] 白血病	(M-980-999)[4] 白血病	(C73) 甲狀腺	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	73	55	48	38	101	210
發生率	7.01	5.68	3.90	3.37	6.18	13.86
百分比	44.24%	43.31%	25.13%	22.35%	16.83%	31.11%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C56, C57.0-C57.4)，(M-980-999)[4] 卵巢、輸卵管及寬韌帶，白血病並列	(C73) 甲狀腺	(C50) 女性乳房
發生數	27	23	19	23	70	96
發生率	2.59	2.38	1.54	2.04	4.28	6.34
百分比	16.36%	18.11%	9.95%	13.53%	11.67%	14.22%
3	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C74-C75) 其他內分泌腺	(M-965-966)[4] 何杰金氏淋巴瘤	(C56, C57.0-C57.4)，(M-980-999)[4] 卵巢、輸卵管及寬韌帶，白血病並列	(M-980-999)[4] 白血病	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶
發生數	11	8	18	23	67	55
發生率	1.06	0.83	1.46	2.04	4.10	3.63
百分比	6.67%	6.30%	9.42%	13.53%	11.17%	8.15%
4	(C69) 眼及淚腺	(C69) 眼及淚腺	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(M-965-966)[4] 何杰金氏淋巴瘤
發生數	9	7	15	16	47	38
發生率	0.86	0.72	1.22	1.42	2.87	2.51
百分比	5.45%	5.51%	7.85%	9.41%	7.83%	5.63%
5	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(C22)，(C64.9) 肝及肝內膽管，腎並列	(C62)，(C74-C75)，(M-959-976)[4] 睪丸，其他內分泌腺，非何杰金氏淋巴瘤並列	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	(M-980-999)[4] 白血病
發生數	8	6	12	12	46	32
發生率	0.77	0.62	0.97	1.07	2.81	2.11
百分比	4.85%	4.72%	6.28%	7.06%	7.67%	4.74%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類–腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14)[5]	(C50)	(C00-C14)[5]	(C50)	(C00-C14)[5]	(C50)	(C18-C21)	(C50)	(C61)	(C18-C21)
口腔、口咽及下咽	女性乳房	口腔、口咽及下咽	女性乳房	口腔、口咽及下咽	女性乳房	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	女性乳房	攝護腺	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
274	1,065	1,480	3,459	2,645	4,103	2,970	3,509	4,034	3,036
14.94	58.11	81.11	183.54	147.71	221.56	211.29	230.45	424.74	258.34
15.27%	33.87%	26.18%	44.41%	20.66%	33.38%	16.23%	25.59%	18.16%	18.53%
(C18-C21)	(C73)	(C18-C21)	(C73)	(C22)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C18-C21)	(C33-C34)
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	甲狀腺	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	甲狀腺	肝及肝內膽管	肺、支氣管及氣管	肺、支氣管及氣管	肺、支氣管及氣管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管
228	576	795	772	1,875	1,515	2,604	2,198	3,646	2,462
12.43	31.43	43.57	40.96	104.71	81.81	185.25	144.35	383.88	209.50
12.71%	18.32%	14.06%	9.91%	14.64%	12.33%	14.23%	16.03%	16.41%	15.03%
(C73)	(C54)	(C22)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C22)	(C18-C21)	(C33-C34)	(C50)
甲狀腺	子宮體	肝及肝內膽管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管	女性乳房
191	196	627	681	1,826	1,317	2,594	1,762	3,624	1,984
10.41	10.69	34.36	36.14	101.98	71.12	184.54	115.72	381.57	168.83
10.65%	6.23%	11.09%	8.74%	14.26%	10.72%	14.18%	12.85%	16.31%	12.11%
(C11)	(C18-C21)	(C33-C34)	(C54)	(C33-C34)	(C54)	(C61)	(C22)	(C22)	(C22)
鼻咽	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管	子宮體	肺、支氣管及氣管	子宮體	攝護腺	肝及肝內膽管	肝及肝內膽管	肝及肝內膽管
147	188	496	581	1,568	1,033	2,160	1,019	2,576	1,976
8.01	10.26	27.18	30.83	87.57	55.78	153.66	66.92	271.23	168.14
8.19%	5.98%	8.77%	7.46%	12.25%	8.41%	11.81%	7.43%	11.59%	12.06%
(C22)	(C53)	(C15)	(C33-C34)	(C15)	(C73)	(C00-C14)[5]	(C54)	(C44)	(C44)
肝及肝內膽管	子宮頸	食道	肺、支氣管及氣管	食道	甲狀腺	口腔、口咽及下咽	子宮體	皮膚	皮膚
119	180	380	563	960	913	2,059	663	1,267	1,207
6.49	9.82	20.82	29.87	53.61	49.30	146.48	43.54	133.40	102.71
6.63%	5.73%	6.72%	7.23%	7.50%	7.43%	11.25%	4.83%	5.70%	7.37%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六　台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 107 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2018（CONTINUED）

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C47,C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(C22)，(C64.9) 肝及肝內膽管，腎並列	(C62)，(C74-C75)，(M-959-976)[4] 睪丸，其他內分泌腺，非何杰金氏淋巴瘤並列	(C47,C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(M-965-966)[4] 何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤
發生數	7	6	12	11	40	31
發生率	0.67	0.62	0.97	0.98	2.45	2.05
百分比	4.24%	4.72%	6.28%	6.47%	6.67%	4.59%
7	(C48) 後腹膜腔及腹膜	(C48)，(C47,C49) 後腹膜腔及腹膜，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C62)，(C74-C75)，(M-959-976)[4] 睪丸，其他內分泌腺，非何杰金氏淋巴瘤並列	(M-965-966)[4] 何杰金氏淋巴瘤	(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸
發生數	6	5	12	10	27	27
發生率	0.58	0.52	0.97	0.89	1.65	1.78
百分比	3.64%	3.94%	6.28%	5.88%	4.50%	4.00%
8	(C62) 睪丸	(C48)，(C47,C49) 後腹膜腔及腹膜，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C47,C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	(C47,C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(C54) 子宮體
發生數	5	5	10	9	26	24
發生率	0.48	0.52	0.81	0.80	1.59	1.58
百分比	3.03%	3.94%	5.24%	5.29%	4.33%	3.56%
9	(C40-C41)，(C64.9)，(M-965-966)[4] 骨、關節及關節軟骨，腎，何杰金氏淋巴瘤並列	(C40-C41)，(C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節軟骨，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C37-C38, C38.4 除外)，(C73) 胸腺、心臟及縱膈，甲狀腺並列	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統
發生數	4	3	9	5	23	21
發生率	0.38	0.31	0.73	0.44	1.41	1.39
百分比	2.42%	2.36%	4.71%	2.94%	3.83%	3.11%
10	(C40-C41)，(C64.9)，(M-965-966)[4] 骨、關節及關節軟骨，腎，何杰金氏淋巴瘤並列	(C40-C41)，(C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節軟骨，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C37-C38, C38.4 除外)，(C73) 胸腺、心臟及縱膈，甲狀腺並列	(C25)，(C64.9) 胰，腎並列	(C37-C38, C38.4 除外) 胸腺、心臟及縱膈	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
發生數	4	3	9	3	22	20
發生率	0.38	0.31	0.73	0.27	1.35	1.32
百分比	2.42%	2.36%	4.71%	1.76%	3.67%	2.96%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類–腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C33-34)、(C56, C57.0-C57.4) 肺、支氣管及氣管，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C11) 鼻咽	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C61) 攝護腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C15) 食道	(C73) 甲狀腺	(C16) 胃	(C16) 胃
116 6.32 6.47%	171 9.33 5.44%	289 15.84 5.11%	283 15.02 3.63%	419 23.40 3.27%	488 26.35 3.97%	774 55.06 4.23%	567 37.24 4.13%	1,076 113.29 4.84%	716 60.93 4.37%
(C62) 睪丸	(C33-34)、(C56, C57.0-C57.4) 肺、支氣管及氣管，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C73) 甲狀腺	(C53) 子宮頸	(C16) 胃	(C22) 肝及肝內膽管	(C16) 胃	(C16) 胃	(C00-C14)[5] 口腔、口咽及下咽	(C25) 胰
103 5.62 5.74%	171 9.33 5.44%	280 15.34 4.95%	254 13.48 3.26%	392 21.89 3.06%	380 20.52 3.09%	707 50.30 3.86%	397 26.07 2.89%	930 97.92 4.19%	614 52.25 3.75%
(M-980-999)[4] 白血病	(M-980-999)[4] 白血病	(M-980-999)[4] 白血病	(M-980-999)[4] 白血病	(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸	(C25) 胰	(C44) 皮膚	(C67) 膀胱	(C65-C66, C68) 腎盂及其他泌尿器官
88 4.80 4.91%	84 4.58 2.67%	149 8.17 2.64%	127 6.74 1.63%	326 18.21 2.55%	307 16.58 2.50%	500 35.57 2.73%	374 24.56 2.73%	832 87.60 3.74%	590 50.21 3.60%
(C64.9) 腎	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(C64.9) 腎	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(C25) 胰	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(C67) 膀胱	(C25) 胰	(C25) 胰	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤
77 4.20 4.29%	59 3.22 1.88%	148 8.11 2.62%	111 5.89 1.43%	296 16.53 2.31%	242 13.07 1.97%	475 33.79 2.60%	360 23.64 2.63%	565 59.49 2.54%	436 37.10 2.66%
(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(C11) 鼻咽	(C16) 胃	(C22) 肝及肝內膽管	(C73) 甲狀腺	(C16) 胃	(C44) 皮膚	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(M-959-976)[4] 非何杰金氏淋巴瘤	(C67) 膀胱
76 4.14 4.24%	54 2.95 1.72%	120 6.58 2.12%	108 5.73 1.39%	293 16.36 2.29%	208 11.23 1.69%	465 33.08 2.54%	336 22.07 2.45%	531 55.91 2.39%	397 33.78 2.42%

4. 白血病、非何杰金氏淋巴瘤、何杰金氏淋巴瘤：詳細 ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

5. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018

口腔、口咽及下咽

ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX　C00 - C06，C09 - C10，C12 - C14

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80333	80513	鱗狀細胞癌	男 Male	7,240	0	0	0	0
80523	80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	715	0	0	0	0
80713	80723							
80743	80753							
80763	80823							
80833	80853							
80863	80903							
85603								
81403	82003	唾液腺癌	男 Male	43	0	0	0	0
83103	84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	33	0	0	0	1
85003	85023							
85253	85503							
89413	89823							
80413	80453	神經內分泌癌	男 Male	6	0	0	0	0
82493		NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	1	0	0	0	0
80203	80213	其他特定上皮癌	男 Male	13	0	0	0	0
80233	80323	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	1	0	0
80413	82403							
82493	85003							
80103		非特定上皮癌	男 Male	36	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	3	0	0	0	0
87203	87723	黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	4	0	0	0	0
		MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	5	0	0	0	0
88003	88013	軟組織肉瘤	男 Male	18	1	0	0	0
88113	88253	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	3	0	0	0	0
88583	88903							
89013	91403							
91803	93643							
95403	95813							
80003	89803	其他惡性腫瘤	男 Male	40	0	0	0	0
93103		OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	0	0	0	0
		總計	男 Male	7,400	1	0	0	0
		TOTAL	女 Female	770	0	1	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
2	7	54	216	523	937	1,206	1,394	1,156	857	379	275	145	89
1	6	8	12	31	50	78	113	109	109	56	59	48	35
2	0	1	2	4	1	6	8	9	3	0	3	1	3
1	1	0	6	0	3	2	3	5	5	2	1	3	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	2	1	1	2	1	1	2	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	2	1	5	7	2	5	3	3	1	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	1	3	3	2	3	1	1	0	2	1
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	4	6	12	6	3	3	3	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
4	7	55	219	534	946	1,226	1,419	1,185	874	387	288	153	102
2	7	9	18	34	53	83	118	114	117	58	61	52	42

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外）

LIP（Excludes Skin of Lip C44.0）　C00

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80333 80513 80523 80703 80713 80723 80743 80753 80763 80903	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	256	0	0	0	0
		女 Female	29	0	0	0	0
81403 82003	唾液腺癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	1
	總計 TOTAL	男 Male	256	0	0	0	0
		女 Female	31	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	1	3	8	18	29	40	52	40	24	22	11	4	4
0	0	0	0	1	0	1	1	3	5	6	6	4	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	3	8	18	29	40	52	40	24	22	11	4	4
0	1	0	0	1	0	1	1	3	5	6	6	4	2

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

舌

TONGUE　C01 - C02

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80333	80513	鱗狀細胞癌	男 Male	1,872	0	0	0	0
80523	80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	328	0	0	0	0
80713	80723							
80743	80753							
80763	80853							
80863	85603							
81403	82003	唾液腺癌	男 Male	8	0	0	0	0
83103	84303	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	7	0	0	0	0
85503								
80203	80323	其他特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80103		非特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
87723		黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	1	0	0	0	0
		MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88003	91403	軟組織肉瘤	男 Male	4	1	0	0	0
95813		SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003		其他惡性腫瘤	男 Male	7	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
		總計	男 Male	1,897	1	0	0	0
		TOTAL	女 Female	338	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
2	3	21	83	156	252	331	344	295	195	94	49	29	18
1	4	7	8	18	26	35	54	56	45	25	22	16	11
0	0	0	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	85	156	253	337	348	299	197	96	51	29	19
1	4	7	9	18	26	37	56	59	45	25	22	16	13

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

齒齦

GUM　C03

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80333	80513	鱗狀細胞癌	男 Male	699	0	0	0	0
80523	80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	92	0	0	0	0
80713	80723							
80743								
81403	82003	唾液腺癌	男 Male	5	0	0	0	0
84303		MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	2	0	0	0	0
80323		其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103		非特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	0	0	0	0	0
87203		黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	3	0	0	0	0
		MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	4	0	0	0	0
88003	88113	軟組織肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
89013	91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
91803	95403							
80003	93103	其他惡性腫瘤	男 Male	3	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
		總計	男 Male	721	0	0	0	0
		TOTAL	女 Female	100	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	4	14	39	61	95	132	121	111	42	39	24	17
0	1	0	0	1	2	9	11	6	19	10	15	11	7
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	14	39	62	98	134	124	114	44	42	25	21
0	1	0	1	3	2	11	11	7	19	10	15	12	8

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

口底

FLOOR OF MOUTH　C04

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80333	80513	鱗狀細胞癌	男 Male	223	0	0	0	0
80523	80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	19	0	0	0	0
80713	80723							
80743								
82003		唾液腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
		MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	1	0	0	0	0
80103		非特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
88003	88013	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
88903		SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
		總計	男 Male	229	0	0	0	0
		TOTAL	女 Female	21	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	1	3	9	37	48	45	38	21	8	5	5	3
0	1	0	0	0	2	5	4	4	0	1	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	3	10	38	48	46	40	21	8	5	5	4
0	1	0	0	0	2	5	4	4	0	1	0	1	3

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位

OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH　C05 - C06

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80513	80523	鱗狀細胞癌	男 Male	2,262	0	0	0	0
80703	80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	117	0	0	0	0
80723	80743							
80753	80763							
80823	80853							
80863								
82003	83103	唾液腺癌	男 Male	23	0	0	0	0
84303	85003	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	20	0	0	0	0
85023	85253							
85503	89413							
89823								
80323	80413	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
82403		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	2	0	1	0	0
80103		非特定上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
87203		黏膜惡性黑色素瘤	男 Male	0	0	0	0	0
		MUCOSAL MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88003	88253	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
88583	91803	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003		其他惡性腫瘤	男 Male	5	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
		總計	男 Male	2,305	0	0	0	0
		TOTAL	女 Female	143	0	1	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	2	23	79	190	322	353	433	326	262	104	96	42	30
0	0	1	2	5	6	14	12	16	21	8	11	13	8
2	0	1	1	4	1	0	3	6	2	0	1	1	1
1	0	0	4	0	3	0	2	1	5	1	1	2	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	2	24	80	194	326	355	441	334	265	105	99	43	35
1	0	1	6	5	9	14	14	17	29	9	13	15	9

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

口咽

OROPHARYNX　C09 - C10

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80333 80513 80523 80703 80713 80723 80743 80753 80763 80853 80863 85603	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	795	0	0	0	0
		女 Female	91	0	0	0	0
83103 84303	唾液腺癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80203 80213 80233 80413 82493 85003	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
89013 91403 93643	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003 89803	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	8	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	819	0	0	0	0
		女 Female	94	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	1	2	9	61	99	143	161	134	96	35	30	21	3
0	0	0	1	5	12	10	19	18	15	4	0	4	3
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	2	9	64	100	148	163	139	98	36	32	24	3
0	0	1	1	5	12	10	19	18	15	5	0	4	4

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

下咽

HYPOPHARYNX　C12 - C13

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80523 80703 80713 80723 80743 80753 80763 80823 80833 80863	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	1,120	0	0	0	0
		女 Female	38	0	0	0	0
82003	唾液腺癌 MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80413 80453 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	6	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	13	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	17	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1,159	0	0	0	0
		女 Female	42	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	19	50	135	194	227	198	148	72	44	19	14
0	0	0	1	1	2	4	12	5	4	2	5	0	2
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	1	3	3	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	1	1	2	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	19	53	136	198	235	205	155	74	47	22	15
0	0	0	1	2	2	5	13	5	4	2	5	0	3

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位

PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX C14

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80703	鱗狀細胞癌	男 Male	13	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
81403	唾液腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	14	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	1	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	1	0	2	2	0	4	0	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	2	2	0	4	0	2	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

主唾液腺

MAJOR SALIVARY GLANDS　C07 - C08

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
84303	黏液表皮樣癌	男 Male	32	0	0	1	0
	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	女 Female	40	1	0	0	0
80333 80703	鱗狀細胞癌	男 Male	15	0	0	0	0
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
81403	腺癌，非特定	男 Male	10	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
82003	腺樣囊狀癌	男 Male	28	0	0	0	1
	ADENOID CYSTIC CARCINOMA	女 Female	31	0	0	0	0
85503	腺泡細胞癌	男 Male	16	0	0	0	1
	ACINAR CELL CARCINOMA	女 Female	22	0	0	0	0
89403 89413	惡性混合性腫瘤	男 Male	15	0	0	0	0
	MALIGNANT MIXED TUMOR	女 Female	12	0	0	0	0
80823	淋巴上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
	LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	女 Female	14	0	0	0	0
80413 81473	其他特定上皮癌	男 Male	57	0	0	0	0
82463 83103	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	22	0	0	0	0
85003 85023							
85603 85623							
89803 89823							
80103 80203	非特定上皮癌	男 Male	8	0	0	0	0
80213	CARCINOMA, NOS	女 Female	2	0	0	0	0
88023 88033	軟組織肉瘤	男 Male	3	0	0	0	0
88543 91403	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	1	0
95403							
80003 87203	其他惡性腫瘤	男 Male	4	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	195	0	0	1	2
	TOTAL	女 Female	152	1	0	1	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	4	2	2	1	2	2	3	6	4	1	0	2	1
0	2	3	4	4	1	6	9	6	2	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	3	1	3	1	2	0	1	2
0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	1	1	2
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	4	4	3	5	1	5	3	1	0	0
0	1	2	4	2	6	2	6	3	1	1	2	1	0
2	0	3	1	3	0	1	1	2	1	0	1	0	0
2	0	1	0	4	4	3	3	3	1	0	1	0	0
0	0	0	1	2	2	1	1	5	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	2	3	2	0	2	0	0	1
0	1	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	2	4	2	0	2	0	1	0
1	4	1	4	3	1	5	9	10	7	1	7	2	2
0	1	1	2	0	1	1	5	2	2	2	4	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9	8	10	16	12	18	22	32	24	9	10	7	10
2	4	7	14	11	13	18	32	21	7	7	8	2	4

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

鼻咽

NASOPHARYNX　C11

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80413	80703	非角化鱗狀細胞癌	男 Male	1,077	0	0	1	5
80723	80733	NONKERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	343	0	0	0	0
80823	80833							
88053								
80713		角化鱗狀細胞癌	男 Male	14	0	0	0	0
		KERATINIZING SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	9	0	0	0	0
81403	82003	唾液腺癌	男 Male	6	0	0	0	0
84303	89823	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	3	0	0	0	0
80523	82463	其他特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
82603	87203	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103		非特定上皮癌	男 Male	18	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	7	0	0	0	0
80003	88013	其他惡性腫瘤	男 Male	4	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
		總計	男 Male	1,122	0	0	1	5
		TOTAL	女 Female	368	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
9	17	38	107	132	150	175	138	131	78	44	32	16	4
2	9	18	32	51	40	56	48	33	20	13	8	10	3
0	0	0	1	0	1	1	5	5	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	0	1	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	2	3	3	4	1	1	1	1	1
0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	17	38	109	135	154	179	147	143	80	47	34	17	6
3	9	20	34	54	42	56	51	39	21	14	11	10	4

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

食道

ESOPHAGUS　C15

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80523 80703 80713 80723 80743 80833	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	2,392	0	0	0	0
		女 Female	168	0	0	0	0
81403 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	92	0	0	0	0
		女 Female	13	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	男 Male	16	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80133 80413 82403 82463	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	19	0	0	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0
80203 80323 80333 82003 84303	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	12	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	21	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
87203 88003 88023 88503 88903 95803	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	16	0	0	0	0
		女 Female	7	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	2,579	0	0	0	0
		女 Female	199	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	0	2	22	121	242	407	511	422	288	157	115	47	57
0	0	0	1	7	9	15	33	39	21	20	9	4	10
0	2	1	2	1	4	4	9	13	17	6	8	11	14
1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4	4
0	0	0	0	1	1	1	4	2	6	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	2	1	3	4	2	3	2	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3	7	1	6	1	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	2	0	3	3	1	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3
1	2	3	24	126	254	427	533	452	322	170	129	62	74
1	0	0	1	9	9	15	36	42	24	24	10	8	20

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

胃

STOMACH　C16

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403	81443	腺癌	男 Male	2,077	0	0	0	1
81453	81483	ADENOCARCINOMA	女 Female	1,257	0	0	0	1
82103	82113							
82553	82603							
82633	84803							
84813	84903							
85503	85763							
85603		腺性鱗狀癌	男 Male	9	0	0	0	0
		ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80703	80713	鱗狀細胞癌	男 Male	27	0	0	0	0
		SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80133	80413	神經內分泌癌	男 Male	59	0	0	0	0
81533	82403	NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	女 Female	45	0	0	0	0
82443	82463							
82493								
80203	80223	其他特定上皮癌	男 Male	14	0	0	0	0
80333	80823	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
85123	85743							
80103	80463	非特定上皮癌	男 Male	25	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	24	0	0	0	0
89363		胃腸基質瘤	男 Male	100	0	0	0	0
		GIST	女 Female	108	0	0	0	0
88003	88013	其他惡性肉瘤	男 Male	7	0	0	0	0
88023	88903	OTHER SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80003	90503	其他惡性腫瘤	男 Male	16	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	15	0	0	0	0
		總計	男 Male	2,334	0	0	0	1
		TOTAL	女 Female	1,464	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	4	7	22	33	66	127	216	327	291	241	235	222	284
1	1	6	26	33	54	67	113	159	173	123	162	168	170
0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
0	0	0	0	0	4	2	5	3	5	1	1	2	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	3	2	7	15	10	8	4	2	6
0	0	1	0	6	1	4	3	7	6	8	2	5	2
0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	1	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
0	0	1	0	0	2	3	1	4	1	4	2	1	6
0	0	0	1	0	1	0	2	4	2	1	6	3	4
0	0	0	1	1	9	9	12	25	10	10	9	6	8
1	0	0	1	4	4	9	8	18	24	7	15	10	7
0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	9
1	4	9	24	35	85	145	247	384	323	269	254	238	315
2	1	7	28	44	60	80	128	192	205	140	191	189	196

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

小腸

SMALL INTESTINE　C17

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403 82603 82633 84803 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	68	0	0	0	0
		女 Female	60	0	0	0	0
80413 81533 82403 82443 82463 82493 86833	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male	23	0	0	0	0
		女 Female	22	0	0	0	0
80203 80333 86803	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	1
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male	135	0	0	0	1
		女 Female	85	0	0	0	0
88003 88583 88903 90403 91403	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
80003 80043 89803 93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	246	0	0	0	1
		女 Female	175	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	2	2	4	6	5	17	8	3	8	13
0	1	0	2	2	6	3	7	6	5	6	4	10	8
0	0	0	2	1	1	3	1	3	2	5	3	0	2
0	0	0	0	1	2	5	4	1	2	2	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
0	1	3	6	11	9	11	20	19	20	10	10	7	7
0	0	1	3	6	5	7	10	15	11	6	12	5	4
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	2	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	3	9	14	13	19	30	31	40	27	17	17	24
0	1	1	5	10	14	16	21	23	18	17	18	16	14

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門

COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS　C18 - C21

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403 81483 82013 82103 82113 82133 82203 82213 82553 82613 82633 82653 84803 84813 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	8,927 6,456	0 0	0 0	0 0	0 4
80133 80413 82403 82433 82443 82463 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male 女 Female	324 245	0 0	0 0	0 1	1 4
80203 80463 80703 80713 80723 85103 85603 85743 87203	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	37 70	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	72 80	0 0	0 0	0 0	0 0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male 女 Female	21 13	0 0	0 0	0 0	0 0
88003 88033 88153 88583 88903 91203	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	4 3	0 0	0 0	0 0	0 0
80003 80013	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	127 146	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	9,512 7,013	0 0	0 0	0 1	1 8

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
12	18	53	118	245	454	699	1,028	1,389	1,448	924	985	779	775
4	7	42	107	240	367	554	655	801	876	606	725	745	723
7	8	19	31	36	38	44	28	44	30	15	11	6	6
5	4	14	24	25	31	29	33	25	15	15	8	3	9
0	0	1	2	2	4	3	5	5	3	3	4	2	3
0	0	0	1	2	5	5	13	8	7	7	8	8	6
1	0	2	2	5	1	5	0	12	9	5	6	11	13
0	0	0	0	4	0	8	6	4	7	6	7	17	21
0	0	0	0	2	2	0	1	3	2	5	3	2	1
0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	1	1	2
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	2	3	5	7	10	15	6	16	25	38
0	0	0	0	4	2	6	5	7	7	4	12	26	73
20	26	75	153	292	503	757	1,069	1,463	1,507	958	1,025	827	836
9	11	56	132	275	406	603	714	847	915	641	761	800	834

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

結腸

COLON C18

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403 81483 82013 82103 82113 82133 82203 82553 82613 82633 82653 84803 84813 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	5,558	0	0	0	0
		女 Female	4,502	0	0	0	4
80133 82403 82433 82443 82463 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male	47	0	0	0	1
		女 Female	57	0	0	1	4
80203 80463 80703 85103 85603	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	14	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	57	0	0	0	0
		女 Female	61	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
88003 88033 88153 88583 88903 91203	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
80003 80013	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	107	0	0	0	0
		女 Female	123	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	5,788	0	0	0	1
		女 Female	4,761	0	0	1	8

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
9	14	29	75	141	266	392	614	840	886	601	641	509	541
3	4	24	80	164	239	370	426	556	635	430	511	533	523
2	0	3	1	3	5	5	6	7	3	5	3	1	2
1	2	3	4	3	7	4	5	4	3	6	2	3	5
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	3
0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	3	5	1
1	0	2	2	5	1	3	0	9	7	4	5	9	9
0	0	0	0	4	0	6	3	3	3	5	7	14	16
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	1	3	3	5	7	11	5	13	23	36
0	0	0	0	2	1	5	4	4	5	4	11	24	63
12	14	34	78	150	276	405	626	865	908	618	664	545	592
4	6	27	84	174	248	385	438	568	650	446	534	579	609

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門

RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS　C19 - C21

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403 81483 82103 82203 82213 82553 82613 82633 82653 84803 84813 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	3,369	0	0	0	0
		女 Female	1,954	0	0	0	0
80133 80413 82403 82443 82463 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male	277	0	0	0	0
		女 Female	188	0	0	0	0
80703 80713 80723 85603 85743 87203	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	26	0	0	0	0
		女 Female	56	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	15	0	0	0	0
		女 Female	19	0	0	0	0
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male	17	0	0	0	0
		女 Female	12	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	20	0	0	0	0
		女 Female	23	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	3,724	0	0	0	0
		女 Female	2,252	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
3	4	24	43	104	188	307	414	549	562	323	344	270	234
1	3	18	27	76	128	184	229	245	241	176	214	212	200
5	8	16	30	33	33	39	22	37	27	10	8	5	4
4	2	11	20	22	24	25	28	21	12	9	6	0	4
0	0	1	2	2	4	2	4	4	2	1	3	1	0
0	0	0	1	1	5	5	13	7	5	6	5	3	5
0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	1	1	2	4
0	0	0	0	0	0	2	3	1	4	1	0	3	5
0	0	0	0	2	2	0	1	2	2	4	2	2	0
0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	1	1	1
0	0	0	0	1	0	2	2	3	4	1	3	2	2
0	0	0	0	2	1	1	1	3	2	0	1	2	10
8	12	41	75	142	227	352	443	598	599	340	361	282	244
5	5	29	48	101	158	218	276	279	265	195	227	221	225

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

肝及肝內膽管

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS　C22

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81703 81713 81723 81733 81743 81753	肝細胞癌 HEPATOCELLULAR CARCINOMA	男 Male 女 Female	6,938 2,924	0 0	0 0	1 0	2 2
81403 81603 81613 81623 84803 85603 85703 85763	膽管癌 CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	661 477	0 0	0 0	0 0	0 0
81803	合併肝細胞癌和膽管癌 COMBINED HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA	男 Male 女 Female	132 48	0 0	0 0	0 0	0 0
89703	肝母細胞瘤 HEPATOBLASTOMA	男 Male 女 Female	3 6	3 6	0 0	0 0	0 0
80203 80213 80323 80333 80413 80703 80823 82403 82463 82493 85033	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	19 15	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 89803	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	10 7	0 0	0 0	0 0	0 0
91203	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male 女 Female	28 18	0 0	0 0	0 0	0 0
88003 88023 88053 88583 88903 89213 89363 89913 91333 93643	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male 女 Female	8 14	0 0	0 0	0 0	1 0
80003 80043	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	20 14	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	7,819 3,523	3 6	0 0	1 0	3 2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	13	22	89	185	381	697	958	1,163	1,137	741	692	483	373
2	1	3	14	30	62	100	208	354	483	427	485	414	339
0	5	5	1	17	24	72	96	95	118	81	54	52	41
1	3	0	5	6	6	21	37	69	80	61	79	64	45
0	2	0	0	3	13	16	18	28	24	12	10	4	2
0	0	0	2	2	1	3	4	6	9	5	7	8	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	2	4	4	2	3	1	2	0
0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	0	3	2	0
0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	2
0	0	0	0	0	0	3	5	4	8	1	5	2	0
0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5	4	3	2
0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	2	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	1	4	1	1
0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	1	2	4	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	4
1	20	29	90	206	421	790	1,085	1,301	1,293	842	767	547	420
3	4	3	22	38	70	127	253	437	582	500	586	496	394

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管

GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS　C23 - C24

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403 81443 81483 81603 81623 81633 82103 82113 82553 82603 82633 83103 84803 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	486	0	0	0	0
		女 Female	453	0	0	0	0
85603	腺性鱗狀癌 ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	男 Male	14	0	0	0	0
		女 Female	9	0	0	0	0
80133 80413 82403 82443 82463 82493	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	13	0	0	0	0
80203 80333 80703 85003 85033 85743	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	16	0	0	0	0
		女 Female	17	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	26	0	0	0	0
		女 Female	20	0	0	0	0
88053	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	26	0	0	0	0
		女 Female	37	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	580	0	0	0	0
		女 Female	549	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	1	2	5	12	33	44	53	94	61	78	52	51
0	0	1	3	11	8	28	35	62	71	60	71	51	52
0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	1	1	3	0
0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	1	2	0
0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	0	2	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	2	6	0	3	2	0
0	0	0	0	1	2	0	2	4	3	3	2	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	4	7	2	7
0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	4	8
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	4	4	10
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	4	21
0	0	1	2	6	14	38	51	62	109	70	94	65	68
0	0	1	4	13	12	28	39	71	86	69	83	60	83

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

胰

PANCREAS　C25

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80203 80353 81403 81443 81633 84413 84533 84703 84803 84903 85003 85033 85603	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	1,022	0	0	0	0
		女 Female	821	0	0	0	0
85503	腺泡細胞癌 ACINAR CELL CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	5	0	0	0	0
80133 80413 81503 81513 81533 82403 82443 82463 82493 93643	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE NEOPLASM/CANCER	男 Male	113	0	0	0	2
		女 Female	102	0	0	0	0
84523	實性偽乳突瘤 SOLID PAPILLARY NEOPLASM	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	24	0	0	1	2
80213 80333 80703 81543 85513 85743	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	8	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	111	0	0	0	0
		女 Female	89	0	0	0	0
88023 88583 89363	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
80003 80033	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	217	0	0	0	0
		女 Female	218	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	1,481	0	0	0	2
		女 Female	1,269	0	0	1	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	2	10	17	52	85	147	162	225	113	107	65	37
1	2	2	4	17	26	50	94	142	156	108	106	74	39
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0
0	2	5	4	6	7	9	17	20	15	10	9	6	1
0	2	2	6	5	9	9	12	20	10	13	10	2	2
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	4	3	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	2	0	0
0	0	0	0	0	4	7	14	14	15	8	16	11	22
0	0	0	0	0	0	3	7	4	9	12	16	21	17
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	2	1	2	4	11	24	18	25	31	34	65
0	0	0	0	1	2	3	9	6	7	19	34	47	90
0	3	7	17	24	67	105	191	223	277	158	164	118	125
5	7	8	14	27	40	66	125	175	185	153	169	144	148

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜

RETROPERITONEUM AND PERITONEUM C48

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
88503 88513 88523 88543 88583	脂肪肉瘤 LIPOSARCOMA	男 Male	38	0	0	0	0
		女 Female	35	0	0	0	0
88903	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	男 Male	8	0	0	0	0
		女 Female	20	0	0	0	0
86803 93643 95003 95403 95803	周邊原始神經外胚層腫瘤 PERIPHERAL PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	男 Male	8	4	0	0	1
		女 Female	11	5	0	0	0
90643 90703 90713 90803 90853	生殖細胞瘤和惡性畸胎瘤 GERM CELL TUMOR AND MALIGNANT TERATOMA	男 Male	3	1	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
90503 90513 90523	惡性間皮瘤 MALIGNANT MESOTHELIOMA	男 Male	7	0	0	0	0
		女 Female	6	0	0	0	0
88003 88023 88063 88103 88113 88253 89003 89363 89803	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male	17	0	0	0	0
		女 Female	18	0	0	0	0
84413 84603 84613	漿液性腺癌 SEROUS ADENOCARCINOMA	男 Male	0	0	0	0	0
		女 Female	69	0	0	0	0
80103 80333 80413 80463 81403 83103 83803 84803	其他上皮癌 OTHER CARCINOMA	男 Male	9	0	0	0	0
		女 Female	30	0	0	0	0
80003 80013 82493 84703 86933 87003	其他惡性腫瘤	男 Male	13	0	1	0	0
		女 Female	4	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	103	5	1	0	1
		女 Female	195	5	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	1	1	2	3	2	5	4	4	4	5	3	3	1
0	0	0	2	4	1	9	4	5	6	2	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0
0	0	1	1	1	4	0	1	6	2	2	0	2	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0
0	0	2	1	0	1	2	0	2	1	5	1	0	2
1	0	0	1	0	1	2	2	2	0	4	3	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	4	6	9	12	11	9	11	5	0
0	0	0	1	1	0	0	1	3	2	0	1	0	0
0	0	0	2	0	0	1	3	6	3	2	6	3	4
1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	1	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	2	5	5	5	4	7	7	14	12	13	9	5	7
1	0	2	8	7	11	20	22	32	24	22	21	13	7

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM C26

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403	84803	腺癌	男 Male	6	0	0	0	0
		ADENOCARCINOMA	女 Female	7	0	0	0	0
82463	82493	神經內分泌癌	男 Male	1	0	0	0	0
		NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	1	0	0	0	0
80203		其他特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103		非特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
89363		惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
		SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80003		其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	2	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2
0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR　C30 - C31

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80523	80703	鱗狀細胞癌	男 Male	84	0	0	0	0
80713	80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	29	0	0	0	0
80743	80833							
85603								
81403	81443	腺癌	男 Male	5	0	0	0	0
82603		ADENOCARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
82003	84303	唾液腺癌	男 Male	12	0	0	0	0
89803	89823	MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	12	0	0	0	0
80133	80413	神經內分泌癌	男 Male	9	0	0	0	0
82403	82463	NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	3	0	0	0	0
85743								
80203		鼻竇未分化上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
		SINONASAL UNDIFFERENTIATED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80823		其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	80333	非特定上皮癌	男 Male	13	0	0	0	0
90453		CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
86803	88003	軟組織肉瘤	男 Male	6	0	0	0	0
88023	88153	SOFT TISSUE SARCOMA	女 Female	2	0	0	0	0
88583	88903							
89103	89203							

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	8	1	9	9	10	12	10	6	8	7	4
0	0	0	3	4	3	3	2	1	3	2	4	1	3
0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	0	2	0	2	2	1	1	1	0
1	0	0	0	1	2	0	1	1	1	3	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	3	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4	4	1	3	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳

NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR　C30 - C31

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
87203	87213	惡性黑色素瘤	男 Male	5	0	0	0	0
		MALIGNANT MELANOMA	女 Female	7	0	0	0	0
80003	86903	其他惡性腫瘤	男 Male	18	0	0	0	0
90813	93643	OTHER MALIGNANCY	女 Female	7	0	0	0	1
95223								
		總計	男 Male	159	0	0	0	0
		TOTAL	女 Female	68	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	1
0	0	1	0	3	2	0	6	3	2	1	0	0	0
0	0	0	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
0	1	2	13	8	18	20	21	25	16	11	10	8	6
1	0	1	7	7	6	5	6	5	7	9	6	3	4

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

喉

LARYNX　C32

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80513 80523 80703 80713 80723 80743 80763 80833 85603	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	732	0	0	0	0
		女 Female	33	0	0	0	0
82403	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	1	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80133 80323 80823 82003	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	3	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	11	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
88013 89803	軟組織肉瘤 SOFT TISSUE SARCOMA	男 Male	2	0	0	0	0
		女 Female	0	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	8	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	757	0	0	0	0
		女 Female	38	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	1	5	24	53	76	122	137	123	70	59	36	26
0	0	0	0	3	0	4	8	5	2	4	5	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	5	26	55	79	125	141	126	73	61	37	28
0	0	0	2	3	0	5	8	6	3	4	5	1	1

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG　C33 - C34

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80523	80703	鱗狀細胞癌	男 Male	1,649	0	0	0	0
80713	80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	200	0	0	0	0
80743	80763							
80833								
80503	81403	腺癌	男 Male	4,890	0	0	0	0
81443	82303	ADENOCARCINOMA	女 Female	6,098	0	0	0	1
82503	82513							
82533	82543							
82553	82563							
82573	82603							
82653	83203							
83333	84803							
84813	84903							
85513								
85603		腺性鱗狀癌	男 Male	105	0	0	0	0
		ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	女 Female	59	0	0	0	0
80033	80123	大細胞癌	男 Male	102	0	0	0	1
80133	80203	LARGE CELL CARCINOMA	女 Female	60	0	0	0	0
80823	81233							
80413	80453	小細胞癌	男 Male	864	0	0	0	0
		SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	104	0	0	0	0
80043	80223	肉瘤樣癌	男 Male	85	0	0	0	0
80313	80323	SARCOMATOID CARCINOMA	女 Female	32	0	0	0	0
80333	89723							
89803								
82403	82463	類癌腫瘤	男 Male	52	0	0	0	0
82493		CARCINOID TUMORS	女 Female	53	0	0	0	0
82003	84303	唾液腺樣癌	男 Male	13	0	0	0	0
		MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLANDS	女 Female	8	0	0	0	1

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	3	9	16	39	91	122	222	257	251	277	209	153
0	0	0	2	4	6	14	20	21	35	24	29	28	17
1	8	18	73	127	221	398	646	786	829	542	548	369	324
0	9	45	110	193	327	592	804	1,003	984	645	612	467	306
0	0	1	0	2	5	7	14	12	17	15	14	13	5
0	0	0	0	2	3	3	8	8	10	6	10	4	5
0	0	0	1	3	0	13	8	17	17	16	9	11	6
0	0	0	2	1	3	4	6	14	10	13	4	2	1
0	0	0	2	19	23	56	78	127	161	131	110	77	80
0	0	1	1	1	2	7	10	14	19	15	15	11	8
1	1	0	0	1	2	5	12	11	12	9	13	12	6
0	0	0	1	1	4	2	6	8	1	0	4	2	3
1	0	1	0	4	7	5	6	4	8	5	4	3	4
0	0	0	4	1	6	4	8	9	11	3	6	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	3	3	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管（續）

TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG　C33 - C34（CONTINUED）

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80463 85743 85763	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	201	0	0	0	0
		女 Female	60	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	193	0	0	0	0
		女 Female	87	0	0	0	0
88003 88023 88103 88153 88583 89733 90403 90413 91203 91333 95403 95613 95813	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	17	1	0	0	0
		女 Female	10	0	0	0	0
80003 80013 87143 87203	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	253	0	0	0	0
		女 Female	150	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	8,424	1	0	0	1
		女 Female	6,921	0	0	0	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	2	2	12	19	29	23	21	17	26	22	28
0	0	0	2	2	2	5	2	7	6	5	6	12	11
0	0	0	2	2	5	14	23	22	23	22	30	25	25
0	0	0	1	0	1	3	7	5	12	10	14	13	21
0	1	0	2	1	2	1	1	3	3	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	0	1	1	0
0	1	0	2	0	1	4	15	11	16	20	40	43	100
0	0	0	1	1	1	1	5	6	9	14	14	37	61
3	11	23	93	178	318	614	954	1,240	1,364	1,032	1,075	785	732
0	10	47	124	207	356	638	877	1,097	1,101	735	715	578	434

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

胸膜

PLEURA　C38.4

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
90503 90513	惡性間皮瘤	男 Male	66	0	0	0	0
90523 90533	MESOTHELIAL TUMORS	女 Female	23	0	0	0	0
88153	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003 89733	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計	男 Male	68	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	24	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	1	0	0	2	11	5	23	8	10	5	1
0	0	0	2	0	0	1	3	7	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	2	11	5	24	8	11	5	1
0	0	0	2	0	0	1	3	7	2	2	3	2	2

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈

THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM　C37 - C38.3，C38.8

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
85803 85813 85823 85833 85843 85853	胸腺瘤 THYMOMA	男 Male 女 Female	174 165	0 0	0 0	0 0	1 1
80133 80333 80413 80703 80823 81233 81403 82403 82463 82493 85863	胸腺癌 THYMIC CARCINOMA	男 Male 女 Female	113 68	0 0	0 0	0 0	2 0
90613 90643 90653 90713 90853 90863 91003	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS (GCT)	男 Male 女 Female	19 1	0 0	0 0	1 0	3 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	6 1	0 0	0 0	0 0	1 0
86803 88003 88013 88023 88053 88113 88153 88253 88583 91203 91803 92203 93643 94903	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	12 12	0 1	0 0	1 1	0 0
80003 86933 87203 93703 95003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	7 2	1 1	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	331 249	1 2	0 0	2 1	7 1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
2	5	9	18	13	19	30	11	25	19	12	4	3	3
1	7	3	13	12	16	14	24	24	24	13	8	4	1
1	2	1	5	2	11	16	15	20	11	14	7	4	2
0	1	0	3	1	4	8	12	8	13	10	4	4	0
9	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	4	2	0	0	0	1	0	0
0	2	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0
0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9	10	27	18	33	50	28	46	32	26	12	9	8
2	10	5	16	14	20	23	38	32	38	23	13	10	1

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨

BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE　C40 - C41

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
91803 91813	骨肉瘤	男 Male	41	0	2	9	5
91823 91833	OSTEOSARCOMA	女 Female	25	0	2	3	3
91863 91873							
91923 91933							
91943							
92203 92213	軟骨肉瘤	男 Male	18	0	0	0	0
92223 92433	CHONDROSARCOMA	女 Female	8	0	0	0	1
92503	惡性骨巨大細胞瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	MALIGNANT GIANT CELL TUMOR	女 Female	0	0	0	0	0
92603 93643	Ewing 氏肉瘤	男 Male	6	1	1	1	0
	EWING SARCOMA	女 Female	6	1	0	2	1
93703 93713	脊索瘤	男 Male	11	0	0	0	0
	CHORDOMA	女 Female	14	0	0	0	1
92613 92703	惡性成釉細胞瘤	男 Male	5	0	0	0	0
	MALIGNANT AMELOBLASTOMA	女 Female	0	0	0	0	0
91203	血管肉瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	ANGIOSARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88123	纖維肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	FIBROSARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88003 88013	其他惡性肉瘤	男 Male	7	0	0	0	0
88023 88053	OTHER SARCOMA	女 Female	4	0	0	0	0
88303							
80003 80103	其他惡性腫瘤	男 Male	2	0	0	0	0
80333 84303	OTHER MALIGNANCY	女 Female	7	0	0	0	1
	總計	男 Male	95	1	3	10	5
	TOTAL	女 Female	64	1	2	5	7

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
3	3	1	3	0	2	5	0	4	0	2	2	0	0
3	0	1	1	2	3	0	3	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	2	3	2	2	3	1	1	0
1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0
0	0	1	1	0	2	0	6	0	1	0	0	0	2
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0
5	4	4	7	5	4	12	5	10	8	6	4	2	0
4	0	3	2	5	7	0	11	3	8	0	1	1	4

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES　C47，C49

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
88103 88113 88143 88153 88253 88323 88403	纖維母細胞 / 肌纖維母細胞肉瘤 FIBROBLASTIC / MYOFIBROBLASTIC TUMOURS	男 Male	53	0	0	0	1
		女 Female	32	1	0	0	0
88503 88513 88523 88543 88553 88583	脂肪肉瘤 LIPOSARCOMA	男 Male	88	0	0	0	2
		女 Female	59	0	0	0	0
88903 88963	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	男 Male	19	0	0	0	0
		女 Female	31	0	0	0	0
89003 89013 89103 89123 89203	橫紋肌肉瘤 RHABDOMYOSARCOMA	男 Male	15	1	2	0	0
		女 Female	6	1	0	0	1
91203 91333 91403	血管肉瘤 ANGIOSARCOMA	男 Male	37	0	0	0	0
		女 Female	22	0	0	0	0
90403 90413 90433	滑膜肉瘤 SYNOVIAL SARCOMA	男 Male	9	0	1	0	0
		女 Female	12	0	0	1	2
95403 95603 95613 95713 95803	惡性周邊神經鞘瘤 MALIGNANT NERVE SHEATH TUMOR	男 Male	29	0	0	1	1
		女 Female	29	0	1	0	3
92603 93643 94903 95003	周邊原始神經外胚層腫瘤 PERIPHERAL PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	男 Male	14	3	0	2	2
		女 Female	7	1	0	0	2
89363	胃腸基質瘤 GIST	男 Male	4	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
88013 88023 88033 88043 88053 88303 91373	未分化肉瘤 UNDIFFERENTIATED SARCOMA	男 Male	45	0	0	0	1
		女 Female	38	0	0	0	1

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
2	2	4	6	6	7	2	2	4	7	2	5	3	0
1	3	2	4	0	1	1	4	2	3	2	2	2	4
0	0	3	4	7	9	9	6	10	11	6	11	4	6
0	3	1	4	6	0	8	12	10	3	5	2	2	3
1	0	2	0	0	1	3	1	2	2	3	2	1	1
1	0	0	1	1	2	4	6	6	5	3	1	1	0
2	0	0	0	1	4	1	0	0	0	3	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	2	0	0	1	4	4	7	7	4	6	2
0	0	0	2	0	1	0	3	1	5	2	3	2	3
2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1
2	1	0	1	2	3	3	5	1	5	0	1	1	2
0	0	2	4	3	1	4	1	3	2	0	2	1	2
1	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	2	1	1	4	2	8	2	6	3	2	2	6	4
0	0	1	1	1	4	4	5	4	8	4	4	1	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織（續）

CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES　C47，C49（CONTINUED）

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
87143 88003 88063 88423 89403 89823 91803 91813 92203 92313 92403 92523 95423 95813	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	男 Male	44	0	0	0	0
		女 Female	28	0	0	0	1
80003 80013 80043 85603 89803 90853	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	5	0	0	0	0
		女 Female	4	1	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	362	4	3	3	7
		女 Female	270	4	1	1	10

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
2	5	2	3	3	1	6	4	6	4	1	1	1	5
0	2	0	4	5	0	3	1	1	5	1	3	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	13	13	18	24	28	34	28	35	40	25	29	24	21
4	10	7	23	17	12	24	34	28	31	19	18	12	15

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

皮膚

SKIN　C44

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80833 80903 80913 80923 80933 80943 80953 80973 80983	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	1,015 1,096	0 0	0 0	1 0	0 0
80513 80523 80703 80713 80723 80743 80753 80763 80843 85603 89803	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	800 559	0 0	0 0	0 0	0 0
81023 81033 82003 84003 84013 84023 84033 84063 84073 84093 84103 84803 84813 85413 85423	皮膚附件癌 CARCINOMA OF SKIN APPENDAGES	男 Male 女 Female	70 51	0 0	0 0	0 0	0 0
87203 87213 87303 87433 87443 87453 87703 87723	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male 女 Female	145 134	0 0	0 0	0 0	0 0
80103 81403 81473 83903 85403 85723	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	18 13	0 0	0 0	0 0	0 0
88323	纖維肉瘤樣隆突性皮膚纖維肉瘤 FIBROSARCOMATOUS DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS	男 Male 女 Female	13 7	0 0	0 0	0 0	0 0

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	3	11	16	28	60	92	103	168	113	160	130	130
1	2	7	15	21	21	56	80	111	161	138	179	150	154
2	4	1	9	10	22	22	43	46	68	71	109	159	234
0	1	2	2	11	4	10	14	29	31	30	93	89	243
0	0	0	1	0	6	1	7	10	11	11	9	8	6
0	0	1	1	4	6	1	2	7	3	4	8	7	7
0	2	1	2	6	5	10	16	18	18	11	19	16	21
0	1	3	1	7	7	5	13	9	15	17	19	18	19
0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	3	5	0	5
0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	1	3
1	2	0	1	4	1	0	2	1	0	0	1	0	0
0	0	2	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

皮膚（續）

SKIN　C44（CONTINUED）

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
91203	91403	血管肉瘤	男 Male	77	0	0	0	0
		ANGIOSARCOMA	女 Female	24	0	0	0	0
82463	82473	惡性神經瘤	男 Male	8	0	0	0	0
95403		MALIGNANT NEURAL TUMORS	女 Female	7	0	0	0	0
88013	88023	其他惡性肉瘤	男 Male	7	1	0	0	1
88113	88523	OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
88903	89103							
80003	85023	其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	4	0	0	0	0
		總計	男 Male	2,153	1	0	1	1
		TOTAL	女 Female	1,896	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	3	2	1	4	2	1	5	9	11	13	9	10	7
0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	4	5	9
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
3	11	7	27	40	65	97	168	188	277	222	315	325	405
1	4	15	19	43	41	76	116	160	214	192	305	270	440

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

女性乳房

FEMALE BREAST C50

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
83153 85003 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	女 Female	12,073	0	0	0	0
84803 84813	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	女 Female	469	0	0	0	0
85103 85133	髓質癌 MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	30	0	0	0	0
85203 85243	侵襲性小葉癌 INVASIVE LOBULAR CARCINOMA	女 Female	673	0	0	0	0
90203	惡性葉狀腫瘤 MALIGNANT PHYLLODES TUMOR	女 Female	68	0	0	0	1
85403 85433	乳房 Paget 氏病 PAGET DISEASE, MAMMARY	女 Female	18	0	0	0	0
80503 85033 85043 85073 85093	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	261	0	0	0	0
80323 80703 85713 85723 85753 89803 89823	化生性癌 METAPLASTIC CARCINOMA	女 Female	91	0	0	0	0
80353 80413 82003 82013 82113 82463 84013 85023 85303 85503 85743 89833	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	137	0	0	0	0

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
14	68	241	682	1,154	1,796	1,753	1,814	1,683	1,285	589	498	309	187
0	5	20	29	51	72	46	38	37	55	33	36	27	20
1	1	2	3	3	4	8	1	4	2	1	0	0	0
0	1	5	14	55	120	101	92	123	74	38	23	15	12
0	1	5	3	14	9	16	8	7	2	0	0	2	0
0	0	0	1	1	1	2	1	2	3	2	4	0	1
0	1	9	17	11	19	24	25	40	44	18	25	18	10
0	0	0	3	2	12	11	15	11	11	10	8	5	3
0	1	2	3	18	26	21	13	19	13	6	10	4	1

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

女性乳房（續）

FEMALE BREAST　C50（CONTINUED）

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80103 80823 81403 82553 85013 85213 85223 85233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	336	0	0	0	0
88003 88583 91203	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	11	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	50	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	14,217	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	0	5	14	34	46	53	50	47	34	19	17	11	5
0	2	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	3	4	5	7	2	10	3	2	7	3	4
16	80	290	775	1,348	2,111	2,044	2,059	1,983	1,526	718	628	395	243

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

男性乳房

MALE BREAST　C50

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
85003 85413	侵襲性癌，非特定型 INVASIVE CARCINOMA OF NO SPECIAL TYPE	男 Male	53	0	0	0	0
84803	黏液性癌 MUCINOUS CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
85093	侵襲性乳頭狀癌 INVASIVE PAPILLARY CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
84303 85743	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	2	0	0	0	0
81403 85233	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	60	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	1	0	5	3	5	11	7	6	6	6	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	1	0	6	3	5	12	7	7	6	8	5

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

子宮，非特定部位

UTERUS, NOS　C55

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
88903　89803	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	6	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

子宮頸

CERVIX UTERI　C53

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80523	80703	鱗狀細胞癌	女 Female	1,016	0	0	0	0
80713	80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA						
80733	80743							
80763	80823							
80833	84303							
81403	82553	腺癌	女 Female	300	0	0	0	0
82603	82633	ADENOCARCINOMA						
83103	83233							
83803	83843							
84413	84803							
84813	84823							
84903	85743							
80133	80413	神經內分泌癌	女 Female	19	0	0	0	0
82463		NEUROENDOCRINE CANCER						
80203	80453	其他特定上皮癌	女 Female	51	0	0	0	0
80983	85603	OTHER SPECIFIED CARCINOMA						
80103		非特定上皮癌	女 Female	22	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS						
89333	89803	混合性上皮與間質腫瘤	女 Female	5	0	0	0	0
		MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA						
88953	89313	惡性肉瘤	女 Female	2	0	0	0	0
		SARCOMA						
80003	80033	其他惡性腫瘤	女 Female	18	0	0	0	0
82443		OTHER MALIGNANCY						
		總計	女 Female	1,433	0	0	0	0
		TOTAL						

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	19	40	85	76	82	89	113	126	106	62	66	67	85
1	3	7	32	37	34	47	31	36	31	15	12	9	5
0	2	3	2	3	1	1	2	1	0	0	1	2	1
0	2	0	9	6	6	10	4	3	4	1	3	3	0
0	0	2	0	1	3	5	2	1	4	0	2	1	1
0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	4	1	6
1	26	52	128	125	129	155	152	170	146	79	88	84	98

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

子宮體

CORPUS UTERI　C54

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
	子宮內膜癌 ENDOMETRIAL CARCINOMA	女 Female	2,439	0	0	0	1
82633 83803 83823 85703	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	2,076	0	0	0	1
84413 84603 84613	漿液性腺癌 SEROUS CARCINOMA, NOS	女 Female	115	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	55	0	0	0	0
80203 80413 80703 81403 82463 82553 83233 84803 85603 85623	其他 OTHERS	女 Female	193	0	0	0	0
89333 89503 89803	惡性 Muller 氏混合性腫瘤 MALIGNANT MULLERIAN MIXED TUMOR	女 Female	139	0	0	0	0
91003 91053	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80333 80443	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	17	0	0	0	0
88903 88913 88963	平滑肌肉瘤 LEIOMYOSARCOMA	女 Female	91	0	0	0	0
88053 89303 89313	子宮內膜基質肉瘤 ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	女 Female	57	0	0	0	0
87143 88003 88023 88503	其他惡性肉瘤 OTHER SARCOMA	女 Female	27	0	0	0	0
80003 80043 89003 93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	11	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	2,787	0	0	0	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
5	19	58	117	184	320	414	499	347	240	110	69	31	25
5	19	55	109	169	292	372	435	279	184	70	50	21	15
0	0	0	1	2	3	5	18	29	25	20	4	6	2
0	0	1	1	1	4	4	9	8	15	4	6	2	0
0	0	2	6	12	21	33	37	31	16	16	9	2	8
0	0	1	3	1	4	23	33	19	22	17	9	5	2
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	5	0	2	1	1	0	0	4	2
0	0	2	3	9	26	13	17	8	7	2	2	2	0
0	0	1	6	7	12	13	9	3	3	2	1	0	0
0	0	0	1	2	7	6	2	4	4	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	2	1	1	1	1	2
5	19	63	133	203	378	470	563	385	278	132	82	43	32

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT　C56，C57.0 - C57.4

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
84413 84423 84603 84613	漿液性腺癌 SEROUS ADENOCARCINOMA	女 Female	494	0	0	0	0
84703 84723 84803	黏液性腺癌 MUCINOUS ADENOCARCINOMA	女 Female	150	0	0	0	3
83803 83833 89503 89803	子宮內膜樣癌 ENDOMETRIOID CARCINOMA	女 Female	233	0	0	0	0
83103	明亮細胞癌 CLEAR CELL CARCINOMA	女 Female	288	0	0	0	0
83233 84743	混合細胞腺癌 MIXED CELL ADENOCARCINOMA	女 Female	53	0	0	0	0
81403	非特定腺癌 ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	72	0	0	0	0
82403 82463 83403 90603 90713 90803 90843 90853 90903	生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	女 Female	63	0	3	5	12
86203 86223 86313 86343 88103	性索間質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	女 Female	75	0	0	1	1
80203 80213 80333 80413 80443 80703 80763 81203 82603 83203 84903 85603 90003	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	34	0	0	1	0

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	2	12	14	24	42	71	87	88	62	41	28	13	9
6	13	15	15	13	12	20	18	15	9	2	3	4	2
2	3	14	23	23	41	52	28	27	11	3	4	2	0
0	1	7	21	22	38	77	55	39	18	7	2	0	1
1	1	4	1	7	11	8	9	8	2	1	0	0	0
0	2	0	5	2	2	11	10	5	9	10	4	9	3
9	7	6	7	1	7	0	2	0	1	3	0	0	0
0	3	3	16	5	11	11	5	5	4	3	5	2	0
1	0	1	2	5	1	7	0	7	5	2	1	1	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

卵巢、輸卵管及寬韌帶（續）

OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT　C56，C57.0 - C57.4（CONTINUED）

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	48	0	0	0	0
88053 88903 89333 91203	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80003 89603 90503 90523 91103	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	41	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	1,557	0	3	7	16

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	2	1	1	5	2	4	7	9	3	3	4	3	3
0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0
0	0	1	2	4	2	3	2	2	5	5	1	7	7
21	34	64	107	112	171	264	224	207	129	80	52	41	25

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官

VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS　C51 - C52，C57.7 - C57.9

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80523 80703 80713 80723 80743 80763 80903	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	104	0	0	0	0
81403 83103 83803 84803 85423	腺癌 ADENOCARCINOMA	女 Female	25	0	0	0	0
80413	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	女 Female	4	0	0	0	0
89803	混合性上皮與間質腫瘤 MIXED EPITHELIAL AND SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
91003 91053	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80203 80323 81303 82003 84613 85603	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	女 Female	5	0	0	0	0
87203 87213	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	女 Female	17	0	0	0	0
87143 88043 88903 88963 90403	惡性肉瘤 SARCOMA	女 Female	6	0	0	0	0
80003 93643	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	0	0	0	0
	總計 TOTAL	女 Female	178	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	1	2	4	3	6	10	12	11	10	13	12	20
0	0	0	0	0	1	5	4	3	5	4	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	2	1	0	6	1	0	2	1	2
0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
2	1	1	8	7	9	16	18	24	18	15	21	15	23

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

攝護腺

PROSTATE GLAND　C61

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403 81413 82013 82553 85003 85503 85513 85523	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male	6,527	0	0	0	0
81203 81223	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	2	0	0	0	0
80703	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
80413 80453 85743	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male	12	0	0	0	0
81473	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male	1	0	0	0	0
80103 80333 82303	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male	33	0	0	0	0
88153	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	2	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	66	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	6,644	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	8	21	90	324	801	1,346	1,235	1,234	808	660
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	4	9	9
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	10	8	7	35
0	0	0	0	8	23	91	328	806	1,354	1,253	1,247	826	708

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

睪丸

TESTIS　C62

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
90613 90633	精細胞瘤 SEMINOMA	男 Male	140	0	0	0	1
90713	卵黃囊瘤 YOLK SAC TUMOR	男 Male	9	4	0	0	2
90703	胚胎性癌 EMBRYONAL CARCINOMA	男 Male	13	0	1	0	2
90813 90853	混合性生殖細胞瘤 MIXED GERM CELL TUMORS	男 Male	88	0	0	0	7
90803	惡性畸胎瘤 MALIGNANT TERATOMA	男 Male	8	0	0	0	0
91003	絨毛膜癌 CHORIOCARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
90643 90653	非特定生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS, NOS	男 Male	4	0	0	0	0
86403 86503	性索基質腫瘤 SEX CORD-STROMAL TUMORS	男 Male	2	0	0	0	0
80003 80103 88513 88583	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	10	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	277	4	1	0	12

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
12	33	35	26	13	12	5	0	2	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	19	17	12	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	2	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
42	59	61	42	23	15	7	3	4	1	1	1	1	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

陰莖及其他男性生殖器官

PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS　C60，C63

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80513 80523 80543 80703 80713 80723 80743 80763	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male	66	0	0	0	0
80903 80973	基底細胞癌 BASAL CELL CARCINOMA	男 Male	6	0	0	0	0
85413 85423	Paget 氏病 PAGET DISEASE	男 Male	24	0	0	0	0
80833 80943 84103	其他上皮癌 OTHER EPITHELIAL CARCINOMA	男 Male	5	0	0	0	0
87203	惡性黑色素瘤 MALIGNANT MELANOMA	男 Male	1	0	0	0	0
86803 88003 88503 88513 88583 88903 91403	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	11	0	0	0	0
90503 90853	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	3	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	116	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	1	0	3	2	3	6	8	12	3	11	7	10
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	3	1	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4	1	2	1	1	0	2	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	3	2	7	11	19	21	10	13	13	15

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

膀胱

BLADDER　C67

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80203 80333 80823 81203 81223 81303 81313	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male 女 Female	1,486 622	0 0	0 0	0 0	0 0
81403 81443 83103 84703 84803 84903	腺癌 ADENOCARCINOMA	男 Male 女 Female	23 15	0 0	0 0	0 0	0 0
80703 80713	鱗狀細胞癌 SQUAMOUS CELL CARCINOMA	男 Male 女 Female	4 6	0 0	0 0	0 0	0 0
80413 80453 86803	神經內分泌癌 NEUROENDOCRINE CANCER	男 Male 女 Female	21 8	0 0	0 0	0 0	0 0
	其他特定上皮癌 OTHER SPECIFIED CARCINOMA	男 Male 女 Female	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	非特定上皮癌 CARCINOMA, NOS	男 Male 女 Female	19 13	0 0	0 0	0 0	0 0
87143 88003	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male 女 Female	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0
80003 80043	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male 女 Female	14 6	0 0	0 0	0 0	0 0
	總計 TOTAL	男 Male 女 Female	1,568 671	0 0	0 0	0 0	0 0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	2	2	9	13	29	57	134	242	210	184	228	184	192
0	0	4	5	6	7	28	46	69	92	73	94	108	90
0	0	0	1	0	1	0	3	4	5	2	2	3	2
0	0	1	0	0	0	2	3	0	3	1	2	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
0	0	0	2	0	0	1	2	3	2	1	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	6	3	4
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	5
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3
0	2	2	12	13	31	61	140	252	223	187	243	191	211
0	0	5	5	6	8	30	49	72	99	75	101	118	103

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

腎

KIDNEY　C64

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
	腎細胞癌	男 Male	967	0	0	0	0
	RENAL CELL CARCINOMA	女 Female	425	0	0	1	2
83103	亮細胞腺癌	男 Male	611	0	0	0	0
	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA	女 Female	253	0	0	0	1
82603	乳突狀腎細胞癌	男 Male	99	0	0	0	0
	PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA	女 Female	24	0	0	0	0
83173	嫌色性腎細胞癌	男 Male	65	0	0	0	0
	CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA	女 Female	55	0	0	0	0
80503 82553	其他與非特定腎細胞癌	男 Male	192	0	0	0	0
83113 83123	RENAL CELL CARCINOMA, NOS AND OTHERS	女 Female	93	0	0	1	1
83163 83183							
83193							
89603	腎母細胞瘤	男 Male	3	3	0	0	0
	NEPHROBLASTOMA	女 Female	6	5	1	0	0
80203 80333	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
80413 82403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	10	0	0	0	0
83233 89803							
80103	非特定上皮癌	男 Male	6	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
87143 88003	惡性肉瘤	男 Male	4	1	0	0	0
88513 88583	SARCOMA	女 Female	6	0	0	0	0
89003 89633							
93643							
80003 83613	其他惡性腫瘤	男 Male	20	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	13	0	0	0	0
	總計	男 Male	1,005	4	0	0	0
	TOTAL	女 Female	468	5	1	1	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	7	23	51	58	90	97	130	152	143	93	67	29	26
1	4	11	21	25	37	44	61	51	57	46	28	23	13
1	4	14	36	42	57	61	93	101	86	55	33	15	13
0	3	4	16	16	16	29	41	25	34	27	19	14	8
0	0	0	4	4	7	8	11	18	19	10	14	2	2
0	0	0	0	3	1	3	4	4	3	6	0	0	0
0	0	2	3	4	8	5	8	11	10	5	3	4	2
1	0	3	2	3	11	6	6	8	7	4	3	1	0
0	3	7	8	8	18	23	18	22	28	23	17	8	9
0	1	4	3	3	9	6	10	14	13	9	6	8	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	3	2	3	2	1	6
0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	4	2
2	7	25	52	58	90	100	133	157	146	97	69	31	34
2	5	11	21	26	41	46	64	56	59	50	33	28	17

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

腎盂

RENAL PELVIS　C65

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80203	80823	泌尿上皮癌	男 Male	394	0	0	0	0
81203	81223	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	522	0	0	0	0
81303	81313							
80703		鱗狀細胞癌	男 Male	6	0	0	0	0
		SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
81403	83103	腺癌	男 Male	6	0	0	0	0
84703	84803	ADENOCARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
85743								
80133	80413	其他特定上皮癌	男 Male	2	0	0	0	0
		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	4	0	0	0	0
80103	80313	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	8	0	0	0	0
88903	91203	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
		SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003		其他惡性腫瘤	男 Male	3	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	7	0	0	0	0
		總計	男 Male	417	0	0	0	0
		TOTAL	女 Female	547	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	2	0	5	9	3	24	37	51	56	60	68	51	28
0	0	1	1	0	10	9	29	59	79	80	103	91	60
0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2
0	2	0	5	9	5	28	39	52	59	62	72	53	31
0	0	1	2	0	10	9	29	64	82	84	106	96	64

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

輸尿管

URETER　C66

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80203 80823	泌尿上皮癌	男 Male	274	0	0	0	0
81203 81223	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	359	0	0	0	0
81303							
80703 80713	鱗狀細胞癌	男 Male	4	0	0	0	0
	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
81403 84803	腺癌	男 Male	3	0	0	0	0
	ADENOCARCINOMA	女 Female	2	0	0	0	0
80133 80303	其他特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
80413 80453	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
88003	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	6	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	0	0	0	0
	總計	男 Male	295	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	379	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	2	2	6	10	28	40	58	36	43	23	26
0	0	1	0	2	4	5	29	45	64	55	62	50	42
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1
0	0	0	2	2	7	10	29	42	62	40	46	25	30
0	0	1	0	2	5	6	30	45	67	61	65	53	44

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

尿道及其周邊腺體

URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND　C68.0 - C68.1

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81203	81303	泌尿上皮癌	男 Male	19	0	0	0	0
		UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	11	0	0	0	0
80703	80713	鱗狀細胞癌	男 Male	2	0	0	0	0
		SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
81403	81443	腺癌	男 Male	2	0	0	0	0
84803		ADENOCARCINOMA	女 Female	6	0	0	0	0
82003		其他特定上皮癌	男 Male	0	0	0	0	0
		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
87203		惡性黑色素瘤	男 Male	0	0	0	0	0
		MALIGNANT MELANOMA	女 Female	1	0	0	0	0
		總計	男 Male	23	0	0	0	0
		TOTAL	女 Female	22	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	1	0	0	0	0	1	1	3	4	1	3	4	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	4	6	1	4	4	1
0	0	0	0	0	1	4	2	2	4	1	3	3	2

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變

OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS　C68.8

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81203	泌尿上皮癌 UROTHELIAL CARCINOMA	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0
	總計 TOTAL	男 Male	3	0	0	0	0
		女 Female	2	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

泌尿系統，非特定部位

URINARY SYSTEM, NOS　C68.9

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81203 81303	泌尿上皮癌	男 Male	10	0	0	0	0
	UROTHELIAL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80103	非特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	3	0	0	0	0
80003	其他惡性腫瘤	男 Male	1	0	0	0	0
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	0	0	0	0	0
	總計	男 Male	12	0	0	0	0
	TOTAL	女 Female	8	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	4	1	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	2	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

眼及淚腺

EYE AND LACRIMAL GLAND　C69

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
95103	95113	視網膜母細胞瘤	男 Male	9	9	0	0	0
		RETINOBLASTOMA	女 Female	6	5	1	0	0
87203	87703	惡性黑色素瘤	男 Male	4	0	0	0	0
87713	87723	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	11	0	0	0	0
80703	80723	鱗狀細胞癌	男 Male	4	0	0	0	0
		SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
81403	82003	淚腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
84303	89413	LACRIMAL GLAND CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80523	85003	其他特定上皮癌	男 Male	1	0	0	0	0
		OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80103	80823	非特定上皮癌	男 Male	3	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
88003	89103	惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
		SARCOMA	女 Female	1	0	1	0	0
80003		其他惡性腫瘤	男 Male	0	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	1	0	0	0	0
		總計	男 Male	23	9	0	0	0
		TOTAL	女 Female	31	5	2	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	3	1	5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	3	5	1	1	2	1	0
1	0	1	2	1	2	8	1	6	1	0	0	1	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

腦

BRAIN　C71

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
94003		瀰漫性星形細胞瘤	男 Male	31	1	1	0	0
		DIFFUSE ASTROCYTOMA	女 Female	24	0	2	1	0
94013		退行性星形細胞瘤	男 Male	41	1	0	1	1
		ANAPLASTIC ASTROCYTOMA	女 Female	18	0	0	0	0
94403	94413	神經膠母細胞瘤	男 Male	210	0	1	0	0
94423	94453	GLIOBLASTOMA	女 Female	146	1	1	0	2
93813	93853	其他特定之星形細胞瘤	男 Male	9	1	3	0	1
94203	94213	OTHER SPECIFIED ASTROCYTOMA	女 Female	9	1	0	2	0
94243	94253							
93823	94503	寡樹突膠質細胞瘤	男 Male	24	0	0	0	0
94513		OLIGODENDROGLIOMA	女 Female	30	0	0	0	1
93913	93923	室管膜瘤	男 Male	13	2	0	0	0
		EPENDYMOMA	女 Female	8	1	1	0	1
93803		非特定之神經膠質瘤	男 Male	13	0	2	0	0
		GLIOMA,NOS	女 Female	25	2	1	0	0
94703	94713	胚胎性瘤	男 Male	11	5	4	2	0
94733	94743	EMBRYONAL TUMORS	女 Female	15	2	6	3	1
94773	95013							
95083								
95053	95063	神經元/混合性神經元神經膠質細胞瘤	男 Male	2	0	0	0	0
		NEURONAL AND MIXED NEURONAL GLIAL TUMORS	女 Female	5	0	0	0	1
90643	90853	生殖細胞瘤	男 Male	18	0	4	4	7
		GERM CELL TUMORS	女 Female	9	0	2	3	0
93903		脈絡叢癌	男 Male	1	1	0	0	0
		CHOROID PLEXUS CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
88013	88153	惡性肉瘤	男 Male	9	0	0	0	0
91203	91803	SARCOMA	女 Female	8	0	0	0	1
93703								

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	1	4	3	5	2	2	4	4	1	0	1	0	1
0	0	5	1	5	0	2	1	2	1	1	0	2	1
0	3	2	8	3	3	3	4	4	4	0	2	2	0
0	2	2	3	2	1	1	2	1	2	2	0	0	0
1	4	3	7	7	11	17	20	37	40	22	19	13	8
2	2	2	10	8	9	20	9	16	18	17	15	10	4
2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	2	4	3	4	1	4	1	1	2	2	0	0	0
0	3	0	2	7	2	5	5	1	0	2	1	0	1
1	0	3	0	0	2	0	0	1	3	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	0	0
1	0	0	0	3	1	2	2	3	2	1	1	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0
0	1	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

腦（續）

BRAIN　C71（CONTINUED）

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
95403	其他特定之惡性瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED MALIGNANT TUMORS	女 Female	1	0	0	0	0
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	25	0	0	0	1
	OTHER MALIGNANCY	女 Female	14	0	0	0	0
	總計	男 Male	407	11	15	7	10
	TOTAL	女 Female	312	7	13	9	7

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	2	4	2	1	1	2	4	7
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	1	2
8	11	18	26	25	20	30	34	51	52	30	24	19	16
6	11	11	22	26	15	32	24	27	24	27	24	16	11

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位

MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM　C70，C72

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
94733 95223	95003	原始性神經外胚層腫瘤 PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR	男 Male	0	0	0	0	0
			女 Female	3	0	1	0	0
93853 94013 94403	94003 94213	星形細胞瘤 ASTROCYTOMA	男 Male	5	0	0	1	0
			女 Female	4	1	0	0	0
93913 93943	93923	室管膜瘤 EPENDYMOMA	男 Male	9	0	0	1	0
			女 Female	11	0	0	0	0
95303 95373 95393	95343 95383	惡性腦膜瘤 MALIGNANT MENINGIOMA	男 Male	20	0	0	0	0
			女 Female	16	0	0	0	0
95403	95613	惡性神經鞘瘤 MALIGNANT SCHWANNOMA	男 Male	2	0	0	0	0
			女 Female	0	0	0	0	0
90713		生殖細胞瘤 GERM CELL TUMORS	男 Male	1	0	0	0	0
			女 Female	0	0	0	0	0
88023 89003	88153 91503	惡性肉瘤 SARCOMA	男 Male	2	0	1	0	0
			女 Female	2	0	0	0	0
87283	93703	其他惡性腫瘤 OTHER MALIGNANCY	男 Male	1	0	0	0	0
			女 Female	2	1	0	0	0
		總計 TOTAL	男 Male	40	0	1	2	0
			女 Female	38	2	1	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	2	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1	1	1	3	0	3	6	1	1
0	1	0	0	1	0	3	2	4	1	1	2	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	1	4	1	3	2	3	3	3	1	4	7	1	1
1	3	3	4	1	0	5	5	6	3	1	2	1	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

甲狀腺

THYROID GLAND　C73

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
82603	83403	乳頭狀癌	男 Male	1,019	0	0	0	7
83413	83423	PAPILLARY CARCINOMA	女 Female	3,040	0	0	2	27
83433	83443							
83503								
82903	83303	濾泡性癌	男 Male	67	0	0	0	1
83313	83323	FOLLICULAR CARCINOMA	女 Female	167	0	0	3	6
83353	83393							
83453	83473	髓質癌	男 Male	14	0	0	0	0
85103		MEDULLARY CARCINOMA	女 Female	24	0	0	0	0
80203	80213	未分化癌	男 Male	13	0	0	0	0
		UNDIFFERENTIATED (ANAPLASTIC) CARCINOMA	女 Female	25	0	0	0	0
80703	81403	其他特定上皮癌	男 Male	15	0	0	0	1
82003	83103	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	17	0	0	0	0
83373	85863							
80103	83483	非特定上皮癌	男 Male	7	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	11	0	0	0	0
88003		惡性肉瘤	男 Male	1	0	0	0	0
		SARCOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003	82633	其他惡性腫瘤	男 Male	7	0	0	0	0
		OTHER MALIGNANCY	女 Female	18	0	0	0	0
		總計	男 Male	1,143	0	0	0	9
		TOTAL	女 Female	3,302	0	0	5	33

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
15	50	66	115	117	148	136	134	104	67	33	16	9	2
79	112	219	322	315	411	453	412	325	192	81	56	26	8
1	4	3	3	6	3	6	5	11	9	4	5	5	1
5	10	10	20	11	21	16	11	15	17	10	7	3	2
0	0	3	1	0	0	1	5	3	0	0	1	0	0
0	2	0	1	3	3	4	3	3	0	2	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	4	0
0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	5	4	6	0
0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	1	2	2	0
0	0	0	2	1	3	4	0	2	2	0	1	1	1
0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	2	0
0	0	1	0	2	1	0	1	2	1	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	0
0	2	1	0	0	1	1	4	0	2	0	0	2	5
16	54	72	119	126	154	146	147	124	81	43	26	23	3
84	126	231	345	332	440	479	434	349	218	99	71	40	16

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

其他內分泌腺

OTHER ENDOCRINE GLANDS　C74 - C75

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
94903 95003	神經母細胞瘤	男 Male	8	8	0	0	0
	NEUROBLASTOMA	女 Female	7	5	2	0	0
83703	腎上腺皮質癌	男 Male	9	0	0	0	0
	ADRENAL CORTICAL CARCINOMA	女 Female	21	1	0	0	0
86803 86923	惡性嗜鉻細胞瘤	男 Male	25	0	0	0	1
87003	MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA	女 Female	48	0	0	0	0
81403	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	3	0	0	0	0
80103 80333	非特定上皮癌	男 Male	5	0	0	0	0
	CARCINOMA, NOS	女 Female	4	0	0	0	0
88153	惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
	SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
90643 90703	生殖細胞瘤	男 Male	21	0	2	2	7
90853	GERM CELL TUMORS	女 Female	2	0	0	1	1
80003 93623	其他惡性腫瘤	男 Male	8	1	0	2	0
93703 94003	OTHER MALIGNANCY	女 Female	5	0	0	0	0
94013 94403							
95103 95303							
	總計	男 Male	80	9	2	4	8
	TOTAL	女 Female	91	6	2	1	1

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	4	2	0	1	0	0
1	1	0	3	1	3	1	4	2	0	1	2	1	0
1	0	3	5	3	4	2	3	1	1	1	0	0	0
1	7	0	3	4	8	2	7	5	5	1	1	3	1
0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
8	4	4	6	4	4	2	6	9	6	2	2	0	0
2	8	1	7	5	11	4	13	9	8	4	4	4	1

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

其他分界不明的部位

OTHER AND ILL-DEFINED SITES　C76

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
80703	80713	鱗狀細胞癌	男 Male	41	0	0	0	0
80723		SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	8	0	0	0	0
81403		非特定之腺癌	男 Male	1	0	0	0	0
		ADENOCARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
80413	80823	其他特定上皮癌	男 Male	4	0	0	0	0
84703	88063	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80103	80333	非特定上皮癌	男 Male	8	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	1	0	0	0	0
88903		其他惡性肉瘤	男 Male	0	0	0	0	0
		OTHER SARCOMA	女 Female	1	0	0	0	0
80003	82493	其他惡性腫瘤	男 Male	4	0	0	2	0
86803	93643	OTHER MALIGNANCY	女 Female	3	0	0	0	0
		總計	男 Male	58	0	0	2	0
		TOTAL	女 Female	14	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	3	5	4	6	6	7	4	4	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	3	6	6	8	8	9	6	5	2	1
0	1	0	1	0	0	0	2	2	3	2	3	0	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

不明原發部位

UNKNOWN PRIMARY SITES　C80

ICD-O-3		組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
81403	82533	腺癌	男 Male	76	0	0	0	0
84803	84813	ADENOCARCINOMA	女 Female	86	0	0	0	0
80703	80713	鱗狀細胞癌	男 Male	52	0	0	0	0
80723	80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA	女 Female	18	0	0	0	0
80203		未分化癌	男 Male	2	0	0	0	0
		CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED	女 Female	1	0	0	0	0
80413		小細胞癌	男 Male	14	0	0	0	0
		SMALL CELL CARCINOMA	女 Female	5	0	0	0	0
80333	80463	其他特定上皮癌	男 Male	42	0	0	0	0
81203	82403	OTHER SPECIFIED CARCINOMA	女 Female	23	0	0	0	0
82463	82493							
82603	83123							
84613	84903							
85003	85503							
85763	89823							
90703	91003							
80103		非特定上皮癌	男 Male	92	0	0	0	0
		CARCINOMA, NOS	女 Female	63	0	0	0	0
88003	88103	惡性肉瘤	男 Male	4	0	0	0	0
88903	89013	SARCOMA	女 Female	6	0	0	0	0
89363	93643							

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
1	0	0	0	4	2	4	14	7	11	8	9	8	8
0	0	0	1	2	2	7	3	7	4	12	16	13	19
0	0	0	1	1	3	7	10	11	6	4	3	2	4
0	0	0	1	0	2	1	4	1	2	0	1	2	4
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	3	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1
0	0	1	2	2	3	2	2	7	8	3	7	2	3
0	0	2	1	0	1	1	3	4	2	2	2	1	4
1	0	0	0	2	4	7	11	19	18	5	7	5	13
0	0	0	0	0	2	3	15	5	6	2	6	9	15
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0

表七　台灣癌症申報發生人數按癌症組織形態、性別及年齡分類，民國 107 年（續）

AGE DISTRIBUTION OF CANCER MORPHOLOGY BY GENDER AND PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018 (CONTINUED)

不明原發部位（續）

UNKNOWN PRIMARY SITES　C80（CONTINUED）

ICD-O-3	組織形態 MORPHOLOGY	性別 GENDER	個案數 CASE NUMBER	0 | 4	5 | 9	10 | 14	15 | 19
87203	惡性黑色素瘤	男 Male	2	0	0	0	0
	MALIGNANT MELANOMA	女 Female	0	0	0	0	0
80003 80013	其他惡性腫瘤	男 Male	70	0	0	0	1
80133 86203	OTHER MALIGNANCY	女 Female	87	0	0	0	0
88063 90643							
91333 92703							
	總計	男 Male	354	0	0	0	1
	TOTAL	女 Female	289	0	0	0	0

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。白血病及惡性淋巴瘤請見表一之二。

20 | 24	25 | 29	30 | 34	35 | 39	40 | 44	45 | 49	50 | 54	55 | 59	60 | 64	65 | 69	70 | 74	75 | 79	80 | 84	85+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	3	3	5	13	5	10	9	18
0	0	0	2	1	1	1	4	6	6	7	7	16	36
3	0	1	4	10	15	26	41	51	59	28	40	29	46
0	0	2	5	3	8	13	29	25	23	24	36	42	79

表八　台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 107 年

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018

ICD-O-3	原　發　部　位　別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	**全癌症（不含白血病與惡性淋巴瘤）** **ALL SITES（excludes leukemia and lymphoma）**	**109,835**
C00-C14	**唇、口腔及咽** **LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX**	**10,007**
C00-C14[2]	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	8,170
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP（excludes skin of lip C44.0）	287
C01-C02	舌 TONGUE	2,235
C03	齒齦 GUM	821
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	250
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2,448
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	913
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	1,201
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	15
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	347
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,490
C15-C26, C48	**消化器官及腹膜** **DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM**	**39,064**
C15	食道 ESOPHAGUS	2,778
C16	胃 STOMACH	3,798
C17	小腸 SMALL INTESTINE	421

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好 Well differentiated Grade 1	中度分化 Moderately differentiated Grade 2	分化不良 Poorly differentiated Grade 3	未分化 Anaplastic Grade 4	Grade 5	高度分化 Low grade	低度分化 High grade	未詳述 Not determined	
11,728	**37,840**	**16,813**	**2,905**	**1,636**	**615**	**3,803**	**34,495**	**C00-C80**
1,478	**4,758**	**1,163**	**1,130**	**-**	**3**	**1**	**1,474**	**C00-C14**
1,463	4,650	900	16	-	-	-	1,141	C00-C14[2]
103	136	16	1	-	-	-	31	C00
406	1,408	227	5	-	-	-	189	C01-C02
197	488	63	-	-	-	-	73	C03
38	166	27	1	-	-	-	18	C04
637	1,379	173	4	-	-	-	255	C05-C06
58	387	207	4	-	-	-	257	C09-C10
23	679	187	1	-	-	-	311	C12-C13
1	7	-	-	-	-	-	7	C14
13	89	25	24	-	3	1	192	C07-C08
2	19	238	1,090	-	-	-	141	C11
2,705	**16,942**	**5,359**	**119**	**-**	**177**	**262**	**13,500**	**C15-C26, C48**
61	1,520	596	-	-	1	2	598	C15
182	949	1,895	2	-	42	122	606	C16
36	60	48	4	-	113	77	83	C17

表八　台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 107 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	16,525
C18	結腸 COLON	10,549
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	5,976
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	11,342
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	1,129
C25	胰 PANCREAS	2,750
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	298
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	23
C30-C39	**呼吸系統及胸腔內器官** **RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS**	**17,039**
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	227
C32	喉 LARYNX	795
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	15,345
C38.4	胸膜 PLEURA	92
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	580
C40-C41	**骨、關節及關節軟骨** **BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE**	**159**
C47, C49	**結締組織、軟組織及其他皮下組織** **CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES**	**632**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

3. 白血病：ICD-O-3　M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好 Well differentiated Grade 1	中度分化 Moderately differentiated Grade 2	分化不良 Poorly differentiated Grade 3	未分化 Anaplastic Grade 4	Grade 5	高度分化 Low grade	低度分化 High grade	未詳述 Not determined	
1,744	10,956	1,184	48	-	16	11	2,566	C18-C21
984	7,184	863	36	-	3	1	1,478	C18
760	3,772	321	12	-	13	10	1,088	C19-C21
402	2,453	1,208	61	-	-	-	7,218	C22
107	410	152	-	-	-	-	460	C23-C24
151	555	233	-	-	-	-	1,811	C25
22	39	42	3	-	5	50	137	C48
-	-	1	1	-	-	-	21	C26
1,627	**4,629**	**3,430**	**46**	**-**	**1**	**1**	**7,305**	**C30-C39**
11	56	56	4	-	-	1	99	C30-C31
52	444	88	-	-	-	-	211	C32
1,557	4,108	3,230	37	-	1	-	6,412	C33-C34
-	1	2	1	-	-	-	88	C38.4
7	20	54	4	-	-	-	495	C37-C38.3, C38.8
10	**20**	**33**	**1**	**-**	**-**	**12**	**83**	**C40-C41**
86	**115**	**158**	**18**	**-**	**-**	**-**	**255**	**C47, C49**

表八　台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 107 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C44	**皮膚** **SKIN**	**4,049**
C44[4]	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	279
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	3,770
C50	**女性乳房** **FEMALE BREAST**	**14,217**
C50	**男性乳房** **MALE BREAST**	**60**
C51-C58	**女性生殖器官** **FEMALE GENITAL ORGANS**	**5,961**
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	6
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,433
C54	子宮體 CORPUS UTERI	2,787
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,557
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	178
C60-C63	**男性生殖器官** **MALE GENITAL ORGANS**	**7,037**
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	6,644
C62	睪丸 TESTIS	277
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	116
C64-C68	**泌尿器官** **URINARY TRACT**	**5,420**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3　C44，　M-87203 - M-87903。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好 Well differentiated Grade 1	中度分化 Moderately differentiated Grade 2	分化不良 Poorly differentiated Grade 3	未分化 Anaplastic Grade 4	Grade 5	高度分化 Low grade	低度分化 High grade	未詳述 Not determined	
516	**609**	**93**	**28**	**-**	**-**	**-**	**2,803**	**C44**
-	1	2	-	-	-	-	276	C44[4]
516	608	91	28	-	-	-	2,527	C44
2,204	**7,026**	**3,718**	**35**	**-**	**15**	**65**	**1,154**	**C50**
3	**40**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**C50**
1,179	**1,634**	**1,211**	**10**	**-**	**71**	**441**	**1,415**	**C51-C58**
-	-	-	-	-	1	2	3	C55
77	564	285	2	-	-	-	505	C53
978	847	588	7	-	36	56	275	C54
113	188	311	1	-	34	382	528	C56, C57.0-C57.4
11	35	27	-	-	-	1	104	C51-C52, C57.7-C57.9
1,392	**1,234**	**1,147**	**1,062**	**1,636**	**-**	**-**	**566**	**C60-C63**
1,372	1,202	1,129	1,061	1,636	-	-	244	C61
1	1	2	1	-	-	-	272	C62
19	31	16	-	-	-	-	50	C60,C63
168	**644**	**289**	**74**	**-**	**335**	**2,992**	**918**	**C64-C68**

表八　台灣癌症申報發生人數按原發部位及組織學分化程度分類，民國 107 年（續）

HISTOLOGIC GRADING AND DIFFERENTIATION IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2018（CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,239
C64	腎 KIDNEY	1,473
C65	腎盂 RENAL PELVIS	964
C66	輸尿管 URETER	674
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	45
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	5
C68.9	泌尿系統，非特定部位 URINARY SYSTEM, NOS	20
C69	**眼及淚腺** **EYE AND LACRIMAL GLAND**	**54**
C70-C72	**中樞神經系統** **BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM**	**797**
C71	腦 BRAIN	719
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	78
C73	**甲狀腺** **THYROID GLAND**	**4,445**
C74-C75	**其他內分泌腺** **OTHER ENDOCRINE GLANDS**	**171**
C76	**其他分界不明的部位** **OTHER AND ILL-DEFINED SITES**	**72**
C80	**不明原發部位** **UNKNOWN PRIMARY SITES**	**643**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 p.496 附錄五。

分級或分化程度 Histologic grading and differentiation								ICD-O-3
分化良好 Well differentiated Grade 1	中度分化 Moderately differentiated Grade 2	分化不良 Poorly differentiated Grade 3	未分化 Anaplastic Grade 4	Grade 5	高度分化 Low grade	低度分化 High grade	未詳述 Not determined	
2	16	20	-	-	235	1,744	222	C67
163	613	248	68	-	-	-	381	C64
3	7	12	5	-	53	699	185	C65
-	4	3	1	-	44	522	100	C66
-	4	4	-	-	2	22	13	C68.0-C68.1
-	-	1	-	-	-	-	4	C68.8
-	-	1	-	-	1	5	13	C68.9
3	**14**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30**	**C69**
14	**119**	**126**	**340**	**-**	**2**	**24**	**172**	**C70-C72**
11	92	107	337	-	2	23	147	C71
3	27	19	3	-	-	1	25	C70, C72
341	**48**	**50**	**34**	**-**	**-**	**-**	**3,972**	**C73**
1	**5**	**10**	**4**	**-**	**11**	**5**	**135**	**C74-C75**
1	**1**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**	**66**	**C76**
-	**1**	**7**	**3**	**-**	**-**	**-**	**632**	**C80**

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018

醫院代碼 ／ 醫院		原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
			Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0101	國立臺灣大學醫學院附設醫院	106	9,778	20	206	93	15	223	64	69	0	53
		107	10,147	22	223	81	18	221	58	75	0	35
		增減數	369	2	17	-12	3	-2	-6	6	0	-18
0102	臺北榮民總醫院	106	8,200	10	121	57	13	122	44	73	3	28
		107	8,526	14	119	60	14	139	46	65	0	20
		增減數	326	4	-2	3	1	17	2	-8	-3	-8
0103	三軍總醫院附設民眾診療服務處	106	2,903	7	41	16	6	49	14	14	0	6
		107	3,203	12	36	22	4	50	21	14	1	7
		增減數	300	5	-5	6	-2	1	7	0	1	1
0104	臺北市立聯合醫院中興院區	106	360	0	2	1	0	2	0	2	0	0
		107	351	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		增減數	-9	0	-2	-1	0	0	0	-2	0	0
0105	臺北市立聯合醫院仁愛院區	106	1,058	0	2	1	0	1	1	4	0	2
		107	1,072	0	5	1	1	3	6	3	0	0
		增減數	14	0	3	0	1	2	5	-1	0	-2
0106	臺北市立聯合醫院和平院區	106	245	1	2	0	0	1	0	1	0	0
		107	288	0	5	0	0	2	0	0	0	0
		增減數	43	-1	3	0	0	1	0	-1	0	0
0107	國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院	106	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		107	41	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		增減數	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0108	基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	106	482	0	4	1	0	2	0	1	0	2
		107	458	0	1	1	0	1	1	0	0	0
		增減數	-24	0	-3	0	0	-1	1	-1	0	-2
0109	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	106	4,424	9	71	31	10	68	28	35	1	9
		107	4,654	9	69	38	11	77	30	34	2	19
		增減數	230	0	-2	7	1	9	2	-1	1	10
0110	臺北醫學大學附設醫院	106	1,757	4	17	12	1	22	5	5	0	8
		107	1,770	4	21	11	2	26	3	8	1	4
		增減數	13	0	4	-1	1	4	-2	3	1	-4
0111	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	106	10,854	28	295	128	21	301	84	153	9	26
		107	10,987	37	291	168	31	345	90	159	0	34
		增減數	133	9	-4	40	10	44	6	6	-9	8
0113	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	106	1,756	2	22	10	1	21	5	5	1	4
		107	1,642	0	25	5	4	19	4	6	0	5
		增減數	-114	-2	3	-5	3	-2	-1	1	-1	1
0114	宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院	106	50	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		107	59	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		增減數	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
162	253	270	38	501	273	811	78	336	24	0	24	59	1,723	0101
166	213	278	24	482	253	749	102	360	30	0	26	58	1,780	
4	-40	8	-14	-19	-20	-62	24	24	6	0	2	-1	57	
86	175	268	23	637	389	652	76	235	21	2	14	54	1,158	0102
82	155	313	31	664	376	646	89	258	39	2	17	73	1,234	
-4	-20	45	8	27	-13	-6	13	23	18	0	3	19	76	
44	69	104	12	209	149	214	36	49	9	2	2	20	433	0103
41	55	122	12	236	123	221	30	71	18	1	6	16	493	
-3	-14	18	0	27	-26	7	-6	22	9	-1	4	-4	60	
2	5	16	2	63	37	23	0	7	0	0	0	0	25	0104
1	7	19	3	45	24	20	4	6	1	0	0	0	28	
-1	2	3	1	-18	-13	-3	4	-1	1	0	0	0	3	
3	20	40	2	168	60	118	10	26	2	0	1	4	84	0105
10	23	60	2	138	63	88	5	32	1	0	1	5	102	
7	3	20	0	-30	3	-30	-5	6	-1	0	0	1	18	
7	10	16	0	46	22	18	5	3	0	0	0	1	32	0106
7	6	22	1	50	29	13	3	3	0	0	2	3	24	
0	-4	6	1	4	7	-5	-2	0	0	0	2	2	-8	
0	2	4	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0107
0	0	6	0	10	2	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	-2	2	0	3	-3	0	0	0	1	0	0	0	0	
4	5	15	2	34	37	7	1	3	1	0	0	1	10	0108
1	3	8	0	29	19	8	2	1	1	0	1	0	14	
-3	-2	-7	-2	-5	-18	1	1	-2	0	0	1	-1	4	
41	94	142	19	542	294	265	24	75	12	0	9	20	444	0109
49	91	159	11	488	249	274	31	73	22	0	6	24	474	
8	-3	17	-8	-54	-45	9	7	-2	10	0	-3	4	30	
17	13	46	3	178	127	69	7	30	4	0	3	2	173	0110
15	24	52	4	165	101	83	9	34	2	0	4	1	167	
-2	11	6	1	-13	-26	14	2	4	-2	0	1	-1	-6	
159	288	335	48	934	494	992	105	223	42	5	34	68	1,151	0111
184	266	313	30	822	453	942	100	232	37	7	30	78	1,300	
25	-22	-22	-18	-112	-41	-50	-5	9	-5	2	-4	10	149	
22	19	58	7	160	116	111	4	33	3	0	3	7	291	0113
15	27	66	2	121	78	85	7	23	7	0	1	6	326	
-7	8	8	-5	-39	-38	-26	3	-10	4	0	-2	-1	35	
0	0	4	1	7	2	6	0	0	0	0	0	0	9	0114
0	0	4	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	7	
0	0	0	-1	-6	4	0	0	0	0	0	0	0	-2	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
0101	106	6	56	324	14	52	200	1,316	4	0	230	229	110	14
	107	13	86	423	11	79	191	1,412	2	1	232	227	134	26
	增減數	7	30	99	-3	27	-9	96	-2	1	2	-2	24	12
0102	106	8	51	228	45	73	117	999	5	0	224	172	144	17
	107	8	57	190	59	79	108	1,046	2	0	211	201	105	20
	增減數	0	6	-38	14	6	-9	47	-3	0	-13	29	-39	3
0103	106	1	13	43	4	16	54	544	1	0	89	67	58	1
	107	3	14	50	0	16	59	563	1	0	70	76	47	10
	增減數	2	1	7	-4	0	5	19	0	0	-19	9	-11	9
0104	106	0	1	2	0	2	8	91	1	0	7	6	1	0
	107	0	3	2	0	0	8	115	2	0	10	8	1	2
	增減數	0	2	0	0	-2	0	24	1	0	3	2	0	2
0105	106	0	2	12	1	5	19	221	0	0	17	13	4	1
	107	0	2	9	0	3	10	241	1	0	23	13	4	0
	增減數	0	0	-3	-1	-2	-9	20	1	0	6	0	0	-1
0106	106	0	0	0	0	3	12	20	0	0	4	2	0	0
	107	0	0	0	0	1	16	49	0	0	8	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	-2	4	29	0	0	4	0	0	0
0107	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	7	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0
0108	106	0	1	0	0	2	3	211	3	0	46	21	4	0
	107	0	0	0	0	1	8	216	1	0	40	23	2	1
	增減數	0	-1	0	0	-1	5	5	-2	0	-6	2	-2	1
0109	106	1	18	56	5	10	134	762	2	0	278	180	74	20
	107	4	16	88	5	29	151	820	2	0	361	157	67	13
	增減數	3	-2	32	0	19	17	58	0	0	83	-23	-7	-7
0110	106	0	6	25	1	4	28	524	0	0	47	51	34	4
	107	0	7	21	3	5	26	490	1	0	48	75	40	2
	增減數	0	1	-4	2	1	-2	-34	1	0	1	24	6	-2
0111	106	3	43	291	16	64	309	1,328	6	0	397	380	144	38
	107	3	54	320	19	62	341	1,285	1	0	392	400	144	29
	增減數	0	11	29	3	-2	32	-43	-5	0	-5	20	0	-9
0113	106	1	9	14	1	3	35	272	1	0	77	67	31	3
	107	0	7	20	0	1	36	256	3	0	74	52	42	3
	增減數	-1	-2	6	-1	-2	1	-16	2	0	-3	-15	11	0
0114	106	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	1	0	0
	107	0	1	1	0	0	1	9	0	0	1	1	3	1
	增減數	0	1	1	0	0	1	0	0	0	-1	0	3	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
457	20	6	195	117	134	13	77	7	398	17	0	41	445	0101
507	19	4	187	111	145	9	58	7	447	28	3	38	493	
50	-1	-2	-8	-6	11	-4	-19	0	49	11	3	-3	48	
474	21	9	226	169	181	7	123	7	299	7	0	49	284	0102
526	11	3	207	178	176	5	144	14	312	25	1	41	341	
52	-10	-6	-19	9	-5	-2	21	7	13	18	1	-8	57	
124	14	3	73	42	42	1	16	0	86	3	0	3	100	0103
182	14	6	85	53	49	1	13	1	137	9	2	19	111	
58	0	3	12	11	7	0	-3	1	51	6	2	16	11	
15	1	0	12	4	4	0	1	0	3	0	0	6	8	0104
16	0	1	9	0	1	0	3	0	1	0	0	3	6	
1	-1	1	-3	-4	-3	0	2	0	-2	0	0	-3	-2	
67	1	1	24	19	25	0	5	0	37	0	0	4	31	0105
71	3	1	31	12	16	0	0	0	41	1	0	5	36	
4	2	0	7	-7	-9	0	-5	0	4	1	0	1	5	
14	1	0	6	0	7	0	2	0	1	0	0	6	2	0106
20	0	0	6	0	0	0	1	0	5	0	0	6	4	
6	-1	0	0	0	-7	0	-1	0	4	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
27	0	0	12	0	11	0	1	0	4	0	0	2	4	0108
35	1	0	18	2	13	0	0	0	3	0	0	2	1	
8	1	0	6	2	2	0	-1	0	-1	0	0	0	-3	
156	2	4	91	34	55	0	14	0	133	1	1	29	121	0109
188	5	2	93	38	35	1	10	1	163	4	1	49	111	
32	3	-2	2	4	-20	1	-4	1	30	3	0	20	-10	
83	4	1	26	19	17	0	14	0	66	0	0	7	50	0110
116	3	0	36	16	15	0	10	0	49	5	0	7	54	
33	-1	-1	10	-3	-2	0	-4	0	-17	5	0	0	4	
428	29	10	283	130	183	21	131	3	257	21	0	37	378	0111
454	28	11	237	164	154	27	138	7	322	21	7	32	385	
26	-1	1	-46	34	-29	6	7	4	65	0	7	-5	7	
90	2	2	32	23	28	0	7	3	92	0	0	6	52	0113
116	5	1	36	9	11	0	3	1	78	2	1	10	43	
26	3	-1	4	-14	-17	0	-4	-2	-14	2	1	4	-9	
2	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0114
7	0	0	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	
5	0	0	4	1	-2	0	-1	0	0	0	0	0	1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0115 中山醫療社團法人中山醫院	106	173	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	137	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-36	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
0119 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處	106	81	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-17	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
0122 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院	106	59	1	1	3	0	0	0	0	0	0
	107	86	1	3	2	0	1	0	0	0	0
	增減數	27	0	2	-1	0	1	0	0	0	0
0124 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院	106	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0125 博仁綜合醫院	106	44	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	107	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	增減數	10	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
0127 臺北市立聯合醫院婦幼院區	106	257	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	107	193	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	-64	0	0	0	0	1	-1	0	0	0
0128 臺北市立聯合醫院陽明院區	106	133	0	1	1	1	2	0	1	0	1
	107	102	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-31	0	0	0	-1	-2	0	-1	0	-1
0130 西園醫療社團法人西園醫院	106	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	161	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	增減數	-4	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0140 臺北市立聯合醫院忠孝院區	106	262	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	107	311	1	0	0	0	4	0	0	0	0
	增減數	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0141 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	106	3,769	3	64	20	7	77	26	40	0	11
	107	3,573	3	64	31	6	55	27	34	0	16
	增減數	-196	0	0	11	-1	-22	1	-6	0	5
0142 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	106	1,542	7	37	17	2	42	11	8	0	4
	107	1,535	4	32	10	3	41	7	12	0	3
	增減數	-7	-3	-5	-7	1	-1	-4	4	0	-1
0143 振興醫療財團法人振興醫院	106	1,487	1	18	6	1	20	9	8	1	13
	107	1,614	1	13	7	1	18	9	5	0	1
	增減數	127	0	-5	1	0	-2	0	-3	-1	-12
0145 臺北市立萬芳醫院－委託財團法人臺北醫學大學辦理	106	1,241	3	20	12	3	26	8	5	0	4
	107	1,313	3	14	11	3	21	9	12	0	3
	增減數	72	0	-6	-1	0	-5	1	7	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	1	2	0	7	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0115
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-1	0	-6	-7	0	0	-1	0	0	0	0	0	
0	0	5	0	14	7	4	1	3	0	0	0	0	2	0119
0	0	3	0	9	4	5	1	6	0	0	0	0	1	
0	0	-2	0	-5	-3	1	0	3	0	0	0	0	-1	
0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0122
0	0	1	0	12	5	0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	-1	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0124
0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	0	0	6	1	4	0	1	0	0	0	0	6	0125
2	1	6	0	9	1	7	0	1	0	0	0	0	8	
2	-1	6	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	
3	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0127
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
-1	-2	-1	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	3	2	0	19	10	4	1	1	0	0	0	0	7	0128
2	1	7	0	9	7	2	2	4	0	0	0	1	6	
0	-2	5	0	-10	-3	-2	1	3	0	0	0	1	-1	
0	1	7	1	18	12	4	0	1	0	0	0	1	2	0130
0	0	7	1	13	9	3	0	0	0	0	0	0	1	
0	-1	0	0	-5	-3	-1	0	-1	0	0	0	-1	-1	
1	8	14	0	36	15	19	3	7	1	0	0	5	33	0140
3	4	15	1	42	13	31	2	3	0	0	2	2	33	
2	-4	1	1	6	-2	12	-1	-4	-1	0	2	-3	0	
74	91	115	11	210	154	204	11	75	10	0	9	10	376	0141
74	75	113	5	202	137	176	27	64	5	0	8	16	383	
0	-16	-2	-6	-8	-17	-28	16	-11	-5	0	-1	6	7	
15	37	64	4	170	71	115	21	36	2	0	1	13	192	0142
16	35	47	6	136	87	125	11	25	1	0	2	11	198	
1	-2	-17	2	-34	16	10	-10	-11	-1	0	1	-2	6	
18	22	61	4	131	70	94	21	35	1	0	6	16	206	0143
31	26	54	5	138	76	124	12	39	3	0	5	17	222	
13	4	-7	1	7	6	30	-9	4	2	0	-1	1	16	
15	19	55	4	129	71	69	7	29	4	0	5	10	147	0145
12	19	72	2	138	88	73	9	30	4	0	3	11	149	
-3	0	17	-2	9	17	4	2	1	0	0	-2	1	2	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0115	106	0	0	0	0	0	2	83	0	0	35	17	3	1
	107	0	0	0	0	0	0	55	0	0	41	23	2	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	-28	0	0	6	6	-1	-1
0119	106	0	0	0	0	0	1	7	0	0	3	1	1	0
	107	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-4	0	0	-1	0	-1	0
0122	106	0	0	0	0	0	0	8	0	0	10	7	7	0
	107	0	0	0	0	1	1	12	0	0	8	13	6	2
	增減數	0	0	0	0	1	1	4	0	0	-2	6	-1	2
0124	106	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
0125	106	1	0	0	0	3	2	3	0	0	4	0	0	0
	107	0	0	0	0	1	2	6	0	0	1	0	1	0
	增減數	-1	0	0	0	-2	0	3	0	0	-3	0	1	0
0127	106	0	0	0	0	0	0	179	1	0	40	14	2	2
	107	0	0	0	0	0	0	147	0	0	28	10	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-32	-1	0	-12	-4	-1	-2
0128	106	0	0	0	0	3	2	29	0	0	15	6	1	0
	107	0	0	0	0	0	1	25	0	0	4	5	0	0
	增減數	0	0	0	0	-3	-1	-4	0	0	-11	-1	-1	0
0130	106	0	0	0	0	1	4	13	0	0	3	0	0	0
	107	0	0	0	0	1	5	13	0	0	2	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	2	0	0
0140	106	0	1	0	0	2	10	25	2	0	5	5	1	0
	107	0	1	2	0	2	21	36	0	0	7	2	0	0
	增減數	0	0	2	0	0	11	11	-2	0	2	-3	-1	0
0141	106	2	12	32	1	31	11	1,174	3	2	86	95	69	4
	107	1	11	40	5	28	20	1,065	2	0	82	102	45	8
	增減數	-1	-1	8	4	-3	9	-109	-1	-2	-4	7	-24	4
0142	106	2	15	12	1	3	9	246	4	0	36	28	19	0
	107	0	14	12	1	7	28	274	0	0	29	43	14	0
	增減數	-2	-1	0	0	4	19	28	-4	0	-7	15	-5	0
0143	106	0	9	8	0	7	29	273	2	0	37	19	19	3
	107	1	8	18	0	6	29	295	2	0	38	45	17	6
	增減數	1	-1	10	0	-1	0	22	0	0	1	26	-2	3
0145	106	1	8	26	0	6	45	162	1	0	42	31	10	2
	107	0	9	28	2	6	62	181	1	0	41	28	17	1
	增減數	-1	1	2	2	0	17	19	0	0	-1	-3	7	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
2	2	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0115
1	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	
-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
14	0	1	7	3	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0119
15	1	0	5	1	2	0	0	0	3	1	0	1	0	
1	1	-1	-2	-2	1	0	-1	0	0	1	0	1	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0122
0	0	0	1	0	1	0	0	0	13	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	-2	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0124
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0125
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0127
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	-2	
12	0	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0128
9	0	0	10	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	
-3	0	-2	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	-2	
17	0	0	4	1	3	0	0	0	71	0	0	0	1	0130
23	1	0	7	1	5	0	0	0	63	0	0	0	1	
6	1	0	3	0	2	0	0	0	-8	0	0	0	0	
19	1	0	19	6	6	0	3	0	5	0	0	2	4	0140
40	1	1	17	2	10	0	0	0	6	0	0	2	5	
21	0	1	-2	-4	4	0	-3	0	1	0	0	0	1	
170	11	4	62	47	51	1	7	2	136	3	0	25	130	0141
193	12	1	63	47	49	2	8	2	107	4	1	37	117	
23	1	-3	1	0	-2	1	1	0	-29	1	1	12	-13	
103	3	0	68	33	29	0	4	1	16	0	0	6	35	0142
122	5	0	46	21	24	0	0	0	34	2	0	6	41	
19	2	0	-22	-12	-5	0	-4	-1	18	2	0	0	6	
80	4	2	44	21	24	0	7	0	75	1	0	18	43	0143
105	2	3	53	19	24	0	8	2	63	2	0	19	42	
25	-2	1	9	-2	0	0	1	2	-12	1	0	1	-1	
84	2	1	40	15	15	0	7	0	46	4	1	7	40	0145
89	3	3	37	13	22	1	4	0	33	2	0	6	37	
5	1	2	-3	-2	7	1	-3	0	-13	-2	-1	-1	-3	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計 Total	唇(唇的皮膚 C44.0 除外) C00	舌 C01-C02	齒齦 C03	口底 C04	口腔之其他及未詳細說明部位 C05-C06	口咽 C09-C10	下咽 C12-C13	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14	主唾液腺 C07-C08
0146 衛生福利部胸腔病院	106	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147 康寧醫療財團法人康寧醫院	106	133	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	125	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	-8	0	-1	0	0	1	0	0	0	0
0148 臺北市立關渡醫院－委託臺北榮民總醫院經營	106	89	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	107	50	0	2	0	0	1	0	0	1	0
	增減數	-39	0	2	-1	0	1	0	0	1	0
0150 中國醫藥大學附設醫院臺北分院	106	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 衛生福利部基隆醫院	106	193	0	4	1	0	3	3	3	0	1
	107	183	2	3	0	2	5	1	7	0	0
	增減數	-10	2	-1	-1	2	2	-2	4	0	-1
0203 醫療財團法人台灣區煤礦業基金會台灣礦工醫院	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處	106	98	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	107	80	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-18	0	1	1	0	-2	-2	0	0	0
0207 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	106	1,783	2	36	11	2	29	23	23	0	3
	107	1,791	5	36	18	7	28	8	25	0	5
	增減數	8	3	0	7	5	-1	-15	2	0	2
0301 衛生福利部臺北醫院	106	340	1	3	1	0	8	1	5	0	0
	107	329	0	6	0	0	5	5	5	0	0
	增減數	-11	-1	3	-1	0	-3	4	0	0	0
0302 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	106	1,406	1	12	2	3	10	6	3	0	1
	107	1,336	2	11	5	3	13	6	3	1	2
	增減數	-70	1	-1	3	0	3	0	0	1	1
0303 板橋中興醫院	106	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 新北市立聯合醫院	106	234	0	2	0	0	2	4	3	0	0
	107	247	0	4	1	0	7	3	1	0	0
	增減數	13	0	2	1	0	5	-1	-2	0	0
0305 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	106	2,683	6	55	38	6	78	28	24	1	10
	107	2,865	10	55	37	6	70	28	19	1	8
	增減數	182	4	0	-1	0	-8	0	-5	0	-2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	
1	1	8	0	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0147
0	3	3	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	2	-5	1	-2	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	13	1	18	2	2	1	2	1	0	0	0	7	0148
0	2	13	0	6	2	1	0	1	0	0	0	0	2	
0	0	0	-1	-12	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-5	
0	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	24	0150
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-6	0	-1	0	0	0	0	0	0	-24	
4	9	19	0	15	15	9	2	2	0	0	0	5	13	0201
1	8	23	1	18	12	3	0	1	0	0	1	6	2	
-3	-1	4	1	3	-3	-6	-2	-1	0	0	1	1	-11	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
5	5	12	0	18	9	3	0	2	0	0	0	2	8	0204
1	6	7	0	19	14	3	0	0	0	0	0	0	4	
-4	1	-5	0	1	5	0	0	-2	0	0	0	-2	-4	
34	55	66	7	178	91	200	12	39	0	1	1	11	167	0207
20	59	64	0	186	93	156	16	40	2	0	3	19	174	
-14	4	-2	-7	8	2	-44	4	1	2	-1	2	8	7	
9	14	17	1	59	39	9	3	4	0	0	0	2	39	0301
7	15	30	1	75	18	10	1	7	0	0	0	0	40	
-2	1	13	0	16	-21	1	-2	3	0	0	0	-2	1	
17	22	49	6	399	99	53	19	26	0	0	1	9	98	0302
13	13	48	8	289	73	67	10	30	1	0	5	7	108	
-4	-9	-1	2	-110	-26	14	-9	4	1	0	4	-2	10	
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0303
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	8	1	33	23	8	0	0	0	0	0	0	3	0304
6	9	8	0	34	30	8	1	0	2	0	2	0	1	
2	6	0	-1	1	7	0	1	0	2	0	2	0	-2	
48	71	84	5	242	143	233	20	61	3	0	9	20	292	0305
52	78	94	6	306	168	254	24	64	8	0	5	27	303	
4	7	10	1	64	25	21	4	3	5	0	-4	7	11	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
0146	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147	106	0	0	0	0	0	1	89	0	0	11	5	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	86	0	0	8	10	1	1
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-3	0	0	-3	5	1	1
0148	106	0	0	1	0	0	8	10	0	0	5	0	0	0
	107	0	0	1	0	0	4	8	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-4	-2	0	0	-3	0	0	0
0150	106	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0201	106	0	0	0	0	2	5	9	0	0	3	2	0	0
	107	0	0	0	0	0	5	9	0	0	5	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	2	0	0	0
0203	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0204	106	1	0	1	0	0	3	7	0	0	1	3	0	0
	107	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	-2	-6	0	0	-1	-3	0	0
0207	106	1	3	43	2	3	19	233	2	0	58	34	10	6
	107	4	1	37	1	4	42	205	0	0	53	31	14	6
	增減數	3	-2	-6	-1	1	23	-28	-2	0	-5	-3	4	0
0301	106	1	1	3	0	3	10	36	0	0	14	8	0	0
	107	2	0	0	1	4	17	25	0	0	0	6	2	0
	增減數	1	-1	-3	1	1	7	-11	0	0	-14	-2	2	0
0302	106	0	0	10	0	6	30	183	0	0	32	22	5	2
	107	0	1	7	0	5	36	258	0	1	40	17	3	0
	增減數	0	1	-3	0	-1	6	75	0	1	8	-5	-2	-2
0303	106	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	3	-1	0	0	0	0	0	0
0304	106	0	0	0	0	2	5	59	0	0	4	7	0	0
	107	0	0	0	0	1	6	42	0	0	6	8	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	1	-17	0	0	2	1	0	0
0305	106	2	11	49	1	7	69	367	1	0	110	71	31	4
	107	0	8	38	1	9	74	374	0	0	115	65	39	4
	增減數	-2	-3	-11	0	2	5	7	-1	0	5	-6	8	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0147
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	
0	0	0	1	1	0	0	1	0	7	0	0	0	5	0148
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	
0	0	0	-1	-1	0	0	-1	0	-4	0	0	0	-4	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0150
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	2	0	25	1	3	0	1	0	1	0	0	11	3	0201
27	1	0	16	0	8	0	0	0	2	0	0	9	3	
10	-1	0	-9	-1	5	0	-1	0	1	0	0	-2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
6	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0204
9	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
3	0	-1	8	-1	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	
103	4	1	56	27	29	0	6	2	84	1	0	16	48	0207
105	2	1	61	32	25	2	6	1	144	2	1	4	43	
2	-2	0	5	5	-4	2	0	-1	60	1	1	-12	-5	
11	1	0	17	0	5	0	0	0	11	0	0	0	4	0301
16	0	2	14	4	4	0	0	0	7	0	0	0	0	
5	-1	2	-3	4	-1	0	0	0	-4	0	0	0	-4	
49	0	0	34	12	16	1	6	1	101	2	0	31	27	0302
70	1	0	23	22	10	0	5	0	88	1	1	12	17	
21	1	0	-11	10	-6	-1	-1	-1	-13	-1	1	-19	-10	
1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0303
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	0	1	12	1	6	0	0	0	0	0	0	3	6	0304
33	3	1	16	1	2	0	0	1	0	0	0	5	5	
-1	3	0	4	0	-4	0	0	1	0	0	0	2	-1	
125	3	2	74	32	38	0	15	0	98	4	1	21	70	0305
117	8	2	72	31	43	0	14	0	119	4	9	18	78	
-8	5	0	-2	-1	5	0	-1	0	21	0	8	-3	8	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0306 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	106	284	0	3	1	1	8	1	0	0	0
	107	289	0	5	0	1	2	0	3	0	0
	增減數	5	0	2	-1	0	-6	-1	3	0	0
0311 祐民醫院	106	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312 宏仁醫院	106	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
0314 板橋國泰醫院	106	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	106	644	0	4	3	0	8	2	1	0	0
	107	632	0	5	3	1	9	0	4	0	1
	增減數	-12	0	1	0	1	1	-2	3	0	1
0317 新泰綜合醫院	106	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318 仁愛醫院	106	33	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	107	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-2	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
0319 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	106	1,488	7	25	21	3	30	14	10	0	2
	107	1,593	4	15	13	5	27	12	6	0	7
	增減數	105	-3	-10	-8	2	-3	-2	-4	0	5
0320 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	106	755	5	16	9	5	16	6	8	0	4
	107	814	3	11	6	3	14	7	15	0	0
	增減數	59	-2	-5	-3	-2	-2	1	7	0	-4
0321 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	106	1,588	3	37	16	3	42	13	13	0	2
	107	1,913	3	29	11	2	45	15	19	1	8
	增減數	325	0	-8	-5	-1	3	2	6	1	6
0322 天主教輔仁大學附設醫院	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	153	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	增減數	153	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0401 國立陽明大學附設醫院	106	689	0	9	4	3	18	5	6	0	4
	107	728	2	10	5	1	16	4	8	0	1
	增減數	39	2	1	1	-2	-2	-1	2	0	-3
0402 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	106	935	0	20	2	5	20	11	12	1	5
	107	1,007	6	12	3	4	18	5	18	0	3
	增減數	72	6	-8	1	-1	-2	-6	6	-1	-2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
6	4	13	1	69	29	14	0	4	0	0	1	2	15	0306
5	9	13	0	75	19	5	1	3	0	0	1	2	12	
-1	5	0	-1	6	-10	-9	1	-1	0	0	0	0	-3	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0314
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	19	34	2	75	66	39	7	12	0	0	1	2	74	0315
1	23	32	3	81	53	37	5	4	2	1	1	4	83	
-1	4	-2	1	6	-13	-2	-2	-8	2	1	0	2	9	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0317
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	3	7	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0318
0	4	4	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	1	-3	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	
20	23	47	3	150	66	138	13	41	3	0	3	5	186	0319
19	26	59	6	155	79	112	10	46	7	0	3	13	211	
-1	3	12	3	5	13	-26	-3	5	4	0	0	8	25	
18	21	30	1	80	44	58	8	11	1	1	1	2	99	0320
12	31	39	0	74	54	50	12	21	3	0	1	9	116	
-6	10	9	-1	-6	10	-8	4	10	2	-1	0	7	17	
21	36	50	7	141	105	129	20	34	1	1	0	11	194	0321
30	42	63	8	248	100	132	16	29	6	0	3	5	241	
9	6	13	1	107	-5	3	-4	-5	5	-1	3	-6	47	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0322
0	0	2	0	3	2	2	2	10	0	0	1	0	2	
0	0	2	0	3	2	2	2	10	0	0	1	0	2	
7	19	39	1	78	29	78	12	11	1	0	1	4	105	0401
3	24	39	1	80	35	82	10	20	2	0	0	3	96	
-4	5	0	0	2	6	4	-2	9	1	0	-1	-1	-9	
14	24	39	3	62	38	122	3	25	2	0	3	16	99	0402
12	44	50	4	80	43	138	5	22	2	0	2	4	98	
-2	20	11	1	18	5	16	2	-3	0	0	-1	-12	-1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
0306	106	0	0	3	0	1	12	39	0	0	9	13	0	0
	107	0	0	3	0	1	19	52	1	0	16	12	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	7	13	1	0	7	-1	1	0
0311	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0312	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0314	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	0	0
0315	106	1	0	1	0	4	25	87	0	0	30	8	3	0
	107	2	2	1	1	3	32	79	1	0	39	11	2	1
	增減數	1	2	0	1	-1	7	-8	1	0	9	3	-1	1
0317	106	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
0318	106	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-2	0	2	0	0	0	0	0	0
0319	106	0	10	38	0	8	33	177	0	0	48	47	26	1
	107	1	4	40	4	9	31	207	0	0	36	39	30	2
	增減數	1	-6	2	4	1	-2	30	0	0	-12	-8	4	1
0320	106	1	5	7	0	3	13	98	1	0	34	20	10	3
	107	0	3	15	0	2	26	103	0	0	29	13	9	0
	增減數	-1	-2	8	0	-1	13	5	-1	0	-5	-7	-1	-3
0321	106	0	5	34	5	10	30	220	2	0	55	41	15	4
	107	1	14	19	3	7	53	275	2	1	65	52	20	3
	增減數	1	9	-15	-2	-3	23	55	0	1	10	11	5	-1
0322	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	4	0	0	1	4	82	1	0	0	1	3	0
	增減數	0	4	0	0	1	4	82	1	0	0	1	3	0
0401	106	0	1	7	2	1	11	109	1	0	11	6	2	1
	107	0	2	14	0	2	11	127	0	0	15	8	0	0
	增減數	0	1	7	-2	1	0	18	-1	0	4	2	-2	-1
0402	106	0	4	23	0	4	56	138	0	0	21	20	2	2
	107	1	3	17	1	3	46	128	1	0	32	21	9	6
	增減數	1	-1	-6	1	-1	-10	-10	1	0	11	1	7	4

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
12	0	1	11	1	1	0	0	0	1	0	0	2	6	0306
12	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	2	6	
0	0	-1	-6	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0312
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0314
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	3	0	22	7	10	0	1	0	7	0	0	7	14	0315
50	0	0	22	5	12	0	1	0	2	0	0	5	8	
-13	-3	0	0	-2	2	0	0	0	-5	0	0	-2	-6	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0317
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0318
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	3	1	38	21	22	0	8	0	54	1	0	12	48	0319
96	0	0	41	33	24	0	10	0	59	1	1	18	72	
14	-3	-1	3	12	2	0	2	0	5	0	1	6	24	
31	0	1	23	5	10	0	4	0	14	1	0	5	22	0320
34	1	2	19	9	7	1	4	0	34	0	1	4	17	
3	1	1	-4	4	-3	1	0	0	20	-1	1	-1	-5	
71	2	1	53	22	24	1	17	0	40	0	0	5	52	0321
119	2	2	59	24	27	0	14	1	39	2	0	5	48	
48	0	1	6	2	3	-1	-3	1	-1	2	0	0	-4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0322
1	1	0	2	8	7	0	3	0	7	1	0	0	0	
1	1	0	2	8	7	0	3	0	7	1	0	0	0	
40	2	0	21	3	5	0	2	0	15	0	0	4	11	0401
39	1	0	16	8	14	0	1	0	10	0	0	5	13	
-1	-1	0	-5	5	9	0	-1	0	-5	0	0	1	2	
31	1	2	33	11	15	0	1	0	17	0	0	3	24	0402
53	3	1	30	16	12	0	0	0	31	0	0	2	18	
22	2	-1	-3	5	-3	0	-1	0	14	0	0	-1	-6	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計 Total	唇(唇的皮膚 C44.0 除外) C00	舌 C01-C02	齒齦 C03	口底 C04	口腔之其他及未詳細說明部位 C05-C06	口咽 C09-C10	下咽 C12-C13	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14	主唾液腺 C07-C08
0403 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院	106	479	0	3	0	1	10	4	3	0	1
	107	430	0	1	0	1	4	2	2	0	0
	增減數	-49	0	-2	0	0	-6	-2	-1	0	-1
0404 臺北榮民總醫院蘇澳分院	106	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0406 財團法人蘭陽仁愛醫院	106	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0407 臺北榮民總醫院員山分院	106	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	106	2,081	2	34	14	5	31	15	14	0	5
	107	2,261	2	25	12	6	38	10	21	1	5
	增減數	180	0	-9	-2	1	7	-5	7	1	0
0503 臺北榮民總醫院新竹分院	106	66	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	107	66	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	-1	1	0	0	0	-1	0	0
0504 南門綜合醫院	106	97	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	91	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	增減數	-6	-1	-1	0	0	2	0	0	0	0
0505 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處	106	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0507 東元醫療社團法人東元綜合醫院	106	180	0	4	3	0	6	1	0	0	0
	107	187	1	7	4	0	6	2	0	0	0
	增減數	7	1	3	1	0	0	1	0	0	0
0509 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院	106	64	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	79	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	增減數	15	0	-1	0	0	1	1	0	0	0
0511 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院	106	44	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	41	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0513 新仁醫院	106	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0515 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	106	1,424	2	20	4	2	20	11	11	0	5
	107	1,581	1	26	8	3	25	27	18	0	4
	增減數	157	-1	6	4	1	5	16	7	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
6	13	28	1	52	23	57	3	17	0	0	1	3	70	0403
3	12	15	1	47	15	74	4	15	1	0	1	3	62	
-3	-1	-13	0	-5	-8	17	1	-2	1	0	0	0	-8	
0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0404
0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
0	-1	1	0	-1	1	-2	0	0	0	0	0	0	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0407
0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	4	
0	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
28	52	76	4	185	126	179	16	50	6	0	3	7	259	0501
17	57	63	12	214	104	166	21	66	5	0	2	10	340	
-11	5	-13	8	29	-22	-13	5	16	-1	0	-1	3	81	
1	2	3	0	6	2	8	0	4	0	0	0	0	8	0503
0	2	7	0	5	2	8	0	3	0	0	0	1	8	
-1	0	4	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	
0	2	7	0	28	22	5	0	2	0	0	0	0	1	0504
0	3	8	0	32	19	3	0	0	0	0	0	0	2	
0	1	1	0	4	-3	-2	0	-2	0	0	0	0	1	
1	1	6	0	7	4	5	0	0	0	0	0	0	4	0505
1	2	4	0	8	3	3	0	1	0	0	0	1	8	
0	1	-2	0	1	-1	-2	0	1	0	0	0	1	4	
1	4	9	0	28	21	8	1	5	1	0	0	0	13	0507
3	5	10	0	27	13	18	0	6	0	0	0	0	16	
2	1	1	0	-1	-8	10	-1	1	-1	0	0	0	3	
0	2	1	0	10	3	4	1	0	0	0	0	0	13	0509
1	4	4	0	7	8	3	0	2	0	0	0	0	4	
1	2	3	0	-3	5	-1	-1	2	0	0	0	0	-9	
0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	8	0511
0	0	4	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	5	
0	0	3	0	1	1	-1	0	-1	0	0	0	0	-3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0513
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
38	35	40	6	149	93	65	5	18	3	0	0	8	168	0515
35	38	39	5	134	90	99	6	30	6	0	2	14	152	
-3	3	-1	-1	-15	-3	34	1	12	3	0	2	6	-16	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
0403	106	0	1	6	0	3	18	48	0	0	21	10	5	1
	107	0	1	10	0	3	11	34	0	0	16	14	2	1
	增減數	0	0	4	0	0	-7	-14	0	0	-5	4	-3	0
0404	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0406	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0407	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	106	0	5	56	0	10	58	348	2	1	72	32	21	4
	107	3	9	54	0	16	43	335	4	0	66	52	22	4
	增減數	3	4	-2	0	6	-15	-13	2	-1	-6	20	1	0
0503	106	0	0	2	0	0	2	5	0	0	2	2	0	0
	107	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	6	0	0
	增減數	0	0	-2	0	0	2	-1	0	0	0	4	0	0
0504	106	0	0	0	0	0	8	1	0	0	4	0	0	0
	107	0	0	0	0	1	7	1	0	0	1	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	-3	1	0	0
0505	106	0	0	0	0	3	2	3	0	0	3	2	0	0
	107	0	0	0	0	1	3	2	0	0	5	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	-2	1	-1	0	0	2	1	0	0
0507	106	0	0	2	0	0	11	11	0	0	8	10	3	0
	107	0	0	1	1	0	7	5	0	0	13	5	0	1
	增減數	0	0	-1	1	0	-4	-6	0	0	5	-5	-3	1
0509	106	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0
	107	0	1	0	0	1	0	3	0	0	1	1	0	0
	增減數	0	1	0	0	1	-2	1	0	0	-1	1	0	0
0511	106	0	0	0	0	0	6	4	0	0	11	2	0	0
	107	1	0	1	1	0	4	5	0	0	4	1	0	0
	增減數	1	0	1	1	0	-2	1	0	0	-7	-1	0	0
0513	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
0515	106	3	8	16	1	6	19	279	1	1	98	58	22	7
	107	2	6	18	2	5	35	297	1	0	93	77	32	3
	增減數	-1	-2	2	1	-1	16	18	0	-1	-5	19	10	-4

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
17	2	0	10	10	2	0	1	1	9	0	0	9	9	0403
16	1	0	17	7	13	0	3	0	10	0	0	4	4	
-1	-1	0	7	-3	11	0	2	-1	1	0	0	-5	-5	
3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0404
2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0407
9	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
100	4	1	47	14	21	2	10	0	88	0	0	11	63	0501
122	5	1	54	21	21	1	12	0	123	5	1	15	75	
22	1	0	7	7	0	-1	2	0	35	5	1	4	12	
2	0	0	6	3	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0503
7	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	
5	0	0	-5	-3	2	0	0	-1	1	0	0	-3	0	
13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0504
7	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0505
9	0	0	7	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	6	2	3	0	0	0	-1	0	0	0	-1	
9	1	0	8	0	1	0	1	0	7	0	0	1	2	0507
12	0	0	12	0	1	0	0	0	3	0	0	0	8	
3	-1	0	4	0	0	0	-1	0	-4	0	0	-1	6	
16	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0509
28	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	
12	0	0	1	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0511
2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	4	-1	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0513
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	3	2	18	6	3	1	2	0	82	0	0	14	38	0515
50	3	1	13	5	7	0	1	0	98	2	1	13	54	
17	0	-1	-5	-1	4	-1	-1	0	16	2	1	-1	16	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0516 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院	106	420	3	14	5	1	10	3	2	0	2
	107	318	0	7	3	1	13	5	5	0	0
	增減數	-102	-3	-7	-2	0	3	2	3	0	-2
0517 中國醫藥大學新竹附設醫院	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	98	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	增減數	98	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0602 新國民醫療社團法人新國民醫院	106	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	106	658	1	12	5	2	14	0	3	0	0
	107	628	1	6	6	2	15	5	0	1	0
	增減數	-30	0	-6	1	0	1	5	-3	1	0
0604 衛生福利部桃園醫院	106	1,244	3	30	7	2	26	11	18	0	3
	107	1,553	3	20	7	1	22	15	14	0	5
	增減數	309	0	-10	0	-1	-4	4	-4	0	2
0605 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處	106	275	0	4	1	2	3	0	0	0	0
	107	289	0	4	2	0	7	1	2	0	1
	增減數	14	0	0	1	-2	4	1	2	0	1
0606 敏盛綜合醫院	106	585	1	3	1	0	3	3	3	0	0
	107	648	0	6	0	1	1	0	1	0	0
	增減數	63	-1	3	-1	1	-2	-3	-2	0	0
0607 陽明醫院(桃園)	106	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608 龍潭敏盛醫院	106	62	0	0	2	1	0	0	0	0	0
	107	47	0	2	0	0	3	0	1	0	0
	增減數	-15	0	2	-2	-1	3	0	1	0	0
0610 天成醫院	106	78	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	107	78	0	2	1	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	2	1	0	-2	0	1	0	0
0612 臺北榮民總醫院桃園分院	106	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	123	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	30	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0613 大園敏盛醫院	106	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0614 聯新國際醫院	106	829	1	15	5	1	13	5	7	0	1
	107	834	4	15	6	0	17	6	5	0	0
	增減數	5	3	0	1	-1	4	1	-2	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
6	12	17	0	49	38	32	1	5	1	0	1	0	45	0516
3	10	12	1	42	14	23	1	2	0	0	2	6	38	
-3	-2	-5	1	-7	-24	-9	0	-3	-1	0	1	6	-7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0517
1	4	2	0	37	26	2	0	2	0	0	0	0	8	
1	4	2	0	37	26	2	0	2	0	0	0	0	8	
0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0602
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	13	20	0	276	32	12	2	3	0	0	0	0	16	0603
7	12	25	3	211	30	27	2	8	0	0	0	1	23	
0	-1	5	3	-65	-2	15	0	5	0	0	0	1	7	
29	39	45	8	148	72	108	12	15	0	0	1	4	175	0604
29	51	55	9	190	90	149	22	37	2	0	4	9	184	
0	12	10	1	42	18	41	10	22	2	0	3	5	9	
0	11	16	1	36	32	18	3	8	0	0	0	0	38	0605
1	3	15	2	43	26	25	6	5	1	0	0	0	40	
1	-8	-1	1	7	-6	7	3	-3	1	0	0	0	2	
4	19	19	2	63	32	56	5	10	1	0	1	2	48	0606
4	13	25	1	63	41	55	2	20	0	0	0	1	60	
0	-6	6	-1	0	9	-1	-3	10	-1	0	-1	-1	12	
0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0607
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	-1	0	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0	-2	
0	3	0	0	2	2	4	0	0	1	0	0	0	8	0608
0	1	2	0	1	8	0	0	1	0	0	0	0	7	
0	-2	2	0	-1	6	-4	0	1	-1	0	0	0	-1	
1	4	5	0	16	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0610
0	3	4	0	19	9	3	0	0	0	0	0	0	3	
-1	-1	-1	0	3	-1	3	-1	0	0	0	0	0	3	
0	1	11	0	15	6	9	0	5	0	0	0	0	13	0612
0	4	13	0	16	8	12	1	3	0	0	0	0	27	
0	3	2	0	1	2	3	1	-2	0	0	0	0	14	
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0613
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	
13	28	22	4	106	59	63	5	14	1	0	0	3	74	0614
8	24	23	4	110	63	65	7	18	0	0	1	2	88	
-5	-4	1	0	4	4	2	2	4	-1	0	1	-1	14	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
0516	106	0	1	3	0	2	16	53	0	0	22	10	4	0
	107	0	0	2	0	1	1	55	0	0	26	7	2	0
	增減數	0	-1	-1	0	-1	-15	2	0	0	4	-3	-2	0
0517	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0
0602	106	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
	107	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	3	0	-1	0	-1	-1	0	0
0603	106	0	0	0	0	1	10	147	1	0	19	8	2	2
	107	1	0	0	1	1	11	164	1	0	13	4	0	0
	增減數	1	0	0	1	0	1	17	0	0	-6	-4	-2	-2
0604	106	2	2	8	1	10	29	155	2	0	43	22	15	3
	107	1	5	10	0	13	35	209	2	0	56	34	29	2
	增減數	-1	3	2	-1	3	6	54	0	0	13	12	14	-1
0605	106	0	0	8	0	2	16	22	0	0	16	3	4	1
	107	0	1	6	0	1	8	13	0	0	21	10	1	0
	增減數	0	1	-2	0	-1	-8	-9	0	0	5	7	-3	-1
0606	106	0	1	3	0	3	7	172	0	0	35	14	4	2
	107	0	1	0	1	3	6	198	0	0	29	17	4	2
	增減數	0	0	-3	1	0	-1	26	0	0	-6	3	0	0
0607	106	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0608	106	0	0	0	0	0	6	17	0	0	1	3	0	0
	107	0	0	0	0	2	3	6	0	0	1	0	1	1
	增減數	0	0	0	0	2	-3	-11	0	0	0	-3	1	1
0610	106	0	0	1	0	0	5	12	0	0	3	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	6	11	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	-1	0	0	1	-1	0	0	-2	0	0	0
0612	106	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	1	0	0
	107	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
0613	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
0614	106	0	2	2	0	3	15	196	2	0	28	17	16	2
	107	0	1	3	1	0	27	182	0	0	17	18	7	1
	增減數	0	-1	1	1	-3	12	-14	-2	0	-11	1	-9	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
19	2	0	9	4	2	1	1	0	12	0	0	4	8	0516
13	0	1	7	0	0	0	0	0	6	0	0	1	8	
-6	-2	1	-2	-4	-2	-1	-1	0	-6	0	0	-3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0517
5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0602
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
18	0	0	13	0	3	0	2	0	7	0	0	4	3	0603
21	0	0	10	0	3	0	1	0	10	0	0	0	2	
3	0	0	-3	0	0	0	-1	0	3	0	0	-4	-1	
57	1	1	33	12	13	0	6	0	22	0	0	16	35	0604
63	4	1	37	20	18	0	12	0	26	1	0	17	40	
6	3	0	4	8	5	0	6	0	4	1	0	1	5	
7	1	0	3	2	1	0	0	0	5	0	0	1	10	0605
12	0	1	12	2	1	0	2	0	2	0	0	2	10	
5	-1	1	9	0	0	0	2	0	-3	0	0	1	0	
22	0	0	15	0	5	0	2	1	8	0	0	4	11	0606
37	4	2	13	5	7	0	0	0	12	0	0	3	10	
15	4	2	-2	5	2	0	-2	-1	4	0	0	-1	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0607
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	
6	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0608
3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
-3	0	0	1	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0610
8	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	-5	0	2	0	0	0	0	0	0	1	-1	
12	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0612
13	0	0	8	1	2	0	3	0	0	0	0	1	2	
1	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	-1	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0613
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0	0	14	6	8	0	2	0	19	0	0	10	17	0614
25	2	1	16	4	4	0	6	0	26	0	0	11	16	
-5	2	1	2	-2	-4	0	4	0	7	0	0	1	-1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0615 怡仁綜合醫院	106	169	0	5	0	0	4	0	2	0	0
	107	145	1	3	0	0	4	1	1	0	1
	增減數	-24	1	-2	0	0	0	1	-1	0	1
0618 天成醫療社團法人天晟醫院	106	91	0	3	0	0	1	0	0	0	0
	107	121	0	1	0	0	2	1	0	0	0
	增減數	30	0	-2	0	0	1	1	0	0	0
0619 衛生福利部桃園醫院新屋分院	106	74	0	1	0	0	0	3	0	0	0
	107	80	0	1	0	0	2	0	0	0	0
	增減數	6	0	0	0	0	2	-3	0	0	0
0701 重光醫院	106	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0702 衛生福利部苗栗醫院	106	246	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	245	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	增減數	-1	0	-1	0	0	0	1	0	1	0
0704 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	106	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	34	0	4	0	1	1	0	1	0	0
	增減數	14	0	4	0	1	0	0	1	0	0
0705 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	106	210	0	4	1	1	0	0	0	0	0
	107	327	0	7	2	1	10	6	6	0	0
	增減數	117	0	3	1	0	10	6	6	0	0
0709 大千綜合醫院	106	567	0	9	0	3	12	4	12	1	0
	107	591	0	12	4	2	13	1	3	0	1
	增減數	24	0	3	4	-1	1	-3	-9	-1	1
0710 協和醫院	106	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712 梓榮醫療社團法人弘大醫院	106	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 衛生福利部臺中醫院	106	536	2	4	3	0	2	2	3	0	1
	107	685	0	5	0	0	1	0	1	0	0
	增減數	149	-2	1	-3	0	-1	-2	-2	0	-1
0802 中山醫學大學附設醫院	106	2,307	13	65	30	3	80	26	22	1	6
	107	2,578	11	73	23	3	110	13	21	0	3
	增減數	271	-2	8	-7	0	30	-13	-1	-1	-3
0804 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	106	290	1	6	0	0	7	0	4	0	1
	107	284	2	4	1	0	7	4	1	0	2
	增減數	-6	1	-2	1	0	0	4	-3	0	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	6	3	0	32	25	7	0	7	1	0	0	0	15	0615
5	7	7	0	12	15	7	1	2	0	0	0	1	26	
3	1	4	0	-20	-10	0	1	-5	-1	0	0	1	11	
2	0	9	0	15	11	7	1	2	0	0	0	0	5	0618
3	0	5	0	22	12	10	1	1	0	0	0	0	12	
1	0	-4	0	7	1	3	0	-1	0	0	0	0	7	
3	3	5	0	11	4	7	0	3	0	0	0	0	11	0619
0	3	4	0	28	4	2	1	0	0	0	0	0	8	
-3	0	-1	0	17	0	-5	1	-3	0	0	0	0	-3	
0	3	4	0	16	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0701
0	7	9	1	14	9	2	0	1	0	0	0	0	4	
0	4	5	1	-2	4	2	-1	1	0	0	0	0	2	
0	5	9	2	45	29	20	1	2	0	0	0	0	36	0702
1	11	5	0	50	22	19	1	2	1	0	0	1	32	
1	6	-4	-2	5	-7	-1	0	0	1	0	0	1	-4	
0	0	1	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0704
2	3	3	0	4	2	0	1	1	0	0	0	1	2	
2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
3	15	15	1	22	19	24	4	5	1	0	0	0	27	0705
7	24	20	1	19	13	40	1	4	2	0	0	3	49	
4	9	5	0	-3	-6	16	-3	-1	1	0	0	3	22	
9	19	25	3	41	28	59	2	4	0	0	0	4	57	0709
11	21	18	3	56	31	58	3	13	2	0	0	5	51	
2	2	-7	0	15	3	-1	1	9	2	0	0	1	-6	
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0710
0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	-1	0	1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0712
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	9	14	1	100	38	37	3	7	1	0	0	0	65	0801
6	8	16	2	217	44	42	2	13	0	0	0	1	82	
4	-1	2	1	117	6	5	-1	6	-1	0	0	1	17	
26	63	55	3	278	84	171	24	77	7	0	7	14	376	0802
28	56	73	7	358	97	178	30	83	5	1	3	12	492	
2	-7	18	4	80	13	7	6	6	-2	1	-4	-2	116	
1	11	6	0	76	24	19	1	5	0	0	0	3	35	0804
6	14	3	0	42	23	26	2	10	0	1	1	6	27	
5	3	-3	0	-34	-1	7	1	5	0	1	1	3	-8	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 \ 原發部位別		胸膜	胸腺、心臟及中隔	白血病	骨、關節及關節軟骨	皮下組織結締組織、軟組織及其他	皮膚	女性乳房	男性乳房	子宮，非特定部位	子宮頸	子宮體	卵巢、輸卵管及寬韌帶	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細
		C38.4	C37-C38.3, C38.8		C40-C41	C47, C49	C44	C50	C50	C55	C53	C54	C56, C57.0-C57.4	C51-C52, C57.7-C57.9
0615	106	0	0	0	0	2	5	36	0	0	8	1	0	0
	107	1	0	0	0	1	5	24	0	0	7	2	1	0
	增減數	1	0	0	0	-1	0	-12	0	0	-1	1	1	0
0618	106	0	0	1	0	0	7	11	0	0	3	0	1	0
	107	0	1	0	0	1	16	18	0	0	1	0	1	0
	增減數	0	1	-1	0	1	9	7	0	0	-2	0	0	0
0619	106	0	0	0	0	0	4	6	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	1	5	7	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	0	0	0	1	1	1	0	0	-1	0	1	0
0701	106	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0
	107	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
0702	106	0	2	0	0	1	13	31	0	0	6	3	1	0
	107	0	0	1	0	1	11	30	1	0	8	3	1	0
	增減數	0	-2	1	0	0	-2	-1	1	0	2	0	0	0
0704	106	1	0	0	0	0	1	3	0	0	4	1	0	0
	107	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	-3	-1	1	0
0705	106	0	0	1	0	1	3	25	0	0	8	5	0	0
	107	0	1	1	0	6	2	35	0	0	3	4	2	0
	增減數	0	1	0	0	5	-1	10	0	0	-5	-1	2	0
0709	106	0	1	4	0	7	21	90	0	0	14	14	6	1
	107	0	0	4	0	4	21	78	0	0	19	17	5	0
	增減數	0	-1	0	0	-3	0	-12	0	0	5	3	-1	-1
0710	106	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	0
0712	106	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
0801	106	0	1	4	0	2	21	127	0	0	11	9	6	0
	107	0	1	4	0	8	15	122	0	0	8	9	2	1
	增減數	0	0	0	0	6	-6	-5	0	0	-3	0	-4	1
0802	106	0	10	17	2	9	70	246	1	0	95	77	38	4
	107	1	11	21	4	9	51	276	1	0	95	64	42	3
	增減數	1	1	4	2	0	-19	30	0	0	0	-13	4	-1
0804	106	0	0	2	0	1	3	27	0	1	8	3	4	0
	107	1	0	0	0	1	3	29	1	0	9	3	4	0
	增減數	1	0	-2	0	0	0	2	1	-1	1	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0615
3	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
1	0	0	3	-1	0	0	0	0	1	0	0	-1	-1	
2	0	0	4	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0618
5	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	
3	1	0	0	0	-2	0	2	0	-2	0	0	0	-1	
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7	1	0619
4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	
2	0	0	2	0	1	0	-1	0	0	0	0	-4	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0701
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	
12	0	1	12	2	4	0	0	0	0	1	0	2	5	0702
10	0	1	10	1	4	0	3	0	3	0	0	2	8	
-2	0	0	-2	-1	0	0	3	0	3	-1	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0704
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	7	3	1	0	0	0	2	0	0	3	2	0705
30	0	0	11	0	4	0	3	0	0	0	0	5	5	
23	0	0	4	-3	3	0	3	0	-2	0	0	2	3	
51	0	1	22	6	5	1	1	0	8	1	0	8	13	0709
63	0	2	22	3	10	0	4	0	12	0	0	4	15	
12	0	1	0	-3	5	-1	3	0	4	-1	0	-4	2	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0712
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	1	0	5	4	6	0	2	0	12	0	0	4	8	0801
34	1	0	16	3	8	0	0	0	4	0	0	1	8	
15	0	0	11	-1	2	0	-2	0	-8	0	0	-3	0	
41	4	0	52	16	41	1	12	2	74	0	0	14	50	0802
58	2	1	51	17	43	1	17	1	61	1	2	8	57	
17	-2	1	-1	1	2	0	5	-1	-13	1	2	-6	7	
14	2	1	10	3	4	0	0	0	0	0	0	3	4	0804
22	2	0	7	1	2	0	1	0	1	0	0	8	7	
8	0	-1	-3	-2	-2	0	1	0	1	0	0	5	3	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0805 澄清綜合醫院	106	320	0	1	0	1	3	1	3	0	0
	107	338	0	1	0	0	2	0	3	0	0
	增減數	18	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
0806 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院	106	31	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	增減數	-18	0	-1	0	0	0	3	0	0	0
0808 臺中榮民總醫院	106	4,812	20	127	63	8	146	52	47	0	11
	107	4,992	24	115	72	13	164	51	68	2	14
	增減數	180	4	-12	9	5	18	-1	21	2	3
0810 中國醫藥大學附設醫院	106	6,996	21	154	65	16	170	70	104	1	17
	107	7,068	23	180	64	9	201	61	110	0	25
	增減數	72	2	26	-1	-7	31	-9	6	-1	8
0811 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院	106	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	9	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
0813 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	106	650	1	8	1	3	12	4	9	2	2
	107	662	3	13	2	0	6	15	12	1	2
	增減數	12	2	5	1	-3	-6	11	3	-1	0
0814 澄清綜合醫院中港分院	106	924	1	2	1	0	10	13	7	0	1
	107	1,070	1	8	2	0	9	6	10	0	1
	增減數	146	0	6	1	0	-1	-7	3	0	0
0815 林新醫療社團法人林新醫院	106	398	0	3	1	0	2	1	2	0	0
	107	836	0	7	0	0	3	2	4	0	0
	增減數	438	0	4	-1	0	1	1	2	0	0
0817 中國醫藥大學附設醫院台中東區分院	106	60	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	107	81	0	2	1	0	1	0	2	0	1
	增減數	21	0	2	1	0	1	-1	2	0	1
0901 光田醫療社團法人光田綜合醫院	106	991	4	35	7	1	32	11	22	0	4
	107	1,030	5	22	3	5	24	7	20	0	5
	增減數	39	1	-13	-4	4	-8	-4	-2	0	1
0903 童綜合醫療社團法人童綜合醫院	106	1,735	3	42	19	4	47	8	22	0	2
	107	1,785	12	47	16	7	45	7	18	0	2
	增減數	50	9	5	-3	3	-2	-1	-4	0	0
0906 衛生福利部豐原醫院	106	633	1	5	2	2	3	0	2	0	0
	107	452	0	6	1	0	1	0	0	0	0
	增減數	-181	-1	1	-1	-2	-2	0	-2	0	0
0910 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	106	45	0	4	0	0	1	1	0	0	0
	107	46	1	0	0	0	1	0	1	0	0
	增減數	1	1	-4	0	0	0	-1	1	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
1	4	10	1	26	23	44	4	7	0	0	1	0	41	0805
2	6	10	1	38	32	40	5	5	1	0	0	1	37	
1	2	0	0	12	9	-4	1	-2	1	0	-1	1	-4	
0	2	3	0	7	2	4	0	0	0	0	0	1	1	0806
1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	
1	-2	-2	0	-7	0	-3	0	0	0	0	0	-1	1	
75	139	157	14	379	269	363	47	103	8	2	8	33	684	0808
73	157	139	11	392	253	394	41	102	9	4	8	32	734	
-2	18	-18	-3	13	-16	31	-6	-1	1	2	0	-1	50	
112	218	189	24	578	344	737	72	104	4	1	14	42	697	0810
110	194	197	24	555	313	698	69	138	11	4	13	37	763	
-2	-24	8	0	-23	-31	-39	-3	34	7	3	-1	-5	66	
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0811
0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	0	6	
0	0	0	0	5	1	1	0	-1	0	0	0	0	6	
8	23	16	4	61	27	78	3	19	2	0	1	2	41	0813
11	18	17	4	81	29	57	4	19	0	0	0	4	47	
3	-5	1	0	20	2	-21	1	0	-2	0	-1	2	6	
11	27	34	4	64	71	105	6	20	1	0	0	3	123	0814
12	32	29	4	80	59	102	8	14	1	0	2	2	133	
1	5	-5	0	16	-12	-3	2	-6	0	0	2	-1	10	
5	5	18	1	43	18	50	3	4	0	0	1	0	33	0815
2	10	16	3	349	64	28	3	5	1	0	1	2	24	
-3	5	-2	2	306	46	-22	0	1	1	0	0	2	-9	
0	3	1	0	4	8	14	1	3	0	0	0	1	2	0817
0	3	4	0	9	6	18	0	0	0	0	0	0	8	
0	0	3	0	5	-2	4	-1	-3	0	0	0	-1	6	
14	48	37	3	130	68	118	8	17	1	0	4	7	98	0901
19	41	30	2	140	67	100	3	16	1	1	4	2	114	
5	-7	-7	-1	10	-1	-18	-5	-1	0	1	0	-5	16	
18	45	48	6	134	95	192	12	25	0	0	2	11	177	0903
15	49	48	4	133	89	185	11	38	6	0	4	8	175	
-3	4	0	-2	-1	-6	-7	-1	13	6	0	2	-3	-2	
1	21	25	1	88	40	78	4	11	1	0	1	0	58	0906
2	16	19	2	45	32	49	2	9	0	0	0	0	32	
1	-5	-6	1	-43	-8	-29	-2	-2	-1	0	-1	0	-26	
0	3	4	0	6	5	1	0	2	0	0	0	1	1	0910
0	2	3	0	2	3	3	0	0	0	0	0	1	4	
0	-1	-1	0	-4	-2	2	0	-2	0	0	0	0	3	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
0805	106	0	0	0	0	3	9	69	1	1	25	8	3	0
	107	1	0	0	0	5	15	69	0	0	13	11	7	2
	增減數	1	0	0	0	2	6	0	-1	-1	-12	3	4	2
0806	106	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1
	107	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-3	0	-1	-1
0808	106	1	22	142	10	22	98	365	2	0	108	95	63	8
	107	1	23	136	16	25	136	430	0	0	107	89	64	12
	增減數	0	1	-6	6	3	38	65	-2	0	-1	-6	1	4
0810	106	2	24	213	9	39	126	1,015	1	0	247	163	89	17
	107	5	28	205	14	32	116	940	3	2	226	153	114	10
	增減數	3	4	-8	5	-7	-10	-75	2	2	-21	-10	25	-7
0811	106	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-3	1	0	0	0	0	0	0
0813	106	0	0	0	0	4	25	123	0	0	13	15	1	1
	107	0	1	4	1	5	27	115	0	0	16	5	1	1
	增減數	0	1	4	1	1	2	-8	0	0	3	-10	0	0
0814	106	0	4	10	0	6	18	196	0	0	40	20	9	0
	107	2	1	8	1	1	25	339	0	0	37	24	8	2
	增減數	2	-3	-2	1	-5	7	143	0	0	-3	4	-1	2
0815	106	0	0	2	0	0	7	51	0	0	61	23	13	1
	107	0	3	3	0	3	6	143	0	0	69	31	7	0
	增減數	0	3	1	0	3	-1	92	0	0	8	8	-6	-1
0817	106	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	1	3	0
	增減數	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	0
0901	106	0	0	11	0	3	44	91	0	0	29	17	5	1
	107	0	5	15	1	5	54	97	1	0	37	16	14	1
	增減數	0	5	4	1	2	10	6	1	0	8	-1	9	0
0903	106	0	2	20	2	10	38	143	0	0	64	36	19	1
	107	0	2	30	1	8	32	169	1	0	58	28	12	2
	增減數	0	0	10	-1	-2	-6	26	1	0	-6	-8	-7	1
0906	106	0	0	13	0	2	22	93	0	0	27	17	6	0
	107	0	2	9	0	1	24	76	0	0	25	9	1	2
	增減數	0	2	-4	0	-1	2	-17	0	0	-2	-8	-5	2
0910	106	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	0	0	0
	107	0	0	0	0	1	2	4	0	0	3	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	1	1	0	0	-1	1	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
2	0	1	15	1	1	0	1	0	2	0	0	1	6	0805
4	0	2	7	0	4	0	0	1	6	0	0	2	5	
2	0	1	-8	-1	3	0	-1	1	4	0	0	1	-1	
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0806
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
-1	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	15	4	150	96	126	1	42	8	134	11	0	48	183	0808
279	12	2	124	98	157	3	55	7	115	4	4	33	188	
-23	-3	-2	-26	2	31	2	13	-1	-19	-7	4	-15	5	
331	21	5	187	70	166	2	49	5	176	6	2	40	237	0810
342	30	7	189	87	165	6	56	3	233	11	9	29	254	
11	9	2	2	17	-1	4	7	-2	57	5	7	-11	17	
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0811
2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	
44	2	0	26	4	21	0	2	2	22	0	0	7	11	0813
59	1	1	24	3	19	0	2	1	19	0	0	1	11	
15	-1	1	-2	-1	-2	0	0	-1	-3	0	0	-6	0	
46	1	0	12	3	2	0	3	1	23	0	0	3	23	0814
45	1	0	10	3	9	0	2	0	13	0	0	4	20	
-1	0	0	-2	0	7	0	-1	-1	-10	0	0	1	-3	
11	2	0	9	1	5	0	2	0	11	0	0	1	7	0815
11	2	1	12	1	3	0	1	0	6	0	0	3	7	
0	0	1	3	0	-2	0	-1	0	-5	0	0	2	0	
11	0	0	1	0	1	0	2	2	1	1	0	0	0	0817
5	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	2	0	
-6	0	0	0	0	2	0	0	-2	1	-1	0	2	0	
24	1	3	21	1	10	0	0	0	31	0	0	6	24	0901
31	4	3	25	4	18	1	2	0	39	0	1	5	20	
7	3	0	4	3	8	1	2	0	8	0	1	-1	-4	
223	7	0	67	18	58	0	12	1	38	0	0	14	50	0903
255	4	2	79	23	45	0	12	0	39	0	0	22	42	
32	-3	2	12	5	-13	0	0	-1	1	0	0	8	-8	
34	0	0	31	0	13	0	4	0	2	0	0	7	18	0906
32	0	0	21	1	17	0	2	1	3	0	0	4	6	
-2	0	0	-10	1	4	0	-2	1	1	0	0	-3	-12	
5	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0910
8	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
3	0	-1	0	1	1	0	1	0	-1	0	0	1	1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
0913 清泉醫院	106	31	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
0914 賢德醫院	106	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0915 中國醫藥大學附設醫院豐原分院	106	43	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
0916 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	106	1,494	2	24	4	3	23	8	14	0	3
	107	1,386	1	15	14	1	40	8	16	0	2
	增減數	-108	-1	-9	10	-2	17	0	2	0	-1
0917 亞洲大學附屬醫院	106	808	2	12	10	2	21	5	7	0	1
	107	1,244	4	21	11	2	26	6	19	0	3
	增減數	436	2	9	1	0	5	1	12	0	2
1001 衛生福利部彰化醫院	106	315	5	8	8	0	16	6	8	0	0
	107	302	1	6	2	1	15	6	7	0	0
	增減數	-13	-4	-2	-6	1	-1	0	-1	0	0
1002 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	106	4,737	32	127	69	13	192	58	60	0	16
	107	5,131	35	141	91	20	218	63	72	1	18
	增減數	394	3	14	22	7	26	5	12	1	2
1006 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	106	947	7	20	10	3	31	9	18	0	3
	107	926	4	31	16	0	37	9	18	0	2
	增減數	-21	-3	11	6	-3	6	0	0	0	-1
1007 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院	106	227	3	5	1	0	7	1	2	0	0
	107	219	3	2	3	1	9	2	7	0	0
	增減數	-8	0	-3	2	1	2	1	5	0	0
1008 員榮醫療社團法人員榮醫院	106	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院	106	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1014 員林何醫院	106	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1018 員生醫院	106	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	112	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	53	0	0	0	0	1	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	3	7	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0913
0	3	4	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	6	
0	0	-3	0	-2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0914
0	1	2	0	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	2	0	5	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	10	4	6	0	1	0	0	0	0	1	0915
0	0	0	0	9	4	2	0	1	0	0	0	0	3	
0	-1	-1	0	-1	0	-4	0	0	0	0	0	0	2	
17	31	64	7	130	89	78	20	23	2	0	1	4	88	0916
16	40	38	6	137	87	108	11	22	3	0	2	15	104	
-1	9	-26	-1	7	-2	30	-9	-1	1	0	1	11	16	
12	32	25	2	76	48	89	7	15	0	0	0	5	80	0917
11	43	25	5	119	60	132	10	21	0	0	1	13	119	
-1	11	0	3	43	12	43	3	6	0	0	1	8	39	
4	6	8	1	34	18	39	2	6	1	0	0	1	38	1001
5	9	8	1	25	11	58	2	9	0	0	0	1	46	
1	3	0	0	-9	-7	19	0	3	-1	0	0	0	8	
62	119	109	21	434	212	463	30	65	7	1	10	46	501	1002
75	126	110	14	462	205	467	40	103	5	1	8	44	533	
13	7	1	-7	28	-7	4	10	38	-2	0	-2	-2	32	
7	30	26	2	85	53	89	4	15	0	0	2	8	148	1006
11	33	21	5	71	47	71	6	17	5	1	0	8	116	
4	3	-5	3	-14	-6	-18	2	2	5	1	-2	0	-32	
0	2	4	0	30	10	13	0	2	0	0	0	1	50	1007
1	4	8	0	14	9	8	1	3	0	0	0	2	45	
1	2	4	0	-16	-1	-5	1	1	0	0	0	1	-5	
0	2	5	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1008
0	2	3	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	-2	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1013
0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	14	
-1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	5	0	12	5	2	0	0	0	0	0	3	0	1018
0	6	6	0	19	10	19	3	4	0	0	0	0	6	
0	4	1	0	7	5	17	3	4	0	0	0	-3	6	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織、軟組織及其他結締組織 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
0913	106	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
	107	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	-1	-1	0	0
0914	106	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
0915	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0916	106	1	3	17	0	3	30	433	2	1	35	27	13	4
	107	0	2	26	1	5	38	244	0	0	32	19	9	4
	增減數	-1	-1	9	1	2	8	-189	-2	-1	-3	-8	-4	0
0917	106	1	1	23	1	2	5	74	0	0	29	32	14	2
	107	1	2	32	3	8	27	117	0	0	21	34	12	2
	增減數	0	1	9	2	6	22	43	0	0	-8	2	-2	0
1001	106	0	1	4	0	0	18	16	0	0	6	2	1	0
	107	0	0	4	0	0	14	14	0	0	2	0	2	0
	增減數	0	-1	0	0	0	-4	-2	0	0	-4	-2	1	0
1002	106	0	16	98	4	14	174	724	1	0	129	92	63	10
	107	3	18	109	7	30	199	756	2	0	133	105	60	17
	增減數	3	2	11	3	16	25	32	1	0	4	13	-3	7
1006	106	0	6	5	0	0	37	116	0	0	32	17	12	2
	107	0	3	5	0	7	48	124	1	0	16	29	16	2
	增減數	0	-3	0	0	7	11	8	1	0	-16	12	4	0
1007	106	0	0	0	0	0	12	24	0	0	17	4	1	0
	107	0	1	1	0	2	16	34	0	0	10	3	0	2
	增減數	0	1	1	0	2	4	10	0	0	-7	-1	-1	2
1008	106	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
1013	106	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	14	0	0	6	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	13	0	0	4	1	0	0
1014	106	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	2	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	增減數	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	-1	-1	0	1
1018	106	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	107	0	0	0	0	2	10	1	0	0	1	2	1	0
	增減數	0	0	0	0	2	8	1	0	0	-1	2	1	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0913
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0914
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0915
12	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
1	0	0	3	0	-3	0	0	0	1	0	0	0	1	
55	2	0	36	10	18	1	1	0	110	0	0	10	47	0916
58	3	2	29	12	31	0	2	0	121	2	0	11	49	
3	1	2	-7	2	13	-1	1	0	11	2	0	1	2	
48	1	0	25	10	29	0	7	0	17	0	0	9	27	0917
62	4	1	41	12	35	0	8	1	123	0	0	11	36	
14	3	1	16	2	6	0	1	1	106	0	0	2	9	
19	1	0	6	6	10	0	0	1	3	0	0	2	10	1001
25	0	0	6	1	6	0	0	0	2	0	0	1	12	
6	-1	0	0	-5	-4	0	0	-1	-1	0	0	-1	2	
182	8	7	97	31	49	4	24	2	196	8	4	17	136	1002
191	8	5	90	44	58	6	15	3	251	5	9	15	139	
9	0	-2	-7	13	9	2	-9	1	55	-3	5	-2	3	
65	2	1	21	7	12	1	5	0	13	0	0	3	20	1006
58	2	0	26	4	12	0	1	0	19	0	0	5	19	
-7	0	-1	5	-3	0	-1	-4	0	6	0	0	2	-1	
15	0	0	5	0	2	0	1	0	5	0	0	3	7	1007
11	0	0	5	1	0	0	2	0	7	0	0	1	1	
-4	0	0	0	1	-2	0	1	0	2	0	0	-2	-6	
10	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1008
16	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1013
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1018
9	1	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
-2	1	0	-5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
1020 惠來醫療社團法人宏仁醫院	106	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	106	522	1	12	4	1	22	6	4	0	3
	107	524	1	12	11	2	16	0	7	0	3
	增減數	2	0	0	7	1	-6	-6	3	0	0
1022 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	106	282	0	4	2	0	11	4	4	0	0
	107	369	0	6	3	0	13	6	7	0	0
	增減數	87	0	2	1	0	2	2	3	0	0
1023 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	106	850	2	17	4	0	23	14	6	0	4
	107	1,222	5	33	6	1	40	12	9	0	2
	增減數	372	3	16	2	1	17	-2	3	0	-2
1102 衛生福利部南投醫院	106	186	0	2	0	1	0	2	1	0	1
	107	79	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	-107	0	0	1	-1	0	-2	-1	0	-1
1103 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	106	128	0	3	0	0	1	2	7	0	0
	107	144	2	4	1	0	4	2	1	0	0
	增減數	16	2	1	1	0	3	0	-6	0	0
1104 臺中榮民總醫院埔里分院	106	99	1	7	1	0	6	1	4	0	0
	107	68	1	5	0	0	3	3	4	0	1
	增減數	-31	0	-2	-1	0	-3	2	0	0	1
1105 曾漢棋綜合醫院	106	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1106 佑民醫療社團法人佑民醫院	106	186	0	4	4	1	5	1	2	0	0
	107	222	2	8	5	2	8	1	1	0	0
	增減數	36	2	4	1	1	3	0	-1	0	0
1107 竹山秀傳醫院	106	147	0	1	0	1	3	1	2	0	0
	107	169	0	2	0	0	1	1	4	0	0
	增減數	22	0	1	0	-1	-2	0	2	0	0
1108 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院	106	137	3	4	2	1	5	5	0	0	0
	107	134	1	3	5	0	6	0	0	0	2
	增減數	-3	-2	-1	3	-1	1	-5	0	0	2
1201 衛生福利部嘉義醫院	106	78	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	107	70	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-8	0	1	0	0	0	0	-1	0	0
1202 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	106	1,017	7	21	24	3	48	8	13	0	4
	107	949	7	24	24	7	43	9	8	0	3
	增減數	-68	0	3	0	4	-5	1	-5	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	1	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1020
0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	4	
0	-1	0	0	-2	0	6	0	-1	0	0	0	0	3	
3	16	23	1	61	35	72	8	10	1	0	0	3	70	1021
9	14	22	1	32	39	53	5	16	0	0	0	1	72	
6	-2	-1	0	-29	4	-19	-3	6	-1	0	0	-2	2	
8	5	11	2	32	12	5	1	1	0	0	0	0	23	1022
6	4	6	0	43	24	13	1	5	0	0	0	4	26	
-2	-1	-5	-2	11	12	8	0	4	0	0	0	4	3	
12	23	19	1	98	64	32	3	5	0	0	0	8	116	1023
13	33	25	1	139	60	117	8	18	0	0	1	4	152	
1	10	6	0	41	-4	85	5	13	0	0	1	-4	36	
0	7	6	0	11	14	16	3	2	0	0	1	0	24	1102
0	6	0	2	3	4	10	1	5	0	0	0	0	6	
0	-1	-6	2	-8	-10	-6	-2	3	0	0	-1	0	-18	
2	6	9	0	26	10	0	0	0	0	0	0	0	7	1103
1	4	11	1	15	7	6	0	0	0	0	0	0	11	
-1	-2	2	1	-11	-3	6	0	0	0	0	0	0	4	
3	0	6	0	8	5	10	1	1	0	0	0	0	7	1104
0	1	5	1	3	8	5	1	2	0	0	0	2	4	
-3	1	-1	1	-5	3	-5	0	1	0	0	0	2	-3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	7	9	0	13	14	7	0	0	0	0	1	2	7	1106
10	5	5	0	16	20	6	0	2	0	0	1	2	13	
7	-2	-4	0	3	6	-1	0	2	0	0	0	0	6	
2	4	5	0	14	10	2	0	0	0	0	1	1	6	1107
0	4	6	0	14	13	3	0	0	0	0	0	0	8	
-2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	-1	-1	2	
2	6	12	1	15	8	16	1	0	0	0	0	1	11	1108
6	3	2	1	10	11	13	3	3	0	0	0	2	14	
4	-3	-10	0	-5	3	-3	2	3	0	0	0	1	3	
0	1	4	0	15	5	8	0	0	0	0	0	0	4	1201
0	0	4	0	13	4	5	0	0	0	0	0	0	14	
0	-1	0	0	-2	-1	-3	0	0	0	0	0	0	10	
7	22	24	2	144	68	140	8	21	1	1	1	12	81	1202
11	21	30	5	111	58	121	2	28	1	0	4	10	92	
4	-1	6	3	-33	-10	-19	-6	7	0	-1	3	-2	11	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
1020	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021	106	0	1	0	1	1	10	54	0	0	17	10	4	0
	107	0	2	3	0	2	18	50	1	0	29	8	7	0
	增減數	0	1	3	-1	1	8	-4	1	0	12	-2	3	0
1022	106	0	0	2	0	0	16	59	2	0	10	6	2	0
	107	0	0	1	1	0	14	62	0	0	17	7	5	0
	增減數	0	0	-1	1	0	-2	3	-2	0	7	1	3	0
1023	106	0	1	3	0	2	23	158	0	0	45	15	6	1
	107	0	3	15	0	7	25	224	0	0	42	23	4	4
	增減數	0	2	12	0	5	2	66	0	0	-3	8	-2	3
1102	106	0	0	7	1	2	3	27	0	0	11	4	5	0
	107	1	0	1	0	0	8	2	0	0	1	2	1	0
	增減數	1	0	-6	-1	-2	5	-25	0	0	-10	-2	-4	0
1103	106	0	0	0	0	0	11	17	0	0	7	5	0	1
	107	0	0	1	0	1	12	29	1	0	9	11	0	0
	增減數	0	0	1	0	1	1	12	1	0	2	6	0	-1
1104	106	0	0	0	0	0	2	12	0	0	1	5	0	1
	107	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	-4	0	0	0	-5	0	-1
1105	106	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
1106	106	0	0	0	0	0	11	47	0	0	12	6	3	0
	107	0	0	2	0	0	13	40	0	0	12	6	0	0
	增減數	0	0	2	0	0	2	-7	0	0	0	0	-3	0
1107	106	0	0	0	0	1	7	9	0	0	7	4	0	2
	107	0	0	0	0	0	12	20	1	0	5	2	1	1
	增減數	0	0	0	0	-1	5	11	1	0	-2	-2	1	-1
1108	106	0	0	0	0	0	2	23	0	0	2	1	0	0
	107	1	0	0	0	1	8	19	0	0	2	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	1	6	-4	0	0	0	-1	0	0
1201	106	0	0	1	0	0	1	11	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	0
	增減數	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	0
1202	106	0	2	12	1	2	19	154	1	0	35	20	9	1
	107	0	8	13	0	0	18	140	0	0	29	17	19	2
	增減數	0	6	1	-1	-2	-1	-14	-1	0	-6	-3	10	1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	3	0	12	3	3	0	0	0	17	0	0	3	4	1021
31	2	2	9	4	3	0	1	0	23	0	0	5	8	
8	-1	2	-3	1	0	0	1	0	6	0	0	2	4	
5	0	0	11	0	3	0	0	0	35	0	0	0	6	1022
24	2	0	14	1	6	0	0	0	38	0	0	2	8	
19	2	0	3	1	3	0	0	0	3	0	0	2	2	
35	1	1	29	4	14	0	1	0	31	0	0	7	22	1023
58	1	1	33	2	18	0	2	0	41	0	0	7	33	
23	0	0	4	-2	4	0	1	0	10	0	0	0	11	
12	0	1	5	0	7	0	0	0	0	0	1	0	9	1102
3	0	0	6	2	6	0	2	0	1	0	0	0	3	
-9	0	-1	1	2	-1	0	2	0	1	0	-1	0	-6	
4	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	3	3	1103
2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
-2	0	0	1	-1	0	0	0	0	1	0	0	-3	0	
8	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	3	1	1104
3	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	
-5	0	0	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	12	0	3	0	1	0	0	0	0	0	5	1106
11	0	1	14	1	5	0	2	0	4	0	0	2	2	
5	0	1	2	1	2	0	1	0	4	0	0	2	-3	
40	0	0	18	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	1107
40	0	0	21	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	-1	-1	
5	0	0	4	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	1108
7	0	0	4	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	
2	0	0	0	-1	2	0	0	0	-1	0	0	0	0	
14	0	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1201
8	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	
-6	0	0	-5	1	-3	0	0	0	0	0	0	1	2	
19	2	2	20	5	12	0	3	0	14	0	0	3	21	1202
13	0	2	10	8	14	0	1	0	15	1	0	0	20	
-6	-2	0	-10	3	2	0	-2	0	1	1	0	-3	-1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計 Total	唇(唇的皮膚 C44.0 除外) C00	舌 C01-C02	齒齦 C03	口底 C04	口腔之其他及未詳細說明部位 C05-C06	口咽 C09-C10	下咽 C12-C13	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14	主唾液腺 C07-C08
1203 臺中榮民總醫院嘉義分院	106	190	0	1	0	1	6	2	1	0	0
	107	191	0	3	2	0	5	1	1	0	1
	增減數	1	0	2	2	-1	-1	-1	0	0	1
1206 衛生福利部朴子醫院	106	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	8	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
1207 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	106	2,115	15	41	21	6	87	19	25	0	6
	107	2,130	10	54	31	6	84	12	27	0	5
	增減數	15	-5	13	10	0	-3	-7	2	0	-1
1210 臺中榮民總醫院灣橋分院	106	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
1214 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	106	1,325	11	41	25	3	47	9	24	0	6
	107	1,238	4	24	11	3	28	8	14	0	3
	增減數	-87	-7	-17	-14	0	-19	-1	-10	0	-3
1215 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	106	2,806	11	44	21	4	74	14	27	0	5
	107	3,105	12	50	15	3	81	17	28	0	6
	增減數	299	1	6	-6	-1	7	3	1	0	1
1216 陽明醫院	106	192	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	168	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	增減數	-24	0	1	0	0	-1	0	1	0	0
1301 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	106	140	1	3	0	0	3	2	1	0	0
	107	106	0	2	0	1	5	1	1	1	0
	增減數	-34	-1	-1	0	1	2	-1	0	1	0
1302 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	106	1,173	8	25	8	3	41	17	20	1	0
	107	1,170	5	28	10	1	38	15	14	0	3
	增減數	-3	-3	3	2	-2	-3	-2	-6	-1	3
1304 中國醫藥大學北港附設醫院	106	300	0	1	1	0	2	1	0	0	0
	107	339	1	1	0	0	4	0	2	0	0
	增減數	39	1	0	-1	0	2	-1	2	0	0
1305 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院	106	259	2	6	1	0	4	1	2	0	1
	107	234	0	3	0	1	4	1	4	0	1
	增減數	-25	-2	-3	-1	1	0	0	2	0	0
1308 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	106	309	1	6	11	2	10	3	4	1	2
	107	415	3	13	8	0	24	6	7	0	0
	增減數	106	2	7	-3	-2	14	3	3	-1	-2
1310 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院	106	35	0	1	0	0	2	0	0	0	0
	107	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	2	0	-1	0	0	-2	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	6	12	0	21	17	35	3	2	2	0	0	0	14	1203
2	6	14	2	27	11	28	2	3	0	0	0	2	31	
0	0	2	2	6	-6	-7	-1	1	-2	0	0	2	17	
0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1206
0	2	5	0	1	2	5	0	1	0	0	0	0	1	
0	2	5	0	-2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	
18	66	45	10	213	133	279	16	42	5	0	5	9	203	1207
29	46	55	4	234	145	238	14	35	3	0	1	8	240	
11	-20	10	-6	21	12	-41	-2	-7	-2	0	-4	-1	37	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
18	31	27	1	88	73	203	4	22	6	0	3	11	175	1214
9	24	26	5	82	86	173	20	19	7	0	2	8	179	
-9	-7	-1	4	-6	13	-30	16	-3	1	0	-1	-3	4	
12	74	63	9	460	176	347	28	45	2	0	3	9	275	1215
22	60	80	14	649	198	350	25	37	2	0	9	20	336	
10	-14	17	5	189	22	3	-3	-8	0	0	6	11	61	
0	11	5	1	27	20	23	0	1	1	0	0	0	12	1216
1	8	5	0	34	10	14	1	1	0	0	0	0	10	
1	-3	0	-1	7	-10	-9	1	0	-1	0	0	0	-2	
4	2	5	0	9	16	15	1	2	0	0	0	1	5	1301
2	1	2	0	14	13	5	0	2	0	0	0	0	1	
-2	-1	-3	0	5	-3	-10	-1	0	0	0	0	-1	-4	
13	35	42	2	76	55	150	4	19	0	0	0	9	171	1302
12	42	28	5	90	58	140	14	22	3	0	0	8	159	
-1	7	-14	3	14	3	-10	10	3	3	0	0	-1	-12	
2	2	7	0	38	15	42	4	2	0	0	0	0	41	1304
1	11	10	1	52	17	53	7	2	1	0	1	0	41	
-1	9	3	1	14	2	11	3	0	1	0	1	0	0	
0	5	7	2	30	17	33	1	1	0	0	2	1	27	1305
2	1	7	1	20	18	24	5	2	0	0	0	3	27	
2	-4	0	-1	-10	1	-9	4	1	0	0	-2	2	0	
4	4	10	1	34	12	18	0	4	0	0	2	2	32	1308
7	13	6	1	40	6	27	1	3	0	0	0	2	37	
3	9	-4	0	6	-6	9	1	-1	0	0	-2	0	5	
0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	8	1310
2	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	9	
2	0	0	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
1203	106	0	0	1	0	1	12	13	0	0	2	1	1	0
	107	0	0	0	1	0	13	9	0	0	0	0	2	0
	增減數	0	0	-1	1	-1	1	-4	0	0	-2	-1	1	0
1206	106	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
1207	106	2	5	15	0	10	80	294	3	0	71	34	11	4
	107	1	6	16	4	6	78	260	1	0	59	27	14	3
	增減數	-1	1	1	4	-4	-2	-34	-2	0	-12	-7	3	-1
1210	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1214	106	0	7	20	1	7	46	149	1	0	42	25	15	2
	107	0	5	31	0	2	51	142	1	0	37	30	17	3
	增減數	0	-2	11	-1	-5	5	-7	0	0	-5	5	2	1
1215	106	1	7	37	2	12	74	206	2	0	63	58	35	7
	107	0	5	71	2	7	88	192	1	0	58	40	27	4
	增減數	-1	-2	34	0	-5	14	-14	-1	0	-5	-18	-8	-3
1216	106	0	0	0	0	1	18	44	1	0	0	0	0	0
	107	0	0	1	1	0	13	32	1	0	4	0	1	0
	增減數	0	0	1	1	-1	-5	-12	0	0	4	0	1	0
1301	106	1	0	1	1	1	11	10	0	0	6	1	1	0
	107	0	0	0	0	0	5	5	0	0	6	1	1	1
	增減數	-1	0	-1	-1	-1	-6	-5	0	0	0	0	0	1
1302	106	1	6	14	2	3	61	80	0	1	21	27	13	2
	107	1	5	13	0	3	64	89	0	0	28	22	15	3
	增減數	0	-1	-1	-2	0	3	9	0	-1	7	-5	2	1
1304	106	0	0	1	2	3	37	15	0	0	6	0	1	1
	107	0	1	0	0	2	32	19	0	0	6	3	1	0
	增減數	0	1	-1	-2	-1	-5	4	0	0	0	3	0	-1
1305	106	0	0	0	0	3	9	14	0	0	4	5	5	0
	107	0	0	2	0	0	4	20	1	0	3	2	0	0
	增減數	0	0	2	0	-3	-5	6	1	0	-1	-3	-5	0
1308	106	0	0	1	0	2	15	45	0	0	8	1	1	1
	107	0	1	0	1	1	19	62	0	0	13	0	0	1
	增減數	0	1	-1	1	-1	4	17	0	0	5	-1	-1	0
1310	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	2	0	0	0	-3	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
15	0	1	2	1	3	0	1	0	4	0	0	3	4	1203
2	0	0	7	1	2	0	0	0	5	0	0	4	4	
-13	0	-1	5	0	-1	0	-1	0	1	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1206
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	2	1	65	16	49	0	9	0	63	1	0	9	42	1207
86	1	1	74	17	46	1	17	1	60	0	1	15	53	
21	-1	0	9	1	-3	1	8	1	-3	-1	1	6	11	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	1	2	27	4	13	1	5	3	40	2	0	10	35	1214
46	1	2	32	4	19	0	9	2	30	2	0	7	30	
7	0	0	5	0	6	-1	4	-1	-10	0	0	-3	-5	
136	4	0	75	25	57	0	18	3	179	1	1	27	73	1215
147	2	1	80	25	67	4	15	2	169	2	2	19	60	
11	-2	1	5	0	10	4	-3	-1	-10	1	1	-8	-13	
15	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	2	2	1216
7	0	0	7	0	5	0	0	0	2	1	0	3	4	
-8	0	0	3	0	4	0	0	0	0	1	0	1	2	
12	0	1	17	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1301
18	0	1	9	1	4	0	0	0	3	0	0	0	0	
6	0	0	-8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	-1	
90	2	0	32	10	17	0	4	1	28	1	0	13	45	1302
90	1	0	36	5	24	0	3	0	39	0	0	9	25	
0	-1	0	4	-5	7	0	-1	-1	11	-1	0	-4	-20	
38	0	0	17	1	9	0	2	0	5	0	0	0	4	1304
38	1	1	10	3	9	0	0	0	2	0	0	2	4	
0	1	1	-7	2	0	0	-2	0	-3	0	0	2	0	
13	0	2	12	4	5	0	2	0	29	0	0	4	5	1305
13	0	0	6	2	6	0	0	0	36	0	0	9	6	
0	0	-2	-6	-2	1	0	-2	0	7	0	0	5	1	
19	0	0	8	0	1	1	1	0	36	0	0	2	4	1308
23	0	0	14	2	4	0	2	0	51	0	0	7	10	
4	0	0	6	2	3	-1	1	0	15	0	0	5	6	
12	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1310
14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	2	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
1401 衛生福利部臺南醫院	106	216	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	107	271	0	1	1	0	1	2	1	0	1
	增減數	55	0	0	1	0	0	2	1	0	1
1402 奇美醫療財團法人奇美醫院	106	3,325	25	61	37	9	101	14	19	0	6
	107	3,244	17	66	41	7	90	16	28	0	12
	增減數	-81	-8	5	4	-2	-11	2	9	0	6
1404 郭綜合醫院	106	288	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	107	237	0	1	1	0	0	2	2	0	0
	增減數	-51	0	1	1	0	0	2	2	0	-1
1408 國立成功大學醫學院附設醫院	106	4,862	12	102	41	11	101	23	31	0	16
	107	4,848	18	103	37	17	103	32	46	0	20
	增減數	-14	6	1	-4	6	2	9	15	0	4
1409 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	106	939	0	7	0	2	3	1	2	0	0
	107	924	1	4	0	1	6	6	5	0	0
	增減數	-15	1	-3	0	-1	3	5	3	0	0
1410 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	106	670	1	5	3	0	14	2	1	0	1
	107	738	2	10	5	1	11	4	3	0	2
	增減數	68	1	5	2	1	-3	2	2	0	1
1412 臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營	106	762	3	6	2	0	8	5	7	0	4
	107	880	1	8	2	0	10	8	6	0	1
	增減數	118	-2	2	0	0	2	3	-1	0	-3
1501 衛生福利部新營醫院	106	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	31	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	增減數	-2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1502 高雄榮民總醫院臺南分院	106	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	78	0	1	0	0	1	0	1	0	0
	增減數	30	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1503 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	106	585	1	9	1	3	7	2	0	0	2
	107	502	3	5	4	3	7	1	0	0	2
	增減數	-83	2	-4	3	0	0	-1	0	0	0
1508 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	106	287	2	3	0	0	11	2	0	0	0
	107	271	0	3	0	0	3	1	2	0	1
	增減數	-16	-2	0	0	0	-8	-1	2	0	1
1509 衛生福利部臺南醫院新化分院	106	21	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	107	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	24	1	0	0	0	0	0	0	-1	0
1510 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	106	1,978	6	42	15	4	42	16	23	1	5
	107	2,031	6	30	14	7	38	12	24	1	4
	增減數	53	0	-12	-1	3	-4	-4	1	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	2	5	0	34	24	7	0	3	1	0	0	0	17	1401
1	6	10	0	45	23	6	2	1	0	0	0	0	17	
1	4	5	0	11	-1	-1	2	-2	-1	0	0	0	0	
39	63	77	18	405	208	309	37	57	5	0	5	19	297	1402
37	68	76	11	375	201	304	19	54	1	0	1	16	332	
-2	5	-1	-7	-30	-7	-5	-18	-3	-4	0	-4	-3	35	
1	4	5	0	38	22	12	1	6	1	0	0	1	22	1404
1	11	12	0	23	16	16	0	3	0	0	0	0	17	
0	7	7	0	-15	-6	4	-1	-3	-1	0	0	-1	-5	
82	94	120	8	335	241	474	59	165	9	0	9	35	616	1408
59	74	133	18	291	178	479	62	173	4	0	9	35	711	
-23	-20	13	10	-44	-63	5	3	8	-5	0	0	0	95	
8	27	36	6	157	93	143	6	16	0	0	0	4	110	1409
6	21	38	5	145	75	151	13	19	1	0	1	1	109	
-2	-6	2	-1	-12	-18	8	7	3	1	0	1	-3	-1	
8	13	25	1	107	81	57	3	10	0	0	2	5	59	1410
8	12	24	1	130	70	77	7	10	1	0	1	0	64	
0	-1	-1	0	23	-11	20	4	0	1	0	-1	-5	5	
10	12	23	0	81	45	86	2	20	0	0	1	4	75	1412
11	20	25	5	121	46	93	8	25	0	0	0	4	91	
1	8	2	5	40	1	7	6	5	0	0	-1	0	16	
0	1	4	0	3	6	3	1	3	0	0	0	0	2	1501
0	2	0	0	4	3	2	0	1	0	0	0	0	1	
0	1	-4	0	1	-3	-1	-1	-2	0	0	0	0	-1	
1	0	2	0	4	3	2	1	2	0	0	0	0	8	1502
0	1	6	0	5	8	5	2	3	0	0	0	0	14	
-1	1	4	0	1	5	3	1	1	0	0	0	0	6	
6	6	23	6	118	41	38	1	13	1	0	0	0	65	1503
5	13	17	2	89	36	31	7	4	0	0	0	2	66	
-1	7	-6	-4	-29	-5	-7	6	-9	-1	0	0	2	1	
2	4	12	3	22	32	29	6	7	0	0	1	1	36	1508
3	6	9	0	45	32	35	7	3	0	0	0	1	23	
1	2	-3	-3	23	0	6	1	-4	0	0	-1	0	-13	
0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1509
0	1	4	0	11	6	4	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	4	0	4	3	4	0	0	0	0	0	0	-1	
26	46	41	9	186	106	227	14	45	0	0	3	11	230	1510
27	49	36	7	158	120	257	16	58	5	0	2	16	247	
1	3	-5	-2	-28	14	30	2	13	5	0	-1	5	17	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
1401	106	0	0	4	1	1	4	64	0	0	9	0	0	0
	107	0	0	5	0	1	13	74	0	0	8	2	0	0
	增減數	0	0	1	-1	0	9	10	0	0	-1	2	0	0
1402	106	5	12	37	1	11	141	373	1	0	83	64	19	7
	107	1	16	50	2	16	134	356	1	0	79	58	26	6
	增減數	-4	4	13	1	5	-7	-17	0	0	-4	-6	7	-1
1404	106	0	0	0	0	2	13	36	0	0	15	13	5	2
	107	0	2	0	1	1	13	31	1	0	14	11	3	1
	增減數	0	2	0	1	-1	0	-5	1	0	-1	-2	-2	-1
1408	106	2	25	107	4	25	187	584	1	0	134	120	71	12
	107	4	31	104	3	22	164	572	2	0	127	137	61	11
	增減數	2	6	-3	-1	-3	-23	-12	1	0	-7	17	-10	-1
1409	106	0	6	8	0	3	36	99	0	0	28	10	4	0
	107	0	7	7	1	2	33	95	0	0	4	7	3	1
	增減數	0	1	-1	1	-1	-3	-4	0	0	-24	-3	-1	1
1410	106	0	3	3	0	3	35	109	1	0	19	28	13	1
	107	0	5	2	0	1	33	104	1	0	25	41	16	3
	增減數	0	2	-1	0	-2	-2	-5	0	0	6	13	3	2
1412	106	2	2	8	0	3	12	167	0	0	3	2	4	0
	107	1	2	9	1	4	20	162	0	0	8	11	7	0
	增減數	-1	0	1	1	1	8	-5	0	0	5	9	3	0
1501	106	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
1502	106	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0
	107	0	0	0	0	2	4	4	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	-1	0	1	3	1	0	0	2	0	-1	0
1503	106	1	1	1	0	4	66	47	0	0	4	4	1	0
	107	0	1	1	0	1	68	32	0	0	9	2	1	0
	增減數	-1	0	0	0	-3	2	-15	0	0	5	-2	0	0
1508	106	0	0	0	0	2	24	24	1	0	15	4	0	2
	107	0	0	1	0	1	25	18	1	0	4	7	1	0
	增減數	0	0	1	0	-1	1	-6	0	0	-11	3	1	-2
1509	106	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	2	0	0
	增減數	0	0	-1	0	0	3	2	0	0	0	2	0	0
1510	106	0	5	48	0	7	131	181	0	0	69	41	19	5
	107	3	7	49	0	8	142	178	1	0	68	41	18	4
	增減數	3	2	1	0	1	11	-3	1	0	-1	0	-1	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
12	0	0	8	0	1	0	0	0	6	0	0	3	8	1401
12	0	0	14	2	8	0	4	0	5	0	0	1	4	
0	0	0	6	2	7	0	4	0	-1	0	0	-2	-4	
210	7	3	126	46	139	0	22	2	123	4	0	10	68	1402
206	9	10	117	52	108	1	17	0	108	5	0	12	82	
-4	2	7	-9	6	-31	1	-5	-2	-15	1	0	2	14	
19	1	1	28	8	13	0	9	0	3	0	0	2	4	1404
18	0	0	11	3	15	0	3	0	0	0	0	2	2	
-1	-1	-1	-17	-5	2	0	-6	0	-3	0	0	0	-2	
159	7	5	146	50	143	4	38	10	246	10	1	24	163	1408
183	13	7	157	54	144	2	29	4	232	7	6	20	150	
24	6	2	11	4	1	-2	-9	-6	-14	-3	5	-4	-13	
45	1	0	27	3	23	0	2	0	8	0	0	1	14	1409
55	1	1	45	3	14	0	1	0	11	1	0	1	23	
10	0	1	18	0	-9	0	-1	0	3	1	0	0	9	
21	0	0	10	2	4	0	1	0	5	0	0	5	9	1410
24	0	0	10	0	5	0	1	0	5	0	0	9	10	
3	0	0	0	-2	1	0	0	0	0	0	0	4	1	
41	0	1	30	4	28	1	1	0	29	0	0	11	19	1412
35	1	0	36	3	30	1	3	0	37	1	1	9	13	
-6	1	-1	6	-1	2	0	2	0	8	1	1	-2	-6	
2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1501
6	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	
10	0	0	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1502
7	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	
-3	0	0	2	0	0	0	0	0	-1	0	0	2	1	
21	0	1	28	1	26	0	1	0	27	0	0	2	6	1503
15	0	0	27	1	16	0	1	0	21	0	0	0	9	
-6	0	-1	-1	0	-10	0	0	0	-6	0	0	-2	3	
10	0	0	10	2	5	0	0	0	4	0	0	4	7	1508
19	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	0	2	4	
9	0	0	1	0	-4	0	0	0	-4	0	0	-2	-3	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1509
0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
-1	0	0	1	0	1	0	0	0	-1	0	0	1	2	
51	5	5	61	8	42	0	7	1	110	0	0	18	66	1510
64	3	2	46	11	43	0	22	0	96	2	0	19	70	
13	-2	-3	-15	3	1	0	15	-1	-14	2	0	1	4	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
1601 高雄市立民生醫院	106	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	98	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1603 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	106	4,011	29	109	83	10	161	24	36	0	12
	107	4,289	20	129	82	8	154	40	51	0	13
	增減數	278	-9	20	-1	-2	-7	16	15	0	1
1604 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	106	676	1	7	3	2	15	2	1	2	0
	107	687	2	10	7	3	10	5	9	1	0
	增減數	11	1	3	4	1	-5	3	8	-1	0
1605 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	106	1,349	4	21	13	3	38	11	10	0	2
	107	1,372	9	25	14	1	41	10	5	0	3
	增減數	23	5	4	1	-2	3	-1	-5	0	1
1609 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	106	156	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	107	159	0	1	1	0	2	0	2	0	0
	增減數	3	0	0	1	0	2	-1	2	0	0
1610 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	106	282	1	5	0	1	2	1	2	0	0
	107	360	0	2	0	0	2	1	2	0	2
	增減數	78	-1	-3	0	-1	0	0	0	0	2
1613 高雄市立聯合醫院	106	319	0	2	0	1	3	0	2	0	0
	107	365	0	7	0	0	1	0	1	0	0
	增減數	46	0	5	0	-1	-2	0	-1	0	0
1615 高雄榮民總醫院	106	3,248	16	73	33	4	96	31	23	0	10
	107	2,734	25	73	19	5	99	39	32	0	7
	增減數	-514	9	0	-14	1	3	8	9	0	-3
1616 祐生醫院	106	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
1618 安泰醫院	106	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1619 健仁醫院	106	210	1	3	1	0	7	1	3	0	0
	107	229	0	5	0	1	6	3	0	1	0
	增減數	19	-1	2	-1	1	-1	2	-3	1	0
1621 乃榮醫療社團法人乃榮醫院	106	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-9	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
1622 健新醫院	106	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	3	6	0	15	8	2	0	4	0	0	0	0	9	1601
0	1	12	0	10	6	9	0	1	0	0	0	0	5	
0	-2	6	0	-5	-2	7	0	-3	0	0	0	0	-4	
50	99	100	13	271	221	406	33	102	9	1	9	37	355	1603
53	114	78	10	328	231	426	39	109	6	1	9	37	408	
3	15	-22	-3	57	10	20	6	7	-3	0	0	0	53	
6	19	25	1	117	46	62	8	15	0	0	2	4	61	1604
3	16	27	3	141	47	50	9	19	0	0	3	3	68	
-3	-3	2	2	24	1	-12	1	4	0	0	1	-1	7	
11	25	44	5	132	119	164	12	45	3	0	0	3	129	1605
13	29	45	4	168	109	132	18	33	2	0	0	3	94	
2	4	1	-1	36	-10	-32	6	-12	-1	0	0	0	-35	
1	3	7	1	22	13	9	2	5	0	0	0	0	9	1609
0	2	8	1	32	8	14	2	6	0	0	1	0	16	
-1	-1	1	0	10	-5	5	0	1	0	0	1	0	7	
7	10	7	0	26	18	17	1	5	1	0	0	1	37	1610
4	10	12	0	30	23	24	3	10	4	0	0	1	33	
-3	0	5	0	4	5	7	2	5	3	0	0	0	-4	
2	4	12	1	34	26	5	1	1	1	0	0	1	23	1613
2	2	6	0	38	19	4	0	0	0	0	0	0	29	
0	-2	-6	-1	4	-7	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	6	
52	88	75	15	283	190	334	24	86	5	0	6	30	296	1615
38	66	72	8	284	124	313	31	57	7	0	4	20	283	
-14	-22	-3	-7	1	-66	-21	7	-29	2	0	-2	-10	-13	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1616
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	7	10	0	35	14	33	0	2	1	0	0	2	32	1619
7	5	5	0	22	21	35	0	4	0	0	0	3	22	
2	-2	-5	0	-13	7	2	0	2	-1	0	0	1	-10	
0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1621
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	-1	0	-3	0	0	0	0	0	0	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織、軟組織及其他結締組織 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
1601	106	0	0	0	0	0	9	22	1	0	2	1	0	1
	107	0	0	0	0	0	12	22	0	0	2	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	3	0	-1	0	0	0	0	-1
1603	106	4	16	100	7	17	177	580	2	0	74	68	50	5
	107	4	23	94	9	22	174	606	3	2	107	60	31	4
	增減數	0	7	-6	2	5	-3	26	1	2	33	-8	-19	-1
1604	106	1	0	9	0	1	32	65	0	0	19	7	4	2
	107	0	0	9	0	3	36	61	0	0	9	5	7	0
	增減數	-1	0	0	0	2	4	-4	0	0	-10	-2	3	-2
1605	106	0	4	1	0	4	30	264	0	0	57	36	27	6
	107	1	1	0	0	1	28	302	2	0	51	34	30	5
	增減數	1	-3	-1	0	-3	-2	38	2	0	-6	-2	3	-1
1609	106	0	0	0	0	0	1	20	0	0	17	7	4	1
	107	0	0	0	0	0	1	27	0	0	12	8	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	7	0	0	-5	1	-4	-1
1610	106	0	3	4	0	0	8	59	0	0	1	3	3	1
	107	1	0	5	0	3	15	106	3	0	5	4	2	0
	增減數	1	-3	1	0	3	7	47	3	0	4	1	-1	-1
1613	106	1	0	0	0	1	9	148	2	0	15	5	4	0
	107	1	0	0	0	1	10	198	2	0	18	4	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	50	0	0	3	-1	-4	0
1615	106	7	17	59	1	8	169	393	1	0	85	69	30	16
	107	1	17	42	3	9	131	269	2	0	90	71	34	9
	增減數	-6	0	-17	2	1	-38	-124	1	0	5	2	4	-7
1616	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1618	106	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
1619	106	0	0	1	0	1	2	22	0	0	2	0	0	0
	107	0	2	1	0	1	8	38	0	0	3	2	1	0
	增減數	0	2	0	0	0	6	16	0	0	1	2	1	0
1621	106	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0
1622	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	-2	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統	未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72		C73	C74-C75	C76	C80		
5	0	0	2	0	1	0	0	0		1	0	0	0	3	1601
6	0	0	5	0	2	0	0	0		1	0	0	1	1	
1	0	0	3	0	1	0	0	0		0	0	0	1	-2	
162	4	3	88	33	84	6	22	0		201	3	0	20	115	1603
188	6	7	87	39	108	5	20	2		207	6	0	19	109	
26	2	4	-1	6	24	-1	-2	2		6	3	0	-1	-6	
30	0	0	20	8	23	0	6	0		23	2	0	10	15	1604
45	0	0	20	1	16	0	4	2		11	1	0	10	11	
15	0	0	0	-7	-7	0	-2	2		-12	-1	0	0	-4	
44	1	0	22	7	21	0	4	0		12	0	0	2	13	1605
45	0	1	43	4	18	0	2	2		19	0	0	6	19	
1	-1	1	21	-3	-3	0	-2	2		7	0	0	4	6	
11	0	0	11	1	0	0	1	0		4	0	0	0	4	1609
6	0	1	4	0	0	0	0	0		3	0	0	0	1	
-5	0	1	-7	-1	0	0	-1	0		-1	0	0	0	-3	
22	2	0	14	1	7	0	0	0		2	0	0	3	7	1610
21	0	1	8	1	6	0	1	0		3	0	0	5	7	
-1	-2	1	-6	0	-1	0	1	0		1	0	0	2	0	
3	2	0	4	0	0	0	0	0		3	0	0	0	3	1613
9	1	0	5	0	1	0	0	0		1	0	0	1	4	
6	-1	0	1	0	1	0	0	0		-2	0	0	1	1	
163	5	4	104	42	98	2	14	0		74	2	0	43	72	1615
110	1	3	58	35	46	6	14	0		77	2	0	14	84	
-53	-4	-1	-46	-7	-52	4	0	0		3	0	0	-29	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1616
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1618
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3	0	0	8	4	2	0	2	0		4	0	0	0	2	1619
12	0	0	6	6	2	0	0	1		3	0	0	0	3	
9	0	0	-2	2	0	0	-2	1		-1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1621
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1622
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計 Total	唇(唇的皮膚 C44.0 除外) C00	舌 C01-C02	齒齦 C03	口底 C04	口腔之其他及未詳細說明部位 C05-C06	口咽 C09-C10	下咽 C12-C13	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14	主唾液腺 C07-C08
1624 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)	106	866	9	30	9	4	28	6	6	0	1
	107	920	3	15	7	1	21	4	11	0	0
	增減數	54	-6	-15	-2	-3	-7	-2	5	0	-1
1627 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)	106	1,138	2	9	2	0	11	6	1	0	2
	107	1,177	2	26	6	3	17	10	7	0	2
	增減數	39	0	17	4	3	6	4	6	0	0
1628 義大醫療財團法人義大大昌醫院	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	95	1	1	1	1	4	1	1	0	2
	增減數	95	1	1	1	1	4	1	1	0	2
1701 衛生福利部旗山醫院	106	54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	98	0	1	0	0	1	1	1	0	0
	增減數	44	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1702 高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）	106	45	0	3	0	0	1	1	0	0	0
	107	43	0	1	0	0	2	0	0	0	0
	增減數	-2	0	-2	0	0	1	-1	0	0	0
1703 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處	106	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-3	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
1704 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	106	6,088	39	155	71	19	191	60	62	2	12
	107	6,291	22	144	98	15	191	61	66	0	25
	增減數	203	-17	-11	27	-4	0	1	4	-2	13
1705 高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）	106	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1707 建佑醫院	106	108	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	107	107	0	1	0	0	2	1	0	0	0
	增減數	-1	0	1	-1	0	2	0	0	0	0
1708 劉光雄醫院	106	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1714 義大醫療財團法人義大醫院	106	2,660	14	101	50	10	123	37	54	0	6
	107	2,540	23	75	49	19	92	39	39	0	8
	增減數	-120	9	-26	-1	9	-31	2	-15	0	2
1716 義大醫療財團法人義大癌治療醫院	106	1,163	0	11	4	1	15	5	16	0	0
	107	1,633	1	21	10	6	28	17	19	0	2
	增減數	470	1	10	6	5	13	12	3	0	2
1801 衛生福利部澎湖醫院	106	62	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	107	80	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	增減數	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
17	24	38	1	93	69	65	5	4	0	0	3	2	64	1624
15	31	24	4	148	91	92	8	17	0	0	1	4	73	
-2	7	-14	3	55	22	27	3	13	0	0	-2	2	9	
15	15	23	1	94	59	67	4	15	2	0	1	3	131	1627
14	13	27	0	104	61	87	2	18	1	0	0	3	133	
-1	-2	4	-1	10	2	20	-2	3	-1	0	-1	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1628
6	2	6	1	0	2	14	0	1	0	0	1	1	2	
6	2	6	1	0	2	14	0	1	0	0	1	1	2	
0	0	0	0	15	3	1	0	0	0	0	0	0	5	1701
0	0	1	0	22	9	3	0	0	0	0	0	1	11	
0	0	1	0	7	6	2	0	0	0	0	0	1	6	
0	3	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1702
2	0	4	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	-3	1	0	1	-2	0	0	0	0	0	0	0	-1	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1703
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	133	147	21	556	328	726	52	112	8	0	13	56	649	1704
76	139	151	16	495	322	751	55	113	17	0	16	71	681	
-12	6	4	-5	-61	-6	25	3	1	9	0	3	15	32	
0	1	1	0	5	3	1	1	0	0	0	0	0	4	1705
0	0	2	0	10	2	3	0	0	0	0	0	0	4	
0	-1	1	0	5	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	
0	5	3	0	17	9	14	1	1	0	0	1	0	15	1707
1	10	6	0	14	6	13	1	3	0	0	0	0	12	
1	5	3	0	-3	-3	-1	0	2	0	0	-1	0	-3	
0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1708
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-2	-1	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	115	89	7	154	113	335	18	43	3	1	8	22	272	1714
43	105	65	7	160	135	296	13	46	1	0	12	19	263	
-7	-10	-24	0	6	22	-39	-5	3	-2	-1	4	-3	-9	
13	58	40	6	60	41	161	8	25	2	0	2	2	127	1716
32	86	46	5	88	74	217	9	45	3	0	6	11	191	
19	28	6	-1	28	33	56	1	20	1	0	4	9	64	
0	2	4	0	6	2	9	0	2	0	0	0	0	5	1801
0	1	7	1	11	4	13	0	1	0	0	0	0	4	
0	-1	3	1	5	2	4	0	-1	0	0	0	0	-1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
1624	106	1	1	0	0	6	42	138	0	0	31	20	5	2
	107	4	4	0	0	4	40	117	2	0	35	19	3	1
	增減數	3	3	0	0	-2	-2	-21	2	0	4	-1	-2	-1
1627	106	2	2	10	0	4	51	328	0	0	22	8	2	2
	107	5	3	3	1	2	33	294	1	0	22	16	4	1
	增減數	3	1	-7	1	-2	-18	-34	1	0	0	8	2	-1
1628	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	6	0	0	1	14	0	0	4	0	0	0
	增減數	0	0	6	0	0	1	14	0	0	4	0	0	0
1701	106	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5	0	1	0
	107	0	0	0	0	0	2	6	0	0	22	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	4	0	0	17	0	-1	0
1702	106	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	1	0	0
	107	0	0	0	0	0	15	0	0	0	1	2	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	1	1	0	0
1703	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	0	0
1704	106	5	19	132	7	32	206	469	0	0	207	160	88	12
	107	7	33	154	5	29	207	537	1	2	223	145	91	15
	增減數	2	14	22	-2	-3	1	68	1	2	16	-15	3	3
1705	106	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	-1	0	0	-1	-1	4	0	0	0	0	0	0
1707	106	1	0	0	0	1	15	7	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	3	0	1	5	5	0	0	1	0	0	0
	增減數	-1	0	3	0	0	-10	-2	0	0	1	0	0	0
1708	106	0	0	0	0	0	18	27	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	15	24	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0
1714	106	1	9	36	0	12	62	205	1	0	65	27	23	3
	107	1	5	61	3	4	83	158	2	0	60	28	24	3
	增減數	0	-4	25	3	-8	21	-47	1	0	-5	1	1	0
1716	106	1	4	18	0	4	35	161	1	0	27	21	21	2
	107	2	3	36	1	3	58	185	1	0	34	24	25	2
	增減數	1	-1	18	1	-1	23	24	0	0	7	3	4	0
1801	106	0	0	0	0	0	4	12	0	0	1	2	0	1
	107	0	0	0	1	0	5	11	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	0	1	0	1	-1	0	0	-1	-1	0	-1

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
44	2	1	38	2	16	0	0	0	12	0	0	6	21	1624
37	1	1	30	3	14	0	1	0	14	1	0	4	15	
-7	-1	0	-8	1	-2	0	1	0	2	1	0	-2	-6	
70	0	5	72	8	38	0	5	0	16	1	0	10	19	1627
95	3	1	52	7	45	1	3	0	14	0	0	8	27	
25	3	-4	-20	-1	7	1	-2	0	-2	-1	0	-2	8	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1628
10	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	1	3	
10	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	1	3	
12	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1701
6	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	
-6	0	0	2	0	-1	0	0	0	-1	0	0	2	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1702
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	-2	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	11	6	168	61	202	3	39	3	265	4	1	53	198	1704
257	14	11	200	54	196	5	37	2	322	8	2	34	175	
20	3	5	32	-7	-6	2	-2	-1	57	4	1	-19	-23	
3	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1705
1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	
7	0	0	3	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1707
8	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	5	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	
6	1	0	2	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	1708
9	0	0	9	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	
3	-1	0	7	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	
128	10	0	91	28	87	1	14	0	148	1	0	17	66	1714
153	10	2	90	35	70	0	24	3	131	2	6	14	59	
25	0	2	-1	7	-17	-1	10	3	-17	1	6	-3	-7	
80	3	0	41	17	39	0	2	0	57	0	0	5	27	1716
115	4	1	43	22	37	0	10	0	57	1	3	11	38	
35	1	1	2	5	-2	0	8	0	0	1	3	6	11	
2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	1801
3	0	0	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	4	
1	0	0	2	1	-1	0	0	0	4	0	0	-1	1	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院	原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	不明部位咽和唇、口腔及咽之分界	主唾液腺
		Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
1802 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	106	53	0	3	0	0	0	1	0	0	0
	107	75	0	0	0	0	1	1	0	1	0
	增減數	22	0	-3	0	0	1	0	0	1	0
1901 衛生福利部屏東醫院	106	516	2	18	5	1	15	5	7	0	0
	107	518	1	26	4	1	26	6	8	0	1
	增減數	2	-1	8	-1	0	11	1	1	0	1
1903 輔英科技大學附設醫院	106	234	1	1	0	0	3	0	0	0	0
	107	211	0	4	0	0	4	0	0	0	0
	增減數	-23	-1	3	0	0	1	0	0	0	0
1904 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	106	772	1	9	4	1	15	10	5	0	1
	107	830	1	16	3	0	17	7	5	0	0
	增減數	58	0	7	-1	-1	2	-3	0	0	-1
1905 國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處	106	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1908 民眾醫院	106	52	0	0	1	0	1	1	2	1	0
	107	85	0	0	0	0	1	3	1	0	0
	增減數	33	0	0	-1	0	0	2	-1	-1	0
1909 南門醫療社團法人南門醫院	106	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1910 高雄榮民總醫院屏東分院	106	61	0	3	1	0	4	0	1	1	1
	107	61	0	2	0	0	1	2	0	0	0
	增減數	0	0	-1	-1	0	-3	2	-1	-1	-1
1913 安泰醫療社團法人安泰醫院	106	566	3	13	8	2	23	8	8	0	2
	107	540	0	22	12	3	15	12	11	0	3
	增減數	-26	-3	9	4	1	-8	4	3	0	1
1914 寶建醫療社團法人寶建醫院	106	385	0	1	1	0	7	3	6	1	0
	107	381	0	1	1	1	2	1	2	0	0
	增減數	-4	0	0	0	1	-5	-2	-4	-1	0
1915 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院	106	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1918 枋寮醫療社團法人枋寮醫院	106	63	0	2	1	0	3	0	0	0	1
	107	62	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	增減數	-1	0	-2	-1	0	-2	0	0	0	0
2001 衛生福利部臺東醫院	106	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	107	31	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	增減數	15	0	0	0	0	-1	0	1	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
0	0	3	2	7	7	7	0	1	0	0	0	2	5	1802
2	5	3	0	15	3	7	0	0	0	0	0	0	7	
2	5	0	-2	8	-4	0	0	-1	0	0	0	-2	2	
15	14	18	1	49	38	34	1	4	0	0	1	5	60	1901
13	10	14	0	40	49	30	6	3	2	0	2	3	66	
-2	-4	-4	-1	-9	11	-4	5	-1	2	0	1	-2	6	
3	9	10	0	26	10	17	3	5	1	0	0	0	12	1903
2	1	4	0	22	9	15	2	2	1	0	0	3	6	
-1	-8	-6	0	-4	-1	-2	-1	-3	0	0	0	3	-6	
12	32	24	5	84	83	75	7	20	1	0	1	6	82	1904
15	36	23	2	82	71	72	5	21	0	0	2	6	96	
3	4	-1	-3	-2	-12	-3	-2	1	-1	0	1	0	14	
0	1	2	0	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1905
0	0	0	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
0	-1	-2	0	-1	-3	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	4	1	0	6	1	9	1	0	0	0	0	0	7	1908
0	4	5	0	12	4	18	3	2	0	0	0	1	16	
0	0	4	0	6	3	9	2	2	0	0	0	1	9	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1909
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	4	1	0	5	4	4	0	1	0	0	1	1	4	1910
0	1	5	0	7	1	5	1	2	1	0	0	0	7	
-1	-3	4	0	2	-3	1	1	1	1	0	-1	-1	3	
8	25	23	2	36	30	82	4	17	1	0	1	4	66	1913
12	27	19	2	39	25	68	8	10	1	0	0	13	74	
4	2	-4	0	3	-5	-14	4	-7	0	0	-1	9	8	
6	10	19	2	55	35	46	3	11	0	0	1	1	25	1914
6	11	16	2	41	31	42	6	7	0	0	0	1	39	
0	1	-3	0	-14	-4	-4	3	-4	0	0	-1	0	14	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	2	1	8	6	8	0	0	0	0	1	0	3	1918
0	2	6	0	5	6	17	0	0	1	0	0	0	6	
0	0	4	-1	-3	0	9	0	0	1	0	-1	0	3	
0	1	1	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2001
1	2	1	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼	原發部位別	胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
1802	106	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	107	1	0	0	0	0	10	0	0	0	3	1	0	0
	增減數	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	1	0	0
1901	106	0	0	10	0	5	46	56	1	0	7	5	3	1
	107	0	1	10	0	3	32	58	1	0	10	7	1	0
	增減數	0	1	0	0	-2	-14	2	0	0	3	2	-2	-1
1903	106	0	2	0	2	2	53	27	0	0	29	3	0	0
	107	0	1	0	0	3	51	27	0	0	19	3	1	0
	增減數	0	-1	0	-2	1	-2	0	0	0	-10	0	1	0
1904	106	0	0	5	0	3	16	139	1	0	31	10	4	0
	107	2	2	9	2	4	32	134	0	0	43	11	8	2
	增減數	2	2	4	2	1	16	-5	-1	0	12	1	4	2
1905	106	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1908	106	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	107	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	-1
1909	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1910	106	0	0	0	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	8	4	0	0	3	0	1	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0
1913	106	0	1	9	0	3	24	39	0	0	16	3	3	0
	107	0	2	6	1	3	28	37	0	0	6	3	3	0
	增減數	0	1	-3	1	0	4	-2	0	0	-10	0	0	0
1914	106	1	1	1	0	1	25	45	0	0	27	3	1	0
	107	1	1	1	0	2	27	62	0	0	20	5	1	2
	增減數	0	0	0	0	1	2	17	0	0	-7	2	0	2
1915	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1918	106	0	0	0	0	0	3	12	0	0	7	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	3	8	0	0	5	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-2	0	0	0
2001	106	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	未詳細說明部位腦膜、脊髓及神經系統	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1802
9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	
30	0	0	22	0	4	0	0	1	5	0	0	6	21	1901
32	0	1	13	1	4	0	3	1	7	0	0	7	15	
2	0	1	-9	1	0	0	3	0	2	0	0	1	-6	
2	0	0	4	2	3	0	0	0	4	0	0	0	0	1903
2	1	0	6	6	11	0	1	0	2	0	0	0	2	
0	1	0	2	4	8	0	1	0	-2	0	0	0	2	
21	0	2	10	1	8	0	4	2	10	0	0	9	18	1904
25	0	0	11	1	8	0	2	1	23	0	0	14	16	
4	0	-2	1	0	0	0	-2	-1	13	0	0	5	-2	
1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1905
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	
1	0	0	2	1	3	0	2	0	0	0	0	3	2	1908
0	0	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0	1	0	
-1	0	0	-1	1	-2	0	1	0	0	0	0	-2	-2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1909
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1910
5	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
-3	0	0	0	0	-2	0	1	0	0	0	0	0	1	
30	1	1	18	2	20	0	1	0	10	0	0	5	14	1913
30	0	0	14	2	13	0	2	0	3	0	0	3	8	
0	-1	-1	-4	0	-7	0	1	0	-7	0	0	-2	-6	
9	1	2	8	1	5	0	1	0	11	0	0	7	2	1914
12	1	0	11	0	9	0	3	0	5	0	0	4	4	
3	0	-2	3	-1	4	0	2	0	-6	0	0	-3	2	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1918
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001
6	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	
6	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 ／ 醫院		原發部位別	總計	唇(唇的皮膚 C44.0 除外)	舌	齒齦	口底	口腔之其他及未詳細說明部位	口咽	下咽	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位	主唾液腺
			Total	C00	C01-C02	C03	C04	C05-C06	C09-C10	C12-C13	C14	C07-C08
2002	東基醫療財團法人台東基督教醫院	106	171	0	2	1	0	3	2	2	0	0
		107	129	1	5	0	2	6	1	1	0	0
		增減數	-42	1	3	-1	2	3	-1	-1	0	0
2003	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	106	649	3	20	6	2	17	7	9	0	0
		107	695	11	22	14	3	44	12	12	0	5
		增減數	46	8	2	8	1	27	5	3	0	5
2004	臺北榮民總醫院臺東分院	106	31	0	0	0	0	1	0	1	0	0
		107	106	0	1	0	0	3	1	0	1	0
		增減數	75	0	1	0	0	2	1	-1	1	0
2101	衛生福利部花蓮醫院	106	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		107	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		增減數	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102	臺北榮民總醫院玉里分院	106	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		107	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		增減數	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103	臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	106	660	2	10	10	1	16	3	6	0	0
		107	630	2	14	3	2	18	7	10	0	0
		增減數	-30	0	4	-7	1	2	4	4	0	0
2104	國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處	106	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		107	44	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		增減數	20	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2105	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	106	1,365	20	57	29	4	86	14	30	0	3
		107	1,404	15	55	46	7	93	22	23	0	6
		增減數	39	-5	-2	17	3	7	8	-7	0	3
2201	衛生福利部金門醫院	106	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		107	45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		增減數	24	0	-1	0	0	1	0	0	0	0
總計		106	159,162	514	3,126	1,426	314	3,801	1,176	1,492	33	409
		107	165,627	533	3,198	1,547	360	3,981	1,244	1,631	21	434
		增減數	6,465	19	72	121	46	180	68	139	-12	25

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

鼻咽	食道	胃	小腸	結腸	直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管	膽囊及肝外膽管	胰	後腹膜腔及腹膜	與腹膜分界不明部位消化器官之其他部位及	鼻腔、副竇、中耳及內耳	喉	肺、支氣管及氣管	醫院代碼
C11	C15	C16	C17	C18	C19-C21	C22	C23-C24	C25	C48	C26	C30-C31	C32	C33-C34	
2	5	4	0	66	11	4	1	1	0	0	0	1	9	2002
2	8	4	0	35	6	9	2	1	1	0	0	0	4	
0	3	0	0	-31	-5	5	1	0	1	0	0	-1	-5	
12	27	30	2	71	44	60	2	11	0	0	0	3	77	2003
10	28	22	2	56	39	67	6	17	0	0	1	6	82	
-2	1	-8	0	-15	-5	7	4	6	0	0	1	3	5	
1	1	1	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0	5	2004
2	7	4	0	6	9	9	2	1	0	0	0	0	18	
1	6	3	0	5	5	7	1	1	0	0	0	0	13	
0	5	6	1	11	5	0	0	1	0	0	0	1	3	2101
0	2	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	
0	-3	-4	-1	-7	-2	1	0	-1	0	0	0	-1	-2	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2102
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	
0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
7	31	30	1	112	41	57	7	8	0	0	0	1	57	2103
4	17	27	1	92	31	51	4	25	2	0	0	0	60	
-3	-14	-3	0	-20	-10	-6	-3	17	2	0	0	-1	3	
1	2	5	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2104
0	3	4	0	5	2	4	0	1	0	0	0	0	6	
-1	1	-1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	4	
25	58	42	7	109	63	142	11	11	6	0	2	10	134	2105
18	50	39	4	87	70	120	19	34	1	0	2	14	163	
-7	-8	-3	-3	-22	7	-22	8	23	-5	0	0	4	29	
0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	4	2201
0	6	5	0	5	0	8	0	3	0	0	0	0	2	
0	6	4	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	-2	
2,124	4,068	5,039	527	15,593	8,875	14,275	1,275	3,289	278	19	284	947	18,069	總計
2,142	4,076	5,127	484	16,219	8,540	14,341	1,400	3,615	355	25	295	1,047	19,583	
18	8	88	-43	626	-335	66	125	326	77	6	11	100	1,514	

表九　台灣癌症登記醫院申報個案人次按原發部位別分類，民國 106 年及 107 年（續）

NUMBER OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES REPORTED BY THE PARTICIPANTS OF THE CANCER REGISTRY, 2017 AND 2018 (CONTINUED)

醫院代碼 \ 原發部位別		胸膜 C38.4	胸腺、心臟及中隔 C37-C38.3, C38.8	白血病	骨、關節及關節軟骨 C40-C41	皮下組織結締組織、軟組織及其他 C47, C49	皮膚 C44	女性乳房 C50	男性乳房 C50	子宮，非特定部位 C55	子宮頸 C53	子宮體 C54	卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56, C57.0-C57.4	說明之女性生殖器官陰道、外陰部及其他未詳細 C51-C52, C57.7-C57.9
2002	106	0	0	0	0	1	6	17	0	0	7	5	0	0
	107	0	0	0	0	1	1	18	0	0	7	3	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	-5	1	0	0	0	-2	0	0
2003	106	0	2	4	1	0	17	109	1	0	19	16	5	2
	107	0	1	2	0	3	25	84	1	0	23	12	8	1
	增減數	0	-1	-2	-1	3	8	-25	0	0	4	-4	3	-1
2004	106	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1
	107	0	0	0	0	1	10	9	0	0	1	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	1	5	9	0	0	1	0	0	-1
2101	106	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	1	-2	0	0	0	0	0	0
2102	106	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	6	0	0	0
2103	106	0	4	8	0	5	22	92	1	0	31	13	6	1
	107	1	1	9	0	1	20	87	0	0	36	17	11	3
	增減數	1	-3	1	0	-4	-2	-5	-1	0	5	4	5	2
2104	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	1	0	0
	增減數	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	1	0	0
2105	106	2	3	42	1	7	41	120	0	0	25	20	15	0
	107	1	3	41	1	4	68	117	0	0	21	18	9	0
	增減數	-1	0	-1	0	-3	27	-3	0	0	-4	-2	-6	0
2201	106	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
	107	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
	增減數	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	1	0
總計	106	86	571	2,769	166	753	4,710	22,730	87	8	5,216	3,639	1,857	320
	107	115	672	3,033	220	800	5,040	23,250	82	9	5,191	3,762	1,867	322
	增減數	29	101	264	54	47	330	520	-5	1	-25	123	10	2

表九是採用各醫院申報數計算，未進行院際間重複個案處理

增減數：截至 109 年 3 月 3 日申報之 107 年發生個案數 － 截至 108 年 4 月 16 日申報之 106 年發生個案數。

白血病 (Leukemia)：詳細 ICD-O-3 M-CODE 請見 p.496 附錄五。

攝護腺	睪丸	陰莖及其他男性生殖器官	膀胱	腎	腎盂及其他泌尿器官	眼及淚腺	腦	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位	甲狀腺	其他內分泌腺	其他分界不明部位	不明原發部位	惡性淋巴瘤	醫院代碼
C61	C62	C60, C63	C67	C64	C65-C66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74-C75	C76	C80		
10	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	2002
1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	
-9	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	2	-3	
25	2	1	6	1	3	0	2	0	8	0	0	9	13	2003
25	0	0	12	1	4	0	2	0	6	0	0	7	19	
0	-2	-1	6	0	1	0	0	0	-2	0	0	-2	6	
6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2004
13	0	0	3	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
7	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2101
8	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
3	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	-2	1	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2102
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0	1	16	1	4	0	3	0	5	0	0	3	23	2103
31	1	0	14	1	4	0	0	0	1	0	0	3	19	
10	1	-1	-2	0	0	0	-3	0	-4	0	0	0	-4	
4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2104
1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
-3	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
52	3	0	50	21	24	1	10	1	20	2	0	2	40	2105
64	3	2	32	17	29	1	5	0	33	0	0	7	40	
12	0	2	-18	-4	5	0	-5	-1	13	-2	0	5	0	
2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2201
2	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7,616	309	141	4,429	1,626	3,009	80	946	80	5,309	128	13	1,059	4,546	總計
8,575	322	153	4,383	1,725	3,006	94	968	79	5,837	192	77	982	4,663	
959	13	12	-46	99	-3	14	22	-1	528	64	64	-77	117	

表十　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 80 至 107 年

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1991 TO 2018

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year / 性別 Gender	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
C00-C80	**全癌症（總 計）** **ALL SITES**	男 Male	17,194	18,808	19,607	20,392	21,442	24,605	26,673	29,697	32,250	33,754	34,578
		女 Female	13,000	14,398	14,892	15,282	16,081	18,513	20,487	22,250	24,088	25,127	25,614
		計 Total	**30,194**	**33,206**	**34,499**	**35,674**	**37,523**	**43,118**	**47,160**	**51,947**	**56,338**	**58,881**	**60,192**
C00-C14	**唇、口腔及咽** **LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX**	男 Male	2,003	2,290	2,370	2,552	2,674	3,033	3,338	3,687	4,096	4,316	4,404
		女 Female	534	588	585	587	587	638	652	699	752	743	812
		計 Total	**2,537**	**2,878**	**2,955**	**3,139**	**3,261**	**3,671**	**3,990**	**4,386**	**4,848**	**5,059**	**5,216**
C00-C14[2]	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	1,087	1,309	1,397	1,586	1,683	2,003	2,261	2,553	2,962	3,158	3,265
		女 Female	160	176	173	165	182	238	243	251	295	298	322
		計 Total	**1,247**	**1,485**	**1,570**	**1,751**	**1,865**	**2,241**	**2,504**	**2,804**	**3,257**	**3,456**	**3,587**
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP（excludes skin of lip C44.0）	男 Male	34	54	48	59	71	88	88	101	115	142	148
		女 Female	7	8	5	11	20	14	16	13	14	19	12
		計 Total	**41**	**62**	**53**	**70**	**91**	**102**	**104**	**114**	**129**	**161**	**160**
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	303	362	374	435	484	523	586	707	806	824	903
		女 Female	52	69	71	59	65	99	94	84	123	123	133
		計 Total	**355**	**431**	**445**	**494**	**549**	**622**	**680**	**791**	**929**	**947**	**1,036**
C03	齒齦 GUM	男 Male	59	73	64	79	92	106	141	156	166	209	218
		女 Female	8	11	10	15	12	23	20	17	29	23	31
		計 Total	**67**	**84**	**74**	**94**	**104**	**129**	**161**	**173**	**195**	**232**	**249**
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	26	30	31	41	30	37	59	55	83	78	82
		女 Female	2	7	4	11	4	3	14	6	9	10	5
		計 Total	**28**	**37**	**35**	**52**	**34**	**40**	**73**	**61**	**92**	**88**	**87**
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	403	481	530	600	656	792	892	947	1,170	1,240	1,192
		女 Female	56	55	57	50	53	72	79	87	79	82	88
		計 Total	**459**	**536**	**587**	**650**	**709**	**864**	**971**	**1,034**	**1,249**	**1,322**	**1,280**
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	74	96	100	127	108	133	171	189	221	237	280
		女 Female	18	15	16	8	20	16	11	25	26	25	26
		計 Total	**92**	**111**	**116**	**135**	**128**	**149**	**182**	**214**	**247**	**262**	**306**
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	177	201	237	232	221	294	301	367	375	393	408
		女 Female	10	7	6	9	7	8	7	15	12	12	19
		計 Total	**187**	**208**	**243**	**241**	**228**	**302**	**308**	**382**	**387**	**405**	**427**
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	11	12	13	13	21	30	23	31	26	35	34
		女 Female	7	4	4	2	1	3	2	4	3	4	8
		計 Total	**18**	**16**	**17**	**15**	**22**	**33**	**25**	**35**	**29**	**39**	**42**
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	68	66	46	68	55	65	75	80	102	86	97
		女 Female	48	45	50	47	46	50	45	49	66	69	96
		計 Total	**116**	**111**	**96**	**115**	**101**	**115**	**120**	**129**	**168**	**155**	**193**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3　C00-C06、C09-C10、C12-C14。

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ICD-O-3
36,681	36,597	40,926	41,144	43,524	45,731	46,747	50,517	52,480	53,268	54,636	56,095	57,211	57,992	58,322	60,895	61,779	**C00-C80**
26,448	26,776	30,112	30,790	32,460	34,217	35,873	39,391	40,975	41,732	44,006	45,645	47,979	49,595	50,205	53,754	54,352	
63,129	**63,373**	**71,038**	**71,934**	**75,984**	**79,948**	**82,620**	**89,908**	**93,455**	**95,000**	**98,642**	**101,740**	**105,190**	**107,587**	**108,527**	**114,649**	**116,131**	
4,700	5,207	5,704	5,633	6,175	6,567	6,831	7,394	7,539	7,759	7,952	8,063	8,395	8,394	8,568	8,487	8,717	**C00-C14**
738	759	864	896	918	980	950	1,030	1,034	1,089	1,097	1,077	1,223	1,161	1,174	1,311	1,290	
5,438	**5,966**	**6,568**	**6,529**	**7,093**	**7,547**	**7,781**	**8,424**	**8,573**	**8,848**	**9,049**	**9,140**	**9,618**	**9,555**	**9,742**	**9,798**	**10,007**	
3,518	3,964	4,459	4,384	4,938	5,247	5,544	6,053	6,191	6,419	6,562	6,716	6,995	7,107	7,247	7,154	7,400	C00-C14[2]
333	354	395	415	452	485	445	555	541	593	597	623	694	670	671	754	770	
3,851	**4,318**	**4,854**	**4,799**	**5,390**	**5,732**	**5,989**	**6,608**	**6,732**	**7,012**	**7,159**	**7,339**	**7,689**	**7,777**	**7,918**	**7,908**	**8,170**	
125	124	146	157	144	164	171	195	217	245	269	255	262	271	265	263	256	C00
14	28	16	24	21	24	25	27	18	29	26	29	40	38	27	38	31	
139	**152**	**162**	**181**	**165**	**188**	**196**	**222**	**235**	**274**	**295**	**284**	**302**	**309**	**292**	**301**	**287**	
899	1,118	1,212	1,227	1,287	1,468	1,459	1,646	1,640	1,695	1,756	1,810	1,796	1,934	1,978	1,910	1,897	C01-C02
136	133	174	165	186	203	176	239	223	280	270	258	297	288	293	325	338	
1,035	**1,251**	**1,386**	**1,392**	**1,473**	**1,671**	**1,635**	**1,885**	**1,863**	**1,975**	**2,026**	**2,068**	**2,093**	**2,222**	**2,271**	**2,235**	**2,235**	
217	241	270	282	344	343	409	358	395	502	529	564	643	601	625	687	721	C03
27	33	25	25	35	48	42	45	62	60	60	71	80	67	86	91	100	
244	**274**	**295**	**307**	**379**	**391**	**451**	**403**	**457**	**562**	**589**	**635**	**723**	**668**	**711**	**778**	**821**	
78	80	97	106	113	127	146	127	157	190	155	167	181	222	197	195	229	C04
12	3	10	14	18	6	10	14	13	19	14	12	11	23	15	21	21	
90	**83**	**107**	**120**	**131**	**133**	**156**	**141**	**170**	**209**	**169**	**179**	**192**	**245**	**212**	**216**	**250**	
1,353	1,508	1,672	1,630	1,813	1,830	1,994	2,176	2,161	2,167	2,161	2,163	2,254	2,173	2,259	2,177	2,305	C05-C06
95	106	93	125	130	137	120	153	149	131	133	139	154	139	141	160	143	
1,448	**1,614**	**1,765**	**1,755**	**1,943**	**1,967**	**2,114**	**2,329**	**2,310**	**2,298**	**2,294**	**2,302**	**2,408**	**2,312**	**2,400**	**2,337**	**2,448**	
283	331	398	379	477	504	550	637	608	646	689	715	753	777	811	814	819	C09-C10
27	33	46	37	40	45	54	48	49	56	72	77	71	89	77	80	94	
310	**364**	**444**	**416**	**517**	**549**	**604**	**685**	**657**	**702**	**761**	**792**	**824**	**866**	**888**	**894**	**913**	
510	511	600	560	712	783	769	869	946	956	996	1,022	1,083	1,097	1,080	1,087	1,159	C12-C13
15	14	30	23	19	20	16	23	22	17	21	33	39	25	30	38	42	
525	**525**	**630**	**583**	**731**	**803**	**785**	**892**	**968**	**973**	**1,017**	**1,055**	**1,122**	**1,122**	**1,110**	**1,125**	**1,201**	
53	51	64	43	48	28	46	45	67	18	7	20	23	32	32	21	14	C14
7	4	1	2	3	2	2	6	5	1	1	4	2	1	2	1	1	
60	**55**	**65**	**45**	**51**	**30**	**48**	**51**	**72**	**19**	**8**	**24**	**25**	**33**	**34**	**22**	**15**	
100	102	94	107	117	119	114	157	139	139	167	161	157	152	171	193	195	C07-C08
74	58	93	82	94	78	105	124	110	98	130	117	130	117	127	150	152	
174	**160**	**187**	**189**	**211**	**197**	**219**	**281**	**249**	**237**	**297**	**278**	**287**	**269**	**298**	**343**	**347**	

表十　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 80 至 107 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1991 TO 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year / 性別 Gender	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	848	915	927	898	936	965	1,002	1,054	1,032	1,072	1,042
		女 Female	326	367	362	375	359	350	364	399	391	376	394
		計 Total	**1,174**	**1,282**	**1,289**	**1,273**	**1,295**	**1,315**	**1,366**	**1,453**	**1,423**	**1,448**	**1,436**
C15-C26, C48	**消化器官及腹膜** DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	7,972	8,561	8,859	8,963	9,644	11,037	12,050	13,566	14,458	15,116	15,594
		女 Female	3,647	4,005	4,128	4,357	4,556	5,360	6,147	6,744	7,365	7,763	7,986
		計 Total	**11,619**	**12,566**	**12,987**	**13,320**	**14,200**	**16,397**	**18,197**	**20,310**	**21,823**	**22,879**	**23,580**
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	560	598	610	635	659	791	819	870	917	999	1,166
		女 Female	62	83	63	66	64	90	76	92	92	83	91
		計 Total	**622**	**681**	**673**	**701**	**723**	**881**	**895**	**962**	**1,009**	**1,082**	**1,257**
C16	胃 STOMACH	男 Male	1,789	1,915	1,851	1,755	1,948	2,056	2,072	2,212	2,262	2,212	2,365
		女 Female	865	870	829	826	901	1,021	1,122	1,079	1,124	1,139	1,137
		計 Total	**2,654**	**2,785**	**2,680**	**2,581**	**2,849**	**3,077**	**3,194**	**3,291**	**3,386**	**3,351**	**3,502**
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	63	69	81	65	69	89	105	116	127	137	140
		女 Female	47	40	52	51	55	58	74	60	86	91	96
		計 Total	**110**	**109**	**133**	**116**	**124**	**147**	**179**	**176**	**213**	**228**	**236**
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	1,966	2,253	2,403	2,517	2,555	3,070	3,321	3,790	4,075	4,371	4,320
		女 Female	1,507	1,670	1,817	1,894	1,928	2,276	2,524	2,889	3,049	3,296	3,320
		計 Total	**3,473**	**3,923**	**4,220**	**4,411**	**4,483**	**5,346**	**5,845**	**6,679**	**7,124**	**7,667**	**7,640**
C18	結腸 COLON	男 Male	1,012	1,157	1,235	1,325	1,316	1,681	1,722	2,032	2,226	2,397	2,341
		女 Female	788	918	1,001	1,012	1,095	1,314	1,384	1,627	1,780	1,865	1,913
		計 Total	**1,800**	**2,075**	**2,236**	**2,337**	**2,411**	**2,995**	**3,106**	**3,659**	**4,006**	**4,262**	**4,254**
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	954	1,096	1,168	1,192	1,239	1,389	1,599	1,758	1,849	1,974	1,979
		女 Female	719	752	816	882	833	962	1,140	1,262	1,269	1,431	1,407
		計 Total	**1,673**	**1,848**	**1,984**	**2,074**	**2,072**	**2,351**	**2,739**	**3,020**	**3,118**	**3,405**	**3,386**
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	3,096	3,172	3,287	3,427	3,786	4,332	4,958	5,701	6,129	6,365	6,564
		女 Female	815	961	943	1,079	1,187	1,382	1,752	1,978	2,285	2,385	2,558
		計 Total	**3,911**	**4,133**	**4,230**	**4,506**	**4,973**	**5,714**	**6,710**	**7,679**	**8,414**	**8,750**	**9,122**
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	157	145	230	193	212	215	236	289	312	326	326
		女 Female	140	149	192	179	185	200	242	244	282	292	304
		計 Total	**297**	**294**	**422**	**372**	**397**	**415**	**478**	**533**	**594**	**618**	**630**
C25	胰 PANCREAS	男 Male	280	346	343	313	361	414	459	518	557	635	640
		女 Female	164	179	179	198	184	276	298	330	370	379	390
		計 Total	**444**	**525**	**522**	**511**	**545**	**690**	**757**	**848**	**927**	**1,014**	**1,030**
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	46	46	36	44	39	57	64	60	70	57	58
		女 Female	31	37	36	42	37	51	50	61	58	76	65
		計 Total	**77**	**83**	**72**	**86**	**76**	**108**	**114**	**121**	**128**	**133**	**123**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ICD-O-3
1,082	1,141	1,151	1,142	1,120	1,201	1,173	1,184	1,209	1,201	1,223	1,186	1,243	1,135	1,150	1,140	1,122	C11
331	347	376	399	372	417	400	351	383	398	370	337	399	374	376	407	368	
1,413	**1,488**	**1,527**	**1,541**	**1,492**	**1,618**	**1,573**	**1,535**	**1,592**	**1,599**	**1,593**	**1,523**	**1,642**	**1,509**	**1,526**	**1,547**	**1,490**	
16,592	16,230	18,197	18,187	19,050	19,932	20,172	21,567	22,796	22,860	23,341	23,915	24,020	24,200	23,738	24,785	24,663	**C15-C26, C48**
8,493	8,543	9,615	9,671	10,202	10,591	11,054	11,995	12,569	12,671	13,314	13,532	13,990	13,977	13,860	14,457	14,401	
25,085	**24,773**	**27,812**	**27,858**	**29,252**	**30,523**	**31,226**	**33,562**	**35,365**	**35,531**	**36,655**	**37,447**	**38,010**	**38,177**	**37,598**	**39,242**	**39,064**	
1,193	1,246	1,434	1,431	1,652	1,723	1,894	1,926	2,139	2,084	2,206	2,372	2,462	2,422	2,465	2,593	2,579	C15
117	110	104	98	115	143	143	151	150	140	180	149	166	174	183	207	199	
1,310	**1,356**	**1,538**	**1,529**	**1,767**	**1,866**	**2,037**	**2,077**	**2,289**	**2,224**	**2,386**	**2,521**	**2,628**	**2,596**	**2,648**	**2,800**	**2,778**	
2,485	2,215	2,390	2,260	2,408	2,372	2,360	2,430	2,469	2,453	2,408	2,464	2,354	2,382	2,343	2,350	2,334	C16
1,209	1,145	1,294	1,248	1,277	1,334	1,304	1,466	1,461	1,422	1,432	1,379	1,482	1,521	1,367	1,439	1,464	
3,694	**3,360**	**3,684**	**3,508**	**3,685**	**3,706**	**3,664**	**3,896**	**3,930**	**3,875**	**3,840**	**3,843**	**3,836**	**3,903**	**3,710**	**3,789**	**3,798**	
162	155	159	173	169	201	202	211	202	210	203	223	257	245	242	251	246	C17
93	126	126	94	103	126	134	132	147	137	157	160	176	175	171	223	175	
255	**281**	**285**	**267**	**272**	**327**	**336**	**343**	**349**	**347**	**360**	**383**	**433**	**420**	**413**	**474**	**421**	
4,744	4,768	5,634	5,675	5,946	6,385	6,516	7,339	8,360	8,345	8,707	8,871	9,175	9,108	8,868	9,589	9,512	C18-C21
3,507	3,623	4,238	4,261	4,587	4,723	4,933	5,473	6,051	6,094	6,526	6,599	6,866	6,732	6,784	7,115	7,013	
8,251	**8,391**	**9,872**	**9,936**	**10,533**	**11,108**	**11,449**	**12,812**	**14,411**	**14,439**	**15,233**	**15,470**	**16,041**	**15,840**	**15,652**	**16,704**	**16,525**	
2,602	2,537	3,142	3,163	3,346	3,655	3,687	4,342	5,021	4,886	5,154	5,264	5,464	5,486	5,320	5,679	5,788	C18
1,974	2,099	2,471	2,600	2,721	2,845	3,052	3,467	3,865	3,891	4,329	4,297	4,442	4,520	4,483	4,717	4,761	
4,576	**4,636**	**5,613**	**5,763**	**6,067**	**6,500**	**6,739**	**7,809**	**8,886**	**8,777**	**9,483**	**9,561**	**9,906**	**10,006**	**9,803**	**10,396**	**10,549**	
2,142	2,231	2,492	2,512	2,600	2,730	2,829	2,997	3,339	3,459	3,553	3,607	3,711	3,622	3,548	3,910	3,724	C19-C21
1,533	1,524	1,767	1,661	1,866	1,878	1,881	2,006	2,186	2,203	2,197	2,302	2,424	2,212	2,301	2,398	2,252	
3,675	**3,755**	**4,259**	**4,173**	**4,466**	**4,608**	**4,710**	**5,003**	**5,525**	**5,662**	**5,750**	**5,909**	**6,135**	**5,834**	**5,849**	**6,308**	**5,976**	
6,926	6,733	7,390	7,534	7,553	7,842	7,767	8,075	8,069	8,150	8,106	8,198	7,963	8,121	7,953	8,027	7,819	C22
2,671	2,691	2,928	2,955	3,111	3,224	3,372	3,507	3,452	3,508	3,598	3,682	3,654	3,650	3,561	3,580	3,523	
9,597	**9,424**	**10,318**	**10,489**	**10,664**	**11,066**	**11,139**	**11,582**	**11,521**	**11,658**	**11,704**	**11,880**	**11,617**	**11,771**	**11,514**	**11,607**	**11,342**	
365	357	434	376	395	460	449	501	499	424	505	515	562	549	559	559	580	C23-C24
355	293	341	372	373	375	423	460	455	435	446	437	489	549	565	496	549	
720	**650**	**775**	**748**	**768**	**835**	**872**	**961**	**954**	**859**	**951**	**952**	**1,051**	**1,098**	**1,124**	**1,055**	**1,129**	
643	690	678	673	842	846	883	992	956	1,069	1,093	1,174	1,164	1,259	1,213	1,322	1,481	C25
462	480	502	543	560	585	643	713	725	806	835	948	987	1,016	1,050	1,219	1,269	
1,105	**1,170**	**1,180**	**1,216**	**1,402**	**1,431**	**1,526**	**1,705**	**1,681**	**1,875**	**1,928**	**2,122**	**2,151**	**2,275**	**2,263**	**2,541**	**2,750**	
65	53	65	55	74	84	77	75	83	106	90	90	79	110	88	82	103	C48
70	63	70	83	64	59	70	67	91	101	100	171	166	155	173	171	195	
135	**116**	**135**	**138**	**138**	**143**	**147**	**142**	**174**	**207**	**190**	**261**	**245**	**265**	**261**	**253**	**298**	

表十　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 80 至 107 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1991 TO 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year / 性別 Gender	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
C26	消化器官之其他部位及與腹膜間分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	15	17	18	14	15	13	16	10	9	14	15
		女 Female	16	16	17	22	15	6	9	11	19	22	25
		計 Total	**31**	**33**	**35**	**36**	**30**	**19**	**25**	**21**	**28**	**36**	**40**
C30-C39	**呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS**	男 Male	2,994	3,291	3,337	3,531	3,640	4,241	4,468	4,846	5,252	5,625	5,540
		女 Female	1,159	1,236	1,259	1,336	1,378	1,661	1,768	2,004	2,219	2,289	2,410
		計 Total	**4,153**	**4,527**	**4,596**	**4,867**	**5,018**	**5,902**	**6,236**	**6,850**	**7,471**	**7,914**	**7,950**
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	73	99	72	84	84	79	99	73	98	132	99
		女 Female	54	55	51	39	26	41	40	46	48	61	50
		計 Total	**127**	**154**	**123**	**123**	**110**	**120**	**139**	**119**	**146**	**193**	**149**
C32	喉 LARYNX	男 Male	278	317	282	345	361	368	395	397	431	485	506
		女 Female	22	19	15	18	19	29	29	16	23	23	23
		計 Total	**300**	**336**	**297**	**363**	**380**	**397**	**424**	**413**	**454**	**508**	**529**
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	2,572	2,792	2,887	3,025	3,104	3,673	3,856	4,280	4,593	4,866	4,799
		女 Female	1,054	1,100	1,137	1,228	1,282	1,524	1,642	1,864	2,085	2,128	2,263
		計 Total	**3,626**	**3,892**	**4,024**	**4,253**	**4,386**	**5,197**	**5,498**	**6,144**	**6,678**	**6,994**	**7,062**
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	5	12	10	6	14	13	15	16	16	21	14
		女 Female	4	13	6	4	4	7	5	5	3	7	8
		計 Total	**9**	**25**	**16**	**10**	**18**	**20**	**20**	**21**	**19**	**28**	**22**
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	66	69	84	71	77	108	103	80	114	121	122
		女 Female	24	49	50	46	47	60	52	73	60	70	66
		計 Total	**90**	**118**	**134**	**117**	**124**	**168**	**155**	**153**	**174**	**191**	**188**
C39	呼吸系統及胸腔器官之其他分界不明之部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN **RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS**	男 Male	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		女 Female	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		計 Total	**1**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C42[3]	**白血病 LEUKEMIA**	男 Male	382	363	428	446	490	487	506	513	562	619	614
		女 Female	255	288	289	319	342	356	368	391	395	449	429
		計 Total	**637**	**651**	**717**	**765**	**832**	**843**	**874**	**904**	**957**	**1,068**	**1,043**
C40-C41	**骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE**	男 Male	85	89	84	86	86	93	88	93	87	82	95
		女 Female	72	74	69	46	63	64	62	64	56	75	70
		計 Total	**157**	**163**	**153**	**132**	**149**	**157**	**150**	**157**	**143**	**157**	**165**
C47, C49	**結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES**	男 Male	109	98	110	127	148	155	142	179	188	204	240
		女 Female	68	87	107	96	84	129	137	139	157	162	139
		計 Total	**177**	**185**	**217**	**223**	**232**	**284**	**279**	**318**	**345**	**366**	**379**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

3. 白血病：ICD-O-3　M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ICD-O-3
9	13	13	10	11	19	24	18	19	19	23	8	4	4	7	12	9	C26
9	12	12	17	12	22	32	26	37	28	40	7	4	5	6	7	14	
18	**25**	**25**	**27**	**23**	**41**	**56**	**44**	**56**	**47**	**63**	**15**	**8**	**9**	**13**	**19**	**23**	
5,664	5,696	6,483	6,585	6,788	7,174	7,275	7,912	7,891	8,046	8,226	8,436	8,553	8,948	9,100	9,419	9,739	**C30-C39**
2,607	2,573	2,870	3,049	3,321	3,583	3,679	4,310	4,267	4,482	4,973	5,053	5,576	5,906	6,391	6,917	7,300	
8,271	**8,269**	**9,353**	**9,634**	**10,109**	**10,757**	**10,954**	**12,222**	**12,158**	**12,528**	**13,199**	**13,489**	**14,129**	**14,854**	**15,491**	**16,336**	**17,039**	
99	91	108	115	132	109	134	135	126	138	145	151	155	149	154	147	159	C30-C31
56	50	52	34	57	47	56	81	56	55	75	74	83	66	77	84	68	
155	**141**	**160**	**149**	**189**	**156**	**190**	**216**	**182**	**193**	**220**	**225**	**238**	**215**	**231**	**231**	**227**	
513	465	531	530	546	556	555	597	627	588	632	667	638	627	706	717	757	C32
26	27	32	21	37	25	30	35	34	44	40	33	45	40	41	36	38	
539	**492**	**563**	**551**	**583**	**581**	**585**	**632**	**661**	**632**	**672**	**700**	**683**	**667**	**747**	**753**	**795**	
4,931	4,998	5,701	5,791	5,938	6,311	6,424	6,950	6,922	7,103	7,227	7,364	7,507	7,871	7,911	8,214	8,424	C33-C34
2,440	2,405	2,692	2,888	3,116	3,399	3,469	4,044	4,037	4,244	4,722	4,802	5,294	5,574	6,024	6,557	6,921	
7,371	**7,403**	**8,393**	**8,679**	**9,054**	**9,710**	**9,893**	**10,994**	**10,959**	**11,347**	**11,949**	**12,166**	**12,801**	**13,445**	**13,935**	**14,771**	**15,345**	
18	21	16	18	34	45	32	31	43	40	48	49	55	59	74	58	68	C38.4
9	6	4	11	17	11	7	15	19	17	16	15	18	24	25	16	24	
27	**27**	**20**	**29**	**51**	**56**	**39**	**46**	**62**	**57**	**64**	**64**	**73**	**83**	**99**	**74**	**92**	
103	121	127	131	138	153	130	199	172	177	174	204	198	242	255	283	331	C37-C38.3,
76	85	90	95	94	101	116	135	121	121	120	129	136	202	224	224	249	C38.8
179	**206**	**217**	**226**	**232**	**254**	**246**	**334**	**293**	**298**	**294**	**333**	**334**	**444**	**479**	**507**	**580**	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	C39
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
828	859	878	930	929	1,024	989	1,177	1,188	1,221	1,254	1,287	1,324	1,300	1,351	1,472	1,455	**C42**
559	553	602	658	654	685	746	833	828	825	903	887	956	921	996	1,026	1,095	
1,387	**1,412**	**1,480**	**1,588**	**1,583**	**1,709**	**1,735**	**2,010**	**2,016**	**2,046**	**2,157**	**2,174**	**2,280**	**2,221**	**2,347**	**2,498**	**2,550**	
88	69	85	113	79	87	95	100	95	99	110	100	90	83	75	79	95	**C40-C41**
74	48	69	74	76	78	83	90	77	78	73	58	68	65	67	53	64	
162	**117**	**154**	**187**	**155**	**165**	**178**	**190**	**172**	**177**	**183**	**158**	**158**	**148**	**142**	**132**	**159**	
236	196	225	226	247	267	265	316	299	296	307	343	344	356	358	359	362	**C47, C49**
163	187	190	177	175	163	184	213	243	212	233	276	273	296	283	260	270	
399	**383**	**415**	**403**	**422**	**430**	**449**	**529**	**542**	**508**	**540**	**619**	**617**	**652**	**641**	**619**	**632**	

表十　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 80 至 107 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1991 TO 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year / 性別 Gender	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
C44	**皮膚 SKIN**	男 Male	393	462	455	532	483	645	715	809	903	890	981
		女 Female	304	368	377	421	451	540	624	740	724	760	866
		計 Total	**697**	**830**	**832**	**953**	**934**	**1,185**	**1,339**	**1,549**	**1,627**	**1,650**	**1,847**
C44[4]	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	42	54	54	51	38	72	60	77	90	78	85
		女 Female	33	47	42	39	43	53	63	69	76	79	75
		計 Total	**75**	**101**	**96**	**90**	**81**	**125**	**123**	**146**	**166**	**157**	**160**
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	351	408	401	481	445	573	655	732	813	812	896
		女 Female	271	321	335	382	408	487	561	671	648	681	791
		計 Total	**622**	**729**	**736**	**863**	**853**	**1,060**	**1,216**	**1,403**	**1,461**	**1,493**	**1,687**
C50	**女性乳房 FEMALE BREAST**	**女** Female	1,991	2,264	2,399	2,515	2,847	3,122	3,640	3,810	4,536	4,679	4,888
C50	**男性乳房 MALE BREAST**	**男** Male	15	19	19	24	18	12	23	24	29	25	27
C51-C58	**女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS**	**女** Female	3,079	3,345	3,369	3,278	3,446	3,992	4,100	4,336	4,394	4,472	4,179
C55	子宮，非特定部位 UTERUS, NOS	女 Female	43	33	23	35	17	5	7	11	11	12	6
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	2,279	2,484	2,471	2,360	2,462	2,943	2,871	2,976	2,967	2,916	2,552
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	262	311	325	327	343	399	495	549	553	627	714
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	415	407	462	480	514	546	633	677	732	790	789
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	80	110	88	76	110	99	94	123	131	127	118
C60-C63	**男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS**	**男** Male	692	779	929	941	1,136	1,351	1,645	1,897	2,155	2,296	2,355

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3　C44，　M-87203 - M-87903。

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ICD-O-3
1,126	956	1,218	1,148	1,313	1,394	1,442	1,640	1,643	1,654	1,859	1,996	2,079	2,079	2,028	2,146	2,153	**C44**
918	810	1,000	1,081	1,135	1,171	1,255	1,386	1,451	1,434	1,476	1,757	1,660	1,782	1,682	1,749	1,896	
2,044	**1,766**	**2,218**	**2,229**	**2,448**	**2,565**	**2,697**	**3,026**	**3,094**	**3,088**	**3,335**	**3,753**	**3,739**	**3,861**	**3,710**	**3,895**	**4,049**	
102	72	99	93	103	117	113	148	140	132	150	159	129	150	141	158	145	C44[4]
77	71	91	83	81	95	89	131	92	110	116	108	128	125	123	131	134	
179	**143**	**190**	**176**	**184**	**212**	**202**	**279**	**232**	**242**	**266**	**267**	**257**	**275**	**264**	**289**	**279**	
1,024	884	1,119	1,055	1,210	1,277	1,329	1,492	1,503	1,522	1,709	1,837	1,950	1,929	1,887	1,988	2,008	C44
841	739	909	998	1,054	1,076	1,166	1,255	1,359	1,324	1,360	1,649	1,532	1,657	1,559	1,618	1,762	
1,865	**1,623**	**2,028**	**2,053**	**2,264**	**2,353**	**2,495**	**2,747**	**2,862**	**2,846**	**3,069**	**3,486**	**3,482**	**3,586**	**3,446**	**3,606**	**3,770**	
5,088	5,380	6,337	6,740	7,065	7,826	8,389	9,149	9,825	10,221	10,682	11,413	11,908	12,530	12,829	14,175	14,217	**C50**
38	31	48	49	48	39	35	49	41	49	35	53	48	47	50	67	60	**C50**
3,905	3,926	4,315	4,143	4,244	4,286	4,534	4,686	4,933	4,884	5,011	5,169	5,434	5,646	5,689	5,952	5,961	**C51-C58**
5	2	8	7	8	16	6	11	9	10	17	14	6	8	8	8	6	C55
2,193	2,097	2,370	2,026	1,888	1,825	1,786	1,824	1,707	1,699	1,589	1,595	1,470	1,497	1,453	1,443	1,433	C53
786	815	921	1,032	1,190	1,196	1,443	1,534	1,763	1,734	1,958	2,034	2,273	2,456	2,506	2,747	2,787	C54
817	862	889	940	1,039	1,092	1,135	1,160	1,294	1,276	1,271	1,350	1,502	1,478	1,541	1,562	1,557	C56, C57.0-C57.4
104	150	127	138	119	157	164	157	160	165	176	176	183	207	181	192	178	C51-C52 C57.7-C57.9
2,601	2,524	3,035	3,045	3,429	3,710	3,979	4,377	4,743	5,028	5,141	5,186	5,350	5,547	5,850	6,453	7,037	**C60-C63**

表十　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 80 至 107 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1991 TO 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year / 性別 Gender	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	580	654	795	807	1,000	1,228	1,520	1,745	1,988	2,113	2,170
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	59	66	70	79	82	59	64	81	94	106	102
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	53	59	64	55	54	64	61	71	73	77	83
C64-C68	**泌尿器官** **URINARY TRACT**	男 Male	1,042	1,174	1,201	1,363	1,334	1,538	1,723	1,863	2,111	2,020	2,196
		女 Female	460	540	615	665	646	750	951	992	1,114	1,208	1,222
		計 Total	**1,502**	**1,714**	**1,816**	**2,028**	**1,980**	**2,288**	**2,674**	**2,855**	**3,225**	**3,228**	**3,418**
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	666	750	752	834	808	950	1,065	1,156	1,295	1,249	1,291
		女 Female	237	264	289	308	291	349	434	413	476	491	523
		計 Total	**903**	**1,014**	**1,041**	**1,142**	**1,099**	**1,299**	**1,499**	**1,569**	**1,771**	**1,740**	**1,814**
C64-C66, C68	腎及其他泌尿器官 KIDNEY AND OTHER URINARY TRACT	男 Male	376	424	449	529	526	588	658	707	816	771	905
		女 Female	223	276	326	357	355	401	517	579	638	717	699
		計 Total	**599**	**700**	**775**	**886**	**881**	**989**	**1,175**	**1,286**	**1,454**	**1,488**	**1,604**
C64	腎 KIDNEY	男 Male	184	215	205	265	265	294	319	330	378	380	414
		女 Female	86	112	118	133	151	165	198	214	202	217	202
		計 Total	**270**	**327**	**323**	**398**	**416**	**459**	**517**	**544**	**580**	**597**	**616**
C65-C66, C68	腎盂及其他泌尿器官（膀胱、腎除外） RENAL PELVIS AND OTHER URINARY TRACT（excludes bladder and kidney）	男 Male	192	209	244	264	261	294	339	377	438	391	491
		女 Female	137	164	208	224	204	236	319	365	436	500	497
		計 Total	**329**	**373**	**452**	**488**	**465**	**530**	**658**	**742**	**874**	**891**	**988**
C69	**眼及淚腺** **EYE AND LACRIMAL GLAND**	男 Male	31	27	24	26	25	24	24	25	30	39	34
		女 Female	27	26	24	22	30	18	21	21	24	29	32
		計 Total	**58**	**53**	**48**	**48**	**55**	**42**	**45**	**46**	**54**	**68**	**66**
C70-C72	**中樞神經系統** **BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM**	男 Male	308	290	324	341	289	325	349	328	398	388	385
		女 Female	208	213	200	226	199	229	226	276	263	301	296
		計 Total	**516**	**503**	**524**	**567**	**488**	**554**	**575**	**604**	**661**	**689**	**681**
C71	腦 BRAIN	男 Male	283	266	289	313	274	310	323	294	369	358	352
		女 Female	189	193	178	204	174	204	203	250	243	264	270
		計 Total	**472**	**459**	**467**	**517**	**448**	**514**	**526**	**544**	**612**	**622**	**622**
C70, C72	腦膜、脊髓及神經系統未詳細說明部位 MENINGES, SPINAL CORD, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male	25	24	35	28	15	15	26	34	29	30	33
		女 Female	19	20	22	22	25	25	23	26	20	37	26
		計 Total	**44**	**44**	**57**	**50**	**40**	**40**	**49**	**60**	**49**	**67**	**59**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ICD-O-3
2,382	2,307	2,827	2,819	3,178	3,481	3,700	4,112	4,467	4,723	4,799	4,878	4,991	5,186	5,474	6,070	6,644	C61
120	112	121	133	157	145	181	172	182	195	215	212	251	253	269	273	277	C62
99	105	87	93	94	84	98	93	94	110	127	96	108	108	107	110	116	C60,C63
2,168	2,223	2,396	2,455	2,543	2,657	2,729	2,803	2,877	2,864	2,942	3,069	3,272	3,189	3,263	3,519	3,323	**C64-C68**
1,209	1,336	1,369	1,418	1,551	1,540	1,628	1,759	1,742	1,730	1,806	1,846	2,042	2,029	2,061	2,218	2,097	
3,377	**3,559**	**3,765**	**3,873**	**4,094**	**4,197**	**4,357**	**4,562**	**4,619**	**4,594**	**4,748**	**4,915**	**5,314**	**5,218**	**5,324**	**5,737**	**5,420**	
1,287	1,312	1,446	1,406	1,450	1,505	1,527	1,462	1,467	1,438	1,455	1,528	1,662	1,561	1,653	1,757	1,568	C67
508	533	544	551	602	609	595	600	558	596	603	597	680	682	681	726	671	
1,795	**1,845**	**1,990**	**1,957**	**2,052**	**2,114**	**2,122**	**2,062**	**2,025**	**2,034**	**2,058**	**2,125**	**2,342**	**2,243**	**2,334**	**2,483**	**2,239**	
881	911	950	1,049	1,093	1,152	1,202	1,341	1,410	1,426	1,487	1,541	1,610	1,628	1,610	1,762	1,755	C64-C66
701	803	825	867	949	931	1,033	1,159	1,184	1,134	1,203	1,249	1,362	1,347	1,380	1,492	1,426	C68
1,582	**1,714**	**1,775**	**1,916**	**2,042**	**2,083**	**2,235**	**2,500**	**2,594**	**2,560**	**2,690**	**2,790**	**2,972**	**2,975**	**2,990**	**3,254**	**3,181**	
404	411	439	514	502	549	629	643	710	724	849	854	948	937	938	1,020	1,005	C64
212	232	259	267	286	294	301	372	381	362	413	430	479	462	475	499	468	
616	**643**	**698**	**781**	**788**	**843**	**930**	**1,015**	**1,091**	**1,086**	**1,262**	**1,284**	**1,427**	**1,399**	**1,413**	**1,519**	**1,473**	
477	500	511	535	591	603	573	698	700	702	638	687	662	691	672	742	750	C65-C66
489	571	566	600	663	637	732	787	803	772	790	819	883	885	905	993	958	C68
966	**1,071**	**1,077**	**1,135**	**1,254**	**1,240**	**1,305**	**1,485**	**1,503**	**1,474**	**1,428**	**1,506**	**1,545**	**1,576**	**1,577**	**1,735**	**1,708**	
35	20	29	29	30	30	37	26	39	31	22	44	18	21	25	33	23	**C69**
14	19	16	18	23	24	15	23	27	20	26	26	28	23	42	32	31	
49	**39**	**45**	**47**	**53**	**54**	**52**	**49**	**66**	**51**	**48**	**70**	**46**	**44**	**67**	**65**	**54**	
379	357	376	368	392	392	423	451	465	444	445	450	467	448	444	480	447	**C70-C72**
261	246	291	299	321	295	316	296	369	362	353	358	380	410	377	356	350	
640	**603**	**667**	**667**	**713**	**687**	**739**	**747**	**834**	**806**	**798**	**808**	**847**	**858**	**821**	**836**	**797**	
335	326	350	334	352	347	381	404	432	393	401	403	419	384	384	437	407	C71
228	214	258	255	289	252	268	244	329	319	306	294	319	356	334	318	312	
563	**540**	**608**	**589**	**641**	**599**	**649**	**648**	**761**	**712**	**707**	**697**	**738**	**740**	**718**	**755**	**719**	
44	31	26	34	40	45	42	47	33	51	44	47	48	64	60	43	40	C70, C72
33	32	33	44	32	43	48	52	40	43	47	64	61	54	43	38	38	
77	**63**	**59**	**78**	**72**	**88**	**90**	**99**	**73**	**94**	**91**	**111**	**109**	**118**	**103**	**81**	**78**	

表十　台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及報告年分類，民國 80 至 107 年（續）

NUMERICAL COMPARISON OF CANCER FROM PRIMARY ANATOMIC SITES, 1991 TO 2018 （CONTINUED）

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	年度 Year / 性別 Gender	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
C73	**甲狀腺 THYROID GLAND**	男 Male	135	196	201	185	181	202	196	238	224	291	273
		女 Female	476	597	667	593	630	704	775	902	1,004	978	1,012
		計 Total	**611**	**793**	**868**	**778**	**811**	**906**	**971**	**1,140**	**1,228**	**1,269**	**1,285**
C74-C75	**其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS**	男 Male	31	32	24	31	33	27	41	34	33	49	33
		女 Female	28	25	16	18	22	28	29	27	28	28	24
		計 Total	**59**	**57**	**40**	**49**	**55**	**55**	**70**	**61**	**61**	**77**	**57**
C76	**其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES**	男 Male	51	60	47	39	26	4	5	2	6	9	3
		女 Female	63	47	41	27	32	9	6	3	5	6	4
		計 Total	**114**	**107**	**88**	**66**	**58**	**13**	**11**	**5**	**11**	**15**	**7**
C80	**不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES**	男 Male	288	368	406	467	463	511	524	636	676	708	613
		女 Female	251	256	288	311	314	370	369	431	433	468	441
		計 Total	**539**	**624**	**694**	**778**	**777**	**881**	**893**	**1,067**	**1,109**	**1,176**	**1,054**
	惡性淋巴瘤 [1] MALIGNANT LYMPHOMA	男 Male	513	628	700	683	719	859	776	881	954	992	1,131
		女 Female	278	386	408	419	419	496	566	629	570	662	766
		計 Total	**791**	**1,014**	**1,108**	**1,102**	**1,138**	**1,355**	**1,342**	**1,510**	**1,524**	**1,654**	**1,897**

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-CODE 範圍請見 P.496 附錄五。

5. 本表之數值與歷年出版之年報略有差異，此因癌登資料庫隨時保持最新狀態，若有任何異動或以往尚未入檔之個案，癌登中心會隨時加以更新。

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ICD-O-3
365	312	355	382	424	443	432	552	591	645	672	771	833	906	940	985	1,143	**C73**
1,097	1,011	1,200	1,187	1,284	1,462	1,568	1,881	1,894	1,972	2,271	2,394	2,562	2,813	2,879	3,245	3,302	
1,462	**1,323**	**1,555**	**1,569**	**1,708**	**1,905**	**2,000**	**2,433**	**2,485**	**2,617**	**2,943**	**3,165**	**3,395**	**3,719**	**3,819**	**4,230**	**4,445**	
45	27	39	33	30	30	34	34	27	40	44	52	63	52	44	67	80	**C74-C75**
25	33	26	23	30	32	30	31	27	31	30	33	43	38	36	55	91	
70	**60**	**65**	**56**	**60**	**62**	**64**	**65**	**54**	**71**	**74**	**85**	**106**	**90**	**80**	**122**	**171**	
2	3	3	2	7	10	4	1	10	9	12	8	2	6	3	10	58	**C76**
5	1	6	6	4	7	8	8	7	1	6	3	4	7	8	6	14	
7	**4**	**9**	**8**	**11**	**17**	**12**	**9**	**17**	**10**	**18**	**11**	**6**	**13**	**11**	**16**	**72**	
634	628	584	602	602	518	504	471	539	560	499	489	488	459	497	426	354	**C80**
426	464	396	405	444	393	359	428	397	412	402	357	333	379	294	296	289	
1,060	**1,092**	**980**	**1,007**	**1,046**	**911**	**863**	**899**	**936**	**972**	**901**	**846**	**821**	**838**	**791**	**722**	**643**	
1,168	1,253	1,256	1,352	1,427	1,456	1,500	1,644	1,693	1,662	1,773	1,829	1,864	1,956	1,983	2,107	2,065	
858	880	937	937	1,008	1,098	1,071	1,269	1,282	1,306	1,346	1,403	1,498	1,611	1,533	1,643	1,681	
2,026	**2,133**	**2,193**	**2,289**	**2,435**	**2,554**	**2,571**	**2,913**	**2,975**	**2,968**	**3,119**	**3,232**	**3,362**	**3,567**	**3,516**	**3,750**	**3,746**	

附錄一　ICD-O-3多重原發性腫瘤分類標準

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3)

1. 多個原發腫瘤並非依據癌症發生的時間先後順序來認定。

2. 蔓延、復發與轉移部位的癌症都不是原發癌症。復發部位：請推至原發的部位與時間來申報，若原發癌症已申報過復發時則不需再申報；轉移部位：則須找到原發部位來申報。

3. 在 ICD-O-3 中，某些 T-code 碼群組應視為單一部位（請見 Table 1）。當組織形態於 Table 2 為相同組時，不能以多個原發腫瘤來申報。

例如：C00 Lip與C03 Gum

依Table 1可視為單一部位。當組織形態同組時，如果於不同時間診斷出，請申報最早的部位；若相同時間診斷則申報C06.9。

多重焦點腫瘤（Multifocal tumors）：意指同一解剖部位發生多個分離、不相連的原發腫瘤且組織形態同組時，應視為單一原發癌症。例如：膀胱就常有multifocal tumors的情形，但均應視為單一部位。

4. 規則 3 不適用於下列 2 種情形：

4.1 系統性（systemic）或多重中心（multicentric）所報告的癌症可能會在全身多處器官發生，此種癌症應視為一個原發癌症，僅需申報一次。系統性或多重中心癌症包括 Table 2 中 group 15 的 Kaposi sarcoma 和 group 8-14 的造血系統腫瘤（tumours of the haematopoietic system）。

4.2 來自相同的原發部位但組織形態（morphology）不同，若要判定是否為多個原發腫瘤，請依據組織形態在 Table 2 中是否屬於同一組來決定。如果在同一組就必須視為單一原發癌症，組織形態請取高碼。相對地，組織形態在 Table 2 中屬於不同組，就要申報成多個原發腫瘤，即使在相同的部位也要視為多個原發腫瘤。

除此之外，如果有2種不同的組織形態，其中一種在Table 2中屬於group (5)、(14)、(17)的未明確組織形態，但另一種有明確組織形態，請申報有明確組織形態的個案，未明確組織形態的診斷請忽略。

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

1. The recognition of the existence of two or more primary cancers dose not depend on time.

2. A primary cancer is one that originates in a primary site or tissue and is not an extension, nor a recurrence, nor a metastasis.

3. Only one tumour shall be recognised as arising in an organ or pair of organs or tissue.

Some groups of codes are considered to be a single organ for the purposes of defining multiple tumours. These topography code groups are shown in Table 1.

Multifocal tumours – that is, discrete masses apparently not in continuity with other primary cancers originating in the *same* primary site or tissue, for example bladder – are counted as a single cancer.

4. Rule 3 dose not apply in two circumstances:

4.1. Systemic (or multicentric) cancers potentially involving many different organs are only counted once in any individual. These are Kaposi sarcoma (group 15 in Table 2) and tumours of the haematopoietic system (group 8-14 in Table 2).

4.2. Neoplasms of different morphology should be regarded as multiple cancers (even if they are diagnosed simultaneously in the same site).

If the morphological diagnoses fall into one category in Table 2, and arise in the same primary site, they are considered to be the same morphology for the purpose of counting multiple primaries. If the morphological diagnoses fall into two or more of the categories in Table 2, even if they concern the same site, the morphology is considered to be different, and two or more cases should be counted.

Single tumours containing several different histologies which fall into one histological group in Table 2 are registered as a single case, using the numerically highest ICD-O morphology code.

If, however, one morphology is not specific (group (5), (14) and (17)) and a specific morphology is available, the case should be reported with the specific histology and the non-specific diagnosis should be ignored.

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 1. Groups of topography codes considered a single site in the definition of multiple cancers

ICD-O-2/3 site code	Label	If diagnosed at different times, code first diagnosis. If diagnosed at the same time use codes given below.
C01	Base of tongue	
C02	Other and unspecified parts of tongue	C02.9
C00	Lip	
C03	Gum	
C04	Floor of mouth	
C05	Palate	
C06	Other and unspecified parts of mouth	C06.9
C09	Tonsil	
C10	Oropharynx	
C12	Pyriform sinus	
C13	Hypopharynx	
C14	Other and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx	C14.0
C19	Rectosigmoid junction	
C20	Rectum	C20.9
C23	Gallbladder	
C24	Other and unspecified parts of biliary tract	C24.9
C33	Trachea	
C34	Bronchus and lung	C34.9
C40	Bones, joints and articular cartilage of limbs	
C41	Bones, joints and articular cartilage of other and unspecified sites	C41.9
C65	Renal pelvis	
C66	Ureter	
C67	Bladder	
C68	Other and unspecified urinary organs	C68.9

INTERNATIONAL RULES FOR MULTIPLE PRIMARY CANCERS (ICD-O-3) (CONTINUED)

Table 2. Groups of malignant neoplasms considered to be histologically 'different' for the purpose of defining multiple tumours (adapted from Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Schottenfeld D & Fraumeni JF Jr. *Cancer Epidemiology and Prevention*, 2nd edition, Chapter 3 of Section 1: Basic Concepts. Oxford, New York, Oxford University Press, pp. 28-44, 1994).

Group	
Carcinomas	
1. Squamous and transitional cell carcinoma	8051-8084, 8120-8131
2. Basal cell carcinomas	8090-8110
3. Adenocarcinomas	8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 8940-8941
4. Other specific carcinomas	8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 8580-8671
(5) Unspecified carcinomas (NOS)	8010-8015, 8020-8022, 8050
6. *Sarcomas* and soft tissue tumours	8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7. ***Mesothelioma***	9050-9055
Tumours of haematopoietic and lymphoid tissues	
8. Myeloid	9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987
9. B-cell neoplasms	9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940
10. T-cell and NK-cell neoplasms	9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11. Hodgkin lymphoma	9650-9667
12. Mast-cell Tumours	9740-9742
13. Histiocytes and Accessory Lymphoid cells	9750-9758
(14) Unspecified types	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989
15. ***Kaposi sarcoma***	9140
16. ***Other specified*** types of cancer	8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380- 9539
(17) ***Unspecified*** types of cancer	8000-8005

附錄二　衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄表(短表)

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第一頁】

申報醫院名稱：　　4碼代碼 [ ][ ][ ][ ]　　申報醫院代碼 1.1 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

患者資料

病歷號碼 1.2 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

姓名 1.3 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

身分證統一編號 1.4 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

性別 1.5 [ ]
- **1** 男性。
- **2** 女性。
- **3** 其他（如：雙性人）。
- **4** 變性人。
- **9** 不詳。

出生日期 1.6 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

戶籍地代碼 1.7 [ ][ ][ ][ ]

癌症確認

診斷年齡 2.1 [ ][ ][ ]

癌症發生順序號碼 2.2 [ ][ ]

個案分類 2.3 [ ]
- **0** 申報醫院診斷，但未於申報醫院接受首次療程。
- **1** 申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。
- **2** 他院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。
- **3** 他院診斷，未於申報醫院接受任何首次療程；因復發或持續的癌症問題至申報醫院就診或是僅於申報醫院接受委外部分放射治療或僅執行維持性(maintenance)治療。
- **5** 屍體解剖時才診斷為癌症。
- **7** 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院，不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。(不需申報)
- **8** 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。(不需申報)
- **9** 不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。

診斷狀態分類 2.3.1 [ ]
- **1** 於申報醫院診斷。
- **2** 於他院診斷，因該癌症於首次療程內/未復發/復發狀況不明下，至申報醫院就診。
- **3** 於他院診斷，因該癌症復發或惡化後，才至申報醫院就診。
- **5** 屍體解剖時才診斷為癌症。
- **7** 僅有病理檢查報告。個案未因診斷或治療癌症而到申報醫院。不包括由屍體解剖才診斷為癌症的個案。
- **8** 僅由死亡診斷證明書診斷為癌症。

治療狀態分類 2.3.2 [ ]
- **0** 未於申報醫院接受任何治療即死亡或病危出院。
- **1** 僅於申報醫院接受首次療程，未於他院接受任何首次療程；首次療程僅接受其他治療(other treatment)。
- **2** 未於申報醫院接受任何首次療程；主要治療計畫由他院規畫，申報醫院接受委外部分放射治療或僅執行維持性治療。
- **3** 於申報醫院接受部分首次療程，也於他院接受部分首次療程；申報醫院委託他院執行部分放射治療。
- **4** 首次療程為不予治療或是再密切觀察；首此療程僅給予非腫瘤切除之緩和性手術、疼痛控制、支持療法、轉介安寧照護。
- **5** 首次療程僅為另類治療。
- **6** 首次療程為個案拒絕治療。
- **7** 他院診斷及治療，因癌症或其治療的併發症至申報醫院求診。
- **8** 他院診斷個案，為了其他疾病至申報醫院求診。(不需申報)
- **9** 首次療程不詳，也無法確認個案拒絕治療。

首次就診日期 2.4 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

最初診斷日期 2.5 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

原發部位 2.6 C[ ][ ][ ]

側性 2.7 [ ]
- **0** 非成對器官。
- **1** 右側。
- **2** 左側。
- **3** 成對器官，只有單側侵犯，左、右側不詳。
- **4** 成對器官，雙側侵犯，側位不詳。
- **5** 成對器官，位於身體中線。
- **9** 成對器官，側位不詳。

組織型態 2.8 [ ][ ][ ][ ] / 性態碼 2.9 [ ]

臨床分級/分化 2.10.1 (請參考摘錄手冊附錄 D) [ ]
- **1** Site-specific grade system category
- **2** Site-specific grade system category
- **3** Site-specific grade system category
- **4** Site-specific grade system category
- **5** Site-specific grade system category
- **L** Low grade
- **H** High grade
- **M** Site-specific grade system category
- **S** Site-specific grade system category
- **A** Well differentiated
- **B** Moderately differentiated
- **C** Poorly differentiated
- **D** Undifferentiated、Anaplastic
- **E** Site-specific grade system category
- **X** High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma
- **8** 不適用**(For Lymphomas and Leukemias)**
- **9** 分化/分級不明、病歷未記載；首次治療前未有分級/分化；術後才診斷為癌症。

病理分級/分化 2.10.2 (請參考摘錄手冊附錄 D) [ ]
- **1** Site-specific grade system category
- **2** Site-specific grade system category
- **3** Site-specific grade system category
- **4** Site-specific grade system category
- **5** Site-specific grade system category
- **L** Low grade
- **H** High grade
- **M** Site-specific grade system category
- **S** Site-specific grade system category
- **A** Well differentiated
- **B** Moderately differentiated
- **C** Poorly differentiated
- **D** Undifferentiated、Anaplastic
- **E** Site-specific grade system category
- **X** High grade dysplasia(severe dysplasia); Ovary borderline tumor (Low malignant potential)合併 microinvasion 或/及 intraepithelial carcinoma
- **8** 不適用**(For Lymphomas and Leukemias)**
- **9** 分化/分級不明、病歷未記載；原發部位未接受手術；術前已接受前導性治療。

癌症確診方式 2.11 [ ]
- **1** 組織病理學確診。
- **2** 細胞學確診。
- **3** 組織病理學確診加上免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性 (適用組織型態 M9590-9993)。
- **4** 經顯微鏡證實，但未描述確診方式。
- **5** 實驗室試驗/腫瘤標記檢查為陽性，但未經顯微鏡證實或免疫表現分型陽性 同時/或 基因檢測為陽性。
- **6** 直接察看診斷，但未經顯微鏡證實。
- **7** 放射線或其他影像學診斷，但未經顯微鏡證實。
- **8** 僅臨床診斷 (不包含 5,6,7)。
- **9** 不清楚是否有經顯微鏡檢證實。

首次顯微鏡檢證實日期 2.12 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

衛生福利部國民健康署癌症登記摘錄(短)表 【第二頁】

首次療程

首次手術日期 4.1.1

申報醫院原發部位手術方式 4.1.4

00 無。 **90** 有。 **99** 不詳。
80 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療。
81 肝癌個案接受編碼 82-84 內任兩種以上之局部腫瘤破壞治療和切除手術。
82 肝癌個案接受 TAE。
83 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT。
84 肝癌個案接受 RFA。
85 肝癌個案接受 TAE 和切除手術。
86 肝癌個案接受 PEIT/ PAIT 和切除手術。
87 肝癌個案接受 RFA 和切除手術。
88 肝癌個案接受非上述之局部腫瘤破壞治療。
89 攝護腺癌個案僅接受 Transurethral resection (TURP)。

放射治療開始日期 4.2.1.3

放射治療機構 4.2.1.7

0 無。 **1** 有。 **9** 不詳。

申報醫院化學治療 4.3.3

00 未接受化學治療，化學治療非首次療程的一部份。
01 接受全身性化學治療
04 個案原發部位僅接受局部動脈栓塞化學治療(TACE)。
05 個案原發部位接受 TACE 及全身性化學治療。
06 個案原發部位接受 TACE 及其他局部性化學治療。
07 個案原發部位接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療。
08 個案僅接受局部性化學治療(不包含 TACE)。
09 個案同時接受全身性及局部性化學治療(不包含 TACE)。
10 轉移性肝癌個案接受 TACE。
11 轉移性肝癌個案接受 TACE 及全身性化學治療。
12 轉移性肝癌個案接受 TACE 及其他局部性化學治療。
13 轉移性肝癌個案接受 TACE、其他局部性及全身性化學治療
20 僅接受臨床試驗化學治療。
21 同時接受非臨床試驗化學治療及臨床試驗化學治療。
30 僅接受雙盲試驗化學治療。
31 同時接受非試驗性化學治療及雙盲試驗化學治療。
88 化學治療雖是既定之首次療程計畫，但摘錄時尚未執行。
99 不詳。

申報醫院化學治療開始日期 4.3.4

申報醫院荷爾蒙/類固醇治療 4.3.6

00 無。 **01** 有。 **99** 不詳。
20 僅接受臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。
21 同時接受非臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療及臨床試驗荷爾蒙/類固醇治療。
30 僅接受雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。
31 同時接受非試驗性荷爾蒙/類固醇治療及雙盲試驗荷爾蒙/類固醇治療。
88 荷爾蒙/類固醇治療雖然是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。

申報醫院荷爾蒙/類固醇治療開始日期 4.3.7

申報醫院免疫治療 4.3.9

00 未接受免疫治療，免疫治療非首次療程的一部份。
01 接受全身性免疫治療。
02 接受局部性免疫治療。
03 接受全身性與局部性免疫治療。
20 僅接受臨床試驗免疫治療。
21 同時接受非臨床試驗全身性或/與局部性免疫治療及臨床試驗免疫治療。
30 僅接受雙盲試驗免疫治療。
31 同時接受非試驗性全身性或/與局部性免疫治療及雙盲試驗免疫治療。
88 免疫治療雖然是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。
99 不詳。

申報醫院免疫治療開始日期 4.3.10

申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置 4.3.11

00 無。 **99** 不詳。
10 骨髓移植。 **20** 幹細胞治療。 **30** 手術/放射線之內分泌處置。
40 合併手術/放射線之內分泌處置及骨髓移植/幹細胞治療(即 30 合併 10、20 中任一種治療)。
88 骨髓/幹細胞移植或內分泌處置雖然是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。

申報醫院骨髓/幹細胞移植或內分泌處置開始日期 4.3.12

申報醫院標靶治療 4.3.14

00 無。 **01** 有。 **99** 不詳。
20 有接受臨床試驗標靶治療。
21 有接受非臨床試驗標靶治療及臨床試驗標靶治療。
30 僅接受雙盲試驗標靶治療。
31 同時接受非試驗性及雙盲試驗標靶治療。
88 標靶治療雖然是既定之首次療程計畫中一部分，但摘錄時尚未執行。

申報醫院標靶治療開始日期 4.3.15

申報醫院緩和照護 4.4

0 無。 **7** 有或轉介/安寧療護。 **9** 不詳。

其他治療 4.5.1

00 無。 **99** 不詳。
01 個案在申報醫院於首次療程中接受其他治療。
02 個案在他院於首次療程中接受其他治療。
03 個案在申報醫院及他院於首次療程中接受其他治療。

其他治療開始日期 4.5.2

摘錄者 6.1

其他因子

身高 7.1.

體重 7.2

吸菸行為 7.3

1-2 碼為每日吸菸量(以支為單位)：
00 無 **01-89** 吸菸支數 **90** ≧90支
91 偶爾吸 **98** 有，量不詳 **99** 不詳
3-4 碼為吸菸年：以實際吸菸年編碼
00 無 **98** 有，年不詳 **99** 不詳
5-6 碼為戒菸年：以實際戒菸年編碼
00 無戒菸或戒菸少於30天 **88** 無吸菸
98 已戒，年不詳 **99** 不詳

嚼檳榔行為 7.4


1-2 碼為每日嚼檳榔量(以顆為單位)：
00 無 **01-89** 嚼檳榔顆數 **90** ≧90顆
91 偶爾嚼 **98** 有，量不詳 **99** 不詳
3-4 碼為嚼檳榔年：以實際嚼檳榔年編碼
00 無 **98** 有，年不詳 **99** 不詳
5-6 碼為戒檳榔年：以實際戒嚼檳榔年編碼
00 無戒嚼檳榔或戒少於 30 天 **88** 無嚼檳榔
98 已戒，年不詳 **99** 不詳

喝酒行為 7.5

000 從未喝酒
001 已戒
002 偶爾喝(不論年數)
003 習慣性喝酒<10 年
004 **習慣性喝酒≧10 年**
009 習慣性喝酒，但年數不詳
999 病歷未記載或不詳

附錄三　台灣人口年齡組成圖，民國 107 年

POPULATION DEMOGRAPHY OF TAIWAN IN 2018



附錄四　1976 年、2000 年世界標準人口

	世界標準人口數	
年齡（歲）	1976 年	2000 年
0 – 4	12,000	8,800
5 – 9	10,000	8,700
10 – 14	9,000	8,600
15 – 19	9,000	8,500
20 – 24	8,000	8,200
25 – 29	8,000	7,900
30 – 34	6,000	7,600
35 – 39	6,000	7,200
40 – 44	6,000	6,600
45 – 49	6,000	6,000
50 – 54	5,000	5,400
55 – 59	4,000	4,600
60 – 64	4,000	3,700
65 – 69	3,000	3,000
70 – 74	2,000	2,200
75 – 79	1,000	1,500
80 – 84	500	900
85 以上	500	600
合　計	100,000	100,000

註：1976 年(同 Segi 1960)與 2000 年世界標準人口請參考 World Health Organization's publication: Discussion Paper 31: Age Standardization of Rates: A New WHO Standard (PDF)

附錄五　WHO 2017 血液腫瘤分類表

WHO 2017 血液腫瘤分類表

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	2017 WHO Classification	ICD-O-3 codes
Leukemia and myeloid neoplasm , total		
AML		
AML with recurrent genetic abnormalities	98653/98663/98693/98713/98773/98783/98793/98963/98973/99113/99123	98653/98663/98693/98713/98963/98973/99113
AML with myelodysplasia-related changes	98953	98953
Therapy-related myeloid neoplasms	99203	99203
Acute myeloid leukemia, NOS	98613	98613
Other acute myeloid leukemia	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313	98403/98673/98703/98723/98733/98743/98913/99103/99313
Myeloid sarcoma	99303	99303
Myeloid proliferations related to Down Syndrome	98983	98983
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm	97273	97273
ALL		
B lymphoblastic leukemia / lymphoma	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/98193	98113/98123/98133/98143/98153/98163/98173/98183/98353/98363
T lymphoblastic leukemia / lymphoma	98373	98373
CML*	98753	98753
CLL	98233	98233
Acute leukemias of ambiguous lineage	98013/98063/98073/98083/98093	98013/98063/98073/98083/98093
Myeloproliferative neoplasms	97401/97403/97413/97423/98633/98763/99453/99463/99503/99613/99623/99633/99643/99653/99663/99673/99683/99753	97401/97403/97413/97423/99453/98633/98763/99463/99503/99603/99613/99623/99633/99643/99653/99663/99673/99753
Myelodysplastic syndromes	99803/99823/99833/99853/99863/99893/99913/99923/99933	99803/99823/99833/99843/99853/99863/99873/99893/99913/99923
Acute biphenotypic leukemia	-	98053
Other Leukemia	-	98203/98323/98603
Leukemia, NOS	-	98003
Lymphoid neoplasms, total		
Hodgkin lymphoma	96503/96513/96523/96533/96543/96553/96593/96633	96503/96513/96523/96533/96593/96613/96623/96633/96643/96653/96673
Non-Hodgkin lymphoma		
B-cell lymphoid neoplasms		
Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT)	96893/96993	96893/96993
Lymphoplasmacytic lymphoma	96713/97613	96713/97613
Follicular lymphoma	95973/96903	95973/96753/96903/96913/96953/96983
Mantle cell lymphoma	96733	96733
Burkitt lymphoma	96873	96873/98263
Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype)	96803/96843/96883/97123/97353/97373/97383	96803/96843/96883/97123/97353/97373/97383
Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma	96793	96793
Other B-cell lymphomas	95963/96783/97623/97663/98333/99403	95963/96703/96783/97283/98333/99403
T/NK-cell lymphoid neoplasms		
Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type	97193	97193
Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides/Sëzary syndrome)	97003/97013/97093/97183/97263	97003/97013/97093/97183/97263
Enteropathy-type T-cell lymphoma	97173	97173
Hepatosplenic T-cell lymphoma	97163	97163
Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma	97083	97083
Peripheral T-cell lymphoma, NOS	97023	97023
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	97053	97053
Anaplastic large cell lymphoma	97143/97153	97143
Adult T-cell lymphoma/leukemia	98273	98273
Other T-cell lymphomas	97243/98313/98343/99483	97243/97293/98343/99483
Plasma cell neoplasm	97313/97323/97343	97313/97323/97333/97343
Histiocytic and dendritic cell neoplasms	97493/97513/97553/97563/97573/97583/97593	97513/97553/97563/97573/97583/97593
Malignant lymphoma, NOS and others	-	95903/95913/97503/97543/97603/97643

* CML : Only BCR-ABL1-positive.

附錄六　107 年口腔之其他及未詳細說明部位個案分布

口腔之其他及未詳細說明部位	ICD-O-FT	英文描述	個案數	百分比
頰黏膜	1450	Cheek mucosa	1576	64.20
口前庭、齒槽溝、頰溝、唇溝	1451	Vestibule of mouth, Alveolar sulcus, Buccal sulcus, Labial sulcus	17	0.69
硬顎	1452	Hard palate	148	6.03
軟顎	1453	Soft palate	346	14.09
懸雍垂	1454	Uvula	20	0.81
顎	1455	Palate, NOS	18	0.73
臼後區	1456	Retromolar area	204	8.31
包含上述兩個或以上次分類	1458	Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth	83	3.38
口腔未詳細說明部位	1459	Mouth, NOS	43	1.75

附錄七　Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版分類標準

頭頸癌除依照ICD-O-3的口腔、口咽、下咽分類外，亦依照Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd版所定義的口腔、口咽、下咽分類進行統計分析，以符合臨床上的判定準則。兩種分類標準各細部位的比較如下表：

Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd (p.19-p.21)	癌症部位	ICD-O-3 分類 (p.6-p.17)
Oral cavity	C00 Lip C02 Other and unspecified parts of tongue *(excludes C024)* C03 Gum C04 Floor of mouth C050 Hard palate C058 Overlapping lesion of palate C059 Palate, NOS C06 Other and unspecified parts of mouth	Oral cavity
Oropharynx	C01 Base of tongue C024 Lingual tonsil C051 Soft palate, NOS *(excludes nasopharyngeal surface of soft palate C113)* C052 Uvula	Oral cavity
	C09 Tonsil C10 Oropharynx	Oropharynx
	C142 Waldeyer ring C148 Overlappinf lesion of lip, oral cavity and pharynx	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx
Hypopharynx	C12 Pyriform sinus C13 Hypopharynx	Hypopharynx
	C140 Pharynx, NOS	Pharynx and ill-defined sites in lip, oral cavity and pharynx

民國 107 年

長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

民國 107 年長表申報 16 種癌症期別與治療方式統計

前　言 xxxiii
長表資料處理流程 xxxviii
民國 107 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程 xlvi
貳、癌症期別分類統計表 501
口腔癌 502
表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 502
表一之二 口腔癌發生人數按整併期別及治療方式分類 504
表一之三 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 504
表一之四 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 505
表一之五 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 505
口咽癌 508
表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 508
表二之二 口咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 510
表二之三 口咽癌(P16+)發生人數按整併期別及治療方式分類 512
表二之四 口咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 513
表二之五 口咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 514
表二之六 口咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 515
表二之七 口咽癌(P16-)發生人數按整併期別及治療方式分類 516
表二之八 口咽癌(P16-) 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 517
表二之九 口咽癌(P16-) 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 518
表二之十 口咽癌(P16-) 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 519
下咽癌 522
表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 522
表三之二 下咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類 524
表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 524
表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 525
表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 525
喉癌 528
表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 528
表四之二 喉癌發生人數按整併期別及治療方式分類 530

表四之三 喉癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 530
表四之四 喉癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 531
表四之五 喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 531
主唾液腺癌 534
表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 534
表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類 536
表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 536
表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 537
表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 537
鼻咽癌 540
表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 540
表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別及治療方式分類 542
表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 542
表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 543
表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 543
食道癌 546
表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 546
表七之二 食道癌發生人數按整併期別及治療方式分類 548
表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 548
表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 549
表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 549
胃癌 552
表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 552
表八之二 胃癌發生人數按整併期別及治療方式分類 554
表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 555
表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 556
表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 557
結腸癌 560
表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 560
表九之二 結腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類 562
表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 563

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 564
表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 565
直腸癌 568
表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 568
表十之二 直腸癌發生人數按整併期別及治療方式分類 570
表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 571
表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 572
表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 573
肝癌 576
表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 576
表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 578
表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別及治療方式分類 580
表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 580
表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 582
表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 582
表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類 584
表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別及治療方式分類 586
表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 586
表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 587
表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 587
肺癌 590
表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 590
表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 592
表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類 594
表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 594
表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 596
表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 596

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按肺小細胞癌的分期系統及治療方式分類..... 598
表十二之八 小細胞肺癌發生人數按整併期別及治療方式分類 598
乳癌 600
表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類..... 600
表十三之二 乳癌發生人數按整併期別及治療方式分類..... 602
表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別及治療方式分類..... 602
表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 605
表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類..... 605
表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 608
子宮頸癌 614
表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 614
表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 616
表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類..... 617
表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類..... 618
表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類..... 619
表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類..... 620
表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別及治療方式分類..... 621
表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 621
表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 622
表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 622
表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類..... 623
子宮體癌 626
表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 626
表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別及治療方式分類..... 628
表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類..... 628
表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 629
表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 629
表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類 630
卵巢癌..... 634
表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 634
表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別及治療方式分類 636

表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 636
表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類..... 637
表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 637
表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別及治療方式分類..... 638
攝護腺癌 642
表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類 642
表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別及治療方式分類..... 644
表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 644
表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別及治療方式分類 646
表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類 646
膀胱癌..... 650
表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類..... 650
表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別之治療方式分類 652
表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別及治療方式分類..... 652
表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別及治療方式分類..... 654
表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別及治療方式分類..... 654
惡性淋巴瘤..... 658
表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類..... 658
表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類..... 660
表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 661
表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 662
表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別及治療方式分類 .. 663

前　言

自民國 71 年起，癌症高居 10 大死因之首。癌症的持續監測，是制定癌症防治措施、醫療資源配置，以及評價防治策略的重要依據。癌症登記是族群癌症監測的基礎，許多國家以立法來確立其強制性。我國於民國 68 年開始，即由衛生福利部實施癌症登記計畫，針對 50 床以上醫院辦理癌症登記，申報每年新發生癌症個案之診斷、治療等摘要資料（稱為**台灣癌症登記短表資料庫**）為基植於實證醫學下，以提昇癌症診療品質；民國 85 年 7 月，由衛生福利部委託台灣公共衛生學會統籌辦理癌症登記工作，成立『癌症登記工作小組』（Cancer Registry System, CRS），以接續進行癌症資料收集、與資料品質監測工作，期建立完整之台灣癌症登記系統。參與**短表資料庫**申報的醫院約 200 餘家，收錄全台灣所有癌症部位之侵襲癌與原位癌個案，欄位包含人口學、診斷與治療等相關資料，共 20 個欄位；此一全國癌症資料庫可了解我國各癌症發生率，更可提供癌症相關流行病學研究之進行。

因癌症防治法於民國 92 年 5 月 21 日公布，該法第十一條規定「為建立癌症防治相關資料庫，癌症防治醫療機構應向中央主管機關所委託之學術研究機構，提報新發生之癌症個案與期別等相關診斷及治療資料。」自此確立了癌症登記的法源依據。

為將癌症診療資料整合至癌症登記系統並與國際接軌，民國 90 年國民健康署開始獎勵 15 家醫療機構成立「癌症防治中心」的同時，「台灣癌症中心資料庫」（Taiwan Cancer Center Data Base, TCDB）進行籌備，並參考美國外科醫學會（American College of Surgeons）癌症諮詢委員會（Commission on Cancer）所出版的 FORDS（Facility Oncology Registry Data Standards），規劃適合國內使用之新版癌症登記資料庫，於民國 92 年另成立「台灣癌症中心資料庫」開始著手長表癌症資料的收集工作（稱為**台灣癌症登記長表資料庫**），收錄民國 91 年 1 月 1 日起新診斷之六種癌症的期別、診斷與治療等資料。建構台灣**長表資料庫**，主要目的為收集並追蹤在各醫院**癌症分期**與**詳細治療或復發**等重要癌症照護相關資料，以建立長期完整而正確的癌症資料庫，提供衛生主管機構及國內外學術機構的施政與研究參考外，亦能提供醫院對癌症病人醫療照護、追蹤及預後情形管理的幫助。

「台灣癌症中心資料庫」初期僅收錄六種癌症部位，民國 91 年參與申報的醫院為 15 家，其中子宮頸癌為必要申報癌症項目，其他 5 種癌症包括：口腔癌（含口咽及下咽）、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌由醫院自選辦理，於民國 93 年 10 月起，擴大至 27 家參加「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」之醫院，全面收錄民國 93 年 1 月 1 日起新診斷之前項六種癌症診療資料；長表癌症資料所收錄之 91-93 年新診斷癌症個案資料，此階段為長表癌症資料之”試辦期”，94-95 年之新診斷資料可視為”穩定期”，此

兩階段所收錄資料欄位皆為 65 項，於”試辦期”階段，若申報長表之癌症資料，同時仍需申報短表 20 項欄位資料至短表資料庫，為了避免同一個案重複申報兩次，導致資源重複浪費，至”穩定期”(94-95 年新診斷資料)，參與長表申報之醫院，僅需申報至長表即可，無需再將同一個案申報至短表。自此，**長短表資料庫**整合為一，由『**癌症登記中心**』負責全國長短表癌症登記資料之收錄。

為將長、短表之癌症診療資料整合且因應FORDS版本之修訂，國民健康署於95年邀請專家學者成立「癌症登記及診療資料庫修版工作小組」，規畫適合國內使用之新版癌症登記資料庫，收錄欄位內容更依申報詳細和摘要診療資料區分為95與33欄位，各醫院自民國96年1月1日起新診斷的癌症個案全面改採「96年版」癌症登記項目申報，此階段長表申報項目增至95欄位，短表申報項目則增加至33欄位，其中50床以上的醫院依規定申報癌症發生和診療摘要資料至短表資料庫；原參與長表申報醫院，則依新版摘錄手冊申報口腔癌、結直腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及子宮頸癌等6種癌症之發生和診療詳細資料至長表資料庫，此階段視為癌症登記資料庫之”推展期”。另自97年新增食道癌、胃癌、攝護腺癌及膀胱癌至長表申報範圍；再於98年起，新增主唾液腺癌、鼻咽癌、子宮體癌、卵巢癌與血液腫瘤等，以及102年起新增喉癌共16大癌症收錄長表資料。

考量各癌別特性與預後或決策有關之特定因子也應收錄至長表癌症登記資料庫內，故國民健康署因應癌症診療實務與品質提升需要，於民國99年委託台灣癌症登記學會組成「癌症登記摘錄手冊修訂小組」來規劃及研擬符合我國收錄之前述15大癌症部位特定因子（Site-Specific Factors，簡稱SSF）摘錄內容，其收錄分類包括：(1)具預後或評估治療效果意義的腫瘤標記（例如：結直腸癌之CEA）、(2)具預後或決定治療方式的腫瘤特性指標（例如：乳癌之HER2）、(3)治療效果評估、(4)決定存活之極重要的治療副作用（例如：血癌之GVHD）、(5)影響預後的手術病理特徵（例如：結直腸癌之Perineural invasion）等。同時，基於公共衛生的考量，國民健康署亦於長短表癌症登記資料庫中納入吸菸、嚼檳榔、飲酒、身體質量指數（BMI）等致癌因子收錄於「100年版」癌症登記摘錄手冊；故自民國100年1月1日起新診斷的癌症個案全面採用100年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至114欄位，短表申報項目新增為42欄位。

為因應AJCC第八版癌症分期手冊應用於民國107年新診斷癌症個案，手冊修訂小組重新檢視「100年版」手冊內容，進行欄位增刪、檢討、修訂與討論，完成「107年版」台灣癌症登記摘錄手冊。故自民國107年1月1日起新診斷的癌症個案全面採用107年版癌症登記項目申報，且長表申報項目新增至115欄位，短表新增為45欄位。

台灣癌症登記長表資料庫自民國92年開始收錄91年後新發診斷癌症個案資料，迄今已收錄91-106年新發診斷個案共計951,974筆資料（91年15家申報醫院、92年17家申報醫院、93年30家申報醫院、94年33家申報醫院、95年的33家申報醫院、96年的43家申報醫院、97年的44家申報醫院、98年的54家申報醫院、99年的76家申報醫院、100年的78家、101年的79家、102年的81家、103年的88家、104年的93家、105年的96家、106

年的97家以及107年的98家，名單詳見101-107年參與長表申報醫院名單）；其中94-96與98年資料經統計分析後，選取期別相關資料回饋各醫院以供參考。經大家努力後，癌症登記資料的完整性及申報品質日趨提高與穩定，故自97年資料起加入年報，以提供更完整之參考。

本報告針對資料庫中107年16大癌症長表個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。

101-107年參與長表申報醫院名單

醫院名稱	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
國立臺灣大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
三軍總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院仁愛院區	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	*	*	*	*	*	*	*
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
振興醫療財團法人振興醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立萬芳醫院－委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	*	*	*	*	*	*	*
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	*	*	*	*	*	*	*
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部桃園醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺中醫院	*	*	*	*	*	*	*
中山醫學大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺中榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
中國醫藥大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院中港分院	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
光田醫療社團法人光田綜合醫院 (合併大甲分院)	*	*	*	*	*	*	*
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部豐原醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	*	*	*	*	*	*	*
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立成功大學醫學院附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺南市立醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄榮民總醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	*	*	*	*	*	*	*
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
義大醫療財團法人義大醫院	*	*	*	*	*	*	*
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	*	*	*	*	*	*	*
寶建醫療社團法人寶建醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	*	*	*	*	*	*	*
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	*	*	*	*	*	*	*
大千綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	*	*	*	*	*	*	*
安泰醫療社團法人安泰醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺南醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部屏東醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部彰化醫院	*	*	*	*	*	*	*
衛生福利部臺北醫院	*	*	*	*	*	*	*
東元綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
林新醫療社團法人林新醫院	*	*	*	*	*	*	*

醫院名稱	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立大同醫院	*	*	*	*	*	*	*
高雄市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
國立陽明大學附設醫院	*	*	*	*	*	*	*
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	*	*	*	*	*	*	*
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	*	*	*	*	*	*	*
敏盛綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
郭綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
新北市立聯合醫院	*	*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院中興院區	*	*	*	*	*	*	*
澄清綜合醫院平等院區	*	*	*	*	*	*	*
壢新醫院	*	*	*	*	*	*	*
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	*	*	*	*	*	*	*
國泰醫院財團法人新竹國泰綜合醫院	*	*	*	*	*	*	*
財團法人天主教耕莘醫院永和分院		*	*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院和平院區			*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院婦幼院區			*	*	*	*	*
臺北市立聯合醫院忠孝院區			*	*	*	*	*
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院			*	*	*	*	*
衛生福利部苗栗醫院			*	*	*	*	*
衛生福利部南投醫院			*	*	*	*	*
輔英科技大學附設醫院			*	*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院				*	*	*	*
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院				*	*	*	*
臺南市立安南醫院－委託中國醫藥大學興建經營				*	*	*	*
國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處				*	*	*	*
義大醫療財團法人義大癌治療醫院				*	*	*	*
亞洲大學附屬醫院					*	*	*
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院					*	*	*
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院					*	*	
臺中榮民總醫院嘉義分院					*	*	*
中國醫藥大學北港附設醫院						*	*
天主教輔仁大學附設醫院							*
中國醫藥大學新竹附設醫院							*

* 表示當年度有參與長表申報

長表資料處理流程

一、申報個案條件

具中華民國國籍，自民國 68 年 1 月 1 日起新發診斷癌症個案，符合國際疾病分類腫瘤學（International Classification of Diseases for Oncology，ICD-O）組織形態分類碼第 5 碼（性態譯碼）為 2（原位癌）或 3（侵襲癌）者，均需申報。

台灣癌症登記自民國 68 年起之新發癌症診斷個案，依據「國際疾病分類，腫瘤學-1976 年版」（ICD-O, 1976）申報，民國 79 年起改用 Field Trial, 1988 年試用版（ICD-O-FT, 1988）。又為與國際同步，自民國 91 年起採用 ICD-O, Third Edition（ICD-O-3, 2000）分類標準申報，該版對於未經顯微鏡檢證實之病例可依其臨床診斷內容對組織形態逕行譯碼。所有申報的癌症個案均需依據申報醫院對於個案之診斷及治療的涵蓋程度，來決定其「個案分類」，其中個案分類為編碼 4、7、8 者不需申報。

個案分類的定義

Case	Includes
Class 0	申報醫院診斷，但於外院接受全部之首次療程或決定不治療。 • 個案於申報醫院診斷，但選擇到他院治療。 • 個案於申報醫院診斷，但被轉介至他院治療。
Class 1	申報醫院診斷，並於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 • 個案於申報醫院診斷，其治療計畫是不予治療或是再密切觀察。 • 個案於申報醫院診斷，但個案拒絕治療。 • 個案於申報醫院診斷，但個案因年長、疾病嚴重或其他醫療狀況而無法治療或接受緩和照護。 • 個案於申報醫院診斷，但不知道是否有建議作治療或有接受治療。 • 個案於申報醫院診斷，有建議作治療，但不知道是否有接受治療。 • 個案於主治醫師(Staff physician)的診所診斷，並於申報醫院接受首次療程。所謂「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。 • 個案於申報醫院診斷，在主治醫師的診所內接受全部或部份的首次療程。
Class 2	外院診斷，於申報醫院接受全部或部份的首次療程。 • 外院診斷，於申報醫院接受緩和照護為其首次療程（或作為部份的首次療程）。
Class 3	外院診斷並接受全部的首次療程。 • 個案於申報醫院治療，但並不知道其首次療程的相關資訊。

Case	Includes
	• 個案於申報醫院建立治療計畫或提供「第二意見」的服務，但於外院診斷與治療。 • 個案因之前診斷的癌症復發或惡化而到申報醫院作治療。
Class 4	個案於民國 68 年以前診斷為癌症。（不須申報）
Class 5	屍體解剖時才診斷為癌症。 • 在屍體解剖之前並未曾診斷或懷疑有癌症。
Class 6	主治醫師(Staff physician)的診所診斷及接受全部的首次療程。所謂的「主治醫師」是指在申報醫院有簽住院權的醫事人員。
Class 7	僅有病理報告。個案未曾於申報醫院診斷或治療。不包括由屍體解剖時才診斷為癌症的個案。（不須申報）
Class 8	僅由死亡證明書得知個案有癌症（death certificate only，DCO）。（不須申報）
Class 9	不詳。病歷上未記載足以決定個案分類的資訊。 • 不清楚之前是否有確診。 • 不清楚之前是否有治療過。 • 之前有確診，但日期不詳。

依據資料分析目的不同，可分為以下兩類：

(1)**可分析個案**：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 91 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

(2)**不分析個案**：個案分類為 0、3－9 的個案，則不納入例行的治療和存活分析，但分析癌症發生率時仍要列入分析。

二、癌症分期原則

AJCC 的 TNM 分期是在臨床、手術和病理學上評估其癌病嚴重程度之依據，同時可作為決定適當治療方式、判斷預後情形及測量最終結果。下列通則適用於所有部位的 AJCC 分期：

- 在評估所有個案的期別時，應至少評估至首次手術治療為止，如果至首次手術治療時之期間短於 4 個月，則應評估至 4 個月。
- 各申報醫院之癌症登記人員必須記錄臨床和病理的 TNM 及期別組合（stage group）。

臨床醫師必須記錄可分析個案（個案分類編碼 1 或 2 者）之所有具足夠的 AJCC 編碼訊息（coding scheme）及其臨床和病理的 T、N、M 組成。若病歷上有記載 T、N、M 組成而沒有期別組合之紀錄時，癌症登記人員可依據這些組成的訊息登錄期別組合。每個個案的紀錄都應包含以下的 AJCC 分期的訊息：

- 依病歷上臨床醫師的記錄作為臨床和病理的 T、N、M 組成之編碼。
- 編碼其臨床和病理的 AJCC 的期別組合。若臨床醫師未記錄期別組合，則癌症登記人員可依據醫師所記錄之 TNM 組成登錄其期別組合。
- 編碼其臨床和病理期別的字首或字根（prefix/suffix descriptor）。
- 編碼所使用之 AJCC TNM 期別系統之版本數字。

有關各特定部位在分期組成及其期別組合之定義，請參考最新版本的 AJCC 癌症分期手冊作為譯碼的依據。

- 若個案有多個原發，則每個原發各自獨立判定其期別。
- 若期別組合無法由所記錄之 T、N、M 組成而決定，則記錄為不詳（999）。
- 當個案有多原發且有轉移，切片檢查或可分辨其轉移的來源。若醫師無法判定何者原發有轉移，則記錄每個原發都有轉移。在一段時間之後，若醫師可確認何者原發有轉移時，則必須更新其合適的期別。
- 如果所使用兒童分期（pediatric staging）而 AJCC 分期不適用時，臨床和病理的 T、N、M 及期別組合均編碼為 88 或 888（不適用）。若臨床或病理的 AJCC 分期適用於兒童腫瘤時，則分別登錄適當的編碼而不是編碼成 88 或 888。

三、首次療程定義

首次療程（first course of treatment）包括記錄所有治療計畫中以及在個案癌病惡化或復發之前所執行的治療方法。若個案拒絕治療、家屬或照護者拒絕治療、個案在治療開始前就死亡、或是醫師建議沒有治療可以提供的時候，則「沒有治療（No therapy）」亦算是一種治療的選擇。

- 癌症復發（Cancer recurrence）：個案必須先經過一段無病期間（disease-free interval）或緩解（remission），亦即臨床上並無該癌症存在之證據。在此無病期間之後，病歷上有記載此後來出現的腫瘤乃起源於原始腫瘤者。
- 緩和治療（Palliative therapy）:世界衛生組織敘述所謂緩和照護（palliative care）為藉由預防或減輕疼痛，以增進個案之生活品質。如果緩和治療也具有破壞或改變癌症組織增生者，則亦可為首次療程的一部份。

一般首次療程起始於最初診斷日四個月內。

- 若個案在申報醫院診斷，於「最初診斷日期」**四個月**內未接受治療，而在「最初診斷日期」後**四個月至一年內**，且臨床期別 T、N、M 皆**無**惡化(T1a 演變至 T1b 視為無惡化)或復發時，則此一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。
- 若個案在外院診斷且不論是否有治療計畫，於「最初診斷日期」四個月內所開始執行的治療，才視為首次療程。換句話說，若個案在他院診斷但未接受治療且超過最初診斷日期四個月後才至申報醫院，則個案於申報醫院所接受的治療，均不可記錄為首次療程。除非申報醫院病歷內容可證實此期間個案臨床期別 T、N、M 皆無惡化或復發，則於一年內所開始執行的治療，均可記錄為首次療程。

治療計畫是指用來改變、控制、移除、破壞正在增生癌細胞的治療方式。這些治療計畫之記載可見於不同的來源：例如醫療或臨床記錄、會診報告以及門診記錄。

- 當確診後在醫師的治療計畫中所列之所有治療，若實際上個案都有接受這些治療，都算是首次療程的一部分。
- 出院計畫（discharge plan）是個案紀錄的一部分，且可能包含在全部或部分的治療計畫之內。
- 若病歷中沒有書面之治療計畫時，那些遵循制定好的治療指引（established protocol）或經過共識的處置指引（accepted management guidelines）可當作是治療計畫的一部份。
- 如果病歷中沒有記載個案的治療計畫，不知癌病是否惡化或復發時，且同時無法諮詢到主責醫師時，則首次療程應結束於「最初診斷日期」後一年；也就是說對於缺乏治療計畫或是該院無標準治療指引的個案，超過一年所給予的治療均不屬於首次療程。

首次療程包括在第一次診斷為癌症期間由醫師計畫的或執行的所有治療。經計畫的治療可包括多種治療方式，而且執行期間可能是一年或更長。在首次療程中斷之後所執行之任何治療，都算是後續的治療（subsequent treatment），不可記錄於首次療程。

若腫瘤未惡化的前提下，因治療毒性或副作用而修改治療，仍屬首次療程；導引/前導性輔助（Induction or Neoadjuvant therapy）後腫瘤未惡化但對治療反應不佳，而修改治療，仍屬首次療程。

四、資料分析之條件

本年度報告以台灣癌症登記長表資料庫 107 年個案資料，進行各癌症的年齡、期別及首次治療相關之統計分析。欲研究個案之篩選條件如下：

(1) 個案分類：**於申報醫院或外院診斷，且在申報醫院接受首次療程之個案，即個案分類條件為 1 或 2 者**（請參考 P.xii 個案分類之定義）

(2) 各癌症部位採用 ICD-O-3 定義之編碼如下：

癌症部位	ICD-O-3 編碼	細部位名稱
口腔 Oral cavity	C00.0-C00.9	Lip
	C02.0-C02.3、C02.8-C02.9	Other and unspecified parts of tongue
	C03.0-C03.1、C03.9	Gum
	C04.0-C04.1、C04.8-C04.9	Floor of mouth
	C05.0 C05.8-C05.9	Hard palate Overlapping lesion of palate / Palate
	C06.0-C06.2、C06.8-C06.9	Other and unspecified parts of mouth
口咽 Oropharynx	C01.9	Base of tongue
	C02.4	Lingual tonsil
	C05.1 C05.2	Soft palate Uvula
	C09.0-C09.1、C09.8-C09.9	Tonsil
	C10.0-C10.4、C10.8-C10.9	Oropharynx
	C14.2 C14.8	Waldeyer ring Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
下咽 Hypopharynx	C12.9	Pyriform sinus
	C13.0-C13.2、C13.8-C13.9	Hypopharynx
	C14.0	Pharynx, NOS
唾液腺 Salivary	C07.9 C08.0 C08.1 C08.9	Parotid gland Submandibular gland Sublingual gland Major salivary gland, NOS
鼻咽 Nasopharynx	C11.0-C11.9	Nasopharynx
食道 Esophagus	C15.0-C15.5、C15.8-C15.9	Esophagus
胃 Stomach	C16.0-C16.6、C16.8-C16.9	Stomach

癌症部位	ICD-O-3 編碼	
結腸 Colon	C18.0-C18.9	Colon
直腸 Rectum	C19.9 C20.9	Rectosigmoid junction Rectum
肝 Liver	C22.0 C22.1	Liver Intrahepatic bile duct
喉 Larynx	C32.0-C32.3、C32.8-C32.9	Larynx
肺 Lung	C34.0-C34.3、C34.8-C34.9	Bronchus and Lung
乳房 Breast	C50.0-C50.9	Breast
子宮頸 Cervix	C53.0-C53.1、C53.8-C53.9	Cervix uteri
子宮體 Corpus Uteri	C54.0 C54.1 C54.2 C54.3 C54.9	Isthmus uteri Endometrium Myometrium Fundus uteri Corpus uteri
卵巢 Ovary	C56.9	Ovary
攝護腺 Prostate	C61.9	Prostate gland
膀胱 Bladder	C67.0-C67.9	Bladder
淋巴 Lymphoma	**M-code:** 9650-9667 **M-code:** 9596-9597、9670-9699、9712、9728、9735-9738、9761-9762、9766、9826、9833、9940 **M-code:** 9700-9709、9714-9726、9729、9827、9831、9834、9948 **M-code:** 9751-9759 **M-code:** 9590-9591、9750、-9760、9764	Hodgkin lymphoma Non-Hodgkin B-cell lymphoma Non-Hodgkin T/NK-cell lymphoma Histiocytic and dentritic cell neoplasms Other Malignant lymphoma (不包含 Plasma cell neoplasm，且 9725、9971 不再視為惡性)

(3)各癌症部位皆排除血液腫瘤疾病，於 ICD-O-3 之組織形態編碼為 9140、9590-9993。（白血病、淋巴瘤、卡波西氏瘤等）

「可分析個案」為診斷年 107 年長表個案，107 年長表申報筆數與重複申報數分類狀況如下表，107 年共 134,771 筆。長表資料庫內「申報 1 筆個案」直接納入分析，而「重複申報」的個案，則取重複個案當中，以相同身分證字號加上相同癌症部位別，且每一筆申報資料臨床期別相同者，才納入分析。最後實際分析個案為 96,134 人，佔所有可分析申報個案的 95.52%。

107 年長表個案申報量與重複筆數分類狀況

癌症部位†	長短表申報筆數	長表申報筆數(%)*¶		長表資料庫可分析筆數‡					
				申報筆數	申報 1 筆	重複 2 筆	重複 3 筆以上	實際分析筆數	醫院家數
口腔癌	8592	8315	96.78	6270	5893	374	3	6065	97
口咽癌	2276	2201	96.70	1683	1603	80	0	1636	91
下咽癌	1644	1583	96.29	1198	1137	58	3	1165	86
喉癌	1047	1008	96.28	758	730	28	0	741	84
主唾液腺癌	433	420	97.00	341	311	30	0	326	63
鼻咽癌	2141	2060	96.22	1442	1356	86	0	1396	96
食道癌	4076	3827	93.89	2682	2531	148	3	2599	96
胃癌	5127	4720	92.06	3321	3202	116	3	3255	96
結腸癌	16221	15193	93.66	12710	12249	458	3	12463	96
直腸癌	8382	7829	93.40	6332	5948	378	6	6115	98
肝癌	14342	13735	95.77	9930	9509	406	15	9697	97
肺癌	19594	18814	96.02	14936	13703	1136	97	14270	97
乳癌	23248	22342	96.10	18009	14901	2984	124	16325	98
子宮頸癌	5191	4878	93.97	3985	3793	186	6	3877	95
子宮體癌	3762	3599	95.67	2833	2625	208	0	2726	93
卵巢癌	1803	1763	97.78	1499	1395	104	0	1446	85
攝護腺癌	8575	7951	92.72	6376	5729	622	25	6020	97
膀胱癌	4383	4016	91.63	3431	3074	342	15	3194	96
惡性淋巴瘤	3934	3843	97.69	2912	2760	146	6	2818	95
合計	134771	128097	95.05	100648	92449	7890	309	96134	98
				100.00%	91.85%	7.84%	0.31%	95.52%	

†肺癌不含 C33 (Trachea)、卵巢癌不含 C57.0-C57.4 (Fallopian tube)。

*長表申報筆數佔長短表總申報筆數之百分比(%)。

¶長表申報筆數：個案分類為 0-3、5-6、9 的個案。

‡可分析申報筆數：針對長表申報個案做治療和存活分析時，應以民國 107 年 1 月 1 日以後到申報醫院接受首次療程的個案為對象，並且只有個案分類為 1、2 時，才列為可分析個案。

五、整併期別與治療組合分類說明

各癌別 AJCC 第八版整併期別流程與婦癌 FIGO 期別、惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別處理流程請參考下頁圖 1-4。自 100 年起，治療組合分析新增「**標靶治療**」與「**局部化療**」兩項目；且於 104 年起，乳癌與攝護腺癌接受「**荷爾蒙治療**」均改以「**內分泌治療**」來呈現。另自 107 年起，治療組合分析可區分**免疫治療為**「**局部性**」或「**全身性**」兩類。

所有可分析個案之治療組合：若於首次療程中**未**接受任何治療方式或拒絕治療，視為「未治療」；於首次療程中**僅接受**為緩解或減輕症狀之照護方式（不包括緩和性手術、放療或化療等），才視為「緩和照護」。自 107 年起，若治療組合描述為"OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

民國 107 年 主要癌症期別資料分析：各癌整併期別流程

圖 1 為 107 年度各癌 AJCC 整併期別流程(不包含惡性淋巴瘤)：




圖 1、107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明

圖 2 為 107 年度子宮頸癌 FIGO 期別：




圖 2、107 年度子宮頸癌 FIGO 臨床期別之整併流

圖 3 為 107 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別




圖 3、107 年度子宮體癌、卵巢癌 FIGO 期別之整併流程說明

圖 4 為 107 年度惡性淋巴瘤期別




圖 4、107 年度惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之處理流程說明

貳、癌症期別分類統計表

口腔癌

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6065	100.00	5457	100.00	608	100.00	4270	100.00	1795	100.00
年齡										
00-04 歲	1	0.02	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00
05-09 歲	1	0.02	0	0.00	1	0.16	1	0.02	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.02	0	0.00	1	0.16	1	0.02	0	0.00
20-24 歲	4	0.07	2	0.04	2	0.33	3	0.07	1	0.06
25-29 歲	11	0.18	6	0.11	5	0.82	9	0.21	2	0.11
30-34 歲	59	0.97	52	0.95	7	1.15	48	1.12	11	0.61
35-39 歲	201	3.31	188	3.45	13	2.14	137	3.21	64	3.57
40-44 歲	437	7.21	410	7.51	27	4.44	306	7.17	131	7.30
45-49 歲	743	12.25	710	13.01	33	5.43	514	12.04	229	12.76
50-54 歲	903	14.89	841	15.41	62	10.20	640	14.99	263	14.65
55-59 歲	1099	18.12	1010	18.51	89	14.64	785	18.38	314	17.49
60-64 歲	978	16.13	887	16.25	91	14.97	704	16.49	274	15.26
65-69 歲	761	12.55	671	12.30	90	14.80	545	12.76	216	12.03
70-74 歲	351	5.79	298	5.46	53	8.72	244	5.71	107	5.96
75-79 歲	270	4.45	212	3.88	58	9.54	177	4.15	93	5.18
80-84 歲	139	2.29	98	1.80	41	6.74	88	2.06	51	2.84
85 歲以上	106	1.75	71	1.30	35	5.76	67	1.57	39	2.17
臨床期別										
0 期	44	0.73	33	0.60	11	1.81	22	0.52	22	1.23
I 期	1437	23.69	1264	23.16	173	28.45	1015	23.77	422	23.51
II 期	1084	17.87	969	17.76	115	18.91	772	18.08	312	17.38
III 期	709	11.69	639	11.71	70	11.51	494	11.57	215	11.98
IV M0	2164	35.68	1990	36.47	174	28.62	1539	36.04	625	34.82
IV M1	56	0.92	51	0.93	5	0.82	37	0.87	19	1.06
不詳	571	9.41	511	9.36	60	9.87	391	9.16	180	10.03
病理期別										
0 期	62	1.02	47	0.86	15	2.47	32	0.75	30	1.67
I 期	1731	28.54	1541	28.24	190	31.25	1236	28.95	495	27.58
II 期	1051	17.33	951	17.43	100	16.45	756	17.70	295	16.43
III 期	676	11.15	615	11.27	61	10.03	471	11.03	205	11.42
IV M0	1641	27.06	1504	27.56	137	22.53	1217	28.50	424	23.62
IV M1	16	0.26	16	0.29	0	0.00	11	0.26	5	0.28
不詳	888	14.64	783	14.35	105	17.27	547	12.81	341	19.00

表一之一 口腔癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6065	100.00	5457	100.00	608	100.00	4270	100.00	1795	100.00
整併期別 [1]										
0 期	61	1.01	46	0.84	15	2.47	31	0.73	30	1.67
I 期	1797	29.63	1601	29.34	196	32.24	1278	29.93	519	28.91
II 期	1117	18.42	1002	18.36	115	18.91	801	18.76	316	17.60
III 期	749	12.35	676	12.39	73	12.01	506	11.85	243	13.54
IV M0	2159	35.60	1967	36.05	192	31.58	1557	36.46	602	33.54
IV M1	56	0.92	52	0.95	4	0.66	38	0.89	18	1.00
不詳	126	2.08	113	2.07	13	2.14	59	1.38	67	3.73
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5393								
治療方式 [3,4]										
手術	3035	50.04	2701	49.50	334	54.93	2127	49.81	908	50.58
手術合併化療與放療	1348	22.23	1241	22.74	107	17.60	970	22.72	378	21.06
手術合併放療	626	10.32	568	10.41	58	9.54	426	9.98	200	11.14
手術合併化療	270	4.45	250	4.58	20	3.29	217	5.08	53	2.95
同步化療與放療或/與標靶治療	290	4.78	266	4.87	24	3.95	197	4.61	93	5.18
非同步化療與放療或/與標靶治療	55	0.91	48	0.88	7	1.15	29	0.68	26	1.45
放療	55	0.91	41	0.75	14	2.30	25	0.59	30	1.67
化療或/與標靶治療	167	2.75	147	2.69	20	3.29	117	2.74	50	2.79
緩和治療	42	0.69	34	0.62	8	1.32	23	0.54	19	1.06
未治療	4	0.07	4	0.07	0	0.00	4	0.09	0	0.00
其他治療	173	2.85	157	2.88	16	2.63	135	3.16	38	2.12
組織型態										
鱗狀細胞癌	5956	98.20	5382	98.63	574	94.41	4197	98.29	1759	97.99
唾液腺癌	37	0.61	14	0.26	23	3.78	29	0.68	8	0.45
其他特定上皮癌	11	0.18	8	0.15	3	0.49	8	0.19	3	0.17
非特定上皮癌	17	0.28	15	0.27	2	0.33	10	0.23	7	0.39
黏膜惡性黑色素瘤	6	0.10	4	0.07	2	0.33	4	0.09	2	0.11
軟組織肉瘤	9	0.15	9	0.16	0	0.00	9	0.21	0	0.00
其他惡性腫瘤	29	0.48	25	0.46	4	0.66	13	0.30	16	0.89

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口腔癌

表一之二 口腔癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6065	3035	50.04	1348	22.23	626	10.32	270	4.45	290	4.78	55	0.91	55	0.91	167	2.75	42	0.69	4	0.07	173	2.85
0 期	61	60	98.36	0	0.00	1	1.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	1797	1616	89.93	25	1.39	44	2.45	74	4.12	5	0.28	1	0.06	8	0.45	9	0.50	2	0.11	0	0.00	13	0.72
II 期	1117	834	74.66	73	6.54	84	7.52	69	6.18	12	1.07	2	0.18	12	1.07	13	1.16	6	0.54	2	0.18	10	0.90
III 期	749	211	28.17	230	30.71	201	26.84	36	4.81	19	2.54	5	0.67	8	1.07	14	1.87	4	0.53	0	0.00	21	2.80
IV M0	2159	210	9.73	1014	46.97	292	13.52	88	4.08	245	11.35	34	1.57	25	1.16	105	4.86	25	1.16	2	0.09	119	5.51
IV M1	56	2	3.57	2	3.57	0	0.00	2	3.57	3	5.36	13	23.21	1	1.79	23	41.07	3	5.36	0	0.00	7	12.50
不詳	126	102	80.95	4	3.17	4	3.17	1	0.79	6	4.76	0	0.00	1	0.79	3	2.38	2	1.59	0	0.00	3	2.38

表一之三 口腔癌 0-39 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	278	147	52.88	71	25.54	35	12.59	6	2.16	7	2.52	3	1.08	0	0.00	3	1.08	0	0.00	0	0.00	6	2.16
0 期	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	86	81	94.19	0	0.00	3	3.49	2	2.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	45	35	77.78	2	4.44	5	11.11	2	4.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22
III 期	49	12	24.49	16	32.65	17	34.69	1	2.04	1	2.04	0	0.00	0	0.00	1	2.04	0	0.00	0	0.00	1	2.04
IV M0	87	9	10.34	53	60.92	10	11.49	1	1.15	6	6.90	2	2.30	0	0.00	2	2.30	0	0.00	0	0.00	4	4.60
IV M1	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口腔癌

表一之四 口腔癌 40-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3182	1544	48.52	809	25.42	314	9.87	147	4.62	152	4.78	22	0.69	14	0.44	88	2.77	10	0.31	2	0.06	80	2.51
0 期	28	28	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	912	810	88.82	14	1.54	28	3.07	41	4.50	4	0.44	0	0.00	4	0.44	5	0.55	0	0.00	0	0.00	6	0.66
II 期	599	456	76.13	46	7.68	41	6.84	36	6.01	6	1.00	1	0.17	3	0.50	5	0.83	1	0.17	1	0.17	3	0.50
III 期	397	108	27.20	135	34.01	108	27.20	21	5.29	5	1.26	2	0.50	2	0.50	5	1.26	2	0.50	0	0.00	9	2.27
IV M0	1152	88	7.64	608	52.78	136	11.81	47	4.08	132	11.46	14	1.22	4	0.35	58	5.03	4	0.35	1	0.09	60	5.21
IV M1	30	1	3.33	2	6.67	0	0.00	1	3.33	3	10.00	5	16.67	1	3.33	14	46.67	2	6.67	0	0.00	1	3.33
不詳	64	53	82.81	4	6.25	1	1.56	1	1.56	2	3.13	0	0.00	0	0.00	1	1.56	1	1.56	0	0.00	1	1.56

表一之五 口腔癌 60 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2605	1344	51.59	468	17.97	277	10.63	117	4.49	131	5.03	30	1.15	41	1.57	76	2.92	32	1.23	2	0.08	87	3.34
0 期	29	28	96.55	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	799	725	90.74	11	1.38	13	1.63	31	3.88	1	0.13	1	0.13	4	0.50	4	0.50	2	0.25	0	0.00	7	0.88
II 期	473	343	72.52	25	5.29	38	8.03	31	6.55	6	1.27	1	0.21	9	1.90	8	1.69	5	1.06	1	0.21	6	1.27
III 期	303	91	30.03	79	26.07	76	25.08	14	4.62	13	4.29	3	0.99	6	1.98	8	2.64	2	0.66	0	0.00	11	3.63
IV M0	920	113	12.28	353	38.37	146	15.87	40	4.35	107	11.63	18	1.96	21	2.28	45	4.89	21	2.28	1	0.11	55	5.98
IV M1	25	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00	0	0.00	7	28.00	0	0.00	9	36.00	1	4.00	0	0.00	6	24.00
不詳	56	43	76.79	0	0.00	3	5.36	0	0.00	4	7.14	0	0.00	1	1.79	2	3.57	1	1.79	0	0.00	2	3.57

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Oral Cavity

Lip C000–C009, Base of Tongue C019, Other Parts of Tongue C020–C029, Gum C030–C039, Floor of Mouth C040–C049, Palate C050–C059, Other Parts of Mouth C060–C069

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

[SEER Note**:** Codes 20-27 include shave and wedge resection]

30 Wide excision, NOS

Code 30 includes:

Hemiglossectomy
Partial glossectomy

40 Radical excision of tumor, NOS

41 Radical excision of tumor ONLY

42 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible (marginal, segmental, hem or total resection)

43 Combination of 41 WITH resection in continuity with maxilla (partial, subtotal, or total resection)

44 Combination of 41 WITH resection in continuity with mandible and maxilla(marginal, segmental, hemi-, or total resection)

[SEER Note**:** “In continuity with” or “en bloc” means that all of the tissues were removed during the same
procedure, but not necessarily in a single specimen]

Codes 40–44 include: Total

glossectomy Radical

glossectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-43

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

口咽癌

表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	359	100.00	289	100.00	70	100.00	231	100.00	128	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	1	0.28	1	0.35	0	0.00	1	0.43	0	0.00
30-34 歲	2	0.56	1	0.35	1	1.43	2	0.87	0	0.00
35-39 歲	7	1.95	6	2.08	1	1.43	3	1.30	4	3.13
40-44 歲	14	3.90	11	3.81	3	4.29	7	3.03	7	5.47
45-49 歲	40	11.14	29	10.03	11	15.71	20	8.66	20	15.63
50-54 歲	47	13.09	40	13.84	7	10.00	34	14.72	13	10.16
55-59 歲	73	20.33	58	20.07	15	21.43	48	20.78	25	19.53
60-64 歲	67	18.66	56	19.38	11	15.71	42	18.18	25	19.53
65-69 歲	59	16.43	45	15.57	14	20.00	42	18.18	17	13.28
70-74 歲	21	5.85	20	6.92	1	1.43	13	5.63	8	6.25
75-79 歲	13	3.62	12	4.15	1	1.43	9	3.90	4	3.13
80-84 歲	12	3.34	9	3.11	3	4.29	9	3.90	3	2.34
85 歲以上	3	0.84	1	0.35	2	2.86	1	0.43	2	1.56
臨床期別										
0 期	1	0.28	1	0.35	0	0.00	1	0.43	0	0.00
I 期	164	45.68	121	41.87	43	61.43	111	48.05	53	41.41
II 期	87	24.23	73	25.26	14	20.00	61	26.41	26	20.31
III 期	82	22.84	72	24.91	10	14.29	45	19.48	37	28.91
IV M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	15	4.18	14	4.84	1	1.43	10	4.33	5	3.91
不詳	10	2.79	8	2.77	2	2.86	3	1.30	7	5.47
病理期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	83	23.12	60	20.76	23	32.86	49	21.21	34	26.56
II 期	18	5.01	16	5.54	2	2.86	14	6.06	4	3.13
III 期	2	0.56	2	0.69	0	0.00	2	0.87	0	0.00
IV M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	3	0.84	2	0.69	1	1.43	3	1.30	0	0.00
不詳	253	70.47	209	72.32	44	62.86	163	70.56	90	70.31

表二之一 口咽癌(P16+)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	359	100.00	289	100.00	70	100.00	231	100.00	128	100.00
整併期別 [1]										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	178	49.58	133	46.02	45	64.29	117	50.65	61	47.66
II 期	87	24.23	73	25.26	14	20.00	62	26.84	25	19.53
III 期	76	21.17	66	22.84	10	14.29	41	17.75	35	27.34
IV M0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	15	4.18	14	4.84	1	1.43	10	4.33	5	3.91
不詳	3	0.84	3	1.04	0	0.00	1	0.43	2	1.56
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.4859								
治療方式 [3,4]										
手術	34	9.47	26	9.00	8	11.43	20	8.66	14	10.94
手術合併化療與放療	53	14.76	38	13.15	15	21.43	37	16.02	16	12.50
手術合併放療	18	5.01	13	4.50	5	7.14	10	4.33	8	6.25
手術合併化療	4	1.11	2	0.69	2	2.86	4	1.73	0	0.00
同步化療與放療或/與標靶治療	171	47.63	141	48.79	30	42.86	109	47.19	62	48.44
非同步化療與放療或/與標靶治療	16	4.46	14	4.84	2	2.86	10	4.33	6	4.69
放療	14	3.90	11	3.81	3	4.29	8	3.46	6	4.69
放療合併標靶治療	18	5.01	18	6.23	0	0.00	13	5.63	5	3.91
放療合併化療與免疫治療	7	1.95	6	2.08	1	1.43	7	3.03	0	0.00
化療或/與標靶治療	14	3.90	14	4.84	0	0.00	7	3.03	7	5.47
緩和治療	3	0.84	2	0.69	1	1.43	2	0.87	1	0.78
未治療	2	0.56	1	0.35	1	1.43	0	0.00	2	1.56
其他治療	5	1.39	3	1.04	2	2.86	4	1.73	1	0.78
組織型態										
鱗狀細胞癌	357	99.44	287	99.31	70	100.00	229	99.13	128	100.00
非特定上皮癌	2	0.56	2	0.69	0	0.00	2	0.87	0	0.00

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之二 口咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1277	100.00	1207	100.00	70	100.00	851	100.00	426	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.08	1	0.08	0	0.00	1	0.12	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	5	0.39	4	0.33	1	1.43	3	0.35	2	0.47
35-39 歲	16	1.25	14	1.16	2	2.86	8	0.94	8	1.88
40-44 歲	98	7.67	94	7.79	4	5.71	65	7.64	33	7.75
45-49 歲	148	11.59	142	11.76	6	8.57	105	12.34	43	10.09
50-54 歲	247	19.34	240	19.88	7	10.00	163	19.15	84	19.72
55-59 歲	271	21.22	257	21.29	14	20.00	175	20.56	96	22.54
60-64 歲	211	16.52	195	16.16	16	22.86	145	17.04	66	15.49
65-69 歲	139	10.88	130	10.77	9	12.86	98	11.52	41	9.62
70-74 歲	61	4.78	56	4.64	5	7.14	40	4.70	21	4.93
75-79 歲	47	3.68	45	3.73	2	2.86	29	3.41	18	4.23
80-84 歲	26	2.04	24	1.99	2	2.86	14	1.65	12	2.82
85 歲以上	7	0.55	5	0.41	2	2.86	5	0.59	2	0.47
臨床期別										
0 期	6	0.47	6	0.50	0	0.00	6	0.71	0	0.00
I 期	205	16.05	194	16.07	11	15.71	143	16.80	62	14.55
II 期	177	13.86	168	13.92	9	12.86	128	15.04	49	11.50
III 期	155	12.14	148	12.26	7	10.00	105	12.34	50	11.74
IV M0	578	45.26	550	45.57	28	40.00	368	43.24	210	49.30
IV M1	51	3.99	50	4.14	1	1.43	32	3.76	19	4.46
不詳	105	8.22	91	7.54	14	20.00	69	8.11	36	8.45
病理期別										
0 期	18	1.41	17	1.41	1	1.43	16	1.88	2	0.47
I 期	211	16.52	200	16.57	11	15.71	141	16.57	70	16.43
II 期	105	8.22	102	8.45	3	4.29	78	9.17	27	6.34
III 期	51	3.99	46	3.81	5	7.14	40	4.70	11	2.58
IV M0	146	11.43	140	11.60	6	8.57	100	11.75	46	10.80
IV M1	8	0.63	8	0.66	0	0.00	5	0.59	3	0.70
不詳	738	57.79	694	57.50	44	62.86	471	55.35	267	62.68

表二之二 口咽癌(P16-)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1277	100.00	1207	100.00	70	100.00	851	100.00	426	100.00
整併期別 [1]										
0 期	16	1.25	15	1.24	1	1.43	14	1.65	2	0.47
I 期	240	18.79	229	18.97	11	15.71	163	19.15	77	18.08
II 期	184	14.41	175	14.50	9	12.86	135	15.86	49	11.50
III 期	147	11.51	139	11.52	8	11.43	100	11.75	47	11.03
IV M0	596	46.67	566	46.89	30	42.86	382	44.89	214	50.23
IV M1	48	3.76	47	3.89	1	1.43	29	3.41	19	4.46
不詳	46	3.60	36	2.98	10	14.29	28	3.29	18	4.23
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5725								
治療方式 [3,4]										
手術	285	22.32	267	22.12	18	25.71	195	22.91	90	21.13
手術合併化療與放療	183	14.33	172	14.25	11	15.71	120	14.10	63	14.79
手術合併放療	47	3.68	41	3.40	6	8.57	31	3.64	16	3.76
手術合併化療	50	3.92	49	4.06	1	1.43	43	5.05	7	1.64
同步化療與放療或/與標靶治療	453	35.47	429	35.54	24	34.29	300	35.25	153	35.92
非同步化療與放療或/與標靶治療	53	4.15	50	4.14	3	4.29	28	3.29	25	5.87
放療	39	3.05	39	3.23	0	0.00	23	2.70	16	3.76
放療合併標靶治療	21	1.64	17	1.41	4	5.71	9	1.06	12	2.82
放療合併化療與免疫治療	14	1.10	14	1.16	0	0.00	13	1.53	1	0.23
化療或/與標靶治療	81	6.34	79	6.55	2	2.86	58	6.82	23	5.40
緩和治療	20	1.57	20	1.66	0	0.00	9	1.06	11	2.58
未治療	1	0.08	1	0.08	0	0.00	0	0.00	1	0.23
拒絕治療	1	0.08	1	0.08	0	0.00	1	0.12	0	0.00
其他治療	29	2.27	28	2.32	1	1.43	21	2.47	8	1.88
組織型態										
鱗狀細胞癌	1237	96.87	1178	97.60	59	84.29	821	96.47	416	97.65
唾液腺癌	21	1.64	14	1.16	7	10.00	18	2.12	3	0.70
神經內分泌癌	3	0.23	3	0.25	0	0.00	2	0.24	1	0.23
其他特定上皮癌	4	0.31	1	0.08	3	4.29	2	0.24	2	0.47
非特定上皮癌	5	0.39	4	0.33	1	1.43	4	0.47	1	0.23
黏膜惡性黑色素瘤	1	0.08	1	0.08	0	0.00	0	0.00	1	0.23
軟組織肉瘤	2	0.16	2	0.17	0	0.00	2	0.24	0	0.00
其他惡性腫瘤	4	0.31	4	0.33	0	0.00	2	0.24	2	0.47

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

口咽癌

表二之三 口咽癌(P16+)發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	359	34	9.47	53	14.76	18	5.01	4	1.11	171	47.63	16	4.46	14	3.90	18	5.01	7	1.95	14	3.90	3	0.84	2	0.56	5	1.39
I 期	178	32	17.98	40	22.47	13	7.30	1	0.56	63	35.39	4	2.25	12	6.74	8	4.49	0	0.00	2	1.12	1	0.56	0	0.00	2	1.12
II 期	87	2	2.30	11	12.64	5	5.75	2	2.30	52	59.77	5	5.75	0	0.00	3	3.45	2	2.30	3	3.45	0	0.00	1	1.15	1	1.15
III 期	76	0	0.00	1	1.32	0	0.00	1	1.32	54	71.05	1	1.32	1	1.32	7	9.21	5	6.58	3	3.95	1	1.32	1	1.32	1	1.32
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	5	33.33	1	6.67	0	0.00	0	0.00	6	40.00	1	6.67	0	0.00	1	6.67
不詳	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之四 口咽癌(P16+) 0-39 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	10	0	0.00	2	20.00	1	10.00	0	0.00	6	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00
I 期	3	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33
II 期	4	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之五 口咽癌(P16+) 40-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	174	16	9.20	28	16.09	7	4.02	1	0.57	94	54.02	7	4.02	8	4.60	2	1.15	3	1.72	4	2.30	1	0.57	1	0.57	2	1.15
I 期	88	16	18.18	22	25.00	6	6.82	1	1.14	33	37.50	1	1.14	8	9.09	1	1.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	43	0	0.00	5	11.63	1	2.33	0	0.00	31	72.09	2	4.65	0	0.00	0	0.00	1	2.33	2	4.65	0	0.00	0	0.00	1	2.33
III 期	36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29	80.56	1	2.78	0	0.00	1	2.78	2	5.56	1	2.78	0	0.00	1	2.78	1	2.78
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	3	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00
不詳	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之六 口咽癌(P16+) 60 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	175	18	10.29	23	13.14	10	5.71	3	1.71	71	40.57	9	5.14	6	3.43	16	9.14	4	2.29	10	5.71	2	1.14	1	0.57	2	1.14
I 期	87	16	18.39	16	18.39	7	8.05	0	0.00	30	34.48	3	3.45	4	4.60	7	8.05	0	0.00	2	2.30	1	1.15	0	0.00	1	1.15
II 期	40	2	5.00	6	15.00	3	7.50	2	5.00	18	45.00	3	7.50	0	0.00	3	7.50	1	2.50	1	2.50	0	0.00	1	2.50	0	0.00
III 期	38	0	0.00	1	2.63	0	0.00	1	2.63	23	60.53	0	0.00	1	2.63	6	15.79	3	7.89	2	5.26	1	2.63	0	0.00	0	0.00
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	22.22	1	11.11	0	0.00	0	0.00	5	55.56	0	0.00	0	0.00	1	11.11
不詳	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之七 口咽癌(P16-)發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1277	285	22.32	183	14.33	47	3.68	50	3.92	453	35.47	53	4.15	39	3.05	21	1.64	14	1.10	81	6.34	20	1.57	2	0.16	29	2.27
0 期	16	13	81.25	1	6.25	2	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	240	172	71.67	15	6.25	11	4.58	14	5.83	10	4.17	0	0.00	11	4.58	0	0.00	0	0.00	3	1.25	1	0.42	0	0.00	3	1.25
II 期	184	60	32.61	24	13.04	13	7.07	14	7.61	52	28.26	2	1.09	8	4.35	4	2.17	0	0.00	2	1.09	1	0.54	0	0.00	4	2.17
III 期	147	14	9.52	27	18.37	10	6.80	7	4.76	67	45.58	1	0.68	7	4.76	3	2.04	3	2.04	4	2.72	0	0.00	0	0.00	4	2.72
IV M0	596	11	1.85	112	18.79	5	0.84	12	2.01	313	52.52	30	5.03	11	1.85	13	2.18	10	1.68	52	8.72	14	2.35	0	0.00	13	2.18
IV M1	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.17	20	41.67	2	4.17	0	0.00	1	2.08	16	33.33	3	6.25	2	4.17	2	4.17
不詳	46	15	32.61	4	8.70	6	13.04	3	6.52	9	19.57	0	0.00	0	0.00	1	2.17	0	0.00	4	8.70	1	2.17	0	0.00	3	6.52

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之八 口咽癌(P16-) 0-39 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	22	5	22.73	6	27.27	1	4.55	0	0.00	8	36.36	1	4.55	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	3	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	10	0	0.00	3	30.00	0	0.00	0	0.00	6	60.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	4	2	50.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之九 口咽癌(P16-) 40-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	764	145	18.98	121	15.84	27	3.53	34	4.45	302	39.53	37	4.84	16	2.09	4	0.52	10	1.31	49	6.41	6	0.79	1	0.13	12	1.57
0 期	10	8	80.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	129	90	69.77	11	8.53	4	3.10	9	6.98	7	5.43	0	0.00	4	3.10	0	0.00	0	0.00	3	2.33	0	0.00	0	0.00	1	0.78
II 期	101	27	26.73	16	15.84	6	5.94	11	10.89	32	31.68	1	0.99	5	4.95	1	0.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.98
III 期	88	7	7.95	20	22.73	9	10.23	4	4.55	41	46.59	1	1.14	2	2.27	0	0.00	2	2.27	1	1.14	0	0.00	0	0.00	1	1.14
IV M0	386	7	1.81	74	19.17	3	0.78	9	2.33	216	55.96	21	5.44	4	1.04	3	0.78	8	2.07	30	7.77	5	1.30	0	0.00	6	1.55
IV M1	31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.45	14	45.16	1	3.23	0	0.00	0	0.00	12	38.71	1	3.23	1	3.23	0	0.00
不詳	19	6	31.58	0	0.00	3	15.79	1	5.26	4	21.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15.79	0	0.00	0	0.00	2	10.53

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

口咽癌

表二之十 口咽癌(P16-) 60 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	491	135	27.49	56	11.41	19	3.87	16	3.26	143	29.12	15	3.05	22	4.48	17	3.46	4	0.81	32	6.52	14	2.85	1	0.20	17	3.46
0 期	6	5	83.33	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	108	80	74.07	3	2.78	7	6.48	5	4.63	3	2.78	0	0.00	7	6.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.93	0	0.00	2	1.85
II 期	80	32	40.00	7	8.75	7	8.75	3	3.75	19	23.75	1	1.25	3	3.75	3	3.75	0	0.00	2	2.50	1	1.25	0	0.00	2	2.50
III 期	57	7	12.28	7	12.28	1	1.75	3	5.26	25	43.86	0	0.00	4	7.02	3	5.26	1	1.75	3	5.26	0	0.00	0	0.00	3	5.26
IV M0	200	4	2.00	35	17.50	2	1.00	3	1.50	91	45.50	8	4.00	7	3.50	10	5.00	2	1.00	22	11.00	9	4.50	0	0.00	7	3.50
IV M1	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	35.29	1	5.88	0	0.00	1	5.88	4	23.53	2	11.76	1	5.88	2	11.76
不詳	23	7	30.43	3	13.04	2	8.70	2	8.70	5	21.74	0	0.00	0	0.00	1	4.35	0	0.00	1	4.35	1	4.35	0	0.00	1	4.35

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx
Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119
Pyriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser
- 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

20 Local tumor excision, NOS

- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 28 Stripping

30 Pharyngectomy, NOS

- 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
- 32 Total pharyngectomy

40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS (does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note*:* Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
- 42 WITH bone [mandibulectomy]
- 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note*:* Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS

- 51 WITHOUT laryngectomy
- 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

下咽癌

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1165	100.00	1126	100.00	39	100.00	747	100.00	418	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	21	1.80	20	1.78	1	2.56	14	1.87	7	1.67
40-44 歲	57	4.89	55	4.88	2	5.13	36	4.82	21	5.02
45-49 歲	136	11.67	134	11.90	2	5.13	84	11.24	52	12.44
50-54 歲	209	17.94	205	18.21	4	10.26	134	17.94	75	17.94
55-59 歲	240	20.60	228	20.25	12	30.77	137	18.34	103	24.64
60-64 歲	205	17.60	201	17.85	4	10.26	147	19.68	58	13.88
65-69 歲	152	13.05	148	13.14	4	10.26	95	12.72	57	13.64
70-74 歲	66	5.67	64	5.68	2	5.13	48	6.43	18	4.31
75-79 歲	43	3.69	38	3.37	5	12.82	28	3.75	15	3.59
80-84 歲	22	1.89	22	1.95	0	0.00	13	1.74	9	2.15
85 歲以上	14	1.20	11	0.98	3	7.69	11	1.47	3	0.72
臨床期別										
0 期	16	1.37	16	1.42	0	0.00	11	1.47	5	1.20
I 期	113	9.70	106	9.41	7	17.95	85	11.38	28	6.70
II 期	107	9.18	104	9.24	3	7.69	69	9.24	38	9.09
III 期	130	11.16	125	11.10	5	12.82	84	11.24	46	11.00
IV M0	695	59.66	676	60.04	19	48.72	439	58.77	256	61.24
IV M1	72	6.18	70	6.22	2	5.13	40	5.35	32	7.66
不詳	32	2.75	29	2.58	3	7.69	19	2.54	13	3.11
病理期別										
0 期	11	0.94	11	0.98	0	0.00	8	1.07	3	0.72
I 期	61	5.24	58	5.15	3	7.69	51	6.83	10	2.39
II 期	34	2.92	33	2.93	1	2.56	24	3.21	10	2.39
III 期	26	2.23	26	2.31	0	0.00	18	2.41	8	1.91
IV M0	153	13.13	147	13.06	6	15.38	106	14.19	47	11.24
IV M1	6	0.52	6	0.53	0	0.00	4	0.54	2	0.48
不詳	874	75.02	845	75.04	29	74.36	536	71.75	338	80.86

表三之一 下咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1165	100.00	1126	100.00	39	100.00	747	100.00	418	100.00
整併期別 [1]										
0 期	19	1.63	19	1.69	0	0.00	13	1.74	6	1.44
I 期	109	9.36	102	9.06	7	17.95	82	10.98	27	6.46
II 期	110	9.44	107	9.50	3	7.69	74	9.91	36	8.61
III 期	128	10.99	123	10.92	5	12.82	82	10.98	46	11.00
IV M0	707	60.69	687	61.01	20	51.28	448	59.97	259	61.96
IV M1	69	5.92	67	5.95	2	5.13	37	4.95	32	7.66
不詳	23	1.97	21	1.87	2	5.13	11	1.47	12	2.87
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.611								
治療方式 [3,4]										
手術	95	8.15	89	7.90	6	15.38	74	9.91	21	5.02
手術合併化療與放療	130	11.16	127	11.28	3	7.69	94	12.58	36	8.61
手術合併放療	32	2.75	30	2.66	2	5.13	15	2.01	17	4.07
手術合併化療	18	1.55	17	1.51	1	2.56	15	2.01	3	0.72
同步化療與放療或/與標靶治療	562	48.24	548	48.67	14	35.90	347	46.45	215	51.44
非同步化療與放療或/與標靶治療	72	6.18	71	6.31	1	2.56	36	4.82	36	8.61
放療	47	4.03	42	3.73	5	12.82	29	3.88	18	4.31
放療合併標靶治療	27	2.32	27	2.40	0	0.00	11	1.47	16	3.83
放療合併化療與免疫治療	28	2.40	27	2.40	1	2.56	28	3.75	0	0.00
化療或/與標靶治療	94	8.07	91	8.08	3	7.69	62	8.30	32	7.66
緩和治療	21	1.80	19	1.69	2	5.13	11	1.47	10	2.39
未治療	3	0.26	3	0.27	0	0.00	1	0.13	2	0.48
其他組合治療	36	3.09	35	3.11	1	2.56	24	3.21	12	2.87
組織型態										
鱗狀細胞癌	1134	97.34	1098	97.51	36	92.31	731	97.86	403	96.41
淋巴上皮癌	4	0.34	3	0.27	1	2.56	3	0.40	1	0.24
唾液腺癌	3	0.26	3	0.27	0	0.00	3	0.40	0	0.00
神經內分泌癌	6	0.52	6	0.53	0	0.00	2	0.27	4	0.96
非特定上皮癌	8	0.69	7	0.62	1	2.56	4	0.54	4	0.96
其他惡性腫瘤	10	0.86	9	0.80	1	2.56	4	0.54	6	1.44

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

下咽癌

表三之二 下咽癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1165	95	8.15	130	11.16	32	2.75	18	1.55	562	48.24	72	6.18	47	4.03	27	2.32	28	2.40	94	8.07	21	1.80	3	0.26	36	3.09
0 期	19	14	73.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	3	15.79	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	109	49	44.95	3	2.75	5	4.59	4	3.67	25	22.94	2	1.83	13	11.93	0	0.00	0	0.00	7	6.42	0	0.00	0	0.00	1	0.92
II 期	110	17	15.45	10	9.09	6	5.45	3	2.73	53	48.18	2	1.82	10	9.09	3	2.73	0	0.00	5	4.55	0	0.00	0	0.00	1	0.91
III 期	128	2	1.56	14	10.94	5	3.91	4	3.13	75	58.59	4	3.13	6	4.69	6	4.69	0	0.00	8	6.25	0	0.00	0	0.00	4	3.13
IV M0	707	11	1.56	100	14.14	15	2.12	6	0.85	396	56.01	32	4.53	11	1.56	16	2.26	28	3.96	46	6.51	16	2.26	1	0.14	29	4.10
IV M1	69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.35	31	44.93	3	4.35	2	2.90	0	0.00	25	36.23	4	5.80	0	0.00	1	1.45
不詳	23	2	8.70	3	13.04	1	4.35	1	4.35	9	39.13	1	4.35	1	4.35	0	0.00	0	0.00	2	8.70	1	4.35	2	8.70	0	0.00

表三之三 下咽癌 0-39 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	21	0	0.00	2	9.52	0	0.00	1	4.76	13	61.90	1	4.76	3	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.76	0	0.00	0	0.00
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	15	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	11	73.33	1	6.67	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

下咽癌

表三之四 下咽癌 40-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	642	53	8.26	78	12.15	17	2.65	7	1.09	328	51.09	39	6.07	27	4.21	4	0.62	17	2.65	46	7.17	6	0.93	2	0.31	18	2.80
0 期	12	9	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	66	27	40.91	1	1.52	3	4.55	2	3.03	18	27.27	2	3.03	9	13.64	0	0.00	0	0.00	3	4.55	0	0.00	0	0.00	1	1.52
II 期	61	7	11.48	5	8.20	4	6.56	1	1.64	32	52.46	1	1.64	7	11.48	0	0.00	0	0.00	4	6.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	60	2	3.33	10	16.67	2	3.33	1	1.67	35	58.33	2	3.33	3	5.00	0	0.00	0	0.00	3	5.00	0	0.00	0	0.00	2	3.33
IV M0	393	6	1.53	60	15.27	8	2.04	3	0.76	236	60.05	17	4.33	5	1.27	3	0.76	17	4.33	17	4.33	5	1.27	1	0.25	15	3.82
IV M1	39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	7.69	16	41.03	0	0.00	1	2.56	0	0.00	18	46.15	1	2.56	0	0.00	0	0.00
不詳	11	2	18.18	2	18.18	0	0.00	0	0.00	4	36.36	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	1	9.09	0	0.00

表三之五 下咽癌 60 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療或/與標靶治療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	502	42	8.37	50	9.96	15	2.99	10	1.99	221	44.02	32	6.37	17	3.39	23	4.58	11	2.19	48	9.56	14	2.79	1	0.20	18	3.59
0 期	7	5	71.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	42	22	52.38	2	4.76	2	4.76	2	4.76	7	16.67	0	0.00	3	7.14	0	0.00	0	0.00	4	9.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	46	10	21.74	4	8.70	2	4.35	2	4.35	20	43.48	1	2.17	2	4.35	3	6.52	0	0.00	1	2.17	0	0.00	0	0.00	1	2.17
III 期	67	0	0.00	4	5.97	3	4.48	3	4.48	39	58.21	2	2.99	3	4.48	6	8.96	0	0.00	5	7.46	0	0.00	0	0.00	2	2.99
IV M0	299	5	1.67	39	13.04	7	2.34	3	1.00	149	49.83	14	4.68	5	1.67	13	4.35	11	3.68	29	9.70	10	3.34	0	0.00	14	4.68
IV M1	30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	50.00	3	10.00	1	3.33	0	0.00	7	23.33	3	10.00	0	0.00	1	3.33
不詳	11	0	0.00	1	9.09	1	9.09	0	0.00	5	45.45	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	1	9.09	1	9.09	1	9.09	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx
Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119
Pyriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser
- 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

20 Local tumor excision, NOS

- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation
- 25 Laser excision
- 28 Stripping

30 Pharyngectomy, NOS

- 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
- 32 Total pharyngectomy

40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS (does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note*:* Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]

- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
- 42 WITH bone [mandibulectomy]
- 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note*:* Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS

- 51 WITHOUT laryngectomy
- 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

喉癌

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	741	100.00	706	100.00	35	100.00	497	100.00	244	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.13	1	0.14	0	0.00	1	0.20	0	0.00
35-39 歲	3	0.40	2	0.28	1	2.86	1	0.20	2	0.82
40-44 歲	28	3.78	25	3.54	3	8.57	21	4.23	7	2.87
45-49 歲	48	6.48	48	6.80	0	0.00	31	6.24	17	6.97
50-54 歲	76	10.26	72	10.20	4	11.43	47	9.46	29	11.89
55-59 歲	122	16.46	115	16.29	7	20.00	83	16.70	39	15.98
60-64 歲	142	19.16	136	19.26	6	17.14	101	20.32	41	16.80
65-69 歲	124	16.73	122	17.28	2	5.71	82	16.50	42	17.21
70-74 歲	69	9.31	66	9.35	3	8.57	46	9.26	23	9.43
75-79 歲	70	9.45	64	9.07	6	17.14	46	9.26	24	9.84
80-84 歲	36	4.86	34	4.82	2	5.71	23	4.63	13	5.33
85 歲以上	22	2.97	21	2.97	1	2.86	15	3.02	7	2.87
臨床期別										
0 期	17	2.29	16	2.27	1	2.86	11	2.21	6	2.46
I 期	296	39.95	276	39.09	20	57.14	198	39.84	98	40.16
II 期	106	14.30	101	14.31	5	14.29	77	15.49	29	11.89
III 期	123	16.60	121	17.14	2	5.71	79	15.90	44	18.03
IV M0	143	19.30	138	19.55	5	14.29	97	19.52	46	18.85
IV M1	12	1.62	12	1.70	0	0.00	7	1.41	5	2.05
不詳	44	5.94	42	5.95	2	5.71	28	5.63	16	6.56
病理期別										
0 期	27	3.64	26	3.68	1	2.86	19	3.82	8	3.28
I 期	181	24.43	167	23.65	14	40.00	135	27.16	46	18.85
II 期	43	5.80	41	5.81	2	5.71	31	6.24	12	4.92
III 期	24	3.24	24	3.40	0	0.00	21	4.23	3	1.23
IV M0	42	5.67	40	5.67	2	5.71	26	5.23	16	6.56
IV M1	1	0.13	1	0.14	0	0.00	1	0.20	0	0.00
不詳	423	57.09	407	57.65	16	45.71	264	53.12	159	65.16

表四之一 喉癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	741	100.00	706	100.00	35	100.00	497	100.00	244	100.00
整併期別 [1]										
0 期	33	4.45	32	4.53	1	2.86	24	4.83	9	3.69
I 期	312	42.11	292	41.36	20	57.14	209	42.05	103	42.21
II 期	112	15.11	106	15.01	6	17.14	79	15.90	33	13.52
III 期	114	15.38	113	16.01	1	2.86	74	14.89	40	16.39
IV M0	144	19.43	138	19.55	6	17.14	98	19.72	46	18.85
IV M1	12	1.62	12	1.70	0	0.00	7	1.41	5	2.05
不詳	14	1.89	13	1.84	1	2.86	6	1.21	8	3.28
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.6977								
治療方式 [3,4]										
手術	232	31.31	217	30.74	15	42.86	174	35.01	58	23.77
手術合併化療與放療	47	6.34	44	6.23	3	8.57	35	7.04	12	4.92
手術合併放療	53	7.15	49	6.94	4	11.43	32	6.44	21	8.61
手術合併化療	14	1.89	14	1.98	0	0.00	10	2.01	4	1.64
同步化療與放療或/與標靶治療	166	22.40	165	23.37	1	2.86	113	22.74	53	21.72
非同步化療與放療	13	1.75	13	1.84	0	0.00	8	1.61	5	2.05
放療	163	22.00	155	21.95	8	22.86	90	18.11	73	29.92
放療合併標靶治療	20	2.70	19	2.69	1	2.86	15	3.02	5	2.05
放療合併化療與免疫治療	5	0.67	5	0.71	0	0.00	4	0.80	1	0.41
化療	7	0.94	6	0.85	1	2.86	5	1.01	2	0.82
緩和治療	8	1.08	7	0.99	1	2.86	3	0.60	5	2.05
未治療	4	0.54	4	0.57	0	0.00	2	0.40	2	0.82
其他治療	9	1.21	8	1.13	1	2.86	6	1.21	3	1.23
組織型態										
鱗狀細胞癌	716	96.63	684	96.88	32	91.43	481	96.78	235	96.31
神經內分泌癌	1	0.13	1	0.14	0	0.00	1	0.20	0	0.00
其他特定上皮癌	5	0.67	3	0.42	2	5.71	4	0.80	1	0.41
非特定上皮癌	15	2.02	14	1.98	1	2.86	8	1.61	7	2.87
軟組織肉瘤	2	0.27	2	0.28	0	0.00	2	0.40	0	0.00
其他惡性腫瘤	2	0.27	2	0.28	0	0.00	1	0.20	1	0.41

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

喉癌

表四之二 喉癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	741	232	31.31	47	6.34	53	7.15	14	1.89	166	22.40	13	1.75	163	22.00	20	2.70	5	0.67	7	0.94	8	1.08	4	0.54	9	1.21
0 期	33	25	75.76	0	0.00	2	6.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	15.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.03	0	0.00
I 期	312	163	52.24	1	0.32	21	6.73	4	1.28	8	2.56	1	0.32	112	35.90	0	0.00	0	0.00	1	0.32	0	0.00	1	0.32	0	0.00
II 期	112	26	23.21	8	7.14	9	8.04	3	2.68	28	25.00	2	1.79	29	25.89	4	3.57	1	0.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.79
III 期	114	8	7.02	8	7.02	9	7.89	2	1.75	65	57.02	1	0.88	10	8.77	8	7.02	1	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.75
IV M0	144	3	2.08	30	20.83	8	5.56	4	2.78	65	45.14	5	3.47	4	2.78	8	5.56	3	2.08	5	3.47	5	3.47	2	1.39	2	1.39
IV M1	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	33.33	1	8.33	0	0.00	0	0.00	1	8.33	3	25.00	0	0.00	3	25.00
不詳	14	7	50.00	0	0.00	4	28.57	1	7.14	0	0.00	0	0.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表四之三 喉癌 0-39 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	1	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

喉癌

表四之四 喉癌 40-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	274	70	25.55	32	11.68	17	6.20	7	2.55	73	26.64	8	2.92	58	21.17	0	0.00	2	0.73	4	1.46	1	0.36	1	0.36	1	0.36
0 期	6	4	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	106	53	50.00	1	0.94	5	4.72	1	0.94	4	3.77	0	0.00	41	38.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.94	0	0.00
II 期	43	11	25.58	4	9.30	4	9.30	3	6.98	11	25.58	2	4.65	8	18.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	41	1	2.44	4	9.76	3	7.32	0	0.00	29	70.73	0	0.00	3	7.32	0	0.00	1	2.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	70	0	0.00	23	32.86	3	4.29	2	2.86	29	41.43	4	5.71	3	4.29	0	0.00	1	1.43	3	4.29	1	1.43	0	0.00	1	1.43
IV M1	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	5	1	20.00	0	0.00	2	40.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表四之五 喉癌 60 歲以上發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療或/與標靶治療		非同步化療與放療		放療		放療合併標靶治療		放療合併化療與免疫治療		化療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	463	160	34.56	15	3.24	36	7.78	7	1.51	92	19.87	5	1.08	104	22.46	20	4.32	3	0.65	3	0.65	7	1.51	3	0.65	8	1.73
0 期	27	21	77.78	0	0.00	2	7.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.70	0	0.00
I 期	204	109	53.43	0	0.00	16	7.84	3	1.47	4	1.96	1	0.49	70	34.31	0	0.00	0	0.00	1	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	68	15	22.06	4	5.88	5	7.35	0	0.00	16	23.53	0	0.00	21	30.88	4	5.88	1	1.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.94
III 期	73	7	9.59	4	5.48	6	8.22	2	2.74	36	49.32	1	1.37	7	9.59	8	10.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.74
IV M0	74	3	4.05	7	9.46	5	6.76	2	2.70	36	48.65	1	1.35	1	1.35	8	10.81	2	2.70	2	2.70	4	5.41	2	2.70	1	1.35
IV M1	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	22.22	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	33.33	0	0.00	3	33.33
不詳	8	5	62.50	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Larynx

C32

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation

25 Laser excision

[SEER Note*:* Codes 30-80 include major salivary gland, NOS]

30 Less than total parotidectomy, NOS; less than total removal of major salivary gland, NOS

- 31 Facial nerve spared
- 32 Facial nerve sacrificed

33 Superficial lobe ONLY

- 34 Facial nerve spared
- 35 Facial nerve sacrificed

36 Deep lobe (Total)

[SEER Note*:* Codes 30-36 are with or without superficial lobe]

- 37 Facial nerve spared
- 38 Facial nerve sacrificed

[SEER Note*:* Codes 40-80 may include submandibulectomy and submaxillectomy]

40 Total parotidectomy, NOS; total removal of major salivary gland, NOS

- 41 Facial nerve spared
- 42 Facial nerve sacrificed

50 Radical parotidectomy, NOS; radical removal of major salivary gland, NOS

- 51 WITHOUT removal of temporal bone
- 52 WITH removal of temporal bone
- 53 WITH removal of overlying skin (requires graft or flap coverage)

80 Parotidectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

主唾液腺癌

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	326	100.00	172	100.00	154	100.00	229	100.00	97	100.00
年齡										
00-04 歲	1	0.31	0	0.00	1	0.65	1	0.44	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	2	0.61	1	0.58	1	0.65	2	0.87	0	0.00
15-19 歲	2	0.61	2	1.16	0	0.00	2	0.87	0	0.00
20-24 歲	7	2.15	5	2.91	2	1.30	4	1.75	3	3.09
25-29 歲	13	3.99	9	5.23	4	2.60	10	4.37	3	3.09
30-34 歲	14	4.29	7	4.07	7	4.55	10	4.37	4	4.12
35-39 歲	21	6.44	8	4.65	13	8.44	15	6.55	6	6.19
40-44 歲	28	8.59	16	9.30	12	7.79	19	8.30	9	9.28
45-49 歲	25	7.67	11	6.40	14	9.09	20	8.73	5	5.15
50-54 歲	33	10.12	15	8.72	18	11.69	24	10.48	9	9.28
55-59 歲	54	16.56	21	12.21	33	21.43	39	17.03	15	15.46
60-64 歲	51	15.64	30	17.44	21	13.64	38	16.59	13	13.40
65-69 歲	27	8.28	21	12.21	6	3.90	17	7.42	10	10.31
70-74 歲	15	4.60	7	4.07	8	5.19	8	3.49	7	7.22
75-79 歲	15	4.60	7	4.07	8	5.19	11	4.80	4	4.12
80-84 歲	8	2.45	6	3.49	2	1.30	5	2.18	3	3.09
85 歲以上	10	3.07	6	3.49	4	2.60	4	1.75	6	6.19
臨床期別										
0 期	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
I 期	42	12.88	15	8.72	27	17.53	30	13.10	12	12.37
II 期	63	19.33	31	18.02	32	20.78	42	18.34	21	21.65
III 期	27	8.28	14	8.14	13	8.44	19	8.30	8	8.25
IV 期	67	20.55	47	27.33	20	12.99	44	19.21	23	23.71
不詳	127	38.96	65	37.79	62	40.26	94	41.05	33	34.02
病理期別										
0 期	3	0.92	1	0.58	2	1.30	2	0.87	1	1.03
I 期	74	22.70	37	21.51	37	24.03	56	24.45	18	18.56
II 期	88	26.99	41	23.84	47	30.52	69	30.13	19	19.59
III 期	46	14.11	23	13.37	23	14.94	33	14.41	13	13.40
IV 期	65	19.94	45	26.16	20	12.99	44	19.21	21	21.65
不詳	50	15.34	25	14.53	25	16.23	25	10.92	25	25.77

表五之一 主唾液腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	308	100.00	174	100.00	134	100.00	208	100.00	100	100.00
整併期別 [1]										
0 期	3	0.92	1	0.58	2	1.30	2	0.87	1	1.03
I 期	76	23.31	37	21.51	39	25.32	57	24.89	19	19.59
II 期	91	27.91	41	23.84	50	32.47	70	30.57	21	21.65
III 期	48	14.72	24	13.95	24	15.58	34	14.85	14	14.43
IV 期	85	26.07	58	33.72	27	17.53	57	24.89	28	28.87
不詳	23	7.06	11	6.40	12	7.79	9	3.93	14	14.43
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.7283								
治療方式 [3,4]										
手術	107	32.82	52	30.23	55	35.71	78	34.06	29	29.90
手術合併化療與放療	71	21.78	43	25.00	28	18.18	48	20.96	23	23.71
手術合併放療	113	34.66	55	31.98	58	37.66	81	35.37	32	32.99
同步化療與放療	10	3.07	3	1.74	7	4.55	7	3.06	3	3.09
放療	7	2.15	5	2.91	2	1.30	3	1.31	4	4.12
化療	4	1.23	3	1.74	1	0.65	2	0.87	2	2.06
緩和治療	3	0.92	3	1.74	0	0.00	2	0.87	1	1.03
未治療	1	0.31	0	0.00	1	0.65	0	0.00	1	1.03
其他治療	10	3.07	8	4.65	2	1.30	8	3.49	2	2.06
組織型態										
黏液表皮樣癌	69	21.17	30	17.44	39	25.32	51	22.27	18	18.56
鱗狀細胞癌	15	4.60	11	6.40	4	2.60	8	3.49	7	7.22
腺癌	13	3.99	10	5.81	3	1.95	7	3.06	6	6.19
腺樣囊狀癌	56	17.18	26	15.12	30	19.48	39	17.03	17	17.53
腺泡細胞癌	37	11.35	14	8.14	23	14.94	31	13.54	6	6.19
惡性混合性腫瘤	26	7.98	13	7.56	13	8.44	18	7.86	8	8.25
淋巴上皮癌	21	6.44	6	3.49	15	9.74	13	5.68	8	8.25
其他特定上皮癌	76	23.31	52	30.23	24	15.58	54	23.58	22	22.68
非特定上皮癌	7	2.15	6	3.49	1	0.65	5	2.18	2	2.06
軟組織肉瘤	4	1.23	2	1.16	2	1.30	2	0.87	2	2.06
其他惡性腫瘤	2	0.61	2	1.16	0	0.00	1	0.44	1	1.03

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

主唾液腺癌

表五之二 主唾液腺癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	326	107	32.82	71	21.78	113	34.66	10	3.07	7	2.15	4	1.23	3	0.92	1	0.31	10	3.07
0 期	3	2	66.67	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	76	38	50.00	4	5.26	33	43.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.32
II 期	91	39	42.86	14	15.38	37	40.66	1	1.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	48	11	22.92	11	22.92	24	50.00	0	0.00	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.08
IV 期	85	9	10.59	35	41.18	11	12.94	9	10.59	6	7.06	3	3.53	3	3.53	1	1.18	8	9.41
不詳	23	8	34.78	7	30.43	7	30.43	0	0.00	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表五之三 主唾液腺癌 0-49 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	113	46	40.71	17	15.04	45	39.82	2	1.77	0	0.00	1	0.88	0	0.00	0	0.00	2	1.77
0 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	34	16	47.06	2	5.88	15	44.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.94
II 期	39	20	51.28	6	15.38	13	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	19	4	21.05	2	10.53	13	68.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	11	1	9.09	4	36.36	2	18.18	2	18.18	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	1	9.09
不詳	8	3	37.50	3	37.50	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

主唾液腺癌

表五之四 主唾液腺癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	165	50	30.30	48	29.09	54	32.73	4	2.42	0	0.00	3	1.82	2	1.21	0	0.00	4	2.42
0 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	37	21	56.76	2	5.41	14	37.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	45	17	37.78	8	17.78	20	44.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	22	4	18.18	9	40.91	9	40.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	48	5	10.42	26	54.17	5	10.42	4	8.33	0	0.00	2	4.17	2	4.17	0	0.00	4	8.33
不詳	12	3	25.00	3	25.00	5	41.67	0	0.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表五之五 主唾液腺癌 70 歲以上發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	48	11	22.92	6	12.50	14	29.17	4	8.33	7	14.58	0	0.00	1	2.08	1	2.08	4	8.33
0 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	5	1	20.00	0	0.00	4	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	7	2	28.57	0	0.00	4	57.14	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	7	3	42.86	0	0.00	2	28.57	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29
IV 期	26	3	11.54	5	19.23	4	15.38	3	11.54	6	23.08	0	0.00	1	3.85	1	3.85	3	11.54
不詳	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Parotid and Other Unspecified Glands

Parotid Gland C079, Major Salivary Glands C080–C089

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS

- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation

25 Laser excision

[SEER Note*:* Codes 30-80 include major salivary gland, NOS]

30 Less than total parotidectomy, NOS; less than total removal of major salivary gland, NOS

- 31 Facial nerve spared
- 32 Facial nerve sacrificed

33 Superficial lobe ONLY

- 34 Facial nerve spared
- 35 Facial nerve sacrificed

36 Deep lobe (Total)

[SEER Note*:* Codes 30-36 are with or without superficial lobe]

- 37 Facial nerve spared
- 38 Facial nerve sacrificed

[SEER Note*:* Codes 40-80 may include submandibulectomy and submaxillectomy]

40 Total parotidectomy, NOS; total removal of major salivary gland, NOS

- 41 Facial nerve spared
- 42 Facial nerve sacrificed

50 Radical parotidectomy, NOS; radical removal of major salivary gland, NOS

- 51 WITHOUT removal of temporal bone
- 52 WITH removal of temporal bone
- 53 WITH removal of overlying skin (requires graft or flap coverage)

80 Parotidectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

鼻咽癌

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1396	100.00	1055	100.00	341	100.00	889	100.00	507	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00
15-19 歲	5	0.36	5	0.47	0	0.00	4	0.45	1	0.20
20-24 歲	11	0.79	8	0.76	3	0.88	6	0.67	5	0.99
25-29 歲	26	1.86	17	1.61	9	2.64	18	2.02	8	1.58
30-34 歲	56	4.01	37	3.51	19	5.57	29	3.26	27	5.33
35-39 歲	138	9.89	106	10.05	32	9.38	94	10.57	44	8.68
40-44 歲	178	12.75	128	12.13	50	14.66	117	13.16	61	12.03
45-49 歲	189	13.54	150	14.22	39	11.44	133	14.96	56	11.05
50-54 歲	220	15.76	166	15.73	54	15.84	143	16.09	77	15.19
55-59 歲	190	13.61	142	13.46	48	14.08	120	13.50	70	13.81
60-64 歲	169	12.11	133	12.61	36	10.56	112	12.60	57	11.24
65-69 歲	97	6.95	76	7.20	21	6.16	54	6.07	43	8.48
70-74 歲	53	3.80	41	3.89	12	3.52	31	3.49	22	4.34
75-79 歲	40	2.87	30	2.84	10	2.93	19	2.14	21	4.14
80-84 歲	18	1.29	12	1.14	6	1.76	7	0.79	11	2.17
85 歲以上	5	0.36	3	0.28	2	0.59	1	0.11	4	0.79
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	127	9.10	97	9.19	30	8.80	89	10.01	38	7.50
II 期	248	17.77	198	18.77	50	14.66	148	16.65	100	19.72
III 期	437	31.30	318	30.14	119	34.90	262	29.47	175	34.52
IV M0	456	32.66	340	32.23	116	34.02	308	34.65	148	29.19
IV M1	118	8.45	97	9.19	21	6.16	77	8.66	41	8.09
不詳	10	0.72	5	0.47	5	1.47	5	0.56	5	0.99
病理期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	5	0.36	3	0.28	2	0.59	3	0.34	2	0.39
II 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	16	1.15	14	1.33	2	0.59	15	1.69	1	0.20
IV M1	17	1.22	15	1.42	2	0.59	12	1.35	5	0.99
不詳	1358	97.28	1023	96.97	335	98.24	859	96.63	499	98.42

表六之一 鼻咽癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1396	100.00	1055	100.00	341	100.00	889	100.00	507	100.00
整併期別 [1]										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	127	9.10	97	9.19	30	8.80	89	10.01	38	7.50
II 期	248	17.77	198	18.77	50	14.66	148	16.65	100	19.72
III 期	437	31.30	318	30.14	119	34.90	262	29.47	175	34.52
IV M0	457	32.74	341	32.32	116	34.02	309	34.76	148	29.19
IV M1	117	8.38	96	9.10	21	6.16	76	8.55	41	8.09
不詳	10	0.72	5	0.47	5	1.47	5	0.56	5	0.99
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		-								
治療方式 [3,4]										
同步化療與放療	1036	74.21	780	73.93	256	75.07	647	72.78	389	76.73
非同步化療與放療	144	10.32	109	10.33	35	10.26	107	12.04	37	7.30
放療	121	8.67	95	9.00	26	7.62	79	8.89	42	8.28
化療	57	4.08	44	4.17	13	3.81	31	3.49	26	5.13
手術	6	0.43	4	0.38	2	0.59	3	0.34	3	0.59
手術合併化療與放療	6	0.43	5	0.47	1	0.29	5	0.56	1	0.20
緩和治療	7	0.50	4	0.38	3	0.88	2	0.22	5	0.99
未治療	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00
其他治療	18	1.29	13	1.23	5	1.47	14	1.57	4	0.79
組織型態										
非角化鱗狀細胞癌	1334	95.56	1012	95.92	322	94.43	849	95.50	485	95.66
角化鱗狀細胞癌	23	1.65	16	1.52	7	2.05	17	1.91	6	1.18
乳頭狀腺癌	2	0.14	1	0.09	1	0.29	1	0.11	1	0.20
唾液腺癌	7	0.50	5	0.47	2	0.59	6	0.67	1	0.20
其他特定上皮癌	3	0.21	1	0.09	2	0.59	3	0.34	0	0.00
非特定上皮癌	26	1.86	19	1.80	7	2.05	12	1.35	14	2.76
其他惡性腫瘤	1	0.07	1	0.09	0	0.00	1	0.11	0	0.00

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：鼻咽癌個案因接受手術治療甚少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

鼻咽癌

表六之二 鼻咽癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		手術[2]		手術合併化療與放療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1396	1036	74.21	144	10.32	121	8.67	57	4.08	6	0.43	6	0.43	7	0.50	1	0.07	18	1.29
I 期	127	13	10.24	6	4.72	99	77.95	2	1.57	3	2.36	0	0.00	1	0.79	0	0.00	3	2.36
II 期	248	223	89.92	9	3.63	11	4.44	1	0.40	0	0.00	2	0.81	0	0.00	0	0.00	2	0.81
III 期	437	392	89.70	28	6.41	9	2.06	3	0.69	0	0.00	2	0.46	0	0.00	0	0.00	3	0.69
IV M0	457	400	87.53	33	7.22	2	0.44	10	2.19	0	0.00	2	0.44	5	1.09	1	0.22	4	0.88
IV M1	117	6	5.13	68	58.12	0	0.00	38	32.48	0	0.00	0	0.00	1	0.85	0	0.00	4	3.42
不詳	10	2	20.00	0	0.00	0	0.00	3	30.00	3	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00

表六之三 鼻咽癌 0-49 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		手術 [2]		手術合併化療與放療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	604	458	75.83	73	12.09	37	6.13	21	3.48	2	0.33	4	0.66	0	0.00	0	0.00	9	1.49
I 期	44	3	6.82	5	11.36	36	81.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	97	90	92.78	3	3.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.06	0	0.00	0	0.00	2	2.06
III 期	203	183	90.15	16	7.88	0	0.00	1	0.49	0	0.00	1	0.49	0	0.00	0	0.00	2	0.99
IV M0	204	179	87.75	17	8.33	1	0.49	4	1.96	0	0.00	1	0.49	0	0.00	0	0.00	2	0.98
IV M1	52	3	5.77	32	61.54	0	0.00	15	28.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.85
不詳	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00

1 鼻咽癌個案僅依照**臨床期別**進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

鼻咽癌

表六之四 鼻咽癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		手術[2]		手術合併化療與放療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	676	510	75.44	62	9.17	63	9.32	28	4.14	2	0.30	2	0.30	2	0.30	0	0.00	7	1.04
I 期	72	10	13.89	1	1.39	55	76.39	2	2.78	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.17
II 期	123	114	92.68	4	3.25	4	3.25	1	0.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	201	183	91.04	11	5.47	3	1.49	2	1.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	1	0.50
IV M0	222	199	89.64	16	7.21	1	0.45	3	1.35	0	0.00	1	0.45	2	0.90	0	0.00	0	0.00
IV M1	52	2	3.85	30	57.69	0	0.00	18	34.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.85
不詳	6	2	33.33	0	0.00	0	0.00	2	33.33	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67

表六之五 鼻咽癌 70 歲以上發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		手術 [2]		手術合併化療與放療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	116	68	58.62	9	7.76	21	18.10	8	6.90	2	1.72	0	0.00	5	4.31	1	0.86	2	1.72
I 期	11	0	0.00	0	0.00	8	72.73	0	0.00	2	18.18	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00
II 期	28	19	67.86	2	7.14	7	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	33	26	78.79	1	3.03	6	18.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV M0	31	22	70.97	0	0.00	0	0.00	3	9.68	0	0.00	0	0.00	3	9.68	1	3.23	2	6.45
IV M1	13	1	7.69	6	46.15	0	0.00	5	38.46	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 鼻咽癌個案僅依照**臨床期別**進行治療方式分類與年齡相關分析。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Pharynx
Tonsil C090–C099, Oropharynx C100–C109, Nasopharynx C110–C119
Pyriform Sinus C129, Hypopharynx C130–C139, Pharynx C140

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS
- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser
- 15 Stripping

No specimen sent to pathology from surgical events 10–15

20 Local tumor excision, NOS
- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy

Any combination of 20 or 26–27 WITH
- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation

25 Laser excision

28 Stripping

30 Pharyngectomy, NOS
- 31 Limited/partial pharyngectomy; tonsillectomy, bilateral tonsillectomy
- 32 Total pharyngectomy

40 Pharyngectomy WITH laryngectomy OR removal of contiguous bone tissue, NOS (does NOT include total mandibular resection)

[SEER Note*:* Code 40 includes mandibulectomy (marginal, segmental, hemi-, and/or laryngectomy) NOS. Contiguous bone tissue refers to the mandible.]
- 41 WITH laryngectomy (laryngopharyngectomy)
- 42 WITH bone [mandibulectomy]
- 43 WITH both 41 and 42

[SEER Note*:* Use **code 40** when the patient had a pharyngectomy and maybe some sort of mandibulectomy and/or maybe a laryngectomy, but the exact procedures are not clear. Use **code 41** when the patient had pharyngectomy and laryngectomy but no mandibulectomy. Use **code 42** when the patient had pharyngectomy and mandibulectomy but no laryngectomy. Use **code 43** when it is known that the patient had both a mandibulectomy and laryngectomy in addition to the pharyngectomy.]

50 Radical pharyngectomy (includes total mandibular resection), NOS
- 51 WITHOUT laryngectomy
- 52 WITH laryngectomy

Specimen sent to pathology from surgical events 20-52.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

食道癌

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2599	100.00	2426	100.00	173	100.00	1537	100.00	1062	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.04	1	0.04	0	0.00	1	0.07	0	0.00
25-29 歲	2	0.08	2	0.08	0	0.00	1	0.07	1	0.09
30-34 歲	3	0.12	3	0.12	0	0.00	1	0.07	2	0.19
35-39 歲	26	1.00	25	1.03	1	0.58	18	1.17	8	0.75
40-44 歲	134	5.16	123	5.07	11	6.36	77	5.01	57	5.37
45-49 歲	263	10.12	255	10.51	8	4.62	158	10.28	105	9.89
50-54 歲	424	16.31	410	16.90	14	8.09	240	15.61	184	17.33
55-59 歲	549	21.12	516	21.27	33	19.08	326	21.21	223	21.00
60-64 歲	475	18.28	437	18.01	38	21.97	287	18.67	188	17.70
65-69 歲	316	12.16	295	12.16	21	12.14	192	12.49	124	11.68
70-74 歲	180	6.93	162	6.68	18	10.40	121	7.87	59	5.56
75-79 歲	114	4.39	105	4.33	9	5.20	57	3.71	57	5.37
80-84 歲	53	2.04	47	1.94	6	3.47	28	1.82	25	2.35
85 歲以上	59	2.27	45	1.85	14	8.09	30	1.95	29	2.73
臨床期別										
0 期	117	4.50	110	4.53	7	4.05	73	4.75	44	4.14
I 期	252	9.70	235	9.69	17	9.83	175	11.39	77	7.25
II 期	366	14.08	334	13.77	32	18.50	195	12.69	171	16.10
III 期	749	28.82	700	28.85	49	28.32	453	29.47	296	27.87
IV 期	1041	40.05	982	40.48	59	34.10	596	38.78	445	41.90
不詳	74	2.85	65	2.68	9	5.20	45	2.93	29	2.73
病理期別										
0 期	92	3.54	89	3.67	3	1.73	63	4.10	29	2.73
I 期	396	15.24	365	15.05	31	17.92	286	18.61	110	10.36
II 期	129	4.96	114	4.70	15	8.67	80	5.20	49	4.61
III 期	178	6.85	167	6.88	11	6.36	114	7.42	64	6.03
IV 期	103	3.96	96	3.96	7	4.05	76	4.94	27	2.54
不詳	1701	65.45	1595	65.75	106	61.27	918	59.73	783	73.73
整併期別 [1]										
0 期	129	4.96	122	5.03	7	4.05	85	5.53	44	4.14
I 期	285	10.97	263	10.84	22	12.72	197	12.82	88	8.29
II 期	312	12.00	286	11.79	26	15.03	158	10.28	154	14.50
III 期	767	29.51	716	29.51	51	29.48	462	30.06	305	28.72
IV 期	1048	40.32	989	40.77	59	34.10	601	39.10	447	42.09
不詳	58	2.23	50	2.06	8	4.62	34	2.21	24	2.26

表七之一 食道癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2599	100.00	2426	100.00	173	100.00	1537	100.00	1062	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.3897								
治療方式[3,4]										
手術	357	13.74	325	13.40	32	18.50	242	15.74	115	10.83
手術合併化療與放療	521	20.05	484	19.95	37	21.39	355	23.10	166	15.63
手術合併放療	11	0.42	11	0.45	0	0.00	5	0.33	6	0.56
手術合併化療	34	1.31	32	1.32	2	1.16	19	1.24	15	1.41
同步化療與放療	841	32.36	802	33.06	39	22.54	462	30.06	379	35.69
非同步化療與放療	283	10.89	266	10.96	17	9.83	154	10.02	129	12.15
放療	126	4.85	108	4.45	18	10.40	60	3.90	66	6.21
化療	165	6.35	157	6.47	8	4.62	90	5.86	75	7.06
化療合併免疫治療	31	1.19	31	1.28	0	0.00	26	1.69	5	0.47
緩和治療	118	4.54	108	4.45	10	5.78	57	3.71	61	5.74
未治療	43	1.65	38	1.57	5	2.89	21	1.37	22	2.07
其他治療	69	2.65	64	2.64	5	2.89	46	2.99	23	2.17
組織型態										
鱗狀細胞癌	2436	93.73	2280	93.98	156	90.17	1453	94.53	983	92.56
腺癌	84	3.23	75	3.09	9	5.20	42	2.73	42	3.95
腺性鱗狀癌	15	0.58	13	0.54	2	1.16	8	0.52	7	0.66
神經內分泌癌	18	0.69	15	0.62	3	1.73	12	0.78	6	0.56
其他特定上皮癌	9	0.35	9	0.37	0	0.00	4	0.26	5	0.47
非特定上皮癌	21	0.81	20	0.82	1	0.58	10	0.65	11	1.04
胃腸基質瘤	3	0.12	3	0.12	0	0.00	2	0.13	1	0.09
其他惡性肉瘤	8	0.31	6	0.25	2	1.16	6	0.39	2	0.19
其他惡性腫瘤	5	0.19	5	0.21	0	0.00	0	0.00	5	0.47

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

食道癌

表七之二 食道癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2599	357	13.74	521	20.05	11	0.42	34	1.31	841	32.36	283	10.89	126	4.85	165	6.35	31	1.19	118	4.54	43	1.65	69	2.65
0 期	129	91	70.54	0	0.00	0	0.00	2	1.55	1	0.78	0	0.00	3	2.33	2	1.55	0	0.00	2	1.55	22	17.05	6	4.65
I 期	285	201	70.53	20	7.02	4	1.40	2	0.70	35	12.28	1	0.35	10	3.51	5	1.75	0	0.00	3	1.05	2	0.70	2	0.70
II 期	312	36	11.54	93	29.81	4	1.28	8	2.56	127	40.71	3	0.96	22	7.05	12	3.85	0	0.00	7	2.24	0	0.00	0	0.00
III 期	767	20	2.61	305	39.77	2	0.26	16	2.09	337	43.94	16	2.09	23	3.00	12	1.56	0	0.00	14	1.83	1	0.13	21	2.74
IV 期	1048	2	0.19	97	9.26	1	0.10	6	0.57	332	31.68	253	24.14	67	6.39	128	12.21	31	2.96	81	7.73	15	1.43	35	3.34
不詳	58	7	12.07	6	10.34	0	0.00	0	0.00	9	15.52	10	17.24	1	1.72	6	10.34	0	0.00	11	18.97	3	5.17	5	8.62

表七之三 食道癌 0-49 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	429	63	14.69	99	23.08	1	0.23	4	0.93	136	31.70	54	12.59	17	3.96	24	5.59	1	0.23	12	2.80	5	1.17	13	3.03
0 期	28	20	71.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.57	1	3.57	0	0.00	0	0.00	5	17.86	1	3.57
I 期	49	37	75.51	5	10.20	1	2.04	0	0.00	2	4.08	0	0.00	3	6.12	1	2.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	48	2	4.17	20	41.67	0	0.00	1	2.08	20	41.67	1	2.08	3	6.25	1	2.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	114	0	0.00	54	47.37	0	0.00	3	2.63	46	40.35	1	0.88	4	3.51	1	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4.39
IV 期	178	0	0.00	19	10.67	0	0.00	0	0.00	67	37.64	51	28.65	5	2.81	19	10.67	1	0.56	11	6.18	0	0.00	5	2.81
不詳	12	4	33.33	1	8.33	0	0.00	0	0.00	1	8.33	1	8.33	1	8.33	1	8.33	0	0.00	1	8.33	0	0.00	2	16.67

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

食道癌

表七之四 食道癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1764	240	13.61	378	21.43	8	0.45	30	1.70	577	32.71	187	10.60	57	3.23	118	6.69	29	1.64	60	3.40	29	1.64	51	2.89
0 期	90	61	67.78	0	0.00	0	0.00	2	2.22	1	1.11	0	0.00	1	1.11	1	1.11	0	0.00	2	2.22	17	18.89	5	5.56
I 期	197	138	70.05	13	6.60	2	1.02	2	1.02	31	15.74	1	0.51	3	1.52	3	1.52	0	0.00	1	0.51	1	0.51	2	1.02
II 期	208	25	12.02	65	31.25	3	1.44	7	3.37	85	40.87	2	0.96	8	3.85	10	4.81	0	0.00	3	1.44	0	0.00	0	0.00
III 期	533	13	2.44	228	42.78	2	0.38	13	2.44	230	43.15	11	2.06	5	0.94	10	1.88	0	0.00	6	1.13	0	0.00	15	2.81
IV 期	706	2	0.28	68	9.63	1	0.14	6	0.85	224	31.73	165	23.37	40	5.67	90	12.75	29	4.11	46	6.52	9	1.27	26	3.68
不詳	30	1	3.33	4	13.33	0	0.00	0	0.00	6	20.00	8	26.67	0	0.00	4	13.33	0	0.00	2	6.67	2	6.67	3	10.00

表七之五 食道癌 70 歲以上發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		化療合併免疫治療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	406	54	13.30	44	10.84	2	0.49	0	0.00	128	31.53	42	10.34	52	12.81	23	5.67	1	0.25	46	11.33	9	2.22	5	1.23
0 期	11	10	90.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	39	26	66.67	2	5.13	1	2.56	0	0.00	2	5.13	0	0.00	4	10.26	1	2.56	0	0.00	2	5.13	1	2.56	0	0.00
II 期	56	9	16.07	8	14.29	1	1.79	0	0.00	22	39.29	0	0.00	11	19.64	1	1.79	0	0.00	4	7.14	0	0.00	0	0.00
III 期	120	7	5.83	23	19.17	0	0.00	0	0.00	61	50.83	4	3.33	14	11.67	1	0.83	0	0.00	8	6.67	1	0.83	1	0.83
IV 期	164	0	0.00	10	6.10	0	0.00	0	0.00	41	25.00	37	22.56	22	13.41	19	11.59	1	0.61	24	14.63	6	3.66	4	2.44
不詳	16	2	12.50	1	6.25	0	0.00	0	0.00	2	12.50	1	6.25	0	0.00	1	6.25	0	0.00	8	50.00	1	6.25	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Esophagus
C150–C159
(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS
- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS
- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy
- 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
- 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH
- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation

- 25 Laser excision

30 Partial esophagectomy

40 Total esophagectomy, NOS

50 Esophagectomy, NOS WITH laryngectomy and/or gastrectomy, NOS

[SEER Note*:* Codes 50-55 include partial esophagectomy, total esophagectomy, or esophagectomy, NOS.]
- 51 WITH laryngectomy
- 52 WITH gastrectomy, NOS
- 53 Partial gastrectomy
- 54 Total gastrectomy
- 55 Combination of 51 WITH any of 52–54

80 Esophagectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

胃癌

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3255	100.00	1995	100.00	1260	100.00	1943	100.00	1312	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	2	0.06	1	0.05	1	0.08	2	0.10	0	0.00
20-24 歲	2	0.06	0	0.00	2	0.16	2	0.10	0	0.00
25-29 歲	6	0.18	5	0.25	1	0.08	5	0.26	1	0.08
30-34 歲	13	0.40	7	0.35	6	0.48	12	0.62	1	0.08
35-39 歲	48	1.47	21	1.05	27	2.14	32	1.65	16	1.22
40-44 歲	68	2.09	30	1.50	38	3.02	46	2.37	22	1.68
45-49 歲	131	4.02	76	3.81	55	4.37	84	4.32	47	3.58
50-54 歲	215	6.61	137	6.87	78	6.19	141	7.26	74	5.64
55-59 歲	347	10.66	226	11.33	121	9.60	211	10.86	136	10.37
60-64 歲	516	15.85	340	17.04	176	13.97	333	17.14	183	13.95
65-69 歲	481	14.78	289	14.49	192	15.24	300	15.44	181	13.80
70-74 歲	360	11.06	244	12.23	116	9.21	209	10.76	151	11.51
75-79 歲	387	11.89	216	10.83	171	13.57	228	11.73	159	12.12
80-84 歲	332	10.20	185	9.27	147	11.67	166	8.54	166	12.65
85 歲以上	347	10.66	218	10.93	129	10.24	172	8.85	175	13.34
臨床期別										
0 期	59	1.81	39	1.95	20	1.59	37	1.90	22	1.68
I 期	761	23.38	451	22.61	310	24.60	468	24.09	293	22.33
II 期	494	15.18	309	15.49	185	14.68	296	15.23	198	15.09
III 期	638	19.60	412	20.65	226	17.94	397	20.43	241	18.37
IV 期	967	29.71	590	29.57	377	29.92	587	30.21	380	28.96
不詳	336	10.32	194	9.72	142	11.27	158	8.13	178	13.57
病理期別										
0 期	59	1.81	34	1.70	25	1.98	38	1.96	21	1.60
I 期	704	21.63	426	21.35	278	22.06	445	22.90	259	19.74
II 期	441	13.55	266	13.33	175	13.89	263	13.54	178	13.57
III 期	653	20.06	426	21.35	227	18.02	383	19.71	270	20.58
IV 期	492	15.12	296	14.84	196	15.56	335	17.24	157	11.97
不詳	906	27.83	547	27.42	359	28.49	479	24.65	427	32.55
整併期別 [1]										
0 期	67	2.06	41	2.06	26	2.06	42	2.16	25	1.91
I 期	772	23.72	470	23.56	302	23.97	488	25.12	284	21.65
II 期	507	15.58	302	15.14	205	16.27	286	14.72	221	16.84
III 期	752	23.10	481	24.11	271	21.51	436	22.44	316	24.09
IV 期	1061	32.60	647	32.43	414	32.86	646	33.25	415	31.63
不詳	96	2.95	54	2.71	42	3.33	45	2.32	51	3.89

表八之一 胃癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3255	100.00	1995	100.00	1260	100.00	1943	100.00	1312	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5061								
治療方式 [3,4]										
手術	1060	32.57	630	31.58	430	34.13	654	33.66	406	30.95
手術合併化療	839	25.78	545	27.32	294	23.33	523	26.92	316	24.09
手術合併化療與放療	89	2.73	68	3.41	21	1.67	38	1.96	51	3.89
手術合併標靶治療	94	2.89	49	2.46	45	3.57	51	2.62	43	3.28
手術合併化療與免疫治療	42	1.29	27	1.35	15	1.19	39	2.01	3	0.23
化療	535	16.44	321	16.09	214	16.98	332	17.09	203	15.47
放療	28	0.86	18	0.90	10	0.79	13	0.67	15	1.14
同步化療與放療	36	1.11	26	1.30	10	0.79	22	1.13	14	1.07
非同步化療與放療	60	1.84	35	1.75	25	1.98	36	1.85	24	1.83
標靶治療	41	1.26	17	0.85	24	1.90	22	1.13	19	1.45
緩和治療	266	8.17	152	7.62	114	9.05	113	5.82	153	11.66
未治療	35	1.08	23	1.15	12	0.95	6	0.31	29	2.21
其他治療	130	3.99	84	4.21	46	3.65	94	4.84	36	2.74
組織型態										
腺癌	2861	87.90	1780	89.22	1081	85.79	1729	88.99	1132	86.28
腺性鱗狀癌	11	0.34	7	0.35	4	0.32	5	0.26	6	0.46
鱗狀細胞癌	23	0.71	21	1.05	2	0.16	11	0.57	12	0.91
神經內分泌癌	85	2.61	50	2.51	35	2.78	52	2.68	33	2.52
其他特定上皮癌	15	0.46	11	0.55	4	0.32	10	0.51	5	0.38
非特定上皮癌	45	1.38	24	1.20	21	1.67	23	1.18	22	1.68
胃腸基質瘤	192	5.90	90	4.51	102	8.10	102	5.25	90	6.86
其他惡性肉瘤	9	0.28	5	0.25	4	0.32	7	0.36	2	0.15
其他惡性腫瘤	14	0.43	7	0.35	7	0.56	4	0.21	10	0.76

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

胃癌

表八之二 胃癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3255	1060	32.57	839	25.78	89	2.73	94	2.89	42	1.29	535	16.44	28	0.86	36	1.11	60	1.84	41	1.26	266	8.17	35	1.08	130	3.99
0 期	67	61	91.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.49	5	7.46	0	0.00
I 期	772	661	85.62	47	6.09	3	0.39	1	0.13	1	0.13	16	2.07	1	0.13	5	0.65	2	0.26	0	0.00	21	2.72	8	1.04	6	0.78
II 期	507	141	27.81	234	46.15	14	2.76	38	7.50	2	0.39	23	4.54	5	0.99	2	0.39	0	0.00	4	0.79	27	5.33	7	1.38	10	1.97
III 期	752	118	15.69	392	52.13	53	7.05	38	5.05	34	4.52	29	3.86	8	1.06	6	0.80	5	0.66	6	0.80	24	3.19	3	0.40	36	4.79
IV 期	1061	55	5.18	161	15.17	18	1.70	14	1.32	5	0.47	457	43.07	12	1.13	22	2.07	53	5.00	24	2.26	160	15.08	9	0.85	71	6.69
不詳	96	24	25.00	5	5.21	1	1.04	3	3.13	0	0.00	10	10.42	2	2.08	1	1.04	0	0.00	7	7.29	33	34.38	3	3.13	7	7.29

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之三 胃癌 0-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	270	67	24.81	84	31.11	8	2.96	9	3.33	3	1.11	57	21.11	1	0.37	3	1.11	2	0.74	5	1.85	6	2.22	0	0.00	25	9.26
0 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	64	52	81.25	7	10.94	1	1.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.69
II 期	29	7	24.14	17	58.62	0	0.00	4	13.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	57	2	3.51	42	73.68	5	8.77	2	3.51	2	3.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	7.02
IV 期	113	1	0.88	18	15.93	2	1.77	3	2.65	1	0.88	57	50.44	1	0.88	2	1.77	2	1.77	3	2.65	6	5.31	0	0.00	17	15.04
不詳	5	3	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之四 胃癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1559	500	32.07	459	29.44	65	4.17	52	3.34	31	1.99	256	16.42	4	0.26	14	0.90	31	1.99	17	1.09	43	2.76	10	0.64	77	4.94
0 期	27	24	88.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	11.11	0	0.00
I 期	389	350	89.97	27	6.94	2	0.51	0	0.00	1	0.26	2	0.51	0	0.00	1	0.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.03	2	0.51
II 期	233	57	24.46	129	55.36	9	3.86	19	8.15	2	0.86	2	0.86	0	0.00	1	0.43	0	0.00	1	0.43	2	0.86	1	0.43	10	4.29
III 期	378	39	10.32	205	54.23	43	11.38	24	6.35	24	6.35	8	2.12	2	0.53	2	0.53	2	0.53	2	0.53	4	1.06	0	0.00	23	6.08
IV 期	503	18	3.58	95	18.89	11	2.19	7	1.39	4	0.80	239	47.51	2	0.40	9	1.79	29	5.77	12	2.39	35	6.96	2	0.40	40	7.95
不詳	29	12	41.38	3	10.34	0	0.00	2	6.90	0	0.00	5	17.24	0	0.00	1	3.45	0	0.00	2	6.90	2	6.90	0	0.00	2	6.90

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

胃癌

表八之五 胃癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併標靶治療		手術合併化療與免疫治療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1426	493	34.57	296	20.76	16	1.12	33	2.31	8	0.56	222	15.57	23	1.61	19	1.33	27	1.89	19	1.33	217	15.22	25	1.75	28	1.96
0 期	38	35	92.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.63	2	5.26	0	0.00
I 期	319	259	81.19	13	4.08	0	0.00	1	0.31	0	0.00	14	4.39	1	0.31	3	0.94	2	0.63	0	0.00	21	6.58	4	1.25	1	0.31
II 期	245	77	31.43	88	35.92	5	2.04	15	6.12	0	0.00	21	8.57	5	2.04	1	0.41	0	0.00	2	0.82	25	10.20	6	2.45	0	0.00
III 期	317	77	24.29	145	45.74	5	1.58	12	3.79	8	2.52	21	6.62	6	1.89	4	1.26	3	0.95	4	1.26	20	6.31	3	0.95	9	2.84
IV 期	445	36	8.09	48	10.79	5	1.12	4	0.90	0	0.00	161	36.18	9	2.02	11	2.47	22	4.94	9	2.02	119	26.74	7	1.57	14	3.15
不詳	62	9	14.52	2	3.23	1	1.61	1	1.61	0	0.00	5	8.06	2	3.23	0	0.00	0	0.00	4	6.45	31	50.00	3	4.84	4	6.45

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Stomach

C160–C169

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS
- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS
- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy
- 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
- 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)
- **Any combination of 20 or 26–27 WITH**
  - 21 Photodynamic therapy (PDT)
  - 22 Electrocautery
  - 23 Cryosurgery
  - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

30 Gastrectomy, NOS (partial, subtotal, hemi-)
- 31 Antrectomy, lower (distal-less than 40% of stomach)***
- 32 Lower (distal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)
- 33 Upper (proximal) gastrectomy (partial, subtotal, hemi-)
- **Code 30 includes:**
  - Partial gastrectomy, including a sleeve resection of the stomach
  - Billroth I: anastomosis to duodenum (duodenostomy)
  - Billroth II: anastomosis to jejunum (jejunostomy)

40 Near-total or total gastrectomy, NOS
- 41 Near-total gastrectomy
- 42 Total gastrectomy
- **A total gastrectomy may follow a previous partial resection of the stomach**

50 Gastrectomy, NOS WITH removal of a portion of esophagus
- 51 Partial or subtotal gastrectomy
- 52 Near total or total gastrectomy

Codes 50–52 are used for gastrectomy resection when only portions of esophagus are included in procedure

60 Gastrectomy with a resection in continuity with the resection of other organs, NOS***
- 61 Partial or subtotal gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
- 62 Near total or total gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***
- 63 Radical gastrectomy, in continuity with the resection of other organs***

Codes 60–63 are used for gastrectomy resections with organs other than esophagus. Portions of esophagus may or may not be included in the resection.

[SEER Note*:* Codes 60-63 may include omentectomy among the organs/tissues removed. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen

80 Gastrectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

*** Incidental splenectomy NOT included

結腸癌

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	12463	100.00	7117	100.00	5346	100.00	6037	100.00	6426	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.02	0	0.00	1	0.02
15-19 歲	9	0.07	1	0.01	8	0.15	4	0.07	5	0.08
20-24 歲	19	0.15	13	0.18	6	0.11	12	0.20	7	0.11
25-29 歲	19	0.15	13	0.18	6	0.11	9	0.15	10	0.16
30-34 歲	64	0.51	36	0.51	28	0.52	35	0.58	29	0.45
35-39 歲	215	1.73	109	1.53	106	1.98	115	1.90	100	1.56
40-44 歲	389	3.12	193	2.71	196	3.67	199	3.30	190	2.96
45-49 歲	653	5.24	366	5.14	287	5.37	341	5.65	312	4.86
50-54 歲	1100	8.83	600	8.43	500	9.35	556	9.21	544	8.47
55-59 歲	1381	11.08	861	12.10	520	9.73	690	11.43	691	10.75
60-64 歲	1939	15.56	1222	17.17	717	13.41	937	15.52	1002	15.59
65-69 歲	1988	15.95	1205	16.93	783	14.65	958	15.87	1030	16.03
70-74 歲	1314	10.54	742	10.43	572	10.70	652	10.80	662	10.30
75-79 歲	1243	9.97	707	9.93	536	10.03	591	9.79	652	10.15
80-84 歲	1100	8.83	536	7.53	564	10.55	500	8.28	600	9.34
85 歲以上	1029	8.26	513	7.21	516	9.65	438	7.26	591	9.20
臨床期別										
0 期	2940	23.59	1920	26.98	1020	19.08	1041	17.24	1899	29.55
I 期	1459	11.71	784	11.02	675	12.63	800	13.25	659	10.26
II 期	1303	10.45	711	9.99	592	11.07	690	11.43	613	9.54
III 期	3040	24.39	1620	22.76	1420	26.56	1541	25.53	1499	23.33
IV 期	2043	16.39	1108	15.57	935	17.49	1141	18.90	902	14.04
不詳	1678	13.46	974	13.69	704	13.17	824	13.65	854	13.29
病理期別										
0 期	3740	30.01	2381	33.46	1359	25.42	1453	24.07	2287	35.59
I 期	1610	12.92	909	12.77	701	13.11	898	14.87	712	11.08
II 期	2065	16.57	1149	16.14	916	17.13	1088	18.02	977	15.20
III 期	2455	19.70	1288	18.10	1167	21.83	1244	20.61	1211	18.85
IV 期	1594	12.79	869	12.21	725	13.56	900	14.91	694	10.80
不詳	999	8.02	521	7.32	478	8.94	454	7.52	545	8.48
整併期別 [1]										
0 期	3747	30.06	2384	33.50	1363	25.50	1455	24.10	2292	35.67
I 期	1646	13.21	923	12.97	723	13.52	917	15.19	729	11.34
II 期	2100	16.85	1162	16.33	938	17.55	1092	18.09	1008	15.69
III 期	2583	20.73	1351	18.98	1232	23.05	1306	21.63	1277	19.87
IV 期	2199	17.64	1190	16.72	1009	18.87	1208	20.01	991	15.42
不詳	188	1.51	107	1.50	81	1.52	59	0.98	129	2.01

表九之一 結腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	12463	100.00	7117	100.00	5346	100.00	6037	100.00	6426	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.6563								
治療方式 [3,4]										
手術	6936	55.65	4114	57.81	2822	52.79	3193	52.89	3743	58.25
手術合併化療	3476	27.89	1882	26.44	1594	29.82	1728	28.62	1748	27.20
手術合併化療與放療	93	0.75	54	0.76	39	0.73	37	0.61	56	0.87
手術合併化療、放療與標靶治療	38	0.30	19	0.27	19	0.36	21	0.35	17	0.26
手術合併化療與標靶治療	814	6.53	466	6.55	348	6.51	487	8.07	327	5.09
同步化療與放療	18	0.14	8	0.11	10	0.19	13	0.22	5	0.08
非同步化療與放療	34	0.27	19	0.27	15	0.28	20	0.33	14	0.22
化療或/與標靶治療	584	4.69	331	4.65	253	4.73	335	5.55	249	3.87
緩和治療	312	2.50	142	2.00	170	3.18	123	2.04	189	2.94
未治療	86	0.69	44	0.62	42	0.79	38	0.63	48	0.75
其他治療	72	0.58	38	0.53	34	0.64	42	0.70	30	0.47
組織型態										
原位癌										
腺癌	3376	98.86	2159	98.90	1217	98.78	1212	99.43	2164	98.54
非特定上皮癌	39	1.14	24	1.10	15	1.22	7	0.57	32	1.46
侵襲癌										
腺癌	8784	97.08	4818	97.65	3966	96.40	4712	97.80	4072	96.26
神經內分泌癌	84	0.93	37	0.75	47	1.14	38	0.79	46	1.09
其他特定上皮癌	21	0.23	8	0.16	13	0.32	12	0.25	9	0.21
非特定上皮癌	51	0.56	21	0.43	30	0.73	23	0.48	28	0.66
胃腸基質瘤	4	0.04	4	0.08	0	0.00	2	0.04	2	0.05
其他惡性肉瘤	5	0.06	2	0.04	3	0.07	3	0.06	2	0.05
其他惡性腫瘤	99	1.09	44	0.89	55	1.34	28	0.58	71	1.68

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

結腸癌

表九之二 結腸癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	12463	6936	55.65	3476	27.89	93	0.75	38	0.30	814	6.53	18	0.14	34	0.27	584	4.69	312	2.50	86	0.69	72	0.58
0 期	3747	3715	99.15	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.05	29	0.77	0	0.00
I 期	1646	1561	94.84	49	2.98	1	0.06	0	0.00	3	0.18	2	0.12	0	0.00	10	0.61	11	0.67	8	0.49	1	0.06
II 期	4	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	1710	820	47.95	839	49.06	11	0.64	0	0.00	2	0.12	1	0.06	0	0.00	5	0.29	26	1.52	3	0.18	3	0.18
IIB 期	244	72	29.51	160	65.57	4	1.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.82	1	0.41	3	1.23	2	0.82
IIC 期	142	41	28.87	77	54.23	14	9.86	0	0.00	1	0.70	0	0.00	0	0.00	2	1.41	5	3.52	1	0.70	1	0.70
III 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	245	29	11.84	201	82.04	4	1.63	0	0.00	1	0.41	0	0.00	1	0.41	4	1.63	3	1.22	0	0.00	2	0.82
IIIB 期	1739	232	13.34	1406	80.85	16	0.92	0	0.00	15	0.86	2	0.12	0	0.00	20	1.15	31	1.78	11	0.63	6	0.35
IIIC 期	598	91	15.22	435	72.74	24	4.01	2	0.33	15	2.51	4	0.67	0	0.00	8	1.34	10	1.67	2	0.33	7	1.17
IV 期	2199	230	10.46	301	13.69	19	0.86	36	1.64	775	35.24	9	0.41	33	1.50	528	24.01	194	8.82	25	1.14	49	2.23
不詳	188	141	75.00	7	3.72	0	0.00	0	0.00	2	1.06	0	0.00	0	0.00	4	2.13	29	15.43	4	2.13	1	0.53

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之三 結腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1369	647	47.26	424	30.97	10	0.73	11	0.80	175	12.78	1	0.07	5	0.37	81	5.92	5	0.37	4	0.29	6	0.44
0 期	413	409	99.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.97	0	0.00
I 期	138	131	94.93	6	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.72
II 期	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	149	48	32.21	99	66.44	1	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.67	0	0.00	0	0.00
IIB 期	22	4	18.18	17	77.27	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	11	2	18.18	7	63.64	1	9.09	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	21	1	4.76	20	95.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	185	11	5.95	169	91.35	1	0.54	0	0.00	4	2.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIC 期	79	3	3.80	65	82.28	5	6.33	0	0.00	5	6.33	0	0.00	0	0.00	1	1.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	322	13	4.04	38	11.80	1	0.31	11	3.42	165	51.24	1	0.31	5	1.55	80	24.84	4	1.24	0	0.00	4	1.24
不詳	25	21	84.00	3	12.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之四 結腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6408	3738	58.33	1787	27.89	58	0.91	23	0.36	429	6.69	9	0.14	21	0.33	260	4.06	25	0.39	24	0.37	34	0.53
0 期	2318	2303	99.35	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	0.60	0	0.00
I 期	946	909	96.09	28	2.96	1	0.11	0	0.00	3	0.32	2	0.21	0	0.00	1	0.11	0	0.00	2	0.21	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	740	287	38.78	442	59.73	7	0.95	0	0.00	1	0.14	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.14	1	0.14
IIB 期	106	21	19.81	82	77.36	2	1.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.94
IIC 期	66	12	18.18	43	65.15	9	13.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.52	0	0.00	0	0.00	1	1.52
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	139	7	5.04	130	93.53	1	0.72	0	0.00	1	0.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	776	43	5.54	702	90.46	12	1.55	0	0.00	7	0.9	1	0.13	0	0.00	5	0.64	2	0.26	2	0.26	2	0.26
IIIC 期	282	17	6.03	242	85.82	13	4.61	0	0.00	5	1.77	0	0.00	0	0.00	1	0.35	1	0.35	0	0.00	3	1.06
IV 期	952	63	6.62	114	11.97	13	1.37	23	2.42	411	43.17	5	0.53	21	2.21	251	26.37	21	2.21	4	0.42	26	2.73
不詳	83	76	91.57	3	3.61	0	0.00	0	0.00	1	1.2	0	0.00	0	0.00	1	1.2	1	1.2	1	1.2	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

結腸癌

表九之五 結腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併化療、放療與標靶治療		手術合併化療與標靶治療		同步化療與放療		非同步化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4686	2551	54.44	1265	27.00	25	0.53	4	0.09	210	4.48	8	0.17	8	0.17	243	5.19	282	6.02	58	1.24	32	0.68
0 期	1016	1003	98.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.20	11	1.08	0	0.00
I 期	562	521	92.70	15	2.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	1.60	11	1.96	6	1.07	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	821	485	59.07	298	36.30	3	0.37	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	5	0.61	25	3.05	2	0.24	2	0.24
IIB 期	116	47	40.52	61	52.59	1	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.72	1	0.86	3	2.59	1	0.86
IIC 期	65	27	41.54	27	41.54	4	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.54	5	7.69	1	1.54	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	85	21	24.71	51	60.00	3	3.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.18	4	4.71	3	3.53	0	0.00	2	2.35
IIIB 期	778	178	22.88	535	68.77	3	0.39	0	0.00	4	0.51	1	0.13	0	0.00	15	1.93	29	3.73	9	1.16	4	0.51
IIIC 期	237	71	29.96	128	54.01	6	2.53	2	0.84	5	2.11	4	1.69	0	0.00	6	2.53	9	3.80	2	0.84	4	1.69
IV 期	925	154	16.65	149	16.11	5	0.54	2	0.22	199	21.51	3	0.32	7	0.76	197	21.30	169	18.27	21	2.27	19	2.05
不詳	80	44	55.00	1	1.25	0	0.00	0	0.00	1	1.25	0	0.00	0	0.00	3	3.75	28	35.00	3	3.75	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Colon
C180–C189
(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS
- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS
- 27 Excisional biopsy
- 26 Polypectomy, NOS
- 28 Polypectomy-endoscopic
- 29 Polypectomy-surgical excision
- 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
- 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–29 WITH
- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation

[SEER Note*:* Codes 21 to 24 above combine 20 Local tumor excision, 27 Excisional biopsy, 26 Polypectomy, NOS, 28 Polypectomy-endoscopic or 29 Polypectomy-surgical excision WITH 21 PDT, 22 Electrocautery, 23 Cryosurgery, or 24 Laser ablation]

- 25 Laser excision

30 Partial colectomy [but less than hemicolectomy] segmental resection
- 32 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note*:* Code 30 includes but is not limited to the following procedures: Appendectomy (for an appendix primary only), enterocolectomy, ileocolectomy, partial colectomy, NOS, partial resection of transverse colon and flexures, and segmental resection (such as cecectomy or sigmoidectomy). Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** "removal of a contiguous organ".]

40 Subtotal colectomy/hemicolectomy (total right or left colon and a portion of transverse colon)
- 41 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note*:* Code 40 includes extended (but less than total) right or left colectomy. Note that the removal of a short portion of the distal ileum is **not** "removal of a contiguous organ".]

50 Total colectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction; may include a portion of the rectum)
- 51 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note*:* Removal of a short portion of the distal ileum is **not** "removal of a contiguous organ"]

60 Total proctocolectomy (removal of colon from cecum to the rectosigmoid junction, including the entire rectum)

[SEER Note*:* Commonly used for familial polyposis or polyposis coli]
- 61 Plus resection of contiguous organ; example: small bowel, bladder

[SEER Note*:* Removal of a short portion of the distal ileum is **not** "removal of a contiguous organ"]

70 Colectomy or coloproctotectomy with resection of contiguous organ(s), NOS (where there is not enough information to code 32, 41, 51, or 61)
Code 70 includes: Any colectomy (partial, hemicolectomy, or total) WITH a resection of any other organs in continuity with the primary site. Other organs may be partially or totally removed. Other
organs may include, but are not limited to, oophorectomy, partial proctectomy, rectal mucosectomy, or pelvic exenteration.
[SEER Note*:* "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Colectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

直腸癌

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6115	100.00	3849	100.00	2266	100.00	3177	100.00	2938	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	10	0.16	7	0.18	3	0.13	6	0.19	4	0.14
25-29 歲	15	0.25	10	0.26	5	0.22	11	0.35	4	0.14
30-34 歲	66	1.08	37	0.96	29	1.28	37	1.16	29	0.99
35-39 歲	119	1.95	77	2.00	42	1.85	67	2.11	52	1.77
40-44 歲	230	3.76	135	3.51	95	4.19	126	3.97	104	3.54
45-49 歲	399	6.52	245	6.37	154	6.80	219	6.89	180	6.13
50-54 歲	620	10.14	389	10.11	231	10.19	333	10.48	287	9.77
55-59 歲	795	13.00	497	12.91	298	13.15	419	13.19	376	12.80
60-64 歲	936	15.31	640	16.63	296	13.06	497	15.64	439	14.94
65-69 歲	914	14.95	622	16.16	292	12.89	482	15.17	432	14.70
70-74 歲	568	9.29	362	9.41	206	9.09	298	9.38	270	9.19
75-79 歲	584	9.55	359	9.33	225	9.93	300	9.44	284	9.67
80-84 歲	470	7.69	268	6.96	202	8.91	210	6.61	260	8.85
85 歲以上	389	6.36	201	5.22	188	8.30	172	5.41	217	7.39
臨床期別										
0 期	655	10.71	419	10.89	236	10.41	263	8.28	392	13.34
I 期	992	16.22	577	14.99	415	18.31	531	16.71	461	15.69
II 期	735	12.02	465	12.08	270	11.92	396	12.46	339	11.54
III 期	1718	28.09	1099	28.55	619	27.32	949	29.87	769	26.17
IV 期	1089	17.81	721	18.73	368	16.24	581	18.29	508	17.29
不詳	926	15.14	568	14.76	358	15.80	457	14.38	469	15.96
病理期別										
0 期	991	16.21	631	16.39	360	15.89	436	13.72	555	18.89
I 期	1237	20.23	739	19.20	498	21.98	709	22.32	528	17.97
II 期	778	12.72	523	13.59	255	11.25	435	13.69	343	11.67
III 期	1206	19.72	744	19.33	462	20.39	614	19.33	592	20.15
IV 期	687	11.23	455	11.82	232	10.24	398	12.53	289	9.84
不詳	1216	19.89	757	19.67	459	20.26	585	18.41	631	21.48
整併期別 [1]										
0 期	986	16.12	628	16.32	358	15.80	434	13.66	552	18.79
I 期	1201	19.64	693	18.00	508	22.42	676	21.28	525	17.87
II 期	826	13.51	546	14.19	280	12.36	445	14.01	381	12.97
III 期	1772	28.98	1119	29.07	653	28.82	939	29.56	833	28.35
IV 期	1115	18.23	736	19.12	379	16.73	594	18.70	521	17.73
不詳	215	3.52	127	3.30	88	3.88	89	2.80	126	4.29

表十之一 直腸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6115	100.00	3849	100.00	2266	100.00	3177	100.00	2938	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5733								
治療方式 [3,4]										
手術	2568	42.00	1568	40.74	1000	44.13	1310	41.23	1258	42.82
手術合併化療	1294	21.16	815	21.17	479	21.14	722	22.73	572	19.47
手術合併化療與放療	1225	20.03	815	21.17	410	18.09	630	19.83	595	20.25
手術合併放療	62	1.01	38	0.99	24	1.06	31	0.98	31	1.06
同步化療與放療	272	4.45	186	4.83	86	3.80	137	4.31	135	4.59
非同步化療與放療	146	2.39	90	2.34	56	2.47	76	2.39	70	2.38
放療	48	0.78	28	0.73	20	0.88	18	0.57	30	1.02
化療或/與標靶治療	279	4.56	187	4.86	92	4.06	142	4.47	137	4.66
緩和治療	131	2.14	67	1.74	64	2.82	60	1.89	71	2.42
未治療	35	0.57	19	0.49	16	0.71	13	0.41	22	0.75
其他治療	55	0.90	36	0.94	19	0.84	38	1.20	17	0.58
組織型態										
原位癌										
腺癌	829	97.99	522	97.75	307	98.40	336	98.82	493	97.43
非特定上皮癌	17	2.01	12	2.25	5	1.60	4	1.18	13	2.57
侵襲癌										
腺癌	4785	90.81	3039	91.67	1746	89.36	2580	90.94	2205	90.67
神經內分泌癌	400	7.59	236	7.12	164	8.39	209	7.37	191	7.85
其他特定上皮癌	15	0.28	3	0.09	12	0.61	10	0.35	5	0.21
非特定上皮癌	21	0.40	12	0.36	9	0.46	10	0.35	11	0.45
胃腸基質瘤	29	0.55	17	0.51	12	0.61	22	0.78	7	0.29
其他惡性腫瘤	19	0.36	8	0.24	11	0.56	6	0.21	13	0.53

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

直腸癌

表十之二 直腸癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6115	2568	42.00	1294	21.16	1225	20.03	62	1.01	272	4.45	146	2.39	48	0.78	279	4.56	131	2.14	35	0.57	55	0.90
0 期	986	976	98.99	2	0.20	2	0.20	1	0.10	0	0.00	0	0.00	1	0.10	0	0.00	1	0.10	3	0.30	0	0.00
I 期	1201	1007	83.85	30	2.50	70	5.83	29	2.41	28	2.33	5	0.42	6	0.50	4	0.33	12	1.00	9	0.75	1	0.08
II 期	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
IIA 期	726	227	31.27	228	31.40	186	25.62	11	1.52	49	6.75	3	0.41	7	0.96	4	0.55	10	1.38	0	0.00	1	0.14
IIB 期	54	9	16.67	27	50.00	14	25.93	1	1.85	3	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	44	4	9.09	14	31.82	13	29.55	0	0.00	8	18.18	1	2.27	1	2.27	0	0.00	2	4.55	1	2.27	0	0.00
IIIA 期	198	15	7.58	90	45.45	68	34.34	4	2.02	14	7.07	0	0.00	2	1.01	0	0.00	1	0.51	2	1.01	2	1.01
IIIB 期	1138	87	7.64	420	36.91	488	42.88	11	0.97	83	7.29	6	0.53	13	1.14	6	0.53	13	1.14	1	0.09	10	0.88
IIIC 期	436	19	4.36	130	29.82	218	50.00	1	0.23	44	10.09	5	1.15	3	0.69	6	1.38	10	2.29	0	0.00	0	0.00
IV 期	1115	58	5.20	349	31.30	154	13.81	3	0.27	42	3.77	125	11.21	11	0.99	255	22.87	76	6.82	10	0.90	32	2.87
不詳	215	166	77.21	4	1.86	12	5.58	1	0.47	1	0.47	1	0.47	4	1.86	4	1.86	6	2.79	9	4.19	7	3.26

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之三 直腸癌 0-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	839	370	44.10	173	20.62	198	23.60	9	1.07	24	2.86	16	1.91	0	0.00	31	3.69	4	0.48	4	0.48	10	1.19
0 期	101	101	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	199	177	88.94	3	1.51	11	5.53	4	2.01	2	1.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.01	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	62	18	29.03	20	32.26	19	30.65	1	1.61	4	6.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIB 期	4	0	0.00	2	50.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	4	0	0.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	20	2	10.00	10	50.00	5	25.00	1	5.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIB 期	150	8	5.33	54	36.00	79	52.67	3	2.00	4	2.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.67	1	0.67
IIIC 期	71	2	2.82	17	23.94	44	61.97	0	0.00	8	11.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	163	4	2.45	67	41.10	33	20.25	0	0.00	2	1.23	16	9.82	0	0.00	30	18.40	4	2.45	0	0.00	7	4.29
不詳	65	58	89.23	0	0.00	3	4.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.54	0	0.00	1	1.54	2	3.08

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之四 直腸癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3265	1385	42.42	725	22.21	737	22.57	24	0.74	116	3.55	76	2.33	10	0.31	139	4.26	20	0.61	8	0.25	25	0.77
0 期	616	611	99.19	2	0.32	1	0.16	1	0.16	0	0.00	0	0.00	1	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	635	546	85.98	18	2.83	36	5.67	12	1.89	18	2.83	1	0.16	1	0.16	0	0.00	0	0.00	3	0.47	0	0.00
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IIA 期	347	85	24.50	135	38.90	102	29.39	3	0.86	16	4.61	2	0.58	0	0.00	1	0.29	2	0.58	0	0.00	1	0.29
IIB 期	28	3	10.71	13	46.43	10	35.71	1	3.57	1	3.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	21	3	14.29	7	33.33	9	42.86	0	0.00	2	9.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	122	5	4.10	59	48.36	50	40.98	1	0.82	6	4.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.82
IIIB 期	585	23	3.93	224	38.29	295	50.43	3	0.51	30	5.13	3	0.51	2	0.34	2	0.34	0	0.00	0	0.00	3	0.51
IIIC 期	231	7	3.03	69	29.87	127	54.98	0	0.00	19	8.23	4	1.73	2	0.87	2	0.87	1	0.43	0	0.00	0	0.00
IV 期	580	21	3.62	195	33.62	101	17.41	2	0.34	24	4.14	66	11.38	4	0.69	133	22.93	17	2.93	1	0.17	16	2.76
不詳	99	81	81.82	3	3.03	6	6.06	1	1.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	0	0.00	4	4.04	3	3.03

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

直腸癌

表十之五 直腸癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與放療		手術合併放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2011	813	40.43	396	19.69	290	14.42	29	1.44	132	6.56	54	2.69	38	1.89	109	5.42	107	5.32	23	1.14	20	0.99
0 期	269	264	98.14	0	0.00	1	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.37	3	1.12	0	0.00
I 期	367	284	77.38	9	2.45	23	6.27	13	3.54	8	2.18	4	1.09	5	1.36	4	1.09	12	3.27	4	1.09	1	0.27
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
IIA 期	317	124	39.12	73	23.03	65	20.50	7	2.21	29	9.15	1	0.32	7	2.21	3	0.95	8	2.52	0	0.00	0	0.00
IIB 期	22	6	27.27	12	54.55	2	9.09	0	0.00	2	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIC 期	19	1	5.26	7	36.84	2	10.53	0	0.00	4	21.05	1	5.26	1	5.26	0	0.00	2	10.53	1	5.26	0	0.00
IIIA 期	56	8	14.29	21	37.50	13	23.21	2	3.57	6	10.71	0	0.00	2	3.57	0	0.00	1	1.79	2	3.57	1	1.79
IIIB 期	403	56	13.90	142	35.24	114	28.29	5	1.24	49	12.16	3	0.74	11	2.73	4	0.99	13	3.23	0	0.00	6	1.49
IIIC 期	134	10	7.46	44	32.84	47	35.07	1	0.75	17	12.69	1	0.75	1	0.75	4	2.99	9	6.72	0	0.00	0	0.00
IV 期	372	33	8.87	87	23.39	20	5.38	1	0.27	16	4.30	43	11.56	7	1.88	92	24.73	55	14.78	9	2.42	9	2.42
不詳	51	27	52.94	1	1.96	3	5.88	0	0.00	1	1.96	1	1.96	4	7.84	2	3.92	6	11.76	4	7.84	2	3.92

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Rectosigmoid

C199

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS
- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–14

20 Local tumor excision, NOS
- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy
- 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
- 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)
- **Combination of 20 or 26–27 WITH**
  - 21 Photodynamic therapy (PDT)
  - 22 Electrocautery
  - 23 Cryosurgery
  - 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

30 Wedge or segmental resection; partial proctosigmoidectomy, NOS
- 31 Plus resection of contiguous organs; example: small bowel, bladder

Procedures coded 30 include, but are not limited to:
- Anterior resection
- Hartmann operation
- Low anterior resection (LAR)
- Partial colectomy, NOS
- Rectosigmoidectomy, NOS
- Sigmoidectomy

40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[**SEER Note:** Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

50 Total proctectomy

[**SEER Note:** Procedures coded 50 include but are not limited to: Abdominoperineal resection (A & P resection), anterior/posterior resection (A/P resection)/Miles' operation, Rankin's operation]

51 Total colectomy

[**SEER Note:** Removal of the colon from cecum to rectosigmoid or portion of rectum]

55 Total colectomy WITH ileostomy, NOS
- 56 Ileorectal reconstruction
- 57 Total colectomy WITH other pouch; example: Koch pouch

60 Total proctocolectomy, NOS [SEER Note*:* Combination of 50 and 51]
- 65 Total proctocolectomy WITH ileostomy, NOS
- 66 Total proctocolectomy WITH ileostomy and pouch

Removal of the colon from cecum to the rectosigmoid or a portion of the rectum.

70 Colectomy or proctocolectomy resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

[**SEER Note:** Procedures that may be part of an en bloc resection include, but are not limited to: an oophorectomy and a rectal mucosectomy. Code 70 includes any colectomy (partial, hemicolectomy or total) with an en bloc resection of any other organs. The "other organs" may be partially or totally resected. "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen.]

80 Colectomy, NOS; Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

Rectum

C209

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser

No specimen sent to pathology from surgical events 10-14

20 Local tumor excision, NOS

- 27 Excisional biopsy
- 26 Polypectomy
- 2M Endoscopic mucosal resection / mucosectomy(EMR)
- 2E Endoscopic submucosa dissection (ESD)

Any combination of 20 or 26–27 WITH

- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation

- 25 Laser excision
- 28 Curette and fulguration

30 Wedge or segmental resection; partial proctectomy, NOS

Procedures coded 30 include, but are not limited to:

Anterior resection

Hartmann's operation

Low anterior resection (LAR)
Transsacral rectosigmoidectomy
Total mesorectal excision (TME)

40 Pull through WITH sphincter preservation (colo-anal anastomosis)

[SEER Note:Procedures coded 40 include but are not limited to: Altemeier's operation, Duhamel's operation, Soave's submucosal resection, Swenson's operation, Turnbull's operation]

50 Total proctectomy

Procedure coded 50 includes, but is not limited to:
Abdominoperineal resection (Miles Procedure)
[SEER Note*:* Also called A & P resection, anterior/posterior (A/P) resection/Miles' operation, Rankin's operation]

60 Total proctocolectomy, NOS

70 Proctectomy or proctocolectomy with resection in continuity with other organs; pelvic exenteration

[SEER Note*:* In continuity with or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]

80 Proctectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肝癌

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	8638	100.00	6107	100.00	2531	100.00	5039	100.00	3599	100.00
年齡										
00-04 歲	9	0.10	3	0.05	6	0.24	8	0.16	1	0.03
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	5	0.06	3	0.05	2	0.08	3	0.06	2	0.06
20-24 歲	2	0.02	1	0.02	1	0.04	1	0.02	1	0.03
25-29 歲	13	0.15	11	0.18	2	0.08	9	0.18	4	0.11
30-34 歲	21	0.24	18	0.29	3	0.12	13	0.26	8	0.22
35-39 歲	93	1.08	80	1.31	13	0.51	63	1.25	30	0.83
40-44 歲	192	2.22	165	2.70	27	1.07	119	2.36	73	2.03
45-49 歲	381	4.41	324	5.31	57	2.25	230	4.56	151	4.20
50-54 歲	724	8.38	628	10.28	96	3.79	424	8.41	300	8.34
55-59 歲	1061	12.28	866	14.18	195	7.70	614	12.18	447	12.42
60-64 歲	1402	16.23	1067	17.47	335	13.24	863	17.13	539	14.98
65-69 歲	1476	17.09	1028	16.83	448	17.70	887	17.60	589	16.37
70-74 歲	1055	12.21	674	11.04	381	15.05	630	12.50	425	11.81
75-79 歲	1021	11.82	608	9.96	413	16.32	575	11.41	446	12.39
80-84 歲	719	8.32	385	6.30	334	13.20	373	7.40	346	9.61
85 歲以上	464	5.37	246	4.03	218	8.61	227	4.50	237	6.59
臨床期別										
I 期	3773	43.68	2522	41.30	1251	49.43	2310	45.84	1463	40.65
II 期	1549	17.93	1067	17.47	482	19.04	912	18.10	637	17.70
III 期	2022	23.41	1542	25.25	480	18.96	1145	22.72	877	24.37
IV 期	1118	12.94	866	14.18	252	9.96	569	11.29	549	15.25
不詳	176	2.04	110	1.80	66	2.61	103	2.04	73	2.03
病理期別										
I 期	1200	13.89	860	14.08	340	13.43	824	16.35	376	10.45
II 期	873	10.11	668	10.94	205	8.10	591	11.73	282	7.84
III 期	385	4.46	298	4.88	87	3.44	236	4.68	149	4.14
IV 期	109	1.26	78	1.28	31	1.22	66	1.31	43	1.19
不詳	6071	70.28	4203	68.82	1868	73.80	3322	65.93	2749	76.38
整併期別 [1]										
I 期	3292	38.11	2163	35.42	1129	44.61	1993	39.55	1299	36.09
II 期	2030	23.50	1435	23.50	595	23.51	1242	24.65	788	21.89
III 期	2043	23.65	1551	25.40	492	19.44	1150	22.82	893	24.81
IV 期	1116	12.92	862	14.11	254	10.04	566	11.23	550	15.28
不詳	157	1.82	96	1.57	61	2.41	88	1.75	69	1.92
BCLC 期別										
0 期	770	8.91	486	7.96	284	11.22	477	9.47	293	8.14
A 期	2674	30.96	1842	30.16	832	32.87	1571	31.18	1103	30.65
B 期	1681	19.46	1241	20.32	440	17.38	1017	20.18	664	18.45
C 期	2507	29.02	1892	30.98	615	24.30	1486	29.49	1021	28.37
D 期	699	8.09	463	7.58	236	9.32	343	6.81	356	9.89
不詳	307	3.55	183	3.00	124	4.90	145	2.88	162	4.50

表十一之一 肝癌(C220)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	8638	100.00	6107	100.00	2531	100.00	5039	100.00	3599	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.4825								
治療方式 [3,4]										
手術	2160	25.01	1594	26.10	566	22.36	1432	28.42	728	20.23
肝臟移植	43	0.50	28	0.46	15	0.59	41	0.81	2	0.06
局部治療	1525	17.65	939	15.38	586	23.15	814	16.15	711	19.76
栓塞	1385	16.03	973	15.93	412	16.28	823	16.33	562	15.62
手術合併栓塞	132	1.53	101	1.65	31	1.22	75	1.49	57	1.58
局部治療合併栓塞	539	6.24	355	5.81	184	7.27	314	6.23	225	6.25
標靶治療	433	5.01	338	5.53	95	3.75	261	5.18	172	4.78
栓塞合併標靶治療	182	2.11	142	2.33	40	1.58	130	2.58	52	1.44
放療	171	1.98	119	1.95	52	2.05	92	1.83	79	2.20
放療合併栓塞	88	1.02	65	1.06	23	0.91	51	1.01	37	1.03
放療合併栓塞與標靶治療	111	1.29	94	1.54	17	0.67	65	1.29	46	1.28
放療合併標靶治療	195	2.26	153	2.51	42	1.66	96	1.91	99	2.75
化療	83	0.96	66	1.08	17	0.67	36	0.71	47	1.31
緩和治療	739	8.56	486	7.96	253	10.00	331	6.57	408	11.34
未治療	129	1.49	85	1.39	44	1.74	56	1.11	73	2.03
其他治療	723	8.37	569	9.32	154	6.08	422	8.37	301	8.36
組織型態										
肝細胞癌	8514	98.56	6037	98.85	2477	97.87	4962	98.47	3552	98.69
膽管癌	6	0.07	4	0.07	2	0.08	0	0.00	6	0.17
合併肝細胞癌和膽管癌	26	0.30	17	0.28	9	0.36	13	0.26	13	0.36
肝母細胞瘤	9	0.10	3	0.05	6	0.24	8	0.16	1	0.03
其他特定上皮癌	16	0.19	8	0.13	8	0.32	9	0.18	7	0.19
非特定上皮癌	9	0.10	6	0.10	3	0.12	2	0.04	7	0.19
血管肉瘤	36	0.42	23	0.38	13	0.51	29	0.58	7	0.19
其他惡性肉瘤	18	0.21	7	0.11	11	0.43	12	0.24	6	0.17
其他惡性腫瘤	4	0.05	2	0.03	2	0.08	4	0.08	0	0.00

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 1%者，則不呈現於報告中。

肝內膽管癌

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1059	100.00	655	100.00	404	100.00	660	100.00	399	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	1	0.09	0	0.00	1	0.25	1	0.15	0	0.00
25-29 歲	8	0.76	6	0.92	2	0.50	7	1.06	1	0.25
30-34 歲	4	0.38	4	0.61	0	0.00	4	0.61	0	0.00
35-39 歲	5	0.47	1	0.15	4	0.99	4	0.61	1	0.25
40-44 歲	23	2.17	17	2.60	6	1.49	15	2.27	8	2.01
45-49 歲	38	3.59	31	4.73	7	1.73	24	3.64	14	3.51
50-54 歲	97	9.16	78	11.91	19	4.70	64	9.70	33	8.27
55-59 歲	131	12.37	95	14.50	36	8.91	97	14.70	34	8.52
60-64 歲	167	15.77	104	15.88	63	15.59	111	16.82	56	14.04
65-69 歲	190	17.94	121	18.47	69	17.08	115	17.42	75	18.80
70-74 歲	128	12.09	76	11.60	52	12.87	82	12.42	46	11.53
75-79 歲	114	10.76	52	7.94	62	15.35	63	9.55	51	12.78
80-84 歲	90	8.50	42	6.41	48	11.88	44	6.67	46	11.53
85 歲以上	63	5.95	28	4.27	35	8.66	29	4.39	34	8.52
臨床期別										
0 期	3	0.28	1	0.15	2	0.50	2	0.30	1	0.25
I 期	214	20.21	143	21.83	71	17.57	140	21.21	74	18.55
II 期	131	12.37	74	11.30	57	14.11	89	13.48	42	10.53
III 期	199	18.79	118	18.02	81	20.05	106	16.06	93	23.31
IV 期	421	39.75	268	40.92	153	37.87	271	41.06	150	37.59
不詳	91	8.59	51	7.79	40	9.90	52	7.88	39	9.77
病理期別										
0 期	5	0.47	1	0.15	4	0.99	4	0.61	1	0.25
I 期	142	13.41	97	14.81	45	11.14	99	15.00	43	10.78
II 期	128	12.09	82	12.52	46	11.39	95	14.39	33	8.27
III 期	73	6.89	37	5.65	36	8.91	47	7.12	26	6.52
IV 期	98	9.25	63	9.62	35	8.66	77	11.67	21	5.26
不詳	613	57.88	375	57.25	238	58.91	338	51.21	275	68.92
整併期別 [1]										
0 期	5	0.47	1	0.15	4	0.99	4	0.61	1	0.25
I 期	189	17.85	125	19.08	64	15.84	126	19.09	63	15.79
II 期	177	16.71	110	16.79	67	16.58	120	18.18	57	14.29
III 期	209	19.74	122	18.63	87	21.53	114	17.27	95	23.81
IV 期	438	41.36	274	41.83	164	40.59	281	42.58	157	39.35
不詳	41	3.87	23	3.51	18	4.46	15	2.27	26	6.52

表十一之二 肝內膽管癌(C221)發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1059	100.00	655	100.00	404	100.00	660	100.00	399	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5899								
治療方式[3,4]										
手術	279	26.35	177	27.02	102	25.25	200	30.30	79	19.80
化療	249	23.51	164	25.04	85	21.04	161	24.39	88	22.06
放療	45	4.25	25	3.82	20	4.95	27	4.09	18	4.51
放療合併化療	80	7.55	50	7.63	30	7.43	49	7.42	31	7.77
手術合併化療	65	6.14	37	5.65	28	6.93	44	6.67	21	5.26
手術合併放療	18	1.70	10	1.53	8	1.98	11	1.67	7	1.75
手術合併化療與放療	26	2.46	12	1.83	14	3.47	14	2.12	12	3.01
局部治療	26	2.46	15	2.29	11	2.72	12	1.82	14	3.51
栓塞	14	1.32	11	1.68	3	0.74	7	1.06	7	1.75
緩和治療	175	16.53	98	14.96	77	19.06	89	13.48	86	21.55
未治療	23	2.17	12	1.83	11	2.72	6	0.91	17	4.26
其他治療	59	5.57	44	6.72	15	3.71	40	6.06	19	4.76
組織型態										
膽管癌	914	86.31	543	82.90	371	91.83	545	82.58	369	92.48
合併肝細胞癌和膽管癌	127	11.99	100	15.27	27	6.68	99	15.00	28	7.02
其他特定上皮癌	15	1.42	10	1.53	5	1.24	13	1.97	2	0.50
非特定上皮癌	2	0.19	1	0.15	1	0.25	2	0.30	0	0.00
血管肉瘤	1	0.09	1	0.15	0	0.00	1	0.15	0	0.00

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 1%者，則不呈現於報告中。

肝癌

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		肝臟移植[3]		局部治療[4]		栓塞[5]		手術合併栓塞		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8638	2160	25.01	43	0.50	1525	17.65	1385	16.03	132	1.53	539	6.24	433	5.01	182	2.11
I 期	3292	1122	34.08	23	0.70	1211	36.79	389	11.82	26	0.79	289	8.78	3	0.09	0	0.00
II 期	2030	763	37.59	14	0.69	291	14.33	474	23.35	35	1.72	217	10.69	8	0.39	17	0.84
III 期	2043	231	11.31	2	0.10	11	0.54	430	21.05	66	3.23	30	1.47	182	8.91	86	4.21
IV 期	1116	15	1.34	0	0.00	2	0.18	80	7.17	2	0.18	1	0.09	234	20.97	78	6.99
不詳	157	29	18.47	4	2.55	10	6.37	12	7.64	3	1.91	2	1.27	6	3.82	1	0.64

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		肝臟移植 [3]		局部治療 [4]		栓塞 [5]		手術合併栓塞		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	716	211	29.47	8	1.12	74	10.34	90	12.57	15	2.09	24	3.35	42	5.87	24	3.35
I 期	221	100	45.25	5	2.26	64	28.96	21	9.50	4	1.81	14	6.33	0	0.00	0	0.00
II 期	167	83	49.70	3	1.80	10	5.99	38	22.75	2	1.20	8	4.79	0	0.00	4	2.40
III 期	184	26	14.13	0	0.00	0	0.00	25	13.59	9	4.89	2	1.09	15	8.15	7	3.80
IV 期	120	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.33	0	0.00	0	0.00	26	21.67	13	10.83
不詳	24	2	8.33	0	0.00	0	0.00	2	8.33	0	0.00	0	0.00	1	4.17	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65-66、90。術式編碼詳見 p.588。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.588。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.588。

5 「栓塞」定義 ：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.588。

表十一之三 肝癌(C220)發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

放療		放療合併栓塞		放療合併栓塞與標靶治療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療[6]		未治療[7]		其他治療[8]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
171	1.98	88	1.02	111	1.29	195	2.26	83	0.96	739	8.56	129	1.49	723	8.37
47	1.43	17	0.52	2	0.06	0	0.00	2	0.06	66	2.00	27	0.82	68	2.07
15	0.74	9	0.44	3	0.15	0	0.00	5	0.25	66	3.25	17	0.84	96	4.73
55	2.69	42	2.06	72	3.52	100	4.89	40	1.96	334	16.35	50	2.45	312	15.27
50	4.48	18	1.61	34	3.05	95	8.51	22	1.97	247	22.13	30	2.69	208	18.64
4	2.55	2	1.27	0	0.00	0	0.00	14	8.92	26	16.56	5	3.18	39	24.84

表十一之四 肝癌(C220) 0-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

放療		放療合併栓塞		放療合併栓塞與標靶治療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療[6]		未治療[7]		其他治療[8]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
10	1.40	8	1.12	20	2.79	27	3.77	9	1.26	40	5.59	12	1.68	102	14.25
2	0.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.45	4	1.81	6	2.71
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.60	4	2.40	3	1.80	11	6.59
4	2.17	6	3.26	16	8.70	11	5.98	4	2.17	14	7.61	2	1.09	43	23.37
4	3.33	2	1.67	4	3.33	16	13.33	1	0.83	20	16.67	2	1.67	28	23.33
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	12.50	1	4.17	1	4.17	14	58.33

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		肝臟移植[3]		局部治療[4]		栓塞[5]		手術合併栓塞		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4663	1342	28.78	34	0.73	789	16.92	658	14.11	84	1.80	275	5.90	238	5.10	104	2.23
I 期	1740	708	40.69	18	1.03	619	35.57	155	8.91	15	0.86	133	7.64	0	0.00	0	0.00
II 期	1146	471	41.10	10	0.87	159	13.87	244	21.29	23	2.01	128	11.17	3	0.26	9	0.79
III 期	1076	135	12.55	2	0.19	3	0.28	210	19.52	43	4.00	13	1.21	105	9.76	48	4.46
IV 期	622	11	1.77	0	0.00	1	0.16	45	7.23	1	0.16	0	0.00	128	20.58	46	7.40
不詳	79	17	21.52	4	5.06	7	8.86	4	5.06	2	2.53	1	1.27	2	2.53	1	1.27

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		肝臟移植[3]		局部治療[4]		栓塞[5]		手術合併栓塞		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3259	607	18.63	1	0.03	662	20.31	637	19.55	33	1.01	240	7.36	153	4.69	54	1.66
I 期	1331	314	23.59	0	0.00	528	39.67	213	16.00	7	0.53	142	10.67	3	0.23	0	0.00
II 期	717	209	29.15	1	0.14	122	17.02	192	26.78	10	1.39	81	11.30	5	0.70	4	0.56
III 期	783	70	8.94	0	0.00	8	1.02	195	24.90	14	1.79	15	1.92	62	7.92	31	3.96
IV 期	374	4	1.07	0	0.00	1	0.27	31	8.29	1	0.27	1	0.27	80	21.39	19	5.08
不詳	54	10	18.52	0	0.00	3	5.56	6	11.11	1	1.85	1	1.85	3	5.56	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65、66、90。術式編碼詳見 p.588。

3 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.588。

4 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.588。

5 「栓塞」定義 ：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.588。

表十一之五 肝癌(C220) 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

放療		放療合併栓塞		放療合併栓塞與標靶治療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療[6]		未治療[7]		其他治療[8]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
73	1.57	46	0.99	66	1.42	112	2.40	55	1.18	264	5.66	52	1.12	471	10.10
15	0.86	5	0.29	1	0.06	0	0.00	0	0.00	17	0.98	9	0.52	45	2.59
3	0.26	5	0.44	2	0.17	0	0.00	3	0.26	16	1.40	5	0.44	65	5.67
25	2.32	26	2.42	43	4.00	57	5.30	27	2.51	116	10.78	21	1.95	202	18.77
29	4.66	8	1.29	20	3.22	55	8.84	17	2.73	108	17.36	14	2.25	139	22.35
1	1.27	2	2.53	0	0.00	0	0.00	8	10.13	7	8.86	3	3.80	20	25.32

表十一之六 肝癌(C220) 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

放療		放療合併栓塞		放療合併栓塞與標靶治療		放療合併標靶治療		化療		緩和治療[6]		未治療[7]		其他治療[8]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
88	2.70	34	1.04	25	0.77	56	1.72	19	0.58	435	13.35	65	1.99	150	4.60
30	2.25	12	0.90	1	0.08	0	0.00	2	0.15	48	3.61	14	1.05	17	1.28
12	1.67	4	0.56	1	0.14	0	0.00	1	0.14	46	6.42	9	1.26	20	2.79
26	3.32	10	1.28	13	1.66	32	4.09	9	1.15	204	26.05	27	3.45	67	8.56
17	4.55	8	2.14	10	2.67	24	6.42	4	1.07	119	31.82	14	3.74	41	10.96
3	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.56	18	33.33	1	1.85	5	9.26

6 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

7 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

8 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝癌

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類

期別	分析數	手術[1]		肝臟移植[2]		局部治療[3]		栓塞[4]		手術合併栓塞		局部治療合併栓塞		標靶治療		栓塞合併標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8638	2160	25.01	43	0.50	1525	17.65	1385	16.03	132	1.53	539	6.24	433	5.01	182	2.11
0 期	770	234	30.39	3	0.39	420	54.55	45	5.84	4	0.52	51	6.62	0	0.00	0	0.00
A 期	2674	1075	40.20	11	0.41	867	32.42	282	10.55	26	0.97	285	10.66	1	0.04	4	0.15
B 期	1681	564	33.55	3	0.18	63	3.75	593	35.28	55	3.27	119	7.08	16	0.95	28	1.67
C 期	2507	239	9.53	6	0.24	105	4.19	366	14.60	42	1.68	65	2.59	373	14.88	135	5.38
D 期	699	4	0.57	15	2.15	22	3.15	66	9.44	0	0.00	11	1.57	32	4.58	12	1.72
不詳	307	44	14.33	5	1.63	48	15.64	33	10.75	5	1.63	8	2.61	11	3.58	3	0.98

1 「手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 13、20-29、30-35、38、50-55、59-60、65、66、90。術式編碼詳見 p.588。

2 「肝臟移植」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 61、75。術式編碼詳見 p.588。

3 「局部治療」定義：針對原發部位進行局部治療且術式編碼為 16-19、27-29、34-35、38、54-55、59。術式編碼詳見 p.588。

4 「栓塞」定義 ：化學治療編碼為 04-07 及術式編碼為 15、18、26、29、33、38、53、59。術式編碼詳見 p.588。

表十一之七 肝癌(C220)發生人數按 BCLC 期別及治療方式分類(續)

放療		放療 合併栓塞		放療合併 栓塞與 標靶治療		放療合併 標靶治療		化療		緩和治療[5]		未治療[6]		其他治療[7]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
171	1.98	88	1.02	111	1.29	195	2.26	83	0.96	739	8.56	129	1.49	723	8.37
3	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.13	3	0.39	6	0.78
16	0.60	9	0.34	0	0.00	0	0.00	1	0.04	7	0.26	8	0.30	82	3.07
22	1.31	30	1.78	11	0.65	4	0.24	5	0.30	39	2.32	12	0.71	117	6.96
89	3.55	44	1.76	98	3.91	183	7.30	55	2.19	231	9.21	37	1.48	439	17.51
33	4.72	4	0.57	0	0.00	4	0.57	5	0.72	404	57.80	52	7.44	35	5.01
8	2.61	1	0.33	2	0.65	4	1.30	17	5.54	57	18.57	17	5.54	44	14.33

5 「緩和治療」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝內膽管癌

表十一之八 肝內膽管癌(C221)發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		化療		放療		放療合併化療		手術合併化療		手術合併放療		手術合併化療與放療		局部治療		栓塞		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1059	279	26.35	249	23.51	45	4.25	80	7.55	65	6.14	18	1.70	26	2.46	26	2.46	14	1.32	175	16.53	23	2.17	59	5.57
I 期	5	4	80.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00
II 期	189	125	66.14	2	1.06	4	2.12	3	1.59	8	4.23	5	2.65	3	1.59	23	12.17	4	2.12	4	2.12	3	1.59	5	2.65
III 期	177	99	55.93	11	6.21	9	5.08	10	5.65	17	9.60	6	3.39	4	2.26	3	1.69	2	1.13	8	4.52	2	1.13	6	3.39
IV 期	209	29	13.88	41	19.62	10	4.78	17	8.13	25	11.96	4	1.91	15	7.18	0	0.00	4	1.91	45	21.53	4	1.91	15	7.18
不詳	438	15	3.42	187	42.69	21	4.79	45	10.27	13	2.97	1	0.23	2	0.46	0	0.00	2	0.46	108	24.66	13	2.97	31	7.08

表十一之九 肝內膽管癌(C221) 0-49 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		化療		放療		放療合併化療		手術合併化療		手術合併放療		手術合併化療與放療		局部治療		栓塞		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	79	23	29.11	22	27.85	2	2.53	6	7.59	9	11.39	2	2.53	3	3.80	1	1.27	2	2.53	4	5.06	0	0.00	5	6.33
I 期	11	7	63.64	0	0.00	0	0.00	1	9.09	1	9.09	0	0.00	0	0.00	1	9.09	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	22	13	59.09	3	13.64	0	0.00	0	0.00	3	13.64	2	9.09	1	4.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	13	1	7.69	1	7.69	1	7.69	0	0.00	5	38.46	0	0.00	2	15.38	0	0.00	1	7.69	1	7.69	0	0.00	1	7.69
IV 期	30	1	3.33	18	60.00	1	3.33	4	13.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.67	0	0.00	4	13.33
不詳	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肝內膽管癌

表十一之十 肝內膽管癌(C221) 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		化療		放療		放療合併化療		手術合併化療		手術合併放療		手術合併化療與放療		局部治療		栓塞		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	585	179	30.60	155	26.50	17	2.91	52	8.89	39	6.67	12	2.05	19	3.25	12	2.05	7	1.20	45	7.69	5	0.85	43	7.35
I 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	120	86	71.67	1	0.83	3	2.50	1	0.83	3	2.50	5	4.17	3	2.50	11	9.17	1	0.83	0	0.00	1	0.83	5	4.17
III 期	103	63	61.17	2	1.94	3	2.91	9	8.74	11	10.68	2	1.94	1	0.97	1	0.97	2	1.94	3	2.91	0	0.00	6	5.83
IV 期	105	17	16.19	25	23.81	3	2.86	10	9.52	14	13.33	3	2.86	11	10.48	0	0.00	2	1.90	10	9.52	0	0.00	10	9.52
不詳	235	7	2.98	121	51.49	8	3.40	30	12.77	9	3.83	1	0.43	2	0.85	0	0.00	1	0.43	31	13.19	4	1.70	21	8.94

表十一之十一 肝內膽管癌(C221) 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		化療		放療		放療合併化療		手術合併化療		手術合併放療		手術合併化療與放療		局部治療		栓塞		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	395	77	19.49	72	18.23	26	6.58	22	5.57	17	4.30	4	1.01	4	1.01	13	3.29	5	1.27	126	31.90	18	4.56	11	2.78
I 期	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00
II 期	58	32	55.17	1	1.72	1	1.72	1	1.72	4	6.90	0	0.00	0	0.00	11	18.97	2	3.45	4	6.90	2	3.45	0	0.00
III 期	52	23	44.23	6	11.54	6	11.54	1	1.92	3	5.77	2	3.85	2	3.85	2	3.85	0	0.00	5	9.62	2	3.85	0	0.00
IV 期	91	11	12.09	15	16.48	6	6.59	7	7.69	6	6.59	1	1.10	2	2.20	0	0.00	1	1.10	34	37.36	4	4.40	4	4.40
不詳	173	7	4.05	48	27.75	12	6.94	11	6.36	4	2.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.58	75	43.35	9	5.20	6	3.47

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS

C22.0–C22.1

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS

- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser
- 15 Transcatheter arterial embolization (TAE)
- 16 Alcohol (Percutaneous Ethanol Injection-PEI) /acetic acid
- 17 Heat-Radio-frequency ablation (RFA)
- 18 Any combination of 15,16 or 17
- 19 Other (ultrasound)

No specimen sent to pathology from surgical events 10–19.

20 Wedge or segmental resection, NOS

- 21 Wedge resection
- 22 Segmental resection, NOS
- 23 One
- 24 Two
- 25 Three
  - 26 Segmental resection AND local tumor destruction TAE only
  - 27 Segmental resection AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
  - 28 Segmental resection AND local tumor destruction RFA only
  - 29 Any combination of 26, 27 or 28

Specimen sent to pathology from surgical events 20–26.

30 Lobectomy, NOS

- 31 Right lobectomy
- 32 Left lobectomy
- 33 Lobectomy AND local tumor destruction TAE only
- 34 Lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
- 35 Lobectomy AND local tumor destruction RFA only
- 38 Any combination of 33, 34 or 35

50 Extended lobectomy, NOS (extended: resection of a single lobe plus a segment of another lobe)

- 51 Extended Right lobectomy
- 52 Extended Left lobectomy
- 53 Extended lobectomy AND local tumor destruction TAE only
- 54 Extended lobectomy AND local tumor destruction PEI /acetic acid only
- 55 Extended lobectomy AND local tumor destruction RFA only
- 59 Any combination of 53, 54 or 55

60 Hepatectomy, NOS

- 61 Total hepatectomy and transplant

65 Excision of a bile duct (for an intra-hepatic bile duct primary only)

- 66 Excision of a bile duct PLUS partial hepatectomy

75 Bile duct and hepatectomy WITH transplant

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

肺癌

表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	13444	100.00	6736	100.00	6708	100.00	8811	100.00	4633	100.00
年齡										
00-04 歲	1	0.01	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	3	0.02	1	0.01	2	0.03	3	0.03	0	0.00
20-24 歲	3	0.02	2	0.03	1	0.01	3	0.03	0	0.00
25-29 歲	23	0.17	13	0.19	10	0.15	16	0.18	7	0.15
30-34 歲	79	0.59	28	0.42	51	0.76	58	0.66	21	0.45
35-39 歲	217	1.61	92	1.37	125	1.86	165	1.87	52	1.12
40-44 歲	400	2.98	162	2.40	238	3.55	291	3.30	109	2.35
45-49 歲	699	5.20	301	4.47	398	5.93	497	5.64	202	4.36
50-54 歲	1225	9.11	546	8.11	679	10.12	885	10.04	340	7.34
55-59 歲	1751	13.02	850	12.62	901	13.43	1235	14.02	516	11.14
60-64 歲	2123	15.79	1035	15.37	1088	16.22	1483	16.83	640	13.81
65-69 歲	2218	16.50	1109	16.46	1109	16.53	1511	17.15	707	15.26
70-74 歲	1486	11.05	804	11.94	682	10.17	951	10.79	535	11.55
75-79 歲	1448	10.77	807	11.98	641	9.56	839	9.52	609	13.14
80-84 歲	999	7.43	528	7.84	471	7.02	510	5.79	489	10.55
85 歲以上	769	5.72	457	6.78	312	4.65	363	4.12	406	8.76
臨床期別										
0 期	215	1.60	66	0.98	149	2.22	183	2.08	32	0.69
I 期	4025	29.94	1528	22.68	2497	37.22	3129	35.51	896	19.34
II 期	619	4.60	345	5.12	274	4.08	412	4.68	207	4.47
III 期	1497	11.14	1052	15.62	445	6.63	893	10.14	604	13.04
IV 期	6207	46.17	3409	50.61	2798	41.71	3596	40.81	2611	56.36
不詳	881	6.55	336	4.99	545	8.12	598	6.79	283	6.11
病理期別										
0 期	656	4.88	181	2.69	475	7.08	541	6.14	115	2.48
I 期	4123	30.67	1560	23.16	2563	38.21	3179	36.08	944	20.38
II 期	498	3.70	284	4.22	214	3.19	357	4.05	141	3.04
III 期	511	3.80	265	3.93	246	3.67	343	3.89	168	3.63
IV 期	2486	18.49	1267	18.81	1219	18.17	1587	18.01	899	19.40
不詳	5170	38.46	3179	47.19	1991	29.68	2804	31.82	2366	51.07
整併期別 [1]										
0 期	656	4.88	181	2.69	475	7.08	540	6.13	116	2.50
I 期	4230	31.46	1631	24.21	2599	38.74	3232	36.68	998	21.54
II 期	577	4.29	344	5.11	233	3.47	394	4.47	183	3.95
III 期	1563	11.63	1050	15.59	513	7.65	940	10.67	623	13.45
IV 期	6281	46.72	3442	51.10	2839	42.32	3641	41.32	2640	56.98
不詳	137	1.02	88	1.31	49	0.73	64	0.73	73	1.58

表十二之一 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	13444	100.00	6736	100.00	6708	100.00	8811	100.00	4633	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.7505								
治療方式[3,4,5]										
手術	4497	33.45	1645	24.42	2852	42.52	3518	39.93	979	21.13
手術合併化療，有/無標靶治療	1121	8.34	563	8.36	558	8.32	786	8.92	335	7.23
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	249	1.85	151	2.24	98	1.46	152	1.73	97	2.09
手術合併標靶治療	210	1.56	69	1.02	141	2.10	140	1.59	70	1.51
手術合併放療與標靶治療	35	0.26	16	0.24	19	0.28	17	0.19	18	0.39
化療	1047	7.79	766	11.37	281	4.19	583	6.62	464	10.02
化療合併標靶治療	312	2.32	154	2.29	158	2.36	169	1.92	143	3.09
標靶治療	2269	16.88	861	12.78	1408	20.99	1396	15.84	873	18.84
放療	456	3.39	355	5.27	101	1.51	243	2.76	213	4.60
非同步放療與標靶治療	755	5.62	326	4.84	429	6.40	468	5.31	287	6.19
非同步放療與化療	590	4.39	474	7.04	116	1.73	313	3.55	277	5.98
非同步放療、化療與標靶治療	133	0.99	69	1.02	64	0.95	72	0.82	61	1.32
非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	65	0.48	49	0.73	16	0.24	41	0.47	24	0.52
同步放療與化療	474	3.53	393	5.83	81	1.21	273	3.10	201	4.34
同步放療與化療與標靶治療	57	0.42	30	0.45	27	0.40	36	0.41	21	0.45
同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療	83	0.62	66	0.98	17	0.25	64	0.73	19	0.41
免疫治療	48	0.36	39	0.58	9	0.13	40	0.45	8	0.17
免疫治療合併化療，有/無標靶治療	160	1.19	112	1.66	48	0.72	117	1.33	43	0.93
緩和治療	592	4.40	408	6.06	184	2.74	211	2.39	381	8.22
未治療	61	0.45	48	0.71	13	0.19	31	0.35	30	0.65
其他治療	230	1.71	142	2.11	88	1.31	141	1.60	89	1.92
組織型態										
原位癌										
腺癌	655	99.85	180	99.45	475	100.00	540	100.00	115	99.14
鱗狀細胞癌	1	0.15	1	0.55	0	0.00	0	0.00	1	0.86
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	1577	12.33	1401	21.37	176	2.82	868	10.49	709	15.70
腺癌	10152	79.39	4450	67.89	5702	91.48	6782	82.00	3370	74.61
腺性鱗狀癌	141	1.10	87	1.33	54	0.87	85	1.03	56	1.24
大細胞癌	153	1.20	97	1.48	56	0.90	103	1.25	50	1.11
肉瘤樣癌	106	0.83	80	1.22	26	0.42	72	0.87	34	0.75
類癌腫瘤	90	0.70	39	0.59	51	0.82	60	0.73	30	0.66
唾液腺樣癌	14	0.11	10	0.15	4	0.06	11	0.13	3	0.07
其他特定上皮癌	189	1.48	150	2.29	39	0.63	120	1.45	69	1.53
非特定上皮癌	209	1.63	145	2.21	64	1.03	110	1.33	99	2.19
惡性肉瘤	14	0.11	8	0.12	6	0.10	8	0.10	6	0.13
其他惡性腫瘤	143	1.12	88	1.34	55	0.88	52	0.63	91	2.01

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 5：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	826	100.00	739	100.00	87	100.00	434	100.00	392	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	1	0.12	0	0.00	1	1.15	0	0.00	1	0.26
35-39 歲	2	0.24	1	0.14	1	1.15	0	0.00	2	0.51
40-44 歲	20	2.42	19	2.57	1	1.15	11	2.53	9	2.30
45-49 歲	23	2.78	21	2.84	2	2.30	14	3.23	9	2.30
50-54 歲	53	6.42	48	6.50	5	5.75	34	7.83	19	4.85
55-59 歲	87	10.53	77	10.42	10	11.49	49	11.29	38	9.69
60-64 歲	121	14.65	108	14.61	13	14.94	67	15.44	54	13.78
65-69 歲	165	19.98	147	19.89	18	20.69	86	19.82	79	20.15
70-74 歲	121	14.65	110	14.88	11	12.64	64	14.75	57	14.54
75-79 歲	100	12.11	89	12.04	11	12.64	43	9.91	57	14.54
80-84 歲	65	7.87	56	7.58	9	10.34	37	8.53	28	7.14
85 歲以上	68	8.23	63	8.53	5	5.75	29	6.68	39	9.95
臨床期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	24	2.91	21	2.84	3	3.45	13	3.00	11	2.81
II 期	13	1.57	9	1.22	4	4.60	8	1.84	5	1.28
III 期	188	22.76	170	23.00	18	20.69	88	20.28	100	25.51
IV 期	599	72.52	537	72.67	62	71.26	323	74.42	276	70.41
不詳	2	0.24	2	0.27	0	0.00	2	0.46	0	0.00
病理期別										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	15	1.82	13	1.76	2	2.30	9	2.07	6	1.53
II 期	4	0.48	3	0.41	1	1.15	1	0.23	3	0.77
III 期	6	0.73	5	0.68	1	1.15	4	0.92	2	0.51
IV 期	172	20.82	154	20.84	18	20.69	101	23.27	71	18.11
不詳	629	76.15	564	76.32	65	74.71	319	73.50	310	79.08
整併期別 [1]										
0 期	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	22	2.66	19	2.57	3	3.45	13	3.00	9	2.30
II 期	13	1.57	9	1.22	4	4.60	7	1.61	6	1.53
III 期	188	22.76	170	23.00	18	20.69	87	20.05	101	25.77
IV 期	601	72.76	539	72.94	62	71.26	325	74.88	276	70.41
不詳	2	0.24	2	0.27	0	0.00	2	0.46	0	0.00

表十二之二 小細胞肺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	826	100.00	739	100.00	87	100.00	434	100.00	392	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		-								
治療方式 [3,4]										
手術	8	0.97	7	0.95	1	1.15	7	1.61	1	0.26
手術合併化療	16	1.94	14	1.89	2	2.30	9	2.07	7	1.79
化療	254	30.75	230	31.12	24	27.59	139	32.03	115	29.34
放療	48	5.81	46	6.22	2	2.30	22	5.07	26	6.63
同步化療與放療	146	17.68	126	17.05	20	22.99	78	17.97	68	17.35
非同步化療與放療	202	24.46	187	25.30	15	17.24	108	24.88	94	23.98
免疫治療合併化療	18	2.18	16	2.17	2	2.30	11	2.53	7	1.79
免疫治療合併化療與放療	21	2.54	19	2.57	2	2.30	14	3.23	7	1.79
緩和治療	80	9.69	72	9.74	8	9.20	31	7.14	49	12.50
未治療	9	1.09	6	0.81	3	3.45	5	1.15	4	1.02
其他治療	24	2.91	16	2.17	8	9.20	10	2.30	14	3.57
組織型態										
侵襲癌										
小細胞癌	826	100.00	739	100.00	87	100.00	434	100.00	392	100.00

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：肺小細胞癌個案因接受手術治療少，病理期別不詳者居多，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

肺癌

表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療[3]，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	13444	4497	33.45	1121	8.34	249	1.85	210	1.56	35	0.26	1047	7.79	312	2.32	2269	16.88	456	3.39	755	5.62
0 期	656	655	99.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	4230	3610	85.34	444	10.50	10	0.24	19	0.45	1	0.02	4	0.09	0	0.00	3	0.07	88	2.08	4	0.09
II 期	577	110	19.06	330	57.19	20	3.47	8	1.39	1	0.17	7	1.21	1	0.17	4	0.69	39	6.76	0	0.00
IIIA 期	652	45	6.90	226	34.66	120	18.40	20	3.07	3	0.46	41	6.29	2	0.31	11	1.69	30	4.60	2	0.31
IIIB 期	606	18	2.97	38	6.27	66	10.89	20	3.30	1	0.17	60	9.90	7	1.16	77	12.71	30	4.95	2	0.33
IIIC 期	305	0	0.00	5	1.64	3	0.98	1	0.33	2	0.66	41	13.44	3	0.98	41	13.44	30	9.84	1	0.33
IV 期	6281	22	0.35	75	1.19	28	0.45	140	2.23	27	0.43	874	13.91	297	4.73	2121	33.77	227	3.61	743	11.83
不詳	137	37	27.01	3	2.19	2	1.46	2	1.46	0	0.00	20	14.60	2	1.46	12	8.76	12	8.76	3	2.19

表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療[3]，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1425	673	47.23	121	8.49	38	2.67	29	2.04	4	0.28	57	4.00	43	3.02	154	10.81	11	0.77	93	6.53
0 期	171	171	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	532	482	90.60	43	8.08	1	0.19	3	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.19	0	0.00
II 期	47	6	12.77	35	74.47	3	6.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIIA 期	54	2	3.70	25	46.30	16	29.63	0	0.00	1	1.85	1	1.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85
IIIB 期	48	0	0.00	2	4.17	10	20.83	1	2.08	0	0.00	4	8.33	1	2.08	2	4.17	1	2.08	0	0.00
IIIC 期	27	0	0.00	2	7.41	1	3.70	0	0.00	0	0.00	1	3.70	0	0.00	2	7.41	2	7.41	0	0.00
IV 期	527	2	0.38	13	2.47	6	1.14	25	4.74	3	0.57	49	9.30	41	7.78	147	27.89	7	1.33	92	17.46
不詳	19	10	52.63	1	5.26	1	5.26	0	0.00	0	0.00	2	10.53	0	0.00	3	15.79	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

表十二之三 小細胞肺癌以外之肺癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

非同步放療與化療		非同步放療、化療與標靶治療		非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		同步放療與化療		同步放療與化療與標靶治療		同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		免疫治療		免疫治療合併化療，有/無標靶治療		緩和治療[4]		未治療[5]		其他治療[6]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
590	4.39	133	0.99	65	0.48	474	3.53	57	0.42	83	0.62	48	0.36	160	1.19	592	4.40	61	0.45	230	1.71
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15	0	0.00
5	0.12	0	0.00	0	0.00	8	0.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.17	6	0.14	21	0.50
9	1.56	0	0.00	0	0.00	10	1.73	0	0.00	2	0.35	0	0.00	0	0.00	10	1.73	5	0.87	21	3.64
20	3.07	0	0.00	0	0.00	62	9.51	4	0.61	14	2.15	1	0.15	1	0.15	24	3.68	3	0.46	23	3.53
35	5.78	4	0.66	3	0.50	143	23.60	15	2.48	31	5.12	0	0.00	3	0.50	26	4.29	3	0.50	24	3.96
22	7.21	1	0.33	1	0.33	80	26.23	8	2.62	26	8.52	2	0.66	4	1.31	19	6.23	3	0.98	12	3.93
493	7.85	126	2.01	60	0.96	163	2.60	30	0.48	9	0.14	44	0.70	152	2.42	491	7.82	37	0.59	122	1.94
6	4.38	2	1.46	1	0.73	8	5.84	0	0.00	1	0.73	1	0.73	0	0.00	15	10.95	3	2.19	7	5.11

表十二之四 小細胞肺癌以外之肺癌 0-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

非同步放療與化療		非同步放療、化療與標靶治療		非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		同步放療與化療		同步放療與化療與標靶治療		同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		免疫治療		免疫治療合併化療，有/無標靶治療		緩和治療[4]		未治療[5]		其他治療[6]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
54	3.79	21	1.47	6	0.42	43	3.02	12	0.84	11	0.77	4	0.28	28	1.96	4	0.28	0	0.00	19	1.33
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.38
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.26
1	1.85	0	0.00	0	0.00	5	9.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.70
3	6.25	1	2.08	0	0.00	11	22.92	4	8.33	6	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4.17
3	11.11	0	0.00	0	0.00	6	22.22	3	11.11	4	14.81	0	0.00	3	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00
46	8.73	20	3.80	6	1.14	21	3.98	5	0.95	1	0.19	4	0.76	25	4.74	4	0.76	0	0.00	10	1.90
1	5.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26

4「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肺癌

表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療[3]，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	7317	2830	38.68	708	9.68	178	2.43	127	1.74	24	0.33	514	7.02	158	2.16	1059	14.47	132	1.80	412	5.63
0 期	432	431	99.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	2625	2291	87.28	278	10.59	4	0.15	14	0.53	0	0.00	2	0.08	0	0.00	0	0.00	17	0.65	0	0.00
II 期	314	52	16.56	213	67.83	15	4.78	4	1.27	1	0.32	3	0.96	0	0.00	0	0.00	8	2.55	0	0.00
IIIA 期	358	21	5.87	140	39.11	90	25.14	11	3.07	2	0.56	11	3.07	2	0.56	4	1.12	5	1.40	1	0.28
IIIB 期	322	6	1.86	30	9.32	45	13.98	14	4.35	1	0.31	20	6.21	2	0.62	32	9.94	7	2.17	1	0.31
IIIC 期	134	0	0.00	2	1.49	2	1.49	1	0.75	2	1.49	15	11.19	1	0.75	18	13.43	5	3.73	1	0.75
IV 期	3069	13	0.42	43	1.40	21	0.68	81	2.64	18	0.59	454	14.79	151	4.92	1000	32.58	87	2.83	408	13.29
不詳	63	16	25.40	2	3.17	1	1.59	2	3.17	0	0.00	9	14.29	2	3.17	5	7.94	3	4.76	1	1.59

表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併化療與放療[3]，有/無標靶治療		手術合併標靶治療		手術合併放療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		標靶治療		放療		非同步放療與標靶治療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4702	994	21.14	292	6.21	33	0.70	54	1.15	7	0.15	476	10.12	111	2.36	1056	22.46	313	6.66	250	5.32
0 期	53	53	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	1073	837	78.01	123	11.46	5	0.47	2	0.19	1	0.09	2	0.19	0	0.00	3	0.28	70	6.52	4	0.37
II 期	216	52	24.07	82	37.96	2	0.93	4	1.85	0	0.00	4	1.85	0	0.00	4	1.85	31	14.35	0	0.00
IIIA 期	240	22	9.17	61	25.42	14	5.83	9	3.75	0	0.00	29	12.08	0	0.00	7	2.92	25	10.42	0	0.00
IIIB 期	236	12	5.08	6	2.54	11	4.66	5	2.12	0	0.00	36	15.25	4	1.69	43	18.22	22	9.32	1	0.42
IIIC 期	144	0	0.00	1	0.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	17.36	2	1.39	21	14.58	23	15.97	0	0.00
IV 期	2685	7	0.26	19	0.71	1	0.04	34	1.27	6	0.22	371	13.82	105	3.91	974	36.28	133	4.95	243	9.05
不詳	55	11	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	16.36	0	0.00	4	7.27	9	16.36	2	3.64

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「放療」定義：放射治療包含照射原發部位及非原發部位。

表十二之五 小細胞肺癌以外之肺癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

非同步放療與化療		非同步放療、化療與標靶治療		非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		同步放療與化療		同步放療與化療與標靶治療		同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		免疫治療		免疫治療合併化療，有/無標靶治療		緩和治療[4]		未治療[5]		其他治療[6]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
341	4.66	85	1.16	46	0.63	279	3.81	36	0.49	51	0.70	20	0.27	92	1.26	97	1.33	13	0.18	115	1.57
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.23	0	0.00
2	0.08	0	0.00	0	0.00	5	0.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.08	10	0.38
1	0.32	0	0.00	0	0.00	4	1.27	0	0.00	2	0.64	0	0.00	0	0.00	1	0.32	1	0.32	9	2.87
7	1.96	0	0.00	0	0.00	34	9.50	3	0.84	7	1.96	1	0.28	0	0.00	3	0.84	1	0.28	15	4.19
18	5.59	2	0.62	2	0.62	93	28.88	9	2.80	19	5.90	0	0.00	3	0.93	5	1.55	0	0.00	13	4.04
6	4.48	0	0.00	0	0.00	51	38.06	4	2.99	16	11.94	1	0.75	1	0.75	2	1.49	0	0.00	6	4.48
305	9.94	81	2.64	44	1.43	84	2.74	20	0.65	6	0.20	17	0.55	88	2.87	83	2.70	7	0.23	58	1.89
2	3.17	2	3.17	0	0.00	8	12.70	0	0.00	1	1.59	1	1.59	0	0.00	3	4.76	1	1.59	4	6.35

表十二之六 小細胞肺癌以外之肺癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

非同步放療與化療		非同步放療、化療與標靶治療		非同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		同步放療與化療		同步放療與化療與標靶治療		同步放療與化療合併免疫治療，有/無標靶治療		免疫治療		免疫治療合併化療，有/無標靶治療		緩和治療[4]		未治療[5]		其他治療[6]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
195	4.15	27	0.57	13	0.28	152	3.23	9	0.19	21	0.45	24	0.51	40	0.85	491	10.44	48	1.02	96	2.04
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	0.28	0	0.00	0	0.00	3	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.65	4	0.37	9	0.84
8	3.70	0	0.00	0	0.00	6	2.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	4.17	4	1.85	10	4.63
12	5.00	0	0.00	0	0.00	23	9.58	1	0.42	7	2.92	0	0.00	1	0.42	21	8.75	2	0.83	6	2.50
14	5.93	1	0.42	1	0.42	39	16.53	2	0.85	6	2.54	0	0.00	0	0.00	21	8.90	3	1.27	9	3.81
13	9.03	1	0.69	1	0.69	23	15.97	1	0.69	6	4.17	1	0.69	0	0.00	17	11.81	3	2.08	6	4.17
142	5.29	25	0.93	10	0.37	58	2.16	5	0.19	2	0.07	23	0.86	39	1.45	404	15.05	30	1.12	54	2.01
3	5.45	0	0.00	1	1.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	21.82	2	3.64	2	3.64

4「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

5「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

6「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

肺癌

表十二之七 小細胞肺癌發生人數按肺小細胞癌的分期系統及治療方式分類

期別	分析數	手術[1]		手術合併化療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		免疫治療合併化療		免疫治療合併化療與放療		緩和治療[2]		未治療[3]		其他治療[4]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	826	8	0.97	16	1.94	254	30.75	48	5.81	146	17.68	202	24.46	18	2.18	21	2.54	80	9.69	9	1.09	24	2.91
局限期	119	2	1.68	4	3.36	28	23.53	5	4.20	54	45.38	17	14.29	0	0.00	3	2.52	4	3.36	0	0.00	2	1.68
廣泛期	322	1	0.31	1	0.31	112	34.78	20	6.21	28	8.70	94	29.19	10	3.11	12	3.73	35	10.87	1	0.31	8	2.48
不詳	385	5	1.30	11	2.86	114	29.61	23	5.97	64	16.62	91	23.64	8	2.08	6	1.56	41	10.65	8	2.08	14	3.64

表十二之八 小細胞肺癌發生人數按整併期別[5]及治療方式分類

期別	分析數	手術[1]		手術合併化療		化療		放療		同步化療與放療		非同步化療與放療		免疫治療合併化療		免疫治療合併化療與放療		緩和治療[2]		未治療[3]		其他治療[4]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	826	8	0.97	16	1.94	254	30.75	48	5.81	146	17.68	202	24.46	18	2.18	21	2.54	80	9.69	9	1.09	24	2.91
I 期	22	6	27.27	8	36.36	2	9.09	3	13.64	2	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.55
II 期	13	0	0.00	2	15.38	2	15.38	1	7.69	5	38.46	2	15.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69
III 期	188	1	0.53	3	1.60	36	19.15	8	4.26	87	46.28	35	18.62	0	0.00	5	2.66	7	3.72	0	0.00	6	3.19
IV 期	601	1	0.17	3	0.50	213	35.44	36	5.99	51	8.49	165	27.45	18	3.00	16	2.66	73	12.15	9	1.50	16	2.66
不詳	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

2 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

3 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

5 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

Lung
C340–C349
(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes
00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
19 Local tumor destruction or excision, NOS
Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (used principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)
15 Local tumor destruction, NOS
12 Laser ablation or cryosurgery
13 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
No specimen sent to pathology from surgical events 12-13 and 15
[SEER Note*:* Assign code 15 for radiofrequency ablation (RFA).]

20 Excision or resection of less than one lobe, NOS
23 Excision, NOS
24 Laser excision
25 Bronchial sleeve resection ONLY
21 Wedge resection
22 Segmental resection, including lingulectomy
Specimen sent to pathology from surgical events 20–25
30 Resection of [at least one] lobe or bilobectomy, but less than the whole lung (partial pneumonectomy, NOS)
33 Lobectomy WITH mediastinal lymph node dissection
The lymph node dissection should also be coded under *Scope of Regional Lymph Node Surgery*
[SEER Note*:* Assign code 30 when lymph node dissection is not performed, but lymph nodes are obtained as part of the lobectomy specimen.]
45 Lobe or bilobectomy extended, NOS
46 WITH chest wall
47 WITH pericardium
48 WITH diaphragm
55 Pneumonectomy, NOS
[SEER Note*:* Code 55 includes the following procedures: complete pneumonectomy, sleeve pneumonectomy, standard pneumonectomy, total pneumonectomy, resection of whole lung]
56 WITH mediastinal lymph node dissection (radical pneumonectomy)
The lymph node dissection should also be coded under *Scope of Regional Lymph Node Surgery*
65 Extended pneumonectomy
66 Extended pneumonectomy plus pleura or diaphragm
70 Extended radical pneumonectomy
The lymph node dissection should also be coded under *Scope of Regional Lymph Node Surgery*
[SEER Note*:* An extended radical pneumonectomy is a radical pneumonectomy (including removal of mediastinal nodes) and the removal of other tissues or nodes]
80 Resection of lung, NOS
90 Surgery, NOS
99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

乳癌

表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	16325	100.00	60	100.00	16265	100.00	8759	100.00	7566	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01
20-24 歲	27	0.17	0	0.00	27	0.17	18	0.21	9	0.12
25-29 歲	92	0.56	0	0.00	92	0.57	49	0.56	43	0.57
30-34 歲	314	1.92	0	0.00	314	1.93	168	1.92	146	1.93
35-39 歲	820	5.02	1	1.67	819	5.04	456	5.21	364	4.81
40-44 歲	1563	9.57	0	0.00	1563	9.61	891	10.17	672	8.88
45-49 歲	2589	15.86	7	11.67	2582	15.87	1380	15.76	1209	15.98
50-54 歲	2418	14.81	3	5.00	2415	14.85	1318	15.05	1100	14.54
55-59 歲	2391	14.65	5	8.33	2386	14.67	1286	14.68	1105	14.60
60-64 歲	2259	13.84	11	18.33	2248	13.82	1179	13.46	1080	14.27
65-69 歲	1775	10.87	7	11.67	1768	10.87	956	10.91	819	10.82
70-74 歲	779	4.77	7	11.67	772	4.75	425	4.85	354	4.68
75-79 歲	665	4.07	6	10.00	659	4.05	332	3.79	333	4.40
80-84 歲	402	2.46	8	13.33	394	2.42	194	2.21	208	2.75
85 歲以上	230	1.41	5	8.33	225	1.38	107	1.22	123	1.63
臨床期別										
0 期	2663	16.31	2	3.33	2661	16.36	1573	17.96	1090	14.41
I 期	4759	29.15	16	26.67	4743	29.16	2550	29.11	2209	29.20
II 期	5300	32.47	23	38.33	5277	32.44	2854	32.58	2446	32.33
III 期	1217	7.45	7	11.67	1210	7.44	599	6.84	618	8.17
IV 期	1088	6.66	5	8.33	1083	6.66	604	6.90	484	6.40
不詳	1298	7.95	7	11.67	1291	7.94	579	6.61	719	9.50
病理期別										
0 期	2701	16.55	5	8.33	2696	16.58	1468	16.76	1233	16.30
I 期	5585	34.21	19	31.67	5566	34.22	3065	34.99	2520	33.31
II 期	4479	27.44	18	30.00	4461	27.43	2344	26.76	2135	28.22
III 期	1490	9.13	11	18.33	1479	9.09	730	8.33	760	10.04
IV 期	520	3.19	0	0.00	520	3.20	291	3.32	229	3.03
不詳	1550	9.49	7	11.67	1543	9.49	861	9.83	689	9.11
整併期別 [1]										
0 期	2623	16.07	5	8.33	2618	16.10	1419	16.20	1204	15.91
I 期	5232	32.05	18	30.00	5214	32.06	2870	32.77	2362	31.22
II 期	5241	32.10	20	33.33	5221	32.10	2801	31.98	2440	32.25
III 期	1975	12.10	11	18.33	1964	12.08	984	11.23	991	13.10
IV 期	1118	6.85	5	8.33	1113	6.84	622	7.10	496	6.56
不詳	136	0.83	1	1.67	135	0.83	63	0.72	73	0.96
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5568								

表十三之一 乳癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	16325	100.00	60	100.00	16265	100.00	8759	100.00	7566	100.00
治療方式 [3,4]										
乳房保留術合併內分泌治療	547	3.35	1	1.67	546	3.36	301	3.44	246	3.25
乳房保留術合併化療與內分泌治療	100	0.61	1	1.67	99	0.61	42	0.48	58	0.77
乳房保留術合併放療與內分泌治療	3733	22.87	4	6.67	3729	22.93	2018	23.04	1715	22.67
乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療	1832	11.22	0	0.00	1832	11.26	950	10.85	882	11.66
乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療	582	3.57	0	0.00	582	3.58	343	3.92	239	3.16
乳房保留術	253	1.55	0	0.00	253	1.56	122	1.39	131	1.73
乳房保留術合併化療	80	0.49	2	3.33	78	0.48	38	0.43	42	0.56
乳房保留術合併放療	473	2.90	0	0.00	473	2.91	228	2.60	245	3.24
乳房保留術合併化療與放療	605	3.71	0	0.00	605	3.72	302	3.45	303	4.00
乳房保留術合併化療、放療與標靶治療	361	2.21	0	0.00	361	2.22	197	2.25	164	2.17
乳房切除術合併內分泌治療	1874	11.48	21	35.00	1853	11.39	1090	12.44	784	10.36
乳房切除術合併化療與內分泌治療	959	5.87	7	11.67	952	5.85	565	6.45	394	5.21
乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療	336	2.06	2	3.33	334	2.05	217	2.48	119	1.57
乳房切除術合併放療與內分泌治療	156	0.96	0	0.00	156	0.96	52	0.59	104	1.37
乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療	952	5.83	6	10.00	946	5.82	440	5.02	512	6.77
乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療	303	1.86	1	1.67	302	1.86	128	1.46	175	2.31
乳房切除術	672	4.12	5	8.33	667	4.10	345	3.94	327	4.32
乳房切除術合併化療	379	2.32	1	1.67	378	2.32	208	2.37	171	2.26
乳房切除術合併化療與標靶治療	344	2.11	0	0.00	344	2.11	218	2.49	126	1.67
乳房切除術合併化療與放療	201	1.23	0	0.00	201	1.24	80	0.91	121	1.60
乳房切除術合併化療、放療與標靶治療	260	1.59	1	1.67	259	1.59	123	1.40	137	1.81
化療	110	0.67	1	1.67	109	0.67	51	0.58	59	0.78
化療合併內分泌治療	165	1.01	3	5.00	162	1.00	99	1.13	66	0.87
化療合併標靶治療	119	0.73	0	0.00	119	0.73	62	0.71	57	0.75
內分泌治療	295	1.81	1	1.67	294	1.81	182	2.08	113	1.49
緩和治療	40	0.25	0	0.00	40	0.25	17	0.19	23	0.30
未治療	6	0.04	0	0.00	6	0.04	3	0.03	3	0.04
其他治療	588	3.60	3	5.00	585	3.60	338	3.86	250	3.30
組織型態										
原位癌										
管道內癌	2438	90.70	3	60.00	2435	90.76	1305	89.51	1133	92.11
小葉原位癌	76	2.83	0	0.00	76	2.83	46	3.16	30	2.44
乳頭狀原位癌	159	5.92	2	40.00	157	5.85	98	6.72	61	4.96
其他原位上皮癌	15	0.56	0	0.00	15	0.56	9	0.62	6	0.49
其他特定原位上皮癌	9	0.33	0	0.00	9	0.34	5	0.34	4	0.33
非特定原位上皮癌	5	0.19	0	0.00	5	0.19	3	0.21	2	0.16
其他惡性腫瘤	1	0.04	0	0.00	1	0.04	1	0.07	0	0.00
侵襲癌										
侵襲性癌，非特定型	11756	86.21	49	89.09	11707	86.19	6311	86.44	5445	85.94
黏液性癌	447	3.28	1	1.82	446	3.28	234	3.21	213	3.36
髓質癌	24	0.18	0	0.00	24	0.18	7	0.10	17	0.27
侵襲性小葉癌	649	4.76	0	0.00	649	4.78	359	4.92	290	4.58
乳房 Paget 氏病	8	0.06	0	0.00	8	0.06	5	0.07	3	0.05
侵襲性乳頭狀癌	246	1.80	1	1.82	245	1.80	128	1.75	118	1.86
化生性癌	85	0.62	0	0.00	85	0.63	50	0.68	35	0.55
其他特定上皮癌	131	0.96	1	1.82	130	0.96	68	0.93	63	0.99
非特定上皮癌	267	1.96	3	5.45	264	1.94	125	1.71	142	2.24
惡性肉瘤	11	0.08	0	0.00	11	0.08	9	0.12	2	0.03
其他惡性腫瘤	13	0.10	0	0.00	13	0.10	5	0.07	8	0.13

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

乳癌

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術[2]合併內分泌治療[3]		乳房保留術合併化療與內分泌治療		乳房保留術合併放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術合併化療		乳房保留術合併放療		乳房保留術合併化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	16325	547	3.35	100	0.61	3733	22.87	1832	11.22	582	3.57	253	1.55	80	0.49	473	2.90	605	3.71
0 期	2623	244	9.30	2	0.08	1182	45.06	3	0.11	0	0.00	111	4.23	0	0.00	302	11.51	2	0.08
IA 期	5041	163	3.23	24	0.48	1948	38.64	504	10.00	135	2.68	57	1.13	21	0.42	135	2.68	226	4.48
IB 期	191	1	0.52	2	1.05	34	17.80	43	22.51	11	5.76	3	1.57	1	0.52	2	1.05	7	3.66
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
IIA 期	3339	79	2.37	35	1.05	444	13.30	675	20.22	184	5.51	30	0.90	28	0.84	23	0.69	219	6.56
IIB 期	1901	20	1.05	22	1.16	79	4.16	347	18.25	154	8.10	5	0.26	16	0.84	3	0.16	84	4.42
III 期	1975	9	0.46	8	0.41	15	0.76	242	12.25	90	4.56	9	0.46	6	0.30	3	0.15	53	2.68
IV 期	1118	6	0.54	7	0.63	4	0.36	15	1.34	6	0.54	0	0.00	8	0.72	1	0.09	11	0.98
不詳	136	25	18.38	0	0.00	27	19.85	3	2.21	2	1.47	38	27.94	0	0.00	3	2.21	3	2.21

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術[2]合併內分泌治療[3]		乳房保留術合併化療與內分泌治療		乳房保留術合併放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術合併化療		乳房保留術合併放療		乳房保留術合併化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	434	12	2.76	1	0.23	84	19.35	81	18.66	37	8.53	13	3.00	1	0.23	8	1.84	27	6.22
0 期	70	8	11.43	0	0.00	35	50.00	0	0.00	0	0.00	5	7.14	0	0.00	5	7.14	0	0.00
IA 期	99	3	3.03	0	0.00	39	39.39	21	21.21	5	5.05	3	3.03	0	0.00	3	3.03	4	4.04
IB 期	9	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	102	0	0.00	1	0.98	7	6.86	31	30.39	18	17.65	2	1.96	1	0.98	0	0.00	14	13.73
IIB 期	64	1	1.56	0	0.00	2	3.13	14	21.88	10	15.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	9.38
III 期	61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	24.59	4	6.56	1	1.64	0	0.00	0	0.00	3	4.92
IV 期	27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.610。
3 「內分泌藥物治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房保留術合併化療、放療與標靶治療		乳房切除術[4]合併內分泌治療		乳房切除術合併化療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療'		乳房切除術合併放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房切除術		乳房切除術合併化療		乳房切除術合併化療與標靶治療	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
361	2.21	1874	11.48	959	5.87	336	2.06	156	0.96	952	5.83	303	1.86	672	4.12	379	2.32	344	2.11
1	0.04	391	14.91	2	0.08	0	0.00	10	0.38	0	0.00	0	0.00	346	13.19	1	0.04	0	0.00
99	1.96	874	17.34	245	4.86	76	1.51	34	0.67	10	0.20	5	0.10	197	3.91	114	2.26	81	1.61
9	4.71	13	6.81	21	10.99	7	3.66	4	2.09	9	4.71	2	1.05	1	0.52	3	1.57	6	3.14
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
105	3.14	409	12.25	380	11.38	102	3.05	19	0.57	104	3.11	29	0.87	59	1.77	142	4.25	96	2.88
71	3.73	102	5.37	186	9.78	73	3.84	38	2.00	263	13.83	80	4.21	26	1.37	59	3.10	59	3.10
60	3.04	52	2.63	88	4.46	48	2.43	37	1.87	502	25.42	162	8.20	30	1.52	43	2.18	71	3.59
15	1.34	25	2.24	36	3.22	29	2.59	14	1.25	63	5.64	23	2.06	4	0.36	16	1.43	31	2.77
1	0.74	8	5.88	1	0.74	1	0.74	0	0.00	1	0.74	2	1.47	9	6.62	1	0.74	0	0.00

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房保留術合併化療、放療與標靶治療		乳房切除術[4]合併內分泌治療		乳房切除術合併化療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療'		乳房切除術合併放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房切除術		乳房切除術合併化療		乳房切除術合併化療與標靶治療	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
10	2.30	28	6.45	19	4.38	10	2.30	0	0.00	33	7.60	15	3.46	8	1.84	9	2.07	4	0.92
0	0.00	11	15.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	8.57	0	0.00	0	0.00
4	4.04	7	7.07	3	3.03	2	2.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	1	1.01	2	2.02
1	11.11	0	0.00	2	22.22	0	0.00	0	0.00	1	11.11	1	11.11	1	11.11	0	0.00	1	11.11
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	1.96	6	5.88	8	7.84	3	2.94	0	0.00	1	0.98	4	3.92	0	0.00	1	0.98	0	0.00
1	1.56	3	4.69	3	4.69	3	4.69	0	0.00	12	18.75	3	4.69	0	0.00	3	4.69	1	1.56
2	3.28	1	1.64	1	1.64	0	0.00	0	0.00	14	22.95	5	8.20	0	0.00	4	6.56	0	0.00
0	0.00	0	0.00	2	7.41	2	7.41	0	0.00	5	18.52	2	7.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.610。

表十三之二 乳癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房切除術合併化療與放療		乳房切除術合併化療、放療與標靶治療		化療		化療合併內分泌治療		化療合併標靶治療		內分泌治療		緩和治療[5]		未治療[6]		其他治療[7]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
201	1.23	260	1.59	110	0.67	165	1.01	119	0.73	295	1.81	40	0.25	6	0.04	588	3.60
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	0.53	0	0.00	2	0.08	10	0.38
3	0.06	4	0.08	3	0.06	7	0.14	1	0.02	32	0.63	1	0.02	0	0.00	42	0.83
4	2.09	3	1.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.62
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	0.78	24	0.72	5	0.15	6	0.18	5	0.15	49	1.47	2	0.06	1	0.03	59	1.77
45	2.37	52	2.74	8	0.42	9	0.47	6	0.32	25	1.32	2	0.11	1	0.05	66	3.47
114	5.77	151	7.65	18	0.91	18	0.91	20	1.01	38	1.92	2	0.10	0	0.00	86	4.35
9	0.81	26	2.33	76	6.80	125	11.18	86	7.69	133	11.90	31	2.77	1	0.09	317	28.35
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.74	4	2.94	2	1.47	1	0.74	3	2.21

表十三之三 乳癌 0-34 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房切除術合併化療與放療		乳房切除術合併化療、放療與標靶治療		化療		化療合併內分泌治療		化療合併標靶治療		內分泌治療		緩和治療[5]		未治療[6]		其他治療[7]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
6	1.38	6	1.38	1	0.23	4	0.92	1	0.23	2	0.46	0	0.00	0	0.00	14	3.23
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01
1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	1	0.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.96
0	0.00	2	3.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	8.20	3	4.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.92
0	0.00	0	0.00	1	3.70	4	14.81	1	3.70	2	7.41	0	0.00	0	0.00	8	29.63
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

乳癌

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術[2]合併內分泌治療[3]		乳房保留術合併化療與內分泌治療		乳房保留術合併放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術合併化療		乳房保留術合併放療		乳房保留術合併化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	4972	125	2.51	33	0.66	1280	25.74	724	14.56	230	4.63	83	1.67	20	0.40	126	2.53	180	3.62
0 期	895	72	8.04	0	0.00	442	49.39	2	0.22	0	0.00	38	4.25	0	0.00	84	9.39	0	0.00
IA 期	1514	28	1.85	6	0.40	629	41.55	194	12.81	61	4.03	14	0.92	6	0.40	30	1.98	56	3.70
IB 期	61	0	0.00	0	0.00	12	19.67	20	32.79	3	4.92	1	1.64	0	0.00	2	3.28	1	1.64
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	976	13	1.33	12	1.23	155	15.88	254	26.02	61	6.25	8	0.82	7	0.72	7	0.72	77	7.89
IIB 期	648	0	0.00	8	1.23	30	4.63	156	24.07	68	10.49	3	0.46	4	0.62	1	0.15	27	4.17
III 期	554	1	0.18	3	0.54	2	0.36	94	16.97	33	5.96	1	0.18	0	0.00	0	0.00	14	2.53
IV 期	266	1	0.38	4	1.50	0	0.00	3	1.13	2	0.75	0	0.00	3	1.13	0	0.00	4	1.50
不詳	58	10	17.24	0	0.00	10	17.24	1	1.72	2	3.45	18	31.03	0	0.00	2	3.45	1	1.72

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術[2]合併內分泌治療[3]		乳房保留術合併化療與內分泌治療		乳房保留術合併放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術合併化療		乳房保留術合併放療		乳房保留術合併化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	8843	217	2.45	52	0.59	2101	23.76	977	11.05	292	3.30	120	1.36	49	0.55	297	3.36	364	4.12
0 期	1479	131	8.86	2	0.14	674	45.57	1	0.07	0	0.00	55	3.72	0	0.00	200	13.52	2	0.14
IA 期	2887	48	1.66	18	0.62	1148	39.76	283	9.80	67	2.32	28	0.97	13	0.45	84	2.91	157	5.44
IB 期	106	1	0.94	1	0.94	17	16.04	22	20.75	8	7.55	2	1.89	0	0.00	0	0.00	6	5.66
II 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
IIA 期	1742	13	0.75	18	1.03	211	12.11	372	21.35	101	5.80	12	0.69	18	1.03	8	0.46	114	6.54
IIB 期	914	5	0.55	8	0.88	26	2.84	165	18.05	67	7.33	2	0.22	8	0.88	1	0.11	48	5.25
III 期	1028	5	0.49	2	0.19	6	0.58	120	11.67	45	4.38	5	0.49	6	0.58	2	0.19	29	2.82
IV 期	619	2	0.32	3	0.48	3	0.48	12	1.94	4	0.65	0	0.00	4	0.65	0	0.00	6	0.97
不詳	67	12	17.91	0	0.00	16	23.88	2	2.99	0	0.00	16	23.88	0	0.00	1	1.49	2	2.99

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.610。
3 「內分泌藥物治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01。

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房保留術合併化療、放療與標靶治療		乳房切除術[4]合併內分泌治療		乳房切除術合併化療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療'		乳房切除術合併放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房切除術		乳房切除術合併化療		乳房切除術合併化療與標靶治療	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
115	2.31	451	9.07	283	5.69	119	2.39	42	0.84	344	6.92	113	2.27	144	2.90	66	1.33	81	1.63
0	0.00	137	15.31	1	0.11	0	0.00	7	0.78	0	0.00	0	0.00	103	11.51	0	0.00	0	0.00
32	2.11	232	15.32	75	4.95	33	2.18	17	1.12	3	0.20	4	0.26	28	1.85	17	1.12	21	1.39
1	1.64	3	4.92	3	4.92	3	4.92	0	0.00	4	6.56	0	0.00	0	0.00	1	1.64	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
36	3.69	70	7.17	115	11.78	29	2.97	4	0.41	40	4.10	7	0.72	4	0.41	26	2.66	17	1.74
22	3.40	4	0.62	62	9.57	31	4.78	7	1.08	111	17.13	39	6.02	0	0.00	13	2.01	13	2.01
17	3.07	0	0.00	22	3.97	14	2.53	4	0.72	162	29.24	55	9.93	4	0.72	5	0.90	25	4.51
6	2.26	2	0.75	5	1.88	9	3.38	3	1.13	23	8.65	7	2.63	0	0.00	4	1.50	5	1.88
1	1.72	3	5.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.72	1	1.72	5	8.62	0	0.00	0	0.00

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房保留術合併化療、放療與標靶治療		乳房切除術[4]合併內分泌治療		乳房切除術合併化療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療'		乳房切除術合併放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房切除術		乳房切除術合併化療		乳房切除術合併化療與標靶治療	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
221	2.50	897	10.14	588	6.65	185	2.09	55	0.62	510	5.77	155	1.75	370	4.18	230	2.60	215	2.43
1	0.07	200	13.52	1	0.07	0	0.00	3	0.20	0	0.00	0	0.00	198	13.39	1	0.07	0	0.00
62	2.15	461	15.97	159	5.51	37	1.28	16	0.55	7	0.24	1	0.03	133	4.61	72	2.49	52	1.80
7	6.60	5	4.72	15	14.15	4	3.77	2	1.89	4	3.77	1	0.94	0	0.00	2	1.89	5	4.72
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
63	3.62	178	10.22	231	13.26	66	3.79	10	0.57	61	3.50	18	1.03	11	0.63	92	5.28	64	3.67
43	4.70	29	3.17	110	12.04	33	3.61	13	1.42	129	14.11	36	3.94	10	1.09	31	3.39	41	4.49
36	3.50	13	1.26	48	4.67	27	2.63	8	0.78	281	27.33	85	8.27	13	1.26	25	2.43	33	3.21
9	1.45	7	1.13	23	3.72	17	2.75	3	0.48	28	4.52	13	2.10	2	0.32	7	1.13	20	3.23
0	0.00	4	5.97	1	1.49	1	1.49	0	0.00	0	0.00	1	1.49	3	4.48	0	0.00	0	0.00

4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.610。

表十三之四 乳癌 35-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房切除術合併化療與放療		乳房切除術合併化療、放療與標靶治療		化療		化療合併內分泌治療		化療合併標靶治療		內分泌治療		緩和治療[5]		未治療[6]		其他治療[7]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
47	0.95	62	1.25	29	0.58	41	0.82	23	0.46	40	0.80	1	0.02	3	0.06	167	3.36
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.34	0	0.00	1	0.11	5	0.56
1	0.07	2	0.13	0	0.00	2	0.13	0	0.00	5	0.33	0	0.00	0	0.00	18	1.19
1	1.64	3	4.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	4.92
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	0.61	5	0.51	1	0.10	0	0.00	1	0.10	4	0.41	0	0.00	0	0.00	17	1.74
13	2.01	13	2.01	1	0.15	3	0.46	2	0.31	2	0.31	0	0.00	0	0.00	15	2.31
23	4.15	36	6.50	7	1.26	2	0.36	7	1.26	3	0.54	0	0.00	0	0.00	20	3.61
3	1.13	3	1.13	20	7.52	34	12.78	13	4.89	21	7.89	1	0.38	1	0.38	89	33.46
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.45	0	0.00	1	1.72	0	0.00

表十三之五 乳癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房切除術合併化療與放療		乳房切除術合併化療、放療與標靶治療		化療		化療合併內分泌治療		化療合併標靶治療		內分泌治療		緩和治療[5]		未治療[6]		其他治療[7]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
128	1.45	168	1.90	59	0.67	84	0.95	76	0.86	111	1.26	21	0.24	3	0.03	298	3.37
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.27	0	0.00	1	0.07	5	0.34
1	0.03	2	0.07	3	0.10	2	0.07	1	0.03	13	0.45	0	0.00	0	0.00	19	0.66
2	1.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.89
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	1.03	15	0.86	2	0.11	3	0.17	4	0.23	13	0.75	1	0.06	1	0.06	24	1.38
30	3.28	30	3.28	5	0.55	3	0.33	4	0.44	4	0.44	0	0.00	1	0.11	32	3.50
71	6.91	101	9.82	8	0.78	8	0.78	8	0.78	10	0.97	0	0.00	0	0.00	33	3.21
6	0.97	20	3.23	41	6.62	68	10.99	58	9.37	65	10.50	18	2.91	0	0.00	180	29.08
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.49	2	2.99	2	2.99	0	0.00	3	4.48

5「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

乳癌

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	乳房保留術[2]合併內分泌治療[3]		乳房保留術合併化療與內分泌治療		乳房保留術合併放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療與內分泌治療		乳房保留術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房保留術		乳房保留術合併化療		乳房保留術合併放療		乳房保留術合併化療與放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2076	193	9.30	14	0.67	268	12.91	50	2.41	23	1.11	37	1.78	10	0.48	42	2.02	34	1.64
0 期	179	33	18.44	0	0.00	31	17.32	0	0.00	0	0.00	13	7.26	0	0.00	13	7.26	0	0.00
IA 期	541	84	15.53	0	0.00	132	24.40	6	1.11	2	0.37	12	2.22	2	0.37	18	3.33	9	1.66
IB 期	15	0	0.00	1	6.67	4	26.67	1	6.67	0	0.00	0	0.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00
II 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IIA 期	519	53	10.21	4	0.77	71	13.68	18	3.47	4	0.77	8	1.54	2	0.39	8	1.54	14	2.70
IIB 期	275	14	5.09	6	2.18	21	7.64	12	4.36	9	3.27	0	0.00	4	1.45	1	0.36	3	1.09
III 期	332	3	0.90	3	0.90	7	2.11	13	3.92	8	2.41	2	0.60	0	0.00	1	0.30	7	2.11
IV 期	206	3	1.46	0	0.00	1	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.49	1	0.49	1	0.49
不詳	9	3	33.33	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	2	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類(續)

乳房保留術合併化療、放療與標靶治療		乳房切除術[4]合併內分泌治療		乳房切除術合併化療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、內分泌治療與標靶治療'		乳房切除術合併放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療與內分泌治療		乳房切除術合併化療、放療、內分泌治療與標靶治療		乳房切除術		乳房切除術合併化療		乳房切除術合併化療與標靶治療	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
15	0.72	498	23.99	69	3.32	22	1.06	59	2.84	65	3.13	20	0.96	150	7.23	74	3.56	44	2.12
0	0.00	43	24.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	39	21.79	0	0.00	0	0.00
1	0.18	174	32.16	8	1.48	4	0.74	1	0.18	0	0.00	0	0.00	35	6.47	24	4.44	6	1.11
0	0.00	5	33.33	1	6.67	0	0.00	2	13.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	0.77	155	29.87	26	5.01	4	0.77	5	0.96	2	0.39	0	0.00	44	8.48	23	4.43	15	2.89
5	1.82	66	24.00	11	4.00	6	2.18	18	6.55	11	4.00	2	0.73	16	5.82	12	4.36	4	1.45
5	1.51	38	11.45	17	5.12	7	2.11	25	7.53	45	13.55	17	5.12	13	3.92	9	2.71	13	3.92
0	0.00	16	7.77	6	2.91	1	0.49	8	3.88	7	3.40	1	0.49	2	0.97	5	2.43	6	2.91
0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.11	1	11.11	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「乳房保留術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-24。術式編碼詳見 p.610。
3 「內分泌藥物治療」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01。
4 「乳房切除術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.610。

表十三之六 乳癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

乳房切除術合併化療與放療		乳房切除術合併化療、放療與標靶治療		化療		化療合併內分泌治療		化療合併標靶治療		內分泌治療		緩和治療[5]		未治療[6]		其他治療[7]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
20	0.96	24	1.16	21	1.01	36	1.73	19	0.92	142	6.84	18	0.87	0	0.00	109	5.25
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	3.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	0.18	0	0.00	0	0.00	3	0.55	0	0.00	14	2.59	1	0.18	0	0.00	4	0.74
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0.39	3	0.58	2	0.39	3	0.58	0	0.00	32	6.17	1	0.19	0	0.00	16	3.08
2	0.73	7	2.55	2	0.73	3	1.09	0	0.00	19	6.91	2	0.73	0	0.00	19	6.91
15	4.52	11	3.31	3	0.90	8	2.41	5	1.51	25	7.53	2	0.60	0	0.00	30	9.04
0	0.00	3	1.46	14	6.80	19	9.22	14	6.80	45	21.84	12	5.83	0	0.00	40	19.42
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

6「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

7「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Breast

C500–C509

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

19 Local tumor destruction, NOS

No specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

20 Partial mastectomy, NOS; less than total mastectomy, NOS

21 Partial mastectomy WITH nipple resection

22 Lumpectomy or excisional biopsy

23 Reexcision of the biopsy site for gross or microscopic residual disease

24 Segmental mastectomy (including wedge resection, quadrantectomy, tylectomy)

Procedures coded 20–24 remove the gross primary tumor and some of the breast tissue (breast-conserving or -preserving). There may be microscopic residual tumor.

30 Subcutaneous mastectomy

A subcutaneous mastectomy, also called a nipple sparing mastectomy, is the removal of breast tissue without the nipple and areolar complex or overlying skin. It is performed to facilitate immediate breast reconstruction. Cases coded 30 may be considered to have undergone breast reconstruction.

40 Total (simple) mastectomy

41 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

43 Reconstruction, NOS

44 Tissue

45 Implant

46 Combined (tissue and implant)

42 WITH removal of uninvolved contralateral breast

47 Reconstruction, NOS

48 Tissue

49 Implant

75 Combined (tissue and implant)

[***SEER Note:*** "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

[***SEER Note:*** Assign code 43 for a simple mastectomy with tissue expanders and acellular dermal matrix/AlloDerm. The tissue expander indicates preparation for reconstruction. The acellular dermal matrix/AlloDerm is not coded because, while they often accompany an implant procedure, they are not the principle element of reconstructive procedures. The principle elements would be tissue from the patient and/or prosthetics (e.g., gel implants).]

A total (simple) mastectomy removes all breast tissue, the nipple, and areolar complex. An axillary dissection is not done, but sentinel lymph nodes may be removed.

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item **Surgical Procedure/Other Site.**

[***SEER Note:*** Example of single primary with removal of involved contralateral breast--Inflammatory carcinoma involving both breasts.Bilateral simple mastectomies. Code Surgery of Primary Site 41 and code Surgical Procedure of Other Site 1.]

If the **contralateral breast** reveals a **second primary**, each breast is abstracted separately. The surgical procedure is coded 41 for the first primary. The surgical code for the contralateral breast is coded to the procedure performed on that site.

Placement of a tissue expander at the time of original surgery means that reconstruction is planned as part of the first course of treatment. When an expander is placed, code the mastectomy and reconstruction.]

Reconstruction that is planned as part of first course treatment is coded 43-49 or 75, regardless of whether it is done at the time of mastectomy or later.

[***SEER Note:*** Reconstruction may be done at the same time as the mastectomy or may be done later. Code 43-49, or 75 if the operative report or medical record states reconstruction will be done later, or if a tissue expander is inserted during the mastectomy procedure. Tissue expander insertion precedes reconstruction.]

76 Bilateral mastectomy for a single tumor involving both breasts, as for bilateral inflammatory carcinoma. (Effective with cases diagnosed 1/1/2011 and forward)

50 Modified radical mastectomy

- 51 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
  - 53 Reconstruction, NOS
    - 54 Tissue
    - 55 Implant
    - 56 Combined (tissue and implant)
- 52 WITH removal of uninvolved contralateral breast
  - 57 Reconstruction, NOS
    - 58 Tissue
    - 59 Implant
    - 63 Combined (tissue and implant)

Removal of all breast tissue, the nipple, the areolar complex, and variable amounts of breast skin in continuity with the axilla. The specimen may or may not include a portion of the pectoralis major muscle. If only sentinel lymph nodes are removed, the procedure should be coded a simple mastectomy.

[***SEER Note:*** "In continuity with" or "en bloc" means that all the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants). Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment. Assign code 51 or 52 if a patient has an excisional biopsy and axillary dissection followed by a simple mastectomy during the first course of therapy. Code the cumulative result of the surgeries, which is a modified radical mastectomy in this case. Code the most invasive, extensive or definitive surgery in Surgery of Primary Site.]

If contralateral breast reveals a second primary, it is abstracted separately. The surgical procedure is coded 41 or 51 for the first primary. The surgical code for the Contralateral breast is coded to the procedure performed for that site.

For **single** primaries only, code removal of involved contralateral breast under the data item **Surgical Procedure/Other Site**.

60 Radical mastectomy, NOS

- 61 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast
  - 64 Reconstruction, NOS

65 Tissue

66 Implant

67 Combined (tissue and implant)

62 WITH removal of uninvolved contralateral breast

68 Reconstruction, NOS

69 Tissue

73 Implant

74 Combined (tissue and implant)

[***SEER Note:*** Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amount of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as en bloc axillary dissection. "Tissue" for reconstruction is defined as human tissue such as muscle (latissimus dorsi or rectus abdominis) or skin in contrast to artificial prostheses (implants).
Placement of a tissue expander at the time of original surgery indicates that reconstruction is planned as part of the first course of treatment.]

70 Extended radical mastectomy

71 WITHOUT removal of uninvolved contralateral breast

72 WITH removal of uninvolved contralateral breast

[***SEER Note:*** Involves removal of breast tissue, nipple, areolar complex, variable amounts of skin, pectoralis minor, and/or pectoralis major, as well as removal of internal mammary nodes and en bloc axillary dissection.]

80 Mastectomy, NOS

Specimen sent to pathology for surgical events coded 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮頸癌

表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3877	100.00	-	-	3877	100.00	2288	100.00	1589	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	32	0.83	-	-	32	0.83	20	0.87	12	0.76
25-29 歲	181	4.67	-	-	181	4.67	119	5.20	62	3.90
30-34 歲	484	12.48	-	-	484	12.48	290	12.67	194	12.21
35-39 歲	602	15.53	-	-	602	15.53	348	15.21	254	15.98
40-44 歲	517	13.34	-	-	517	13.34	310	13.55	207	13.03
45-49 歲	410	10.58	-	-	410	10.58	240	10.49	170	10.70
50-54 歲	367	9.47	-	-	367	9.47	225	9.83	142	8.94
55-59 歲	326	8.41	-	-	326	8.41	192	8.39	134	8.43
60-64 歲	304	7.84	-	-	304	7.84	172	7.52	132	8.31
65-69 歲	272	7.02	-	-	272	7.02	148	6.47	124	7.80
70-74 歲	122	3.15	-	-	122	3.15	77	3.37	45	2.83
75-79 歲	96	2.48	-	-	96	2.48	61	2.67	35	2.20
80-84 歲	89	2.30	-	-	89	2.30	51	2.23	38	2.39
85 歲以上	75	1.93	-	-	75	1.93	35	1.53	40	2.52
FIGO 期別 [1]										
0 期	2630	67.84	-	-	2630	67.84	1449	63.33	1181	74.32
1 期	3	0.08	-	-	3	0.08	1	0.04	2	0.13
1A 期	11	0.28	-	-	11	0.28	4	0.17	7	0.44
1A1 期	71	1.83	-	-	71	1.83	50	2.19	21	1.32
1A2 期	12	0.31	-	-	12	0.31	11	0.48	1	0.06
1B 期	24	0.62	-	-	24	0.62	11	0.48	13	0.82
1B1 期	293	7.56	-	-	293	7.56	213	9.31	80	5.03
1B2 期	105	2.71	-	-	105	2.71	74	3.23	31	1.95
1B3 期	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.04	0	0.00
2 期	4	0.10	-	-	4	0.10	2	0.09	2	0.13
2A 期	18	0.46	-	-	18	0.46	11	0.48	7	0.44
2A1 期	27	0.70	-	-	27	0.70	18	0.79	9	0.57
2A2 期	52	1.34	-	-	52	1.34	35	1.53	17	1.07
2B 期	230	5.93	-	-	230	5.93	161	7.04	69	4.34
3 期	1	0.03	-	-	1	0.03	1	0.04	0	0.00
3A 期	22	0.57	-	-	22	0.57	11	0.48	11	0.69
3B 期	112	2.89	-	-	112	2.89	81	3.54	31	1.95
4 期	5	0.13	-	-	5	0.13	0	0.00	5	0.31
4A 期	58	1.50	-	-	58	1.50	27	1.18	31	1.95
4B 期	106	2.73	-	-	106	2.73	79	3.45	27	1.70
不詳	92	2.37	-	-	92	2.37	48	2.10	44	2.77

表十四之一 子宮頸癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3877	100.00	-	-	3877	100.00	2288	100.00	1589	100.00
臨床期別										
0 期	2630	67.84	-	-	2630	67.84	1449	63.33	1181	74.32
I 期	473	12.20	-	-	473	12.20	330	14.42	143	9.00
II 期	349	9.00	-	-	349	9.00	244	10.66	105	6.61
III 期	121	3.12	-	-	121	3.12	81	3.54	40	2.52
IV 期	212	5.47	-	-	212	5.47	131	5.73	81	5.10
不詳	92	2.37	-	-	92	2.37	53	2.32	39	2.45
病理期別										
0 期	2630	67.84	-	-	2630	67.84	1449	63.33	1181	74.32
I 期	437	11.27	-	-	437	11.27	302	13.20	135	8.50
II 期	103	2.66	-	-	103	2.66	63	2.75	40	2.52
III 期	2	0.05	-	-	2	0.05	1	0.04	1	0.06
IV 期	55	1.42	-	-	55	1.42	39	1.70	16	1.01
不詳	650	16.77	-	-	650	16.77	434	18.97	216	13.59
整併期別 [2]										
0 期	2630	67.84	-	-	2630	67.84	1449	63.33	1181	74.32
I 期	528	13.62	-	-	528	13.62	361	15.78	167	10.51
II 期	373	9.62	-	-	373	9.62	260	11.36	113	7.11
III 期	119	3.07	-	-	119	3.07	81	3.54	38	2.39
IV 期	216	5.57	-	-	216	5.57	133	5.81	83	5.22
不詳	11	0.28	-	-	11	0.28	4	0.17	7	0.44
臨床與病理期別一致性										
Kappa[3]		0.9045								
治療方式 [4,5]										
手術	2925	75.44	-	-	2925	75.44	1655	72.33	1270	79.92
手術合併化療與放療	181	4.67	-	-	181	4.67	117	5.11	64	4.03
手術合併放療	56	1.44	-	-	56	1.44	34	1.49	22	1.38
手術合併化療	28	0.72	-	-	28	0.72	15	0.66	13	0.82
同步化療與放療	382	9.85	-	-	382	9.85	277	12.11	105	6.61
非同步化療與放療	67	1.73	-	-	67	1.73	48	2.10	19	1.20
放療	135	3.48	-	-	135	3.48	77	3.37	58	3.65
化療	23	0.59	-	-	23	0.59	14	0.61	9	0.57
緩和治療	30	0.77	-	-	30	0.77	15	0.66	15	0.94
未治療	15	0.39	-	-	15	0.39	9	0.39	6	0.38
其他治療	35	0.90	-	-	35	0.90	27	1.18	8	0.50
組織型態										
原位癌										
鱗狀細胞癌	2488	94.56	-	-	2488	94.56	1383	95.38	1105	93.56
腺癌	79	3.00	-	-	79	3.00	59	4.07	20	1.69
其他原位上皮癌	64	2.43	-	-	64	2.43	8	0.55	56	4.74
侵襲癌										
鱗狀細胞癌	895	71.83	-	-	895	71.83	600	71.60	295	72.30
腺癌	256	20.55	-	-	256	20.55	184	21.96	72	17.65
神經內分泌癌	20	1.61	-	-	20	1.61	12	1.43	8	1.96
其他特定上皮癌	44	3.53	-	-	44	3.53	28	3.34	16	3.92
非特定上皮癌	16	1.28	-	-	16	1.28	9	1.07	7	1.72
混合性上皮與間質腫瘤	5	0.40	-	-	5	0.40	4	0.48	1	0.25

註 1：FIGO 期別*-請參考 107 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

註 2：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 5：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮頸癌

表十四之二 子宮頸癌發生人數按 FIGO 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3877	2925	75.44	181	4.67	56	1.44	28	0.72	382	9.85	67	1.73	135	3.48	23	0.59	30	0.77	15	0.39	35	0.90
0 期	2630	2612	99.32	0	0.00	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.11	0	0.00	2	0.08	7	0.27	5	0.19
1 期	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	11	9	81.82	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00
1A1 期	71	66	92.96	2	2.82	2	2.82	1	1.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	12	7	58.33	1	8.33	4	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	24	13	54.17	7	29.17	2	8.33	0	0.00	1	4.17	0	0.00	1	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	293	151	51.54	48	16.38	18	6.14	14	4.78	34	11.60	0	0.00	24	8.19	0	0.00	1	0.34	1	0.34	2	0.68
1B2 期	105	12	11.43	32	30.48	8	7.62	5	4.76	32	30.48	5	4.76	8	7.62	1	0.95	1	0.95	0	0.00	1	0.95
1B3 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	4	0	0.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	18	1	5.56	5	27.78	1	5.56	0	0.00	9	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56	0	0.00	1	5.56
2A1 期	27	3	11.11	7	25.93	4	14.81	1	3.70	6	22.22	0	0.00	6	22.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	52	2	3.85	19	36.54	2	3.85	0	0.00	24	46.15	0	0.00	4	7.69	1	1.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	230	2	0.87	25	10.87	1	0.43	4	1.74	159	69.13	5	2.17	26	11.30	1	0.43	1	0.43	1	0.43	5	2.17
3 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	22	0	0.00	2	9.09	0	0.00	0	0.00	11	50.00	0	0.00	8	36.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.55
3B 期	112	0	0.00	4	3.57	0	0.00	0	0.00	66	58.93	6	5.36	22	19.64	2	1.79	2	1.79	3	2.68	7	6.25
4 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	58	0	0.00	1	1.72	2	3.45	0	0.00	28	48.28	4	6.90	12	20.69	2	3.45	7	12.07	2	3.45	0	0.00
4B 期	106	1	0.94	4	3.77	0	0.00	1	0.94	9	8.49	45	42.45	12	11.32	14	13.21	9	8.49	0	0.00	11	10.38
不詳	92	45	48.91	21	22.83	9	9.78	2	2.17	1	1.09	0	0.00	5	5.43	1	1.09	6	6.52	0	0.00	2	2.17

1 「FIGO」定義：請參考 107 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之三 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按 FIGO 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	213	196	92.02	5	2.35	1	0.47	1	0.47	6	2.82	2	0.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.94	0	0.00
0 期	189	187	98.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.06	0	0.00
1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	8	5	62.50	2	25.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	4	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	80.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 107 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之四 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按 FIGO 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2013	1798	89.32	65	3.23	17	0.84	16	0.79	72	3.58	13	0.65	5	0.25	5	0.25	3	0.15	3	0.15	16	0.79
0 期	1627	1621	99.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.12	4	0.25
1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	6	5	83.33	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	46	44	95.65	0	0.00	1	2.17	1	2.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	8	5	62.50	1	12.50	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	8	5	62.50	3	37.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	123	77	62.60	20	16.26	6	4.88	9	7.32	8	6.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.81	2	1.63
1B2 期	44	9	20.45	13	29.55	5	11.36	2	4.55	10	22.73	3	6.82	0	0.00	1	2.27	0	0.00	0	0.00	1	2.27
1B3 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	4	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00
2A1 期	4	1	25.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	14	2	14.29	7	50.00	0	0.00	0	0.00	4	28.57	0	0.00	0	0.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	47	2	4.26	7	14.89	0	0.00	3	6.38	32	68.09	2	4.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.13
3 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	3	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	14	0	0.00	2	14.29	0	0.00	0	0.00	7	50.00	0	0.00	3	21.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	14.29
4 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	60.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	20	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	4	20.00	7	35.00	0	0.00	3	15.00	1	5.00	0	0.00	4	20.00
不詳	37	27	72.97	4	10.81	2	5.41	0	0.00	1	2.70	0	0.00	1	2.70	0	0.00	1	2.70	0	0.00	1	2.70

1 「FIGO」定義：請參考 107 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之五 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按 FIGO 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1269	804	63.36	99	7.80	24	1.89	11	0.87	220	17.34	38	2.99	30	2.36	15	1.18	6	0.47	4	0.32	18	1.42
0 期	711	704	99.02	0	0.00	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.42	0	0.00	0	0.00	2	0.28	1	0.14
1 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	4	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00
1A1 期	18	17	94.44	0	0.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	10	4	40.00	4	40.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	117	57	48.72	24	20.51	8	6.84	4	3.42	18	15.38	0	0.00	6	5.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B2 期	45	2	4.44	17	37.78	3	6.67	3	6.67	16	35.56	1	2.22	2	4.44	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00
1B3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	8	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	7	87.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A1 期	14	2	14.29	4	28.57	4	28.57	0	0.00	4	28.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	23	0	0.00	11	47.83	0	0.00	0	0.00	11	47.83	0	0.00	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	118	0	0.00	16	13.56	0	0.00	1	0.85	91	77.12	1	0.85	4	3.39	1	0.85	0	0.00	0	0.00	4	3.39
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	7	0	0.00	1	14.29	0	0.00	0	0.00	5	71.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.29
3B 期	62	0	0.00	2	3.23	0	0.00	0	0.00	47	75.81	2	3.23	5	8.06	1	1.61	0	0.00	1	1.61	4	6.45
4 期	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00	2	50.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	26	0	0.00	1	3.85	0	0.00	0	0.00	16	61.54	3	11.54	3	11.54	1	3.85	2	7.69	0	0.00	0	0.00
4B 期	62	0	0.00	2	3.23	0	0.00	1	1.61	4	6.45	29	46.77	6	9.68	10	16.13	3	4.84	0	0.00	7	11.29
不詳	36	13	36.11	15	41.67	4	11.11	2	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.78	0	0.00	0	0.00	1	2.78

1 「FIGO」定義：請參考 107 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之六 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按 FIGO 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	382	127	33.25	12	3.14	14	3.66	0	0.00	84	21.99	14	3.66	100	26.18	3	0.79	21	5.50	6	1.57	1	0.26
0 期	103	100	97.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.94	1	0.97	0	0.00
1 期	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A1 期	5	3	60.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A2 期	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B 期	5	3	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B1 期	45	12	26.67	2	4.44	4	8.89	0	0.00	8	17.78	0	0.00	18	40.00	0	0.00	1	2.22	0	0.00	0	0.00
1B2 期	12	1	8.33	1	8.33	0	0.00	0	0.00	4	33.33	0	0.00	6	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1B3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A 期	6	1	16.67	1	16.67	1	16.67	0	0.00	2	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00
2A1 期	9	0	0.00	2	22.22	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	6	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2A2 期	14	0	0.00	0	0.00	2	14.29	0	0.00	9	64.29	0	0.00	3	21.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	60	0	0.00	2	3.33	1	1.67	0	0.00	32	53.33	1	1.67	22	36.67	0	0.00	1	1.67	1	1.67	0	0.00
3 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	41.67	0	0.00	7	58.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3B 期	36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	33.33	4	11.11	14	38.89	1	2.78	2	5.56	2	5.56	1	2.78
4 期	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	26	0	0.00	0	0.00	1	3.85	0	0.00	9	34.62	0	0.00	9	34.62	1	3.85	4	15.38	2	7.69	0	0.00
4B 期	23	1	4.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.35	9	39.13	6	26.09	1	4.35	5	21.74	0	0.00	0	0.00
不詳	19	5	26.32	2	10.53	3	15.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	21.05	0	0.00	5	26.32	0	0.00	0	0.00

1 「FIGO」定義：請參考 107 年度子宮頸癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 2 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之七 子宮頸癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3877	2925	75.44	181	4.67	56	1.44	28	0.72	382	9.85	67	1.73	135	3.48	23	0.59	30	0.77	15	0.39	35	0.90
0 期	2630	2612	99.32	0	0.00	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.11	0	0.00	2	0.08	7	0.27	5	0.19
I 期	528	298	56.44	71	13.45	41	7.77	17	3.22	56	10.61	4	0.76	34	6.44	1	0.19	1	0.19	2	0.38	3	0.57
II 期	373	8	2.14	94	25.20	11	2.95	8	2.14	207	55.50	1	0.27	35	9.38	1	0.27	1	0.27	1	0.27	6	1.61
III 期	119	0	0.00	5	4.20	1	0.84	0	0.00	75	63.03	3	2.52	25	21.01	3	2.52	0	0.00	2	1.68	5	4.20
IV 期	216	4	1.85	9	4.17	2	0.93	2	0.93	44	20.37	57	26.39	38	17.59	18	8.33	23	10.65	3	1.39	16	7.41
不詳	11	3	27.27	2	18.18	0	0.00	1	9.09	0	0.00	2	18.18	0	0.00	0	0.00	3	27.27	0	0.00	0	0.00

表十四之八 子宮頸癌 0-29 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	213	196	92.02	5	2.35	1	0.47	1	0.47	6	2.82	2	0.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.94	0	0.00
0 期	189	187	98.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.06	0	0.00
I 期	15	9	60.00	2	13.33	0	0.00	1	6.67	2	13.33	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	7	0	0.00	2	28.57	1	14.29	0	0.00	4	57.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IV 期	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不詳	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之九 子宮頸癌 30-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2013	1798	89.32	65	3.23	17	0.84	16	0.79	72	3.58	13	0.65	5	0.25	5	0.25	3	0.15	3	0.15	16	0.79
0 期	1627	1621	99.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.12	4	0.25
I 期	251	172	68.53	28	11.16	16	6.37	10	3.98	16	6.37	3	1.20	1	0.40	1	0.40	0	0.00	1	0.40	3	1.20
II 期	81	3	3.70	30	37.04	0	0.00	5	6.17	40	49.38	0	0.00	0	0.00	1	1.23	0	0.00	0	0.00	2	2.47
III 期	17	0	0.00	3	17.65	1	5.88	0	0.00	9	52.94	0	0.00	3	17.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88
IV 期	32	0	0.00	3	9.38	0	0.00	0	0.00	7	21.88	9	28.13	1	3.13	3	9.38	3	9.38	0	0.00	6	18.75
不詳	5	2	40.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十四之十 子宮頸癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1269	804	63.36	99	7.80	24	1.89	11	0.87	220	17.34	38	2.99	30	2.36	15	1.18	6	0.47	4	0.32	18	1.42
0 期	711	704	99.02	0	0.00	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.42	0	0.00	0	0.00	2	0.28	1	0.14
I 期	192	95	49.48	37	19.27	17	8.85	6	3.13	28	14.58	0	0.00	8	4.17	0	0.00	0	0.00	1	0.52	0	0.00
II 期	191	2	1.05	54	28.27	5	2.62	3	1.57	119	62.30	0	0.00	4	2.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.09
III 期	60	0	0.00	2	3.33	0	0.00	0	0.00	48	80.00	1	1.67	4	6.67	2	3.33	0	0.00	0	0.00	3	5.00
IV 期	113	3	2.65	5	4.42	1	0.88	2	1.77	25	22.12	36	31.86	11	9.73	13	11.50	6	5.31	1	0.88	10	8.85
不詳	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮頸癌

表十四之十一 子宮頸癌 70 歲以上發生人數按整併期別1及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療與放療		手術合併放療		手術合併化療		同步化療與放療		非同步化療與放療		放療		化療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	382	127	33.25	12	3.14	14	3.66	0	0.00	84	21.99	14	3.66	100	26.18	3	0.79	21	5.50	6	1.57	1	0.26
0 期	103	100	97.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.94	1	0.97	0	0.00
I 期	70	22	31.43	4	5.71	8	11.43	0	0.00	10	14.29	0	0.00	25	35.71	0	0.00	1	1.43	0	0.00	0	0.00
II 期	94	3	3.19	8	8.51	5	5.32	0	0.00	44	46.81	1	1.06	31	32.98	0	0.00	1	1.06	1	1.06	0	0.00
III 期	42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	42.86	2	4.76	18	42.86	1	2.38	0	0.00	2	4.76	1	2.38
IV 期	69	1	1.45	0	0.00	1	1.45	0	0.00	12	17.39	11	15.94	26	37.68	2	2.90	14	20.29	2	2.90	0	0.00
不詳	4	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Cervix Uteri
C530–C539
(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)
[SEER Note:**Do not code** dilation and curettage (D&C) as Surgery of Primary Site **for invasive cancers**]

Codes
00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
10 Local tumor destruction, NOS
11 Photodynamic therapy (PDT)
12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
13 Cryosurgery
15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)
16 Laser ablation
17 Thermal ablation
No specimen sent to pathology from surgical events 10–17

20 Local tumor excision, NOS
[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement. Procedures in code 20 include but are not limited to: cryosurgery, electrocautery, excisional biopsy, laser ablation, or thermal ablation.]
26 Excisional biopsy, NOS
27 Cone biopsy
24 Cone biopsy WITH gross excision of lesion
29 Trachelectomy(**radical**); removal of cervical stump; cervicectomy
Any combination of 20, 24, 26, 27 or 29 WITH
21 Electrocautery
22 Cryosurgery
23 Laser ablation or excision
25 Dilatation and curettage; endocervical curettage (for in situ only)
28 Loop electrocautery excision procedure (LEEP)
30 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tubes and ovaries
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also include a portion of vaginal cuff
40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tubes and/or ovary
Total hysterectomy removes both the corpus and the cervix uteri and may also
50 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy
51 Modified radical hysterectomy
52 Extended hysterectomy
53 Radical hysterectomy; Wertheim procedure
54 Extended radical hysterectomy
60 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tubes and ovaries
61 WITHOUT removal of tubes and ovaries
62 WITH removal of tubes and ovaries
70 Pelvic exenteration
71 Anterior exenteration
Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

72 Posterior exenteration
Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.
[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

73 Total exenteration
Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.
[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

74 Extended exenteration
Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-74.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

子宮體癌

表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2726	100.00	-	-	2726	100.00	1775	100.00	951	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.06	0	0.00
20-24 歲	6	0.22	-	-	6	0.22	5	0.28	1	0.11
25-29 歲	25	0.92	-	-	25	0.92	20	1.13	5	0.53
30-34 歲	69	2.53	-	-	69	2.53	49	2.76	20	2.10
35-39 歲	140	5.14	-	-	140	5.14	96	5.41	44	4.63
40-44 歲	214	7.85	-	-	214	7.85	134	7.55	80	8.41
45-49 歲	379	13.90	-	-	379	13.90	243	13.69	136	14.30
50-54 歲	474	17.39	-	-	474	17.39	328	18.48	146	15.35
55-59 歲	544	19.96	-	-	544	19.96	345	19.44	199	20.93
60-64 歲	360	13.21	-	-	360	13.21	230	12.96	130	13.67
65-69 歲	252	9.24	-	-	252	9.24	165	9.30	87	9.15
70-74 歲	125	4.59	-	-	125	4.59	69	3.89	56	5.89
75-79 歲	77	2.82	-	-	77	2.82	47	2.65	30	3.15
80-84 歲	37	1.36	-	-	37	1.36	26	1.46	11	1.16
85 歲以上	23	0.84	-	-	23	0.84	17	0.96	6	0.63
FIGO 期別 [1]										
0 期	131	4.81	-	-	131	4.81	105	5.92	26	2.73
1 期	10	0.37	-	-	10	0.37	3	0.17	7	0.74
1A 期	1093	40.10	-	-	1093	40.10	659	37.13	434	45.64
1B 期	329	12.07	-	-	329	12.S07	195	10.99	134	14.09
1C 期	3	0.11	-	-	3	0.11	2	0.11	1	0.11
2 期	108	3.96	-	-	108	3.96	61	3.44	47	4.94
2A 期	1	0.04	-	-	1	0.04	0	0.00	1	0.11
2B 期	6	0.22	-	-	6	0.22	5	0.28	1	0.11
3 期	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.06	0	0.00
3A 期	91	3.34	-	-	91	3.34	57	3.21	34	3.58
3B 期	18	0.66	-	-	18	0.66	14	0.79	4	0.42
3C 期	2	0.07	-	-	2	0.07	1	0.06	1	0.11
3C1 期	105	3.85	-	-	105	3.85	61	3.44	44	4.63
3C2 期	61	2.24	-	-	61	2.24	40	2.25	21	2.21
4 期	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.06	0	0.00
4A 期	5	0.18	-	-	5	0.18	3	0.17	2	0.21
4B 期	116	4.26	-	-	116	4.26	75	4.23	41	4.31
不詳	645	23.66	-	-	645	23.66	492	27.72	153	16.09

表十五之一 子宮體癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2726	100.00	-	-	2726	100.00	1775	100.00	951	100.00
臨床期別										
0 期	131	4.81	-	-	131	4.81	105	5.92	26	2.73
I 期	1621	59.46	-	-	1621	59.46	1057	59.55	564	59.31
II 期	143	5.25	-	-	143	5.25	90	5.07	53	5.57
III 期	245	8.99	-	-	245	8.99	166	9.35	79	8.31
IV 期	174	6.38	-	-	174	6.38	121	6.82	53	5.57
不詳	412	15.11	-	-	412	15.11	236	13.30	176	18.51
病理期別										
0 期	131	4.81	-	-	131	4.81	105	5.92	26	2.73
I 期	1736	63.68	-	-	1736	63.68	1110	62.54	626	65.83
II 期	144	5.28	-	-	144	5.28	87	4.90	57	5.99
III 期	349	12.80	-	-	349	12.80	240	13.52	109	11.46
IV 期	172	6.31	-	-	172	6.31	117	6.59	55	5.78
不詳	194	7.12	-	-	194	7.12	116	6.54	78	8.20
整併期別 [2]										
0 期	131	4.81	-	-	131	4.81	105	5.92	26	2.73
I 期	1803	66.14	-	-	1803	66.14	1160	65.35	643	67.61
II 期	147	5.39	-	-	147	5.39	90	5.07	57	5.99
III 期	364	13.35	-	-	364	13.35	246	13.86	118	12.41
IV 期	213	7.81	-	-	213	7.81	145	8.17	68	7.15
不詳	68	2.49	-	-	68	2.49	29	1.63	39	4.10
臨床與病理期別一致性										
Kappa[3]		0.7129								
治療方式 [4,5,6]										
手術	1306	47.91	-	-	1306	47.91	850	47.89	456	47.95
手術合併化療，有/無標靶治療	280	10.27	-	-	280	10.27	181	10.20	99	10.41
手術合併放療	441	16.18	-	-	441	16.18	272	15.32	169	17.77
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	343	12.58	-	-	343	12.58	234	13.18	109	11.46
手術合併內分泌治療	128	4.70	-	-	128	4.70	71	4.00	57	5.99
化療	39	1.43	-	-	39	1.43	27	1.52	12	1.26
放療	21	0.77	-	-	21	0.77	18	1.01	3	0.32
內分泌治療	52	1.91	-	-	52	1.91	39	2.20	13	1.37
緩和治療	10	0.37	-	-	10	0.37	6	0.34	4	0.42
未治療	3	0.11	-	-	3	0.11	0	0.00	3	0.32
其他治療	103	3.78	-	-	103	3.78	77	4.34	26	2.73
組織型態										
子宮內膜癌	2288	83.93	-	-	2288	83.93	1471	82.87	817	85.91
惡性 Muller 氏混合性腫瘤	137	5.03	-	-	137	5.03	91	5.13	46	4.84
子宮內膜原位癌	131	4.81	-	-	131	4.81	105	5.92	26	2.73
絨毛膜癌	2	0.07	-	-	2	0.07	1	0.06	1	0.11
其他特定上皮癌	2	0.07	-	-	2	0.07	2	0.11	0	0.00
非特定上皮癌	10	0.37	-	-	10	0.37	6	0.34	4	0.42
平滑肌肉瘤	87	3.19	-	-	87	3.19	53	2.99	34	3.58
子宮內膜基質肉瘤	54	1.98	-	-	54	1.98	36	2.03	18	1.89
其他惡性肉瘤	9	0.33	-	-	9	0.33	8	0.45	1	0.11
其他惡性腫瘤	6	0.22	-	-	6	0.22	2	0.11	4	0.42

註 1：FIGO 期別*-請參考 107 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。
註 2：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。
註 4：參考後續治療方式相關表格之附註。
註 5：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。
註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

子宮體癌

表十五之二 子宮體癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		手術合併內分泌治療		化療		放療		內分泌治療	緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2726	1306	47.91	280	10.27	441	16.18	343	12.58	128	4.70	39	1.43	21	0.77	52	10	0.37	3	0.11	103	3.78
0 期	131	83	63.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29	22.14	0	0.00	0	0.00	9	0	0.00	1	0.76	9	6.87
I 期	1803	1120	62.12	113	6.27	328	18.19	63	3.49	82	4.55	0	0.00	15	0.83	38	1	0.06	0	0.00	43	2.38
II 期	147	16	10.88	17	11.56	80	54.42	21	14.29	4	2.72	0	0.00	1	0.68	0	1	0.68	0	0.00	7	4.76
III 期	364	25	6.87	77	21.15	21	5.77	212	58.24	4	1.10	2	0.55	1	0.27	0	1	0.27	0	0.00	21	5.77
IV 期	213	26	12.21	65	30.52	5	2.35	44	20.66	1	0.47	36	16.90	4	1.88	2	7	3.29	2	0.94	21	9.86
不詳	68	36	52.94	8	11.76	7	10.29	3	4.41	8	11.76	1	1.47	0	0.00	3	0	0.00	0	0.00	2	2.94

表十五之三 子宮體癌 0-39 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		手術合併內分泌治療		化療		放療		內分泌治療	緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	241	100	41.49	14	5.81	15	6.22	14	5.81	33	13.69	2	0.83	1	0.41	37	0	0.00	1	0.41	24	9.96
0 期	34	12	35.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	32.35	0	0.00	0	0.00	6	0	0.00	1	2.94	4	11.76
I 期	165	83	50.30	5	3.03	12	7.27	2	1.21	19	11.52	0	0.00	0	0.00	30	0	0.00	0	0.00	14	8.48
II 期	10	2	20.00	1	10.00	3	30.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00	1	10.00	0	0	0.00	0	0.00	1	10.00
III 期	15	0	0.00	4	26.67	0	0.00	8	53.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	3	20.00
IV 期	12	2	16.67	3	25.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00	2	16.67	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	2	16.67
不詳	5	1	20.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十五之四 子宮體癌 40-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		手術合併內分泌治療		化療		放療		內分泌治療	緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1611	851	52.82	166	10.30	223	13.84	197	12.23	82	5.09	22	1.37	4	0.25	13	0.81	2	0.12	1	0.06	50	3.10
0 期	90	64	71.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	20.00	0	0.00	0	0.00	3	3.33	0	0.00	0	0.00	5	5.56
I 期	1066	720	67.54	68	6.38	160	15.01	35	3.28	52	4.88	0	0.00	3	0.28	7	0.66	0	0.00	0	0.00	21	1.97
II 期	78	10	12.82	6	7.69	43	55.13	11	14.10	3	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	6.41
III 期	206	18	8.74	44	21.36	12	5.83	122	59.22	2	0.97	0	0.00	1	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	3.40
IV 期	123	12	9.76	43	34.96	3	2.44	27	21.95	1	0.81	21	17.07	0	0.00	1	0.81	2	1.63	1	0.81	12	9.76
不詳	48	27	56.25	5	10.42	5	10.42	2	4.17	6	12.50	1	2.08	0	0.00	2	4.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十五之五 子宮體癌 60 歲以上發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	手術 [2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		手術合併內分泌治療		化療		放療		內分泌治療	緩和治療 [3]		未治療 [4]		其他治療 [5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%		申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	874	355	40.62	100	11.44	203	23.23	132	15.10	13	1.49	15	1.72	16	1.83	2	0.23	8	0.92	1	0.11	29	3.32
0 期	7	7	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
I 期	572	317	55.42	40	6.99	156	27.27	26	4.55	11	1.92	0	0.00	12	2.10	1	0.17	1	0.17	0	0.00	8	1.40
II 期	59	4	6.78	10	16.95	34	57.63	9	15.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.69	0	0.00	1	1.69
III 期	143	7	4.90	29	20.28	9	6.29	82	57.34	2	1.40	2	1.40	0	0.00	0	0.00	1	0.70	0	0.00	11	7.69
IV 期	78	12	15.38	19	24.36	2	2.56	14	17.95	0	0.00	13	16.67	4	5.13	1	1.28	5	6.41	1	1.28	7	8.97
不詳	15	8	53.33	2	13.33	2	13.33	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	13.33

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

子宮體癌

表十五之六 子宮體癌發生人數按 FIGO 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		手術合併內分泌治療		化療		放療		內分泌治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%			申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2726	1306	47.91	280	10.27	441	16.18	343	12.58	128	4.70	39	1.43	21	0.77	52	1.91	10	0.37	3	0.11	103	3.78
0 期	131	83	63.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29	22.14	0	0.00	0	0.00	9	6.87	0	0.00	1	0.76	9	6.87
1 期	10	6	60.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1A 期	1093	804	73.56	62	5.67	146	13.36	28	2.56	46	4.21	0	0.00	0	0.00	1	0.09	0	0.00	0	0.00	6	0.55
1B 期	329	75	22.80	36	10.94	158	48.02	34	10.33	14	4.26	0	0.00	0	0.00	1	0.30	0	0.00	0	0.00	11	3.34
1C 期	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2 期	108	9	8.33	12	11.11	66	61.11	16	14.81	1	0.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.70
2A 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2B 期	6	1	16.67	0	0.00	4	66.67	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 期	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3A 期	91	8	8.79	24	26.37	9	9.89	44	48.35	1	1.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	5.49
3B 期	18	3	16.67	6	33.33	2	11.11	6	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.56
3C 期	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3C1 期	105	7	6.67	19	18.10	5	4.76	70	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.81
3C2 期	61	5	8.20	11	18.03	1	1.64	39	63.93	1	1.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	6.56
4 期	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4A 期	5	2	40.00	2	40.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4B 期	116	16	13.79	48	41.38	2	1.72	32	27.59	0	0.00	8	6.90	1	0.86	0	0.00	0	0.00	1	0.86	8	6.90
不詳	645	285	44.19	55	8.53	46	7.13	72	11.16	34	5.27	31	4.81	20	3.10	40	6.20	10	1.55	1	0.16	51	7.91

1 「FIGO 期別」-請參考 107 年度子宮體癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Corpus Uteri
C540–C559
(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes
00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
19 Local tumor destruction or excision, NOS
Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 19 (principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)

10 Local tumor destruction, NOS
- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser
- 15 Loop Electrocautery Excision Procedure (LEEP)
- 16 Thermal ablation

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS; simple excision, NOS
- 24 Excisional biopsy
- 25 Polypectomy
- 26 Myomectomy

Any combination of 20 or 24–26 WITH
- 21 Electrocautery
- 22 Cryosurgery
- 23 Laser ablation or excision

[SEER Note: Margins of resection may have microscopic involvement]

30 Subtotal hysterectomy/supracervical hysterectomy/fundectomy WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
- 31 WITHOUT tube(s) and ovary(ies)
- 32 WITH tube(s) and ovary(ies)

[SEER Note:For these procedures, the cervix is left in place]

40 Total hysterectomy (simple, pan-) WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

50 Total hysterectomy (simple, pan-) WITH removal of tube(s) and/or ovary(ies)
Removes both the corpus and cervix uteri. It may also include a portion of the vaginal cuff.

60 Modified radical or extended hysterectomy; radical hysterectomy; extended radical hysterectomy
- 61 Modified radical hysterectomy
- 62 Extended hysterectomy
- 63 Radical hysterectomy; Wertheim procedure
  [SEER Note:Use code 63 for “Type III” hysterectomy]
- 64 Extended radical hysterectomy

65 Hysterectomy, NOS, WITH or WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
- 66 WITHOUT removal of tube(s) and ovary(ies)
- 67 WITH removal of tube(s) and ovary(ies)

75 Pelvic exenteration

76 Anterior exenteration

Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

77 Posterior exenteration

Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

78 Total exenteration

Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.

[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site]

79 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

Specimen sent to pathology from surgical events 20-79.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

卵巢癌

表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1446	100.00	-	-	1446	100.00	951	100.00	495	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	3	0.21	-	-	3	0.21	2	0.21	1	0.20
10-14 歲	7	0.48	-	-	7	0.48	4	0.42	3	0.61
15-19 歲	16	1.11	-	-	16	1.11	10	1.05	6	1.21
20-24 歲	20	1.38	-	-	20	1.38	13	1.37	7	1.41
25-29 歲	36	2.49	-	-	36	2.49	22	2.31	14	2.83
30-34 歲	66	4.56	-	-	66	4.56	48	5.05	18	3.64
35-39 歲	103	7.12	-	-	103	7.12	63	6.62	40	8.08
40-44 歲	109	7.54	-	-	109	7.54	76	7.99	33	6.67
45-49 歲	159	11.00	-	-	159	11.00	103	10.83	56	11.31
50-54 歲	254	17.57	-	-	254	17.57	172	18.09	82	16.57
55-59 歲	201	13.90	-	-	201	13.90	139	14.62	62	12.53
60-64 歲	194	13.42	-	-	194	13.42	127	13.35	67	13.54
65-69 歲	115	7.95	-	-	115	7.95	79	8.31	36	7.27
70-74 歲	68	4.70	-	-	68	4.70	45	4.73	23	4.65
75-79 歲	46	3.18	-	-	46	3.18	28	2.94	18	3.64
80-84 歲	29	2.01	-	-	29	2.01	13	1.37	16	3.23
85 歲以上	20	1.38	-	-	20	1.38	7	0.74	13	2.63
FIGO 期別 [1]										
1 期	3	0.21	-	-	3	0.21	1	0.11	2	0.40
1A 期	268	18.53	-	-	268	18.53	182	19.14	86	17.37
1B 期	19	1.31	-	-	19	1.31	11	1.16	8	1.62
1C 期	23	1.59	-	-	23	1.59	9	0.95	14	2.83
1C1 期	159	11.00	-	-	159	11.00	113	11.88	46	9.29
1C2 期	85	5.88	-	-	85	5.88	61	6.41	24	4.85
1C3 期	51	3.53	-	-	51	3.53	32	3.36	19	3.84
2A 期	38	2.63	-	-	38	2.63	29	3.05	9	1.82
2B 期	72	4.98	-	-	72	4.98	49	5.15	23	4.65
3 期	1	0.07	-	-	1	0.07	1	0.11	0	0.00
3A 期	2	0.14	-	-	2	0.14	1	0.11	1	0.20
3A1 期	52	3.60	-	-	52	3.60	43	4.52	9	1.82
3A2 期	36	2.49	-	-	36	2.49	25	2.63	11	2.22
3B 期	71	4.91	-	-	71	4.91	41	4.31	30	6.06
3C 期	217	15.01	-	-	217	15.01	159	16.72	58	11.72
4 期	11	0.76	-	-	11	0.76	7	0.74	4	0.81
4A 期	31	2.14	-	-	31	2.14	22	2.31	9	1.82
4B 期	106	7.33	-	-	106	7.33	77	8.10	29	5.86
不詳	201	13.90	-	-	201	13.90	88	9.25	113	22.83

表十六之一 卵巢癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	1446	100.00	-	-	1446	100.00	951	100.00	495	100.00
臨床期別										
I 期	466	32.23	-	-	466	32.23	298	31.34	168	33.94
II 期	76	5.26	-	-	76	5.26	47	4.94	29	5.86
III 期	358	24.76	-	-	358	24.76	252	26.50	106	21.41
IV 期	198	13.69	-	-	198	13.69	126	13.25	72	14.55
不詳	348	24.07	-	-	348	24.07	228	23.97	120	24.24
病理期別										
I 期	630	43.57	-	-	630	43.57	407	42.80	223	45.05
II 期	119	8.23	-	-	119	8.23	81	8.52	38	7.68
III 期	373	25.80	-	-	373	25.80	268	28.18	105	21.21
IV 期	181	12.52	-	-	181	12.52	119	12.51	62	12.53
不詳	143	9.89	-	-	143	9.89	76	7.99	67	13.54
整併期別 [2]										
I 期	631	43.64	-	-	631	43.64	405	42.59	226	45.66
II 期	118	8.16	-	-	118	8.16	80	8.41	38	7.68
III 期	429	29.67	-	-	429	29.67	302	31.76	127	25.66
IV 期	218	15.08	-	-	218	15.08	134	14.09	84	16.97
不詳	50	3.46	-	-	50	3.46	30	3.15	20	4.04
臨床與病理期別一致性										
Kappa[3]		0.7657								
治療方式 [4,5]										
手術	291	20.12	-	-	291	20.12	191	20.08	100	20.20
手術合併化療	827	57.19	-	-	827	57.19	535	56.26	292	58.99
手術合併化療與標靶治療	156	10.79	-	-	156	10.79	126	13.25	30	6.06
手術合併化療與放療	22	1.52	-	-	22	1.52	15	1.58	7	1.41
化療或/與標靶治療	83	5.74	-	-	83	5.74	48	5.05	35	7.07
緩和治療	25	1.73	-	-	25	1.73	10	1.05	15	3.03
其他治療	42	2.90	-	-	42	2.90	26	2.73	16	3.23
組織型態										
漿液性腺癌	444	30.71	-	-	444	30.71	296	31.13	148	29.90
黏液性腺癌	158	10.93	-	-	158	10.93	106	11.15	52	10.51
子宮內膜樣癌	228	15.77	-	-	228	15.77	143	15.04	85	17.17
明亮細胞癌	284	19.64	-	-	284	19.64	204	21.45	80	16.16
混合細胞腺癌	51	3.53	-	-	51	3.53	36	3.79	15	3.03
非特定腺癌	64	4.43	-	-	64	4.43	39	4.10	25	5.05
生殖細胞瘤	59	4.08	-	-	59	4.08	39	4.10	20	4.04
性索間質腫瘤	74	5.12	-	-	74	5.12	37	3.89	37	7.47
其他特定上皮癌	30	2.07	-	-	30	2.07	24	2.52	6	1.21
非特定上皮癌	38	2.63	-	-	38	2.63	19	2.00	19	3.84
惡性肉瘤	4	0.28	-	-	4	0.28	3	0.32	1	0.20
其他惡性腫瘤	12	0.83	-	-	12	0.83	5	0.53	7	1.41

註 1：FIGO 期別*-請參考 107 年度子宮體癌及卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

註 2：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 5：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

卵巢癌

表十六之二 卵巢癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		其他治療[4]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1446	291	20.12	827	57.19	156	10.79	22	1.52	83	5.74	25	1.73	42	2.90
I 期	631	219	34.71	385	61.01	8	1.27	5	0.79	0	0.00	1	0.16	13	2.06
II 期	118	6	5.08	96	81.36	10	8.47	3	2.54	1	0.85	0	0.00	2	1.69
III 期	429	25	5.83	245	57.11	96	22.38	6	1.40	36	8.39	8	1.86	13	3.03
IV 期	218	12	5.50	85	38.99	42	19.27	8	3.67	44	20.18	15	6.88	12	5.50
不詳	50	29	58.00	16	32.00	0	0.00	0	0.00	2	4.00	1	2.00	2	4.00

表十六之三 卵巢癌 0-39 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		其他治療[4]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	251	91	36.25	130	51.79	11	4.38	3	1.20	7	2.79	0	0.00	9	3.59
I 期	166	74	44.58	81	48.80	2	1.20	3	1.81	0	0.00	0	0.00	6	3.61
II 期	17	1	5.88	14	82.35	2	11.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
III 期	39	3	7.69	28	71.79	4	10.26	0	0.00	4	10.26	0	0.00	0	0.00
IV 期	12	1	8.33	3	25.00	3	25.00	0	0.00	3	25.00	0	0.00	2	16.67
不詳	17	12	70.59	4	23.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.88

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十六之四 卵巢癌 40-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		其他治療[4]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	723	131	18.12	448	61.96	85	11.76	13	1.80	25	3.46	2	0.28	19	2.63
I 期	326	96	29.45	220	67.48	5	1.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1.53
II 期	69	3	4.35	57	82.61	5	7.25	3	4.35	0	0.00	0	0.00	1	1.45
III 期	212	13	6.13	121	57.08	55	25.94	5	2.36	9	4.25	1	0.47	8	3.77
IV 期	97	6	6.19	45	46.39	20	20.62	5	5.15	15	15.46	1	1.03	5	5.15
不詳	19	13	68.42	5	26.32	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	0.00

表十六之五 卵巢癌 60 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		其他治療[4]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	472	69	14.62	249	52.75	60	12.71	6	1.27	51	10.81	23	4.87	14	2.97
I 期	139	49	35.25	84	60.43	1	0.72	2	1.44	0	0.00	1	0.72	2	1.44
II 期	32	2	6.25	25	78.13	3	9.38	0	0.00	1	3.13	0	0.00	1	3.13
III 期	178	9	5.06	96	53.93	37	20.79	1	0.56	23	12.92	7	3.93	5	2.81
IV 期	109	5	4.59	37	33.94	19	17.43	3	2.75	26	23.85	14	12.84	5	4.59
不詳	14	4	28.57	7	50.00	0	0.00	0	0.00	1	7.14	1	7.14	1	7.14

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

卵巢癌

表十六之六 卵巢癌發生人數按 FIGO 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療		手術合併化療與標靶治療		手術合併化療與放療		化療或/與標靶治療		緩和治療[3]		其他治療[4]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1446	291	20.12	827	57.19	156	10.79	22	1.52	83	5.74	25	1.73	42	2.9
1 期	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1A 期	268	154	57.46	106	39.55	2	0.75	1	0.37	0	0	0	0	5	1.87
1B 期	19	5	26.32	14	73.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1C 期	23	4	17.39	18	78.26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.35
1C1 期	159	33	20.75	118	74.21	3	1.89	2	1.26	0	0	0	0	3	1.89
1C2 期	85	8	9.41	70	82.35	3	3.53	2	2.35	0	0	0	0	2	2.35
1C3 期	51	3	5.88	46	90.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.92
2A 期	38	1	2.63	32	84.21	5	13.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2B 期	72	4	5.56	58	80.56	6	8.33	3	4.17	0	0	0	0	1	1.39
3 期	1	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3A 期	2	0	0	1	50	0	0	0	0	1	50	0	0	0	0
3A1 期	52	4	7.69	36	69.23	8	15.38	2	3.85	0	0	0	0	2	3.85
3A2 期	36	0	0	25	69.44	8	22.22	1	2.78	0	0	0	0	2	5.56
3B 期	71	5	7.04	43	60.56	17	23.94	3	4.23	1	1.41	0	0	2	2.82
3C 期	217	15	6.91	127	58.53	61	28.11	2	0.92	4	1.84	2	0.92	6	2.76
4 期	11	1	9.09	4	36.36	0	0	1	9.09	2	18.18	1	9.09	2	18.18
4A 期	31	2	6.45	12	38.71	9	29.03	0	0	6	19.35	1	3.23	1	3.23
4B 期	106	6	5.66	53	50	28	26.42	3	2.83	9	8.49	2	1.89	5	4.72
不詳	201	43	21.39	63	31.34	6	2.99	2	1.00	60	29.85	19	9.45	8	3.98

1 「FIGO 期別」-請參考 107 年度卵巢癌 FIGO 期別之流程說明，如圖 3 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Ovary
C569
(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes
00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
17 Local tumor destruction, NOS
No specimen sent to pathology from surgical event 17

25 Total removal of tumor or (single) ovary, NOS
26 Resection of ovary (wedge, subtotal, or partial) ONLY, NOS; unknown if hysterectomy done
27 WITHOUT hysterectomy
28 WITH hysterectomy
35 Unilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done
36 WITHOUT hysterectomy
37 WITH hysterectomy
[SEER Note*:* Use code 37 for current unilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]
50 Bilateral (salpingo-) oophorectomy; unknown if hysterectomy done
51 WITHOUT hysterectomy
52 WITH hysterectomy
[SEER Note*:* Use code 52 for current bilateral (salpingo-) oophorectomy with previous history of hysterectomy.]
55 Unilateral or bilateral (salpingo-) oophorectomy WITH OMENTECTOMY, NOS; partial or total; unknown if hysterectomy done
56 WITHOUT hysterectomy
57 WITH hysterectomy
60 Debulking; cytoreductive surgery, NOS
61 WITH colon (including appendix) and/or small intestine resection (not incidental)
62 WITH partial resection of urinary tract (not incidental)
63 Combination of 61 and 62
Debulking is a partial or total removal of the tumor mass and can involve the removal of multiple organ sites. It may include removal of ovaries and/or the uterus (a hysterectomy). The pathology report may or may not identify ovarian tissue. A debulking is usually followed by another treatment modality such as chemotherapy.
[SEER Note:Debulking or cytoreductive surgery is implied by the following phrases in the operative report, pathology report, discharge summary, or consultation.
(This is not intended to be a complete list. Other phrases may also imply debulking).
Adjuvant treatment pending surgical reduction of tumor
Ovaries, tubes buried in tumor
Tumor burden
Tumor cakes
Very large tumor mass
Do not code debulking or cytoreductive surgery based on: multiple biopsies alone, the mention of "multiple tissue fragments" or "removal of multiple implants." Multiple biopsies and multiple specimens confirm the presence or absence of metastasis.]

70 Pelvic exenteration, NOS

71 Anterior exenteration

Includes bladder, distal ureters, and genital organs WITH their ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

72 Posterior exenteration

Includes rectum and rectosigmoid WITH ligamentous attachments and pelvic lymph nodes.

[SEER Note: Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

73 Total exenteration

Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes.

[SEER Note:Do not code removal of pelvic lymph nodes under Surgical Procedure/Other Site.]

74 Extended exenteration

Includes pelvic blood vessels or bony pelvis

80 (Salpingo-) oophorectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 25-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

攝護腺癌

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6020	100.00	6020	100.00	-	-	3356	100.00	2664	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
30-34 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
35-39 歲	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0	0.00
40-44 歲	7	0.12	7	0.12	-	-	5	0.15	2	0.08
45-49 歲	23	0.38	23	0.38	-	-	16	0.48	7	0.26
50-54 歲	84	1.40	84	1.40	-	-	55	1.64	29	1.09
55-59 歲	307	5.10	307	5.10	-	-	195	5.81	112	4.20
60-64 歲	745	12.38	745	12.38	-	-	472	14.06	273	10.25
65-69 歲	1251	20.78	1251	20.78	-	-	756	22.53	495	18.58
70-74 歲	1147	19.05	1147	19.05	-	-	667	19.87	480	18.02
75-79 歲	1138	18.90	1138	18.90	-	-	571	17.01	567	21.28
80-84 歲	741	12.31	741	12.31	-	-	349	10.40	392	14.71
85 歲以上	577	9.58	577	9.58	-	-	270	8.05	307	11.52
臨床期別										
I 期	615	10.22	615	10.22	-	-	357	10.64	258	9.68
II 期	1515	25.17	1515	25.17	-	-	937	27.92	578	21.70
III 期	1771	29.42	1771	29.42	-	-	975	29.05	796	29.88
IV 期	1863	30.95	1863	30.95	-	-	999	29.77	864	32.43
不詳	256	4.25	256	4.25	-	-	88	2.62	168	6.31
病理期別										
I 期	147	2.44	147	2.44	-	-	105	3.13	42	1.58
II 期	633	10.51	633	10.51	-	-	446	13.29	187	7.02
III 期	799	13.27	799	13.27	-	-	534	15.91	265	9.95
IV 期	300	4.98	300	4.98	-	-	171	5.10	129	4.84
不詳	4141	68.79	4141	68.79	-	-	2100	62.57	2041	76.61
整併期別 [1]										
I 期	591	9.82	591	9.82	-	-	331	9.86	260	9.76
II 期	1386	23.02	1386	23.02	-	-	855	25.48	531	19.93
III 期	1944	32.29	1944	32.29	-	-	1083	32.27	861	32.32
IV 期	1932	32.09	1932	32.09	-	-	1043	31.08	889	33.37
不詳	167	2.77	167	2.77	-	-	44	1.31	123	4.62

表十七之一 攝護腺癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	6020	100.00	6020	100.00	-	-	3356	100.00	2664	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5137								
治療方式[3,4,5]										
根除性手術	1365	22.67	1365	22.67	-	-	968	28.84	397	14.90
冷凍療法	4	0.07	4	0.07	-	-	3	0.09	1	0.04
HIFU	55	0.91	55	0.91	-	-	51	1.52	4	0.15
雷射治療	280	4.65	280	4.65	-	-	137	4.08	143	5.37
TURP/其他手術	261	4.34	261	4.34	-	-	132	3.93	129	4.84
根除性手術合併內分泌治療，有/無放療	360	5.98	360	5.98	-	-	199	5.93	161	6.04
HIFU 合併內分泌治療，有/無放療	36	0.60	36	0.60	-	-	29	0.86	7	0.26
雷射合併內分泌治療，有/無放療	399	6.63	399	6.63	-	-	168	5.01	231	8.67
TURP 合併內分泌治療，有/無放療	535	8.89	535	8.89	-	-	202	6.02	333	12.50
雷射或 TURP 合併化療與內分泌治療	27	0.45	27	0.45	-	-	19	0.57	8	0.30
放療	93	1.54	93	1.54	-	-	48	1.43	45	1.69
內分泌治療	1097	18.22	1097	18.22	-	-	574	17.10	523	19.63
放療合併內分泌治療	1004	16.68	1004	16.68	-	-	508	15.14	496	18.62
化療合併內分泌治療	95	1.58	95	1.58	-	-	64	1.91	31	1.16
化療合併放療與內分泌治療	30	0.50	30	0.50	-	-	21	0.63	9	0.34
緩和治療	19	0.32	19	0.32	-	-	9	0.27	10	0.38
未治療	206	3.42	206	3.42	-	-	150	4.47	56	2.10
拒絕治療	9	0.15	9	0.15	-	-	2	0.06	7	0.26
其他治療	145	2.41	145	2.41	-	-	72	2.15	73	2.74
組織型態										
腺癌	5943	98.72	5943	98.72	-	-	3333	99.31	2610	97.97
泌尿上皮癌	1	0.02	1	0.02	-	-	0	0.00	1	0.04
鱗狀細胞癌	1	0.02	1	0.02	-	-	0	0.00	1	0.04
神經內分泌癌	10	0.17	10	0.17	-	-	5	0.15	5	0.19
非特定上皮癌	21	0.35	21	0.35	-	-	8	0.24	13	0.49
惡性肉瘤	2	0.03	2	0.03	-	-	2	0.06	0	0.00
其他惡性腫瘤	42	0.70	42	0.70	-	-	8	0.24	34	1.28

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 5：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

攝護腺癌

表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術[2]		冷凍療法[3]		HIFU[4]		雷射治療[5]		TURP/其他手術[6]		根除性手術合併內分泌治療[7]，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		雷射合併內分泌治療，有/無放療		TURP 合併內分泌治療，有/無放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	6020	1365	22.67	4	0.07	55	0.91	280	4.65	261	4.34	360	5.98	36	0.60	399	6.63	535	8.89
I 期	591	149	25.21	1	0.17	8	1.35	116	19.63	125	21.15	8	1.35	2	0.34	12	2.03	20	3.38
II 期	1386	599	43.22	3	0.22	36	2.60	83	5.99	83	5.99	37	2.67	12	0.87	55	3.97	72	5.19
III 期	1944	565	29.06	0	0.00	11	0.57	39	2.01	27	1.39	214	11.01	19	0.98	122	6.28	171	8.80
IV 期	1932	41	2.12	0	0.00	0	0.00	3	0.16	5	0.26	99	5.12	3	0.16	188	9.73	251	12.99
不詳	167	11	6.59	0	0.00	0	0.00	39	23.35	21	12.57	2	1.20	0	0.00	22	13.17	21	12.57

表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 [2]		冷凍療法 [3]		HIFU[4]		雷射治療 [5]		TURP/其他手術 [6]		根除性手術合併內分泌治療 [7]，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		雷射合併內分泌治療，有/無放療		TURP 合併內分泌治療，有/無放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	421	172	40.86	1	0.24	8	1.90	10	2.38	9	2.14	46	10.93	3	0.71	8	1.90	2	0.48
I 期	46	20	43.48	0	0.00	1	2.17	8	17.39	6	13.04	1	2.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II 期	127	85	66.93	1	0.79	4	3.15	1	0.79	1	0.79	1	0.79	2	1.57	1	0.79	1	0.79
III 期	110	59	53.64	0	0.00	3	2.73	0	0.00	0	0.00	27	24.55	1	0.91	1	0.91	1	0.91
IV 期	130	7	5.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	12.31	0	0.00	5	3.85	0	0.00
不詳	8	1	12.50	0	0.00	0	0.00	1	12.50	2	25.00	1	12.50	0	0.00	1	12.50	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.648。

3 「冷凍療法」定義針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.648。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17。術式編碼詳見 p.648。

5 「雷射治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 15 及 25。術式編碼詳見 p. 652。

6 「TURP/其他手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.648。

7 「內分泌治」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01-31 及內分泌處置編碼為 10-50。

表十七之二 攝護腺癌發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

雷射或TURP合併化療與內分泌治療		放療		內分泌治療		放療合併內分泌治療		化療合併內分泌治療		化療合併放療與內分泌治療		緩和治療[8]		未治療[9]		拒絕治療		其他治療[10]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
27	0.45	93	1.54	1097	18.22	1004	16.68	95	1.58	30	0.50	19	0.32	206	3.42	9	0.15	145	2.41
0	0.00	18	3.05	9	1.52	16	2.71	0	0.00	0	0.00	4	0.68	79	13.37	6	1.02	18	3.05
0	0.00	49	3.54	57	4.11	186	13.42	0	0.00	0	0.00	4	0.29	74	5.34	3	0.22	33	2.38
0	0.00	21	1.08	187	9.62	480	24.69	1	0.05	0	0.00	3	0.15	27	1.39	0	0.00	57	2.93
27	1.40	4	0.21	824	42.65	319	16.51	94	4.87	29	1.50	5	0.26	5	0.26	0	0.00	35	1.81
0	0.00	1	0.60	20	11.98	3	1.80	0	0.00	1	0.60	3	1.80	21	12.57	0	0.00	2	1.20

表十七之三 攝護腺癌 0-59 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

雷射或TURP合併化療與內分泌治療		放療		內分泌治療		放療合併內分泌治療		化療合併內分泌治療		化療合併放療與內分泌治療		緩和治療[8]		未治療[9]		拒絕治療		其他治療[10]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
4	0.95	5	1.19	47	11.16	53	12.59	14	3.33	8	1.90	0	0.00	20	4.75	1	0.24	10	2.38
0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	13.04	1	2.17	2	4.35
0	0.00	4	3.15	0	0.00	12	9.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	9.45	0	0.00	2	1.57
0	0.00	1	0.91	4	3.64	9	8.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.82	0	0.00	2	1.82
4	3.08	0	0.00	42	32.31	31	23.85	14	10.77	8	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.31
0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.50

8「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療，此處個案均為積極監測(active surveillance)/再密切觀察(watchful waiting)。

10「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

攝護腺癌

表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術[2]		冷凍療法[3]		HIFU[4]		雷射治療[5]		TURP/其他手術[6]		根除性手術合併內分泌治療[7]，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		雷射合併內分泌治療，有/無放療		TURP 合併內分泌治療，有/無放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	3143	1016	32.33	3	0.10	32	1.02	132	4.20	118	3.75	269	8.56	26	0.83	133	4.23	194	6.17
I 期	373	115	30.83	1	0.27	6	1.61	61	16.35	70	18.77	7	1.88	1	0.27	6	1.61	10	2.68
II 期	826	448	54.24	2	0.24	24	2.91	40	4.84	32	3.87	32	3.87	7	0.85	20	2.42	31	3.75
III 期	998	420	42.08	0	0.00	2	0.20	12	1.20	7	0.70	158	15.83	15	1.50	32	3.21	49	4.91
IV 期	873	26	2.98	0	0.00	0	0.00	2	0.23	2	0.23	71	8.13	3	0.34	66	7.56	95	10.88
不詳	73	7	9.59	0	0.00	0	0.00	17	23.29	7	9.59	1	1.37	0	0.00	9	12.33	9	12.33

表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術[2]		冷凍療法[3]		HIFU[4]		雷射治療[5]		TURP/其他手術[6]		根除性手術合併內分泌治療[7]，有/無放療		HIFU 合併內分泌治療，有/無放療		雷射合併內分泌治療，有/無放療		TURP 合併內分泌治療，有/無放療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2456	177	7.21	0	0.00	15	0.61	138	5.62	134	5.46	45	1.83	7	0.29	258	10.50	339	13.80
I 期	172	14	8.14	0	0.00	1	0.58	47	27.33	49	28.49	0	0.00	1	0.58	6	3.49	10	5.81
II 期	433	66	15.24	0	0.00	8	1.85	42	9.70	50	11.55	4	0.92	3	0.69	34	7.85	40	9.24
III 期	836	86	10.29	0	0.00	6	0.72	27	3.23	20	2.39	29	3.47	3	0.36	89	10.65	121	14.47
IV 期	929	8	0.86	0	0.00	0	0.00	1	0.11	3	0.32	12	1.29	0	0.00	117	12.59	156	16.79
不詳	86	3	3.49	0	0.00	0	0.00	21	24.42	12	13.95	0	0.00	0	0.00	12	13.95	12	13.95

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30-80。術式編碼詳見 p.648。

3 「冷凍療法」定義針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 14 及 24。術式編碼詳見 p.648。

4 「HIFU」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 17。術式編碼詳見 p.648。

5 「雷射治療」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 15 及 25。術式編碼詳見 p.648。

6 「TURP/其他手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 10、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26 以及 90。術式編碼詳見 p.648。

7 「內分泌治」定義：個案於首次療程中接受內分泌藥物(荷爾蒙)治療且編碼為 01-31 及內分泌處置編碼為 10-50。

表十七之四 攝護腺癌 60-74 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

雷射或TURP合併化療與內分泌治療		放療		內分泌治療		放療合併內分泌治療		化療合併內分泌治療		化療合併放療與內分泌治療		緩和治療[8]		未治療[9]		拒絕治療		其他治療[10]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
19	0.60	51	1.62	380	12.09	491	15.62	57	1.81	17	0.54	7	0.22	110	3.50	4	0.13	84	2.67
0	0.00	9	2.41	5	1.34	10	2.68	0	0.00	0	0.00	2	0.54	55	14.75	4	1.07	11	2.95
0	0.00	26	3.15	14	1.69	94	11.38	0	0.00	0	0.00	2	0.24	35	4.24	0	0.00	19	2.30
0	0.00	12	1.20	34	3.41	217	21.74	0	0.00	0	0.00	1	0.10	7	0.70	0	0.00	32	3.21
19	2.18	4	0.46	321	36.77	168	19.24	57	6.53	16	1.83	0	0.00	1	0.11	0	0.00	22	2.52
0	0.00	0	0.00	6	8.22	2	2.74	0	0.00	1	1.37	2	2.74	12	16.44	0	0.00	0	0.00

表十七之五 攝護腺癌 75 歲以上發生人數按整併期別[1]及治療方式分類(續)

雷射或TURP合併化療與內分泌治療		放療		內分泌治療		放療合併內分泌治療		化療合併內分泌治療		化療合併放療與內分泌治療		緩和治療[8]		未治療[9]		拒絕治療		其他治療[10]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
4	0.16	37	1.51	670	27.28	460	18.73	24	0.98	5	0.20	12	0.49	76	3.09	4	0.16	51	2.08
0	0.00	9	5.23	4	2.33	5	2.91	0	0.00	0	0.00	2	1.16	18	10.47	1	0.58	5	2.91
0	0.00	19	4.39	43	9.93	80	18.48	0	0.00	0	0.00	2	0.46	27	6.24	3	0.69	12	2.77
0	0.00	8	0.96	149	17.82	254	30.38	1	0.12	0	0.00	2	0.24	18	2.15	0	0.00	23	2.75
4	0.43	0	0.00	461	49.62	120	12.92	23	2.48	5	0.54	5	0.54	4	0.43	0	0.00	10	1.08
0	0.00	1	1.16	13	15.12	1	1.16	0	0.00	0	0.00	1	1.16	9	10.47	0	0.00	1	1.16

8「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療，此處個案均為積極監測(active surveillance)/再密切觀察(watchful waiting)。

10「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

Prostate
C619
(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes
00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY
18 Local tumor destruction or excision, NOS
19 Transurethral resection (TURP), NOS
Unknown whether a specimen was sent to pathology for surgical events coded 18 or 19
(principally for cases diagnosed prior to January 1, 2003)
10 Local tumor destruction [or excision], NOS
14 Cryoprostatectomy
15 Laser ablation
16 Hyperthermia
17 Other method of local tumor destruction
No specimen sent to pathology from surgical events 10–17
[SEER Note: Assign **code 15** for Niagara laser photovaporization of the prostate. Assign **code 16** for Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT). Assign **code 17** for High Intensity Focused Ultrasonography (HIFU) and for Transurethral Needle Ablation (TUNA).]

20 Local tumor excision, NOS
21 Transurethral resection (TURP), NOS
22 TURP—cancer is incidental finding during surgery for benign disease
23 TURP—patient has suspected/known cancer
Any combination of 20–23 WITH
24 Cryosurgery
25 Laser
26 Hyperthermia
30 Subtotal, segmental, or simple prostatectomy, which may leave all or part of the capsule intact
[SEER Note: May include suprapubic prostatectomy.]
50 Radical prostatectomy, NOS; total prostatectomy, NOS
Includes excision of the prostate, prostatic capsule, ejaculatory ducts, seminal vesicle(s); and may include a narrow cuff of bladder neck.
70 Prostatectomy WITH resection in continuity with other organs; pelvic exenteration
Surgeries coded 70 are any prostatectomy WITH resection in continuity with any other organs. The other organs may be partially or totally removed. Procedures may include, but are not limited to cystoprostatectomy, radical cystectomy, and prostatectomy.
[SEER Note: "In continuity with" or "en bloc" means that all of the tissues were removed during the same procedure, but not necessarily in a single specimen]
80 Prostatectomy, NOS
Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS
99 Unknown if surgery performed; death certificate ONLY

膀胱癌

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3194	100.00	2224	100.00	970	100.00	1732	100.00	1462	100.00
年齡										
00-04 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05-09 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10-14 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15-19 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20-24 歲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25-29 歲	7	0.22	7	0.31	0	0.00	4	0.23	3	0.21
30-34 歲	14	0.44	5	0.22	9	0.93	8	0.46	6	0.41
35-39 歲	25	0.78	18	0.81	7	0.72	14	0.81	11	0.75
40-44 歲	36	1.13	28	1.26	8	0.82	22	1.27	14	0.96
45-49 歲	73	2.29	58	2.61	15	1.55	39	2.25	34	2.33
50-54 歲	142	4.45	96	4.32	46	4.74	79	4.56	63	4.31
55-59 歲	286	8.95	218	9.80	68	7.01	153	8.83	133	9.10
60-64 歲	470	14.72	353	15.87	117	12.06	254	14.67	216	14.77
65-69 歲	537	16.81	351	15.78	186	19.18	300	17.32	237	16.21
70-74 歲	392	12.27	270	12.14	122	12.58	224	12.93	168	11.49
75-79 歲	466	14.59	327	14.70	139	14.33	230	13.28	236	16.14
80-84 歲	402	12.59	253	11.38	149	15.36	236	13.63	166	11.35
85 歲以上	344	10.77	240	10.79	104	10.72	169	9.76	175	11.97
臨床期別										
0 期	1081	33.84	780	35.07	301	31.03	620	35.80	461	31.53
I 期	1067	33.41	749	33.68	318	32.78	549	31.70	518	35.43
II 期	473	14.81	320	14.39	153	15.77	246	14.20	227	15.53
III 期	323	10.11	219	9.85	104	10.72	196	11.32	127	8.69
IV 期	143	4.48	86	3.87	57	5.88	89	5.14	54	3.69
不詳	107	3.35	70	3.15	37	3.81	32	1.85	75	5.13
病理期別										
0 期	131	4.10	95	4.27	36	3.71	80	4.62	51	3.49
I 期	84	2.63	55	2.47	29	2.99	47	2.71	37	2.53
II 期	69	2.16	46	2.07	23	2.37	46	2.66	23	1.57
III 期	105	3.29	66	2.97	39	4.02	66	3.81	39	2.67
IV 期	36	1.13	24	1.08	12	1.24	24	1.39	12	0.82
不詳	2769	86.69	1938	87.14	831	85.67	1469	84.82	1300	88.92
整併期別 [1]										
0 期	1130	35.38	816	36.69	314	32.37	642	37.07	488	33.38
I 期	1062	33.25	740	33.27	322	33.20	547	31.58	515	35.23
II 期	450	14.09	306	13.76	144	14.85	235	13.57	215	14.71
III 期	331	10.36	223	10.03	108	11.13	195	11.26	136	9.30
IV 期	146	4.57	89	4.00	57	5.88	92	5.31	54	3.69
不詳	75	2.35	50	2.25	25	2.58	21	1.21	54	3.69

表十八之一 膀胱癌發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	3194	100.00	2224	100.00	970	100.00	1732	100.00	1462	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[2]		0.5667								
治療方式 [3,4,5]										
根除性手術	108	3.38	55	2.47	53	5.46	70	4.04	38	2.60
根除性手術合併全身化療，有/無局部化療	76	2.38	55	2.47	21	2.16	56	3.23	20	1.37
根除性手術合併局部化療	22	0.69	15	0.67	7	0.72	10	0.58	12	0.82
部分切除性手術	25	0.78	17	0.76	8	0.82	18	1.04	7	0.48
部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上	33	1.03	22	0.99	11	1.13	16	0.92	17	1.16
TURBT	592	18.53	396	17.81	196	20.21	276	15.94	316	21.61
TURBT 合併全身化療	97	3.04	65	2.92	32	3.30	58	3.35	39	2.67
TURBT 合併局部化療	1463	45.80	1067	47.98	396	40.82	741	42.78	722	49.38
TURBT 合併局部免疫治療	170	5.32	114	5.13	56	5.77	115	6.64	55	3.76
TURBT 合併局部化療與局部免疫治療	170	5.32	121	5.44	49	5.05	116	6.70	54	3.69
TURBT 合併全身化療與局部藥物治療(化學或免疫任一種以上)	41	1.28	28	1.26	13	1.34	24	1.39	17	1.16
TURBT 合併放療	78	2.44	45	2.02	33	3.40	37	2.14	41	2.80
TURBT 合併放療與化療(全身或局部任一種以上)	134	4.20	95	4.27	39	4.02	88	5.08	46	3.15
TURBT 合併全身免疫治療，有/無化療(全身或局部任一種以上)	58	1.82	44	1.98	14	1.44	26	1.50	32	2.19
緩和治療	24	0.75	17	0.76	7	0.72	17	0.98	7	0.48
未治療	11	0.34	6	0.27	5	0.52	6	0.35	5	0.34
其他治療	92	2.88	62	2.79	30	3.09	58	3.35	34	2.33
組織型態										
原位癌										
泌尿上皮癌	88	7.72	56	6.81	32	10.06	52	8.14	36	7.19
乳突狀原位癌	1046	91.75	762	92.70	284	89.31	585	91.55	461	92.02
腺癌	2	0.18	1	0.12	1	0.31	2	0.31	0	0.00
非特定原位上皮癌	4	0.35	3	0.36	1	0.31	0	0.00	4	0.80
侵襲癌										
泌尿上皮癌	1977	96.25	1358	96.86	619	94.94	1042	95.33	935	97.29
腺癌	19	0.93	9	0.64	10	1.53	13	1.19	6	0.62
鱗狀細胞癌	7	0.34	3	0.21	4	0.61	4	0.37	3	0.31
神經內分泌癌	28	1.36	20	1.43	8	1.23	20	1.83	8	0.83
非特定上皮癌	15	0.73	6	0.43	9	1.38	7	0.64	8	0.83
惡性肉瘤	2	0.10	1	0.07	1	0.15	2	0.18	0	0.00
其他惡性腫瘤	6	0.29	5	0.36	1	0.15	5	0.46	1	0.10

註 1：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 2：計算 Kappa 值時，排除病理期別、臨床期別不詳者。

註 3：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 4：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 5：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

膀胱癌

表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別[1]之治療方式分類

期別	分析數	根除性手術[2]		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療[3]		根除性手術合併局部化療		部分切除性手術[4]		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT[5]		TURBT合併全身化療		TURBT合併局部化療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	
合計	3194	108	3.38	76	2.38	22	0.69	25	0.78	33	1.03	592	18.53	97	3.04	1463	45.80
0 期	1130	14	1.24	0	0.00	3	0.27	1	0.09	5	0.44	264	23.36	2	0.18	696	61.59
I 期	1062	26	2.45	1	0.09	4	0.38	11	1.04	8	0.75	155	14.60	6	0.56	610	57.44
II 期	450	32	7.11	21	4.67	10	2.22	5	1.11	8	1.78	75	16.67	35	7.78	97	21.56
III 期	331	31	9.37	47	14.20	5	1.51	6	1.81	10	3.02	49	14.80	26	7.85	23	6.95
IV 期	146	3	2.05	6	4.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29	19.86	28	19.18	5	3.42
不詳	75	2	2.67	1	1.33	0	0.00	2	2.67	2	2.67	20	26.67	0	0.00	32	42.67

表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術[2]		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療[3]		根除性手術合併局部化療		部分切除性手術[4]		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT[5]		TURBT合併全身化療		TURBT合併局部化療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	
合計	155	3	1.94	3	1.94	1	0.65	1	0.65	0	0.00	30	19.35	8	5.16	77	49.68
0 期	83	0	0.00	0	0.00	1	1.20	0	0.00	0	0.00	21	25.30	0	0.00	50	60.24
I 期	39	1	2.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	12.82	0	0.00	21	53.85
II 期	17	2	11.76	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76	1	5.88	5	29.41
III 期	11	0	0.00	2	18.18	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	4	36.36	1	9.09
IV 期	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00
不詳	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.656。
3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。
4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.656。
5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.656。

表十八之二 膀胱癌發生人數按整併期別[1]之治療方式分類(續)

TURBT 合併局部免疫治療[6]		TURBT 合併局部化療與局部免疫治療		TURBT 合併全身化療與局部藥物治療(化學或免疫任一種以上)		TURBT 合併放療		TURBT 合併放療與化療(全身或局部任一種以上)		TURBT 合併全身免疫治療[7]，有/無化療(全身或局部任一種以上)		緩和治療[8]		未治療[9]		其它治療[10]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
170	5.32	170	5.32	41	1.28	78	2.44	134	4.20	58	1.82	24	0.75	11	0.34	92	2.88
62	5.49	61	5.40	1	0.09	1	0.09	0	0.00	2	0.18	2	0.18	6	0.53	10	0.88
90	8.47	101	9.51	2	0.19	6	0.56	6	0.56	27	2.54	0	0.00	1	0.09	8	0.75
13	2.89	8	1.78	23	5.11	31	6.89	59	13.11	8	1.78	3	0.67	1	0.22	21	4.67
3	0.91	0	0.00	7	2.11	27	8.16	54	16.31	9	2.72	4	1.21	0	0.00	30	9.06
0	0.00	0	0.00	7	4.79	9	6.16	12	8.22	10	6.85	13	8.90	2	1.37	22	15.07
2	2.67	0	0.00	1	1.33	4	5.33	3	4.00	2	2.67	2	2.67	1	1.33	1	1.33

表十八之三 膀胱癌 0-49 歲發生人數按整併期別[1]之治療方式分類(續)

TURBT 合併局部免疫治療[6]		TURBT 合併局部化療與局部免疫治療		TURBT 合併全身化療與局部藥物治療(化學或免疫任一種以上)		TURBT 合併放療		TURBT 合併放療與化療(全身或局部任一種以上)		TURBT 合併全身免疫治療[7]，有/無化療(全身或局部任一種以上)		緩和治療[8]		未治療[9]		其它治療[10]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
9	5.81	10	6.45	1	0.65	1	0.65	4	2.58	0	0.00	0	0.00	1	0.65	6	3.87
2	2.41	5	6.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.20	3	3.61
6	15.38	5	12.82	0	0.00	1	2.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	17.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.76
0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	1	9.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03。

8「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

膀胱癌

表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術[2]		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療[3]		根除性手術合併局部化療		部分切除性手術[4]		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT[5]		TURBT合併全身化療		TURBT合併局部化療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	
合計	1435	52	3.62	52	3.62	13	0.91	12	0.84	20	1.39	214	14.91	53	3.69	693	48.29
0 期	545	7	1.28	0	0.00	1	0.18	0	0.00	3	0.55	114	20.92	1	0.18	346	63.49
I 期	491	16	3.26	0	0.00	2	0.41	7	1.43	6	1.22	51	10.39	3	0.61	285	58.04
II 期	180	16	8.89	14	7.78	8	4.44	1	0.56	3	1.67	18	10.00	21	11.67	38	21.11
III 期	122	11	9.02	31	25.41	2	1.64	2	1.64	7	5.74	13	10.66	9	7.38	10	8.20
IV 期	69	1	1.45	6	8.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	14.49	19	27.54	2	2.90
不詳	28	1	3.57	1	3.57	0	0.00	2	7.14	1	3.57	8	28.57	0	0.00	12	42.86

表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別 [1] 及治療方式分類

期別	分析數	根除性手術 [2]		根除性手術合併全身化療，有/無局部化療 [3]		根除性手術合併局部化療		部分切除性手術 [4]		部分切除性手術合併全身或局部化療任一種以上		TURBT[5]		TURBT合併全身化療		TURBT合併局部化療	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	
合計	1604	53	3.30	21	1.31	8	0.50	12	0.75	13	0.81	348	21.70	36	2.24	693	43.20
0 期	502	7	1.39	0	0.00	1	0.20	1	0.20	2	0.40	129	25.70	1	0.20	300	59.76
I 期	532	9	1.69	1	0.19	2	0.38	4	0.75	2	0.38	99	18.61	3	0.56	304	57.14
II 期	253	14	5.53	6	2.37	2	0.79	4	1.58	5	1.98	55	21.74	13	5.14	54	21.34
III 期	198	20	10.10	14	7.07	3	1.52	3	1.52	3	1.52	36	18.18	13	6.57	12	6.06
IV 期	74	2	2.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	25.68	6	8.11	3	4.05
不詳	45	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22	10	22.22	0	0.00	20	44.44

1 「整併期別」定義：請參考(107 年度)臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。
2 「根除性手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 50-90。術式編碼詳見 p.656。
3 「局部化學治療」定義：個案於首次療程中接受膀胱灌注局部化療且編碼為 08 或 09。
4 「部分切除手術」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 30。術式編碼詳見 p.656。
5 「TURBT」定義：針對原發部位進行手術治療且術式編碼為 20-27。術式編碼詳見 p.656。

表十八之四 膀胱癌 50-69 歲發生人數按整併期別[1]之治療方式分類(續)

TURBT 合併局部免疫治療[6]		TURBT 合併局部化療與局部免疫治療		TURBT 合併全身化療與局部藥物治療(化學或免疫任一種以上)		TURBT 合併放療		TURBT 合併放療與化療(全身或局部任一種以上)		TURBT 合併全身免疫治療[7]，有/無化療(全身或局部任一種以上)		緩和治療[8]		未治療[9]		其它治療[10]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
86	5.99	84	5.85	21	1.46	9	0.63	56	3.90	27	1.88	3	0.21	1	0.07	39	2.72
35	6.42	32	5.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.18	0	0.00	1	0.18	4	0.73
47	9.57	49	9.98	1	0.20	0	0.00	4	0.81	15	3.05	0	0.00	0	0.00	5	1.02
4	2.22	3	1.67	11	6.11	5	2.78	27	15.00	3	1.67	0	0.00	0	0.00	8	4.44
0	0.00	0	0.00	4	3.28	2	1.64	18	14.75	2	1.64	0	0.00	0	0.00	11	9.02
0	0.00	0	0.00	4	5.80	2	2.90	7	10.14	4	5.80	3	4.35	0	0.00	11	15.94
0	0.00	0	0.00	1	3.57	0	0.00	0	0.00	2	7.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表十八之五 膀胱癌 70 歲以上發生人數按整併期別[1]之治療方式分類(續)

TURBT 合併局部免疫治療[6]		TURBT 合併局部化療與局部免疫治療		TURBT 合併全身化療與局部藥物治療(化學或免疫任一種以上)		TURBT 合併放療		TURBT 合併放療與化療(全身或局部任一種以上)		TURBT 合併全身免疫治療，有/無化療(全身或局部任一種以上)		緩和治療[7]		未治療[8]		其它治療[9]	
申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
75	4.68	76	4.74	19	1.18	68	4.24	74	4.61	31	1.93	21	1.31	9	0.56	47	2.93
25	4.98	24	4.78	1	0.20	1	0.20	0	0.00	1	0.20	2	0.40	4	0.80	3	0.60
37	6.95	47	8.83	1	0.19	5	0.94	2	0.38	12	2.26	0	0.00	1	0.19	3	0.56
8	3.16	5	1.98	12	4.74	26	10.28	29	11.46	5	1.98	3	1.19	1	0.40	11	4.35
3	1.52	0	0.00	2	1.01	25	12.63	35	17.68	7	3.54	4	2.02	0	0.00	18	9.09
0	0.00	0	0.00	3	4.05	7	9.46	5	6.76	6	8.11	10	13.51	2	2.70	11	14.86
2	4.44	0	0.00	0	0.00	4	8.89	3	6.67	0	0.00	2	4.44	1	2.22	1	2.22

6 「局部免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 01、03。

7 「全身免疫治療」定義：個案於首次療程中接受免疫治療且編碼為 02、03。

8「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

9「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

10「其他治療」定義：個案於首次療程中接受賀爾蒙治療、內分泌治療等其他治療組合方式。

Bladder

C670–C679

(Except for M9727, 9732, 9741-9742, 9762-9809, 9832, 9840-9931, 9945-9946, 9950-9968, and 9975-9993)

Codes

00 None; no surgery of primary site; autopsy ONLY

10 Local tumor destruction, NOS
- 11 Photodynamic therapy (PDT)
- 12 Electrocautery; fulguration (includes use of hot forceps for tumor destruction)
- 13 Cryosurgery
- 14 Laser
- 15 Intravesical therapy
- 16 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) or other immunotherapy
  [SEER Note：Code BCG as both surgery and immunotherapy]

No specimen sent to pathology from surgical events 10–16

20 Local tumor excision, NOS
- 26 Polypectomy
- 27 Excisional biopsy
  [SEER Note：Code TURB as 27]

Any combination of 20 or 26–27 WITH
- 21 Photodynamic therapy (PDT)
- 22 Electrocautery
- 23 Cryosurgery
- 24 Laser ablation
- 25 Laser excision

30 Partial cystectomy

50 Simple/total/complete cystectomy

60 Complete cystectomy with reconstruction
[SEER Note：Use code 71 for cystoprostatectomy.]
- 61 Radical cystectomy PLUS ileal conduit
- 62 Radical cystectomy PLUS continent reservoir or pouch, NOS
- 63 Radical cystectomy PLUS abdominal pouch (cutaneous)
- 64 Radical cystectomy PLUS in situ pouch (orthotopic)

When the procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

70 Pelvic exenteration, NOS
- 71 Radical cystectomy including anterior exenteration
  [SEER Note：Use code 71 for cystoprostatectomy.]

For females, includes removal of bladder, uterus, ovaries, entire vaginal wall, and entire urethra. For males, includes removal of the prostate. When a procedure is described as a pelvic exenteration for males, but the prostate is not removed, the surgery should be coded as a cystectomy (code 60-64).

- 72 Posterior exenteration
  For females, also includes removal of vagina, rectum and anus. For males, also includes prostate, rectum and anus.
- 73 Total exenteration
  Includes all tissue and organs removed for an anterior and posterior exenteration.
  [SEER Note：Includes removal of all pelvic contents and pelvic lymph nodes. The lymph node dissection should also be coded under Scope of Regional Lymph Node Surgery (癌登欄位序號 #4.16 or 4.17).]
- 74 Extended exenteration
  Includes pelvic blood vessels and/or bony pelvis

80 Cystectomy, NOS

Specimen sent to pathology from surgical events 20-80.

90 Surgery, NOS

99 Unknown if surgery performed; death

惡性淋巴瘤

表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2818	100.00	1559	100.00	1259	100.00	1980	100.00	838	100.00
年齡										
00-04 歲	11	0.39	6	0.38	5	0.40	11	0.56	0	0.00
05-09 歲	16	0.57	15	0.96	1	0.08	16	0.81	0	0.00
10-14 歲	18	0.64	14	0.90	4	0.32	14	0.71	4	0.48
15-19 歲	32	1.14	20	1.28	12	0.95	28	1.41	4	0.48
20-24 歲	76	2.70	49	3.14	27	2.14	65	3.28	11	1.31
25-29 歲	90	3.19	48	3.08	42	3.34	71	3.59	19	2.27
30-34 歲	75	2.66	39	2.50	36	2.86	57	2.88	18	2.15
35-39 歲	105	3.73	55	3.53	50	3.97	74	3.74	31	3.70
40-44 歲	110	3.90	53	3.40	57	4.53	78	3.94	32	3.82
45-49 歲	128	4.54	67	4.30	61	4.85	98	4.95	30	3.58
50-54 歲	209	7.42	102	6.54	107	8.50	161	8.13	48	5.73
55-59 歲	325	11.53	184	11.80	141	11.20	230	11.62	95	11.34
60-64 歲	371	13.17	227	14.56	144	11.44	268	13.54	103	12.29
65-69 歲	380	13.48	206	13.21	174	13.82	261	13.18	119	14.20
70-74 歲	253	8.98	144	9.24	109	8.66	171	8.64	82	9.79
75-79 歲	269	9.55	135	8.66	134	10.64	162	8.18	107	12.77
80-84 歲	189	6.71	106	6.80	83	6.59	117	5.91	72	8.59
85 歲以上	161	5.71	89	5.71	72	5.72	98	4.95	63	7.52
Ann Arbor 期別 [1]										
I 期	267	9.47	155	9.94	112	8.90	181	9.14	86	10.26
IE 期	174	6.17	85	5.45	89	7.07	141	7.12	33	3.94
II 期	422	14.98	223	14.30	199	15.81	280	14.14	142	16.95
II Bulky 期	22	0.78	9	0.58	13	1.03	19	0.96	3	0.36
IIE 期	108	3.83	52	3.34	56	4.45	80	4.04	28	3.34
III 期	447	15.86	243	15.59	204	16.20	283	14.29	164	19.57
IV 期	1063	37.72	598	38.36	465	36.93	761	38.43	302	36.04
不詳	315	11.18	194	12.44	121	9.61	235	11.87	80	9.55
整併期別 [2]										
I 期	441	15.65	240	15.39	201	15.97	322	16.26	119	14.20
II 期	552	19.59	284	18.22	268	21.29	379	19.14	173	20.64
III 期	447	15.86	243	15.59	204	16.20	283	14.29	164	19.57
IV 期	1063	37.72	598	38.36	465	36.93	761	38.43	302	36.04
不詳	315	11.18	194	12.44	121	9.61	235	11.87	80	9.55

表十九之一 惡性淋巴瘤發生人數之主要特性按性別及醫療機構別分類(續)

特性	合計		男性		女性		醫學中心		非醫學中心	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
總個案數	2818	100.00	1559	100.00	1259	100.00	1980	100.00	838	100.00
臨床與病理期別一致性										
Kappa[3]		-								
治療方式[4,5,6]										
手術	69	2.45	32	2.05	37	2.94	44	2.22	25	2.98
手術合併化療，有/無標靶治療	99	3.51	55	3.53	44	3.49	56	2.83	43	5.13
手術合併放療	35	1.24	23	1.48	12	0.95	30	1.52	5	0.60
手術合併化療與放療，有/無標靶治療	29	1.03	19	1.22	10	0.79	20	1.01	9	1.07
放療	87	3.09	51	3.27	36	2.86	62	3.13	25	2.98
放療合併化療	130	4.61	66	4.23	64	5.08	97	4.90	33	3.94
放療合併化療與標靶治療	167	5.93	97	6.22	70	5.56	94	4.75	73	8.71
化療	486	17.25	291	18.67	195	15.49	361	18.23	125	14.92
化療合併標靶治療	1260	44.71	678	43.49	582	46.23	896	45.25	364	43.44
化療合併骨幹移植，有/無標靶治療	63	2.24	40	2.57	23	1.83	57	2.88	6	0.72
緩和治療	85	3.02	46	2.95	39	3.10	43	2.17	42	5.01
未治療	138	4.90	60	3.85	78	6.20	91	4.60	47	5.61
其他治療	170	6.03	101	6.48	69	5.48	129	6.52	41	4.89
組織型態										
何杰金氏淋巴瘤	228	8.09	126	8.08	102	8.10	173	8.74	55	6.56
非何杰金氏淋巴瘤	2415	85.70 (100.00)	1331	85.38 (100.00)	1084	86.10 (100.00)	1677	84.70 (100.00)	738	88.07 (100.00)
B 細胞淋巴樣瘤	2102	(87.04)	1138	(85.50)	964	(88.93)	1440	(85.87)	662	(89.70)
T/NK 細胞淋巴樣瘤	313	(12.96)	193	(14.50)	120	(11.07)	237	(14.13)	76	(10.30)
組織細胞與樹突狀細胞瘤	24	0.85	8	0.51	16	1.27	20	1.01	4	0.48
其他惡性淋巴瘤	151	5.36	94	6.03	57	4.53	110	5.56	41	4.89

註 1：「Ann Arbor 期別」定義：請參考(107 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

註 2：整併期別*-請參考 107 年度臨床與病理期別(AJCC_8th)之整併流程說明，如圖 1 所示。

註 3：惡性淋巴瘤個案因 Ann Arbor 期別屬於臨床分期，無病理期別，故未進行臨床病理期別一致性分析。

註 4：參考後續治療方式相關表格之附註。

註 5：治療方式為 "OOO 合併 XX 治療，有/無□□治療"，表示包含「OOO 合併 XX 治療」與「OOO 合併 XX 治療與□□治療」之兩種方式合併呈現。

註 6：治癒性治療組合所佔比例若小於 0.2%者，則不呈現於報告中。

惡性淋巴瘤

表十九之二 惡性淋巴瘤發生人數按 Ann Arbor 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	2818	69	2.45	99	3.51	35	1.24	29	1.03	87	3.09	130	4.61	167	5.93	486	17.25	1260	44.71	63	2.24	85	3.02	138	4.90	170	6.03
I 期	441	35	7.94	28	6.35	18	4.08	18	4.08	48	10.88	27	6.12	37	8.39	24	5.44	108	24.49	0	0.00	8	1.81	39	8.84	51	11.56
II 期	552	6	1.09	25	4.53	3	0.54	5	0.91	13	2.36	58	10.51	56	10.14	80	14.49	260	47.10	4	0.72	5	0.91	22	3.99	15	2.72
III 期	447	2	0.45	17	3.80	0	0.00	1	0.22	3	0.67	8	1.79	18	4.03	98	21.92	237	53.02	9	2.01	14	3.13	20	4.47	20	4.47
IV 期	1063	9	0.85	20	1.88	0	0.00	1	0.09	4	0.38	11	1.03	50	4.70	194	18.25	603	56.73	46	4.33	38	3.57	38	3.57	49	4.61
不詳	315	17	5.40	9	2.86	14	4.44	4	1.27	19	6.03	26	8.25	6	1.90	90	28.57	52	16.51	4	1.27	20	6.35	19	6.03	35	11.11

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(107 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之三 惡性淋巴瘤 0-39 歲發生人數按 Ann Arbor 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	423	8	1.89	14	3.31	7	1.65	3	0.71	12	2.84	55	13.00	25	5.91	145	34.28	103	24.35	19	4.49	1	0.24	8	1.89	23	5.44
I 期	44	4	9.09	4	9.09	3	6.82	2	4.55	6	13.64	0	0.00	4	9.09	4	9.09	9	20.45	0	0.00	0	0.00	1	2.27	7	15.91
II 期	139	0	0.00	2	1.44	0	0.00	0	0.00	2	1.44	39	28.06	14	10.07	45	32.37	33	23.74	3	2.16	0	0.00	1	0.72	0	0.00
III 期	47	0	0.00	2	4.26	0	0.00	1	2.13	0	0.00	5	10.64	0	0.00	18	38.30	15	31.91	4	8.51	0	0.00	0	0.00	2	4.26
IV 期	115	0	0.00	3	2.61	0	0.00	0	0.00	1	0.87	2	1.74	6	5.22	42	36.52	45	39.13	10	8.70	0	0.00	1	0.87	5	4.35
不詳	78	4	5.13	3	3.85	4	5.13	0	0.00	3	3.85	9	11.54	1	1.28	36	46.15	1	1.28	2	2.56	1	1.28	5	6.41	9	11.54

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(107 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之四 惡性淋巴瘤 40-59 歲發生人數按 Ann Arbor 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	772	22	2.85	30	3.89	12	1.55	13	1.68	21	2.72	34	4.40	49	6.35	106	13.73	350	45.34	35	4.53	10	1.30	47	6.09	43	5.57
I 期	154	11	7.14	11	7.14	6	3.90	7	4.55	17	11.04	16	10.39	12	7.79	7	4.55	32	20.78	0	0.00	1	0.65	15	9.74	19	12.34
II 期	141	1	0.71	8	5.67	3	2.13	2	1.42	0	0.00	8	5.67	17	12.06	14	9.93	76	53.90	1	0.71	0	0.00	6	4.26	5	3.55
III 期	122	1	0.82	2	1.64	0	0.00	0	0.00	1	0.82	1	0.82	5	4.10	28	22.95	68	55.74	2	1.64	3	2.46	6	4.92	5	4.10
IV 期	291	3	1.03	6	2.06	0	0.00	1	0.34	0	0.00	3	1.03	14	4.81	46	15.81	162	55.67	30	10.31	5	1.72	13	4.47	8	2.75
不詳	64	6	9.38	3	4.69	3	4.69	3	4.69	3	4.69	6	9.38	1	1.56	11	17.19	12	18.75	2	3.13	1	1.56	7	10.94	6	9.38

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(107 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。

惡性淋巴瘤

表十九之五 惡性淋巴瘤 60 歲以上發生人數按 Ann Arbor 期別[1]及治療方式分類

期別	分析數	手術[2]		手術合併化療，有/無標靶治療		手術合併放療		手術合併化療與放療，有/無標靶治療		放療		放療合併化療		放療合併化療與標靶治療		化療		化療合併標靶治療		化療合併骨幹移植，有/無標靶治療		緩和治療[3]		未治療[4]		其他治療[5]	
		申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%	申報數	%
合計	1623	39	2.40	55	3.39	16	0.99	13	0.80	54	3.33	41	2.53	93	5.73	235	14.48	807	49.72	9	0.55	74	4.56	83	5.11	104	6.41
I 期	243	20	8.23	13	5.35	9	3.70	9	3.70	25	10.29	11	4.53	21	8.64	13	5.35	67	27.57	0	0.00	7	2.88	23	9.47	25	10.29
II 期	272	5	1.84	15	5.51	0	0.00	3	1.10	11	4.04	11	4.04	25	9.19	21	7.72	151	55.51	0	0.00	5	1.84	15	5.51	10	3.68
III 期	278	1	0.36	13	4.68	0	0.00	0	0.00	2	0.72	2	0.72	13	4.68	52	18.71	154	55.40	3	1.08	11	3.96	14	5.04	13	4.68
IV 期	657	6	0.91	11	1.67	0	0.00	0	0.00	3	0.46	6	0.91	30	4.57	106	16.13	396	60.27	6	0.91	33	5.02	24	3.65	36	5.48
不詳	173	7	4.05	3	1.73	7	4.05	1	0.58	13	7.51	11	6.36	4	2.31	43	24.86	39	22.54	0	0.00	18	10.40	7	4.05	20	11.56

1 「Ann Arbor 期別」定義：請參考(107 年度)惡性淋巴瘤 Ann Arbor 期別之整併流程說明，如圖 4 所示。

2 「手術」定義：外院或申報醫院有進行原發部位手術，且術式編碼為 20-90。

3 「緩和照護」定義：僅接受緩解或減輕個案症狀所提供之照護(無毒殺或抑制腫瘤功能)，例如繞道手術或疼痛控制等治療。若為緩和性原發部位手術、放療或化療則納入前述治療欄位內分析。

4 「未治療」定義：個案於首次療程中未接受任何的治療方式，包括拒絕治療。

5 「其他治療」定義：個案於首次療程中接受其他治療組合方式。