
不同性別長者健康狀況

衛生福利部 國民健康署
慢性疾病防治組

103 年 12 月 27 日




長者健康狀況之重要指標

- 死亡情形
- 自覺健康狀況
- 失能情形
- 疾病罹患情形
 - 生理
 - 心理
- 預防保健與醫療利用



102年長者十大死因之性別分析




資料來源：衛生福利部統計處2013年死因統計數據

說明：102年65歲以上年中人口數計 2,647,279 人, 男性 1,242,814 , 女性 1,404,465 人。




長者自覺健康情形



資料來源：102國民健康訪問調查(NHIS) 【65歲以上民眾自覺目前健康狀況】



長者失能狀況




資料來源：102國民健康訪問調查(NHIS) 【65歲以上民眾之失能情形】

說明：失能的定義為自述單獨進行各項日常生活活動(ADL)，包括進食、洗澡、穿脫衣服、上廁所、上下床、室內走動等6項，有任一項有些困難、非常困難或完全不能做。




長者罹患三高狀況



資料來源：102國民健康訪問調查(NHIS) 【65歲以上民眾自述曾經醫師診斷罹患慢性病之情形】




長者罹患慢性腎臟病狀況



資料來源：102國民健康訪問調查(NHIS) 【65歲以上民眾自述曾經醫師診斷罹患慢性病之情形】



長者罹患白內障狀況



資料來源：102國民健康訪問調查(NHIS) 【65歲以上民眾自述曾經醫師診斷罹患慢性病之情形】



長者罹患慢性病情形

性別	1項以上	2項以上	3項以上
全	86.3%	68.6%	47.3%
男性	84.3%	64.1%	40.7%
女性	88.1%	72.5%	53.1%

備註：1.樣本數：3204人（男性1526人、女性1678人）

2.罹患慢性病項目包括：高血壓、糖尿病、心臟病、中風、肺或呼吸道疾病(慢性阻塞性肺疾病、氣喘)、關節炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍、肝膽疾病(不包括肝癌、膽囊癌)、髖骨骨折、白內障、腎臟疾病、痛風、脊椎骨骨刺、骨質疏鬆、癌症、高血脂、貧血等17項。


3.百分比經加權處理。

4.資料來源：國民健康署102年「國民健康訪問調查」。



長者心理健康狀況-憂鬱傾向


□ 老人有憂鬱傾向：男性13.0%、女性17.2%



有憂鬱傾向定義：心理健康狀況係以 CES-D 簡表進行測量，分數在 10 分(含)以上者。
資料來源：98年國民健康訪問調查



長者成人預防保健服務利用人數




資料來源：96-102年衛生福利部中央健康保險署核付檔資料分析

年度



長者醫療利用狀況-門、住診(包括急診)就診率



資料來源：101年衛生福利部統計處【門、住診合計就診率統計---按性別及年齡別分】

單位：每十萬人口就診率

就診率計算公式 = 患者人數 * 100,000 / 年中人口數

附註：年齡大於一歲者係健保就醫資料依附於親人者



敬請指教，謝謝！



**Taiwan
Health
Promotion
Administration**

Ministry of Health & Welfare

Promotion.

Prevention.

Protection.

Participation!

