

表 1、20 歲以上民眾經醫護人員告知有中風之情形

年齡層	全體 (%)	男 (%)	女 (%)
20-34	0.15	0.12	0.18
35-49	0.26	0.36	0.15
50-64	1.56	2.30	0.84
65 歲以上	6.62	6.65	6.58

資料來源：98 年國民健康訪問調查 (以問卷調查方式取得民眾自述資料)

備註：

問卷題目—B6. 您是不是曾經有發生過中風 (腦溢血或腦血栓) 的情形？

沒有 有 不知道

B6a. 您那(第)一次發生中風時，是不是醫護人員告訴您的？

不是 是

表 2、18 歲以上民眾與缺血性中風患者曾經吸菸之情形

	男 (%)	女 (%)
缺血性中風 ¹	64.9	7.2
18 歲以上民眾 ²	47.9	6.1

資料來源：

1.100 年「癌症及心血管疾病與吸菸、二手菸、飲酒、嚼檳榔之關係調查計畫」

2.100 年成人吸菸行為調查

曾經吸菸定義：從以前到現在吸菸累計超過五包 (100 支) 者。

題目：

1. B1. 從以前到現在為止【台語：自卡早到目前為止】，請問您吸菸總共有超過五包(約100 支)嗎？1 從未吸過菸2 曾吸菸，但未超過5 包
3 曾吸菸，而且超過5 包

A1. 從以前到現在為止【台語：自卡早到目前為止】，請問您吸菸總共有超過五包(約 100 支)嗎？【台語：你吃菸攏總咁有超過五包(100 支)？】
(01) 曾吸過菸，而且超過五包