

新聞稿附件

表 1、COPD 相關統計資料

	世界衛生組織(WHO)	我國(2012)
罹患人數	全球 2.1 億人	40 歲以上吸菸者每 4 人有一人得病
年死亡人數	300 萬人	6326 人
排名	全球死因第四位	十大死因第 7 位
未來增加死亡比率	增加 30% 以上	--

註：

資料來源為原行政院衛生署統計處 101 年「死因統計」。

世界衛生組織 WHO-COPD <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html>

表 2、100 年 COPD(門、住診)健保醫療資源耗費

	國際疾病傷害及死因分類標準 ICD-9	患者人數(人)	申報件數(件)	醫療點數(點)	消耗費用 ² (元)
COPD	490-493 支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,607,132	3,318,902	5,144,320,516	4,863,440,616
	495,496 其他慢性阻塞性肺疾病	196,103	363,538	1,035,459,321	978,923,242
	合計	1,803,235	3,682,440	6,179,779,837	5,842,363,858

註：

1. 資料來源為衛生福利部統計處 100 年「全民健康保險醫療統計年報」。

2. COPD 消耗費用是以 100 年第四季全民健保總額支付制度每點平均支付 0.9454 所推估




圖 1、戒菸對於肺功能損失減少之成效

註：

資料來源為 Fletcher CM, Peto R (1977). The natural history of chronic airflow obstruction. *BMJ*, 1(6077): 1645-1648.