

外籍配偶  
育兒保健手冊

# 照顧寶寶有一套

## 「របៀបការថែទាំទារក」



行政院衛生署國民健康局  
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយអំពីសុខភាព  
<http://www.bhp.doh.gov.tw>

GPN:1009202046

ISBN: 957-01-5301-6 (平裝)


非賣品



【中東對照版】




行政院衛生署國民健康局  
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយអំពីសុខភាព




照顧寶寶  
有一套

外籍配偶  
育兒保健手冊

របៀបការថែទាំទារក







目 錄

- 第一章：新生兒照顧 ..... 5
- 第二章：關心寶寶的成長發育 ..... 17
- 第三章：預防接種 ..... 19
- 第四章：寶寶的飲食 ..... 25
- 第五章：事故傷害預防 ..... 41
- 第六章：牙齒保健 ..... 43
- 第七章：大小便訓練 ..... 45
- 第八章：兒童預防保健服務 ..... 47
- 第九章：篩檢 ..... 49
- 第十章：服務處所 ..... 54

មាតិកា

- I. ការថែទាំទារកទើបនឹងកើត ..... 5
- II. យកចិត្តទុកដាក់ការលូតលាស់របស់ទារក ..... 17
- III. ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ ..... 19
- IV. របបអាហាររបស់ទារក ..... 25
- V. ការការពារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ..... 41
- VI. ការថែទាំធ្មេញ ..... 43
- VII. ការបណ្តុះបណ្តាលអោយចេះប្រើបង្គន់ ..... 45
- VIII. ការពិនិត្យសុខភាពសំរាប់កុមារ ..... 47
- IX. ការពិនិត្យសំរាំង ..... 49
- X. កន្លែងផ្តល់សេវា ..... 54

第一章  
I

新生兒照護

ការថែទាំទារកទើបនឹងកើត

出生後一個月內的新生兒，正是寶寶適應新環境的重要期間，這時可能遇到生理上的一些困難，所以需要給予特別照顧。

នៅខែដំបូងក្រោយកើត គឺជារយៈពេលដ៏មានសារៈសំខាន់សំរាប់ទារកទើបនឹងកើត ក្នុងការសំរួលទៅនឹងបរិយាកាសថ្មី ។

ទារកទើបនឹងកើតអាចជួបប្រទះការសំបាកផ្លូវកាយមួយចំនួនដូចនេះមាមាមនូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះទារកទើបនឹងកើត ។

一、舒適環境

寶寶房間應保持整潔和安靜。但是也無需刻意避免所有的聲音，適當的聲音嬰兒會適應且是聽覺發展所必需的。父母應注意寶寶的體溫，寶寶房間的溫度宜保持在25-28℃左右，且要留心室內空氣的流通。

1. បរិយាកាសនៃមាត់ស្តុកភាព

ជាការសំខាន់ ត្រូវមានបន្ទប់ដែលស្ងាត និង សាត់សំរាប់ទារក ។ ប៉ុន្តែ បរិយាកាសដែលសាត់ខឹង គួរ សំលេងសោះ ក៏មិនទាបចំដែរ ព្រោះថា ទារកត្រូវមានសំលេងក្នុងកិច្ចមួយ សំរាប់ការល្អចោលនៃការងារ របស់ទារក ។ ឪពុកម្តាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិស្តុកភាពរបស់ទារក ។ សិទ្ធិស្តុកភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងបន្ទប់ គឺ មន្ត្រី ពី ២៥-២៨ អង្សាសេ ។ មានខ្យល់ចេញចូលបន្តបន្ទាប់ ក៏ជាការសំខាន់ដែរ ។

二、衣服

嬰兒衣服的選擇，應輕軟、溫和而不易褪色。棉織內衣是最適當的衣服。衣服的型式須簡單，太緊和太寬，都會妨礙寶寶的活動。為了避免因葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症（俗稱蠶豆症）引起溶血，替寶寶準備用物時，請勿於寶寶的衣物或周遭環境存放奈丸。

2. ការស្លៀកពាក់

សំលៀកពាក់របស់ទារក ត្រូវ គ្រោលខ្លាច គ្រួលពាក់ និង មិនមេញពណ៌ ។ ជំងឺសប្បុរសភាពបំផុតគឺសំលៀកពាក់បំពាក់ធ្វើពីកញ្ចក់ ។ គ្រឿងវិលសំលៀកពាក់ ដែលមានផ្ទុកសារធាតុ និងមាយស្រួល ។ សំលៀក ពាក់ដែល គឺមេញ ប្រឡូងពេក និងមានដាច់មនោរម្យរបស់ទារក ។ ដើម្បីឡើងវិញការវិវឌ្ឍការបំបាត់នៃបណ្តាមេមក ពីជំងឺខ្លះអស់ស៊ីម dehydrogenase សំរាប់បំបែកជាតិក្នុងកូស-៦-ផូស្វាត (G-6-P-D) នៅពេលរៀបចំរបស់ របស់ទារកម្តាយ សូមកុំដាក់វ៉ិហ្សូតាស៊ីន (ថ្នាំសំរាប់ដាក់កុំរោគយសត្វជិតខ្លួនមកកាន់សំលៀកពាក់) នៅក្បែរ សំលៀកពាក់របស់ទារក និងនៅជុំវិញ ឬក្បែរទារក ។



### 三、換尿布

嬰兒解大小便時，要馬上換尿布，並用溫水洗淨屁股，再以棉質手巾輕輕拭乾。

### 3. ការជួសជុលកូនប្រាកដថា

ត្រូវផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម ឬផ្តល់ថវិកាទាមទារ ឬជុះ ក្រើមីក ក្រៅឈ្មួញ ដោយសំអាតកូនទារក រួចយកវាទៅលាងដោយទឹកប្រាសជ្រូតជ្រូត។

### 四、洗澡

每天要為寶寶洗澡，除提供清潔舒適外，還可觀察身體有無異常現象，如紅疹、瘀斑、外傷等等。建議照顧者應每天替寶寶洗一次澡。最恰當的洗澡時間是在兩次餵奶之間或餵奶前，可避免溢奶的現象，水的溫度要適當，先放冷水再放熱水（37.5-39℃）可用手腕內側測試，感覺熱熱不燙即可洗澡，洗澡的時間約5分-10分為宜。洗澡時千萬不要讓寶寶單獨留在浴缸中，以預防發生意外。

### 4. ការដូតមីក

ដូតមីកដោយទារករាល់ថ្ងៃ ដើម្បីសំអាត និងធ្វើអោយទារកមានជាសុភមង្គល ព្រមទាំងដើម្បីធានាថា គ្មានកាតមិនធម្មតាណាមួយនៅលើទារករបស់អ្នក ដូចជា កន្ទួល ស្នាមជាំ ឬដំបៅផ្សេងៗ ពេលដេកអោយ អ្នកថែទាំ- ទាំងឡាយ ត្រូវដូតមីកដោយទារករៀងរាល់ថ្ងៃ ។  
ពេលដេក ដំបៅលើជំងឺដូត ខែករដូតមីកដោយទារក គឺចម្រុះពេលបញ្ចេញអាហារ ឬមុខពេល បំបៅដោះ ដើម្បីជៀសវាងការរីករាលដាល ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យសិទ្ធិស្បែកដូតមីក ដោយចេញ ។ ដំបៅ ទាក់មីក ត្រជាក់ រួចទាក់ថែមមីកក្រៅ ដើម្បីកែលម្អសិទ្ធិស្បែកដូតមីកដោយទៅ ចន្លោះ ៣៧.៥ - ៣៩ អង្សាសេ ។ លុកមើលមីក ដោយដាច់ដៃរបស់អ្នក ។ មីកត្រូវដាក់ក្រៅឈ្មួញ ប្រើខ្លួនជាមីកក្រៅឡើយ ។ រយៈពេលដូតមីក គឺចន្លោះ ៥-១០ នាទី ។ កុំទុកទារករបស់អ្នកដោយនៅឱ្យកំចៅនៅក្នុង ដើមដូតមីក ព្រោះថា វាអាចយឺត ។

### (一) 橄欖球式抱法：

用一手手掌托住寶寶的頭，手肘夾住嬰兒身體置於腋下，並且貼近自己，此抱法適合洗臉及頭部。



### (1) របៀប ក្របី ដេត ប្រាកដថា ៖

គេកាន់ចំក្បាលទារកដោយដៃខ្លួន ។ គ្រងទូនទារកជាមួយនិងកំណាត់កែងដៃ ហើយទប់ទារកជាមួយ និងទូនរបស់អ្នក ។ របៀបពរទេ សមស្របសំរាប់ការដូតដោយមុខ និងក្បាលរបស់ទារក ។



### (二) 搖籃式抱法：

用一手置於寶寶的背部，繞過腋下扣住其路肢窩，另一手則抓住兩腳，防止寶寶滑落，此法適用於洗身體。



### (2) របៀបគ្រុក ឯ ឈាត ៖

ដាក់ដៃខ្លួនរបស់អ្នក គ្រុកក្រោមទូនទារក ហើយលួកដៃរបស់អ្នក គ្រងដៃរបស់ទារក ដើម្បីធានា ដោយជាន់ជួរ ។ គ្រុកដៃទារកដោយដៃខ្លួនឡើយ ដើម្បីបង្ការការរហូតទារកពីដៃ ។ របៀបពរទេ សមស្រប សំរាប់ការដូតដោយដៃខ្លួនរបស់ទារក ។

五、臍帶護理

臍帶通常於出生後7-14天會脫落，在脫落前，每洗完澡至少做一次臍帶護理，但如果臍帶潮濕或有臭味，即要多做幾次護理，並保持乾燥，當臍輪周圍發紅、出血、長肉芽、臭味時，均需找醫師診治。

5. ការថែទាំផ្ទៃ

តាមធម្មតា មេដំបូងទារក ដាច់ក្នុងចន្លោះ ៧ ទៅ ១៤ ថ្ងៃក្រោយកើត ។ គេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើ ដួងទឹកអោយទារក រហូតទាល់តែមេដំបូងទារកប្រុង ។ ប៉ុន្តែជាញឹកញយ គេត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំ ទៀត ទៅលើមេដំបូងមេដំបូងទារកសើម ឬរុំក្លិនស្អុយ ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហានេះ គេចាំបាច់ត្រូវរក្សាអោយ មេដំបូងស្ងួត ។ ត្រូវពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ប្រសិនបើ កន្លែង ជុំវិញមេដំបូង មានចេញកម្រិត ឬ ចេញឈាម រាងដុំតូច ឬមានក្លិន ។

(一) 臍帶消毒溶液：95%酒精。

(1) ទឹកថ្លង់មាត់មេរោគ：ជាទឹកមាត់ក្នុង ៩៥% ។

(二) 消毒法：

(2) វិធីថែទាំមេរោគ：



洗澡後先用小棉棒將臍部水份擦乾。 ចាប់ពីដួងទឹកហើយ ដួងសំអាតតំបន់ជុំវិញ មេដំបូង ជាមួយមេដំបូង សំប៊ី ។



再用一支小棉棒沾消毒溶液，一手用姆指、食指輕壓臍部周圍將皺褶處撐開，由臍部內面往外環消毒1-2次。

យកមេដំបូងមួយទៀតជ្រួលកំផ្លូវមាត់មេរោគ ។ លាតស្រែកដែលជ្រួលជុំវិញទឹកដោយប្រើមេដំបូងមួយទៀត ។ សំអាតមាត់មេរោគជុំវិញតំបន់មេដំបូងជុំវិញនៅក្រៅម្តង ឬពីរដង ។



尿片不要覆蓋住臍帶，避免尿濕引起感染，若不慎尿濕需再做臍部護理。

កុំគ្របមេដំបូង ជាមួយ កន្ទុប គ្រាប់ចូន ដើម្បីជៀសវាង ការឆ្លងមេរោគពីកន្ទុបដែល គ្របដាក់ ។ ឥឡូវគ្រាប់ចូន លេចមុខទៀតនៅពេលកន្ទុប គ្រាប់ចូនសើម ។

六、避免感染

因寶寶對於感染的抵抗力很低，接觸或準備寶寶食物時應先洗手，千萬不要讓寶寶接近有傳染病的人，例如有傷風感冒的患者，並切忌親吻嬰兒的嘴，以免傳染疾病。

6. ការការពារការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ

ដោយសារប្រព័ន្ធការពាររបស់ទារកនៅឡើយ និងមិនទាន់អាចទប់ទល់នឹងការឆ្លងមេរោគបាន ទាំងអស់អ្នកត្រូវលាងសំអាតដៃអោយហ្មត់ចត់ មុនពេលរៀបចំអាហាររបស់ទារក ។ កុំអោយទារករបស់ អ្នកទៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលជំងឺ ដូចជា អ្នកមានជំងឺផ្តាសាយជាដើម ។ កុំទើបមាត់របស់ទារក ដើម្បី ចៀសវាងការ- ឆ្លងមេរោគ ។

七、哭鬧的處理

哭鬧是寶寶與人溝通的表現，通常當他飢餓、口渴、尿尿、疲勞、環境溫度太冷或太熱時會哭鬧；也會因為疼痛、生病或感到孤單、無聊而哭鬧。照顧者要明白可能是什麼原因導致寶寶哭鬧，並區分不同的哭聲，減少寶寶哭鬧的次數。

嬰兒哭鬧時該如何處理？

- 最好先檢查是否尿布濕了？餓了？口渴？或穿得過多？
- 應該把寶寶抱直安撫，說說話、聽柔和的音樂，千萬不要搖晃寶寶身體。父母本身則應避免過度緊張，以免將不安之情緒傳給嬰兒。
- 若是因餵食過量引起，應該採少量多餐來餵食。
- 假如仍持續哭鬧不斷，則請洽詢醫院小兒科醫師。

7. ការគ្រប់គ្រងធ្វើការងារទាក់ទងការងារ/ម្ចាស់

ការស្រែកយំ និងការម្ចាស់ គឺជាអន្តរាគមន៍ ដែលទារកធ្វើការទាក់ទងជាមួយមនុស្សដទៃ ។ ជាធម្មតាវា ស្រែកយំនៅពេលវាឃ្លាន ស្រែកទឹក ជុំរោម ជុំអាម៉ូនី ឆ្លើយហត់ ត្រជាក់ ឬ ក្តៅ ។ វាក៏យំផងដែរ នៅពេល វាឃើញមានជម្ងឺ ត្រង់ត្រមោម ឬអង្កាម ។ អ្នកថែទាំត្រូវតែយល់ពីហេតុផលដែលទារកយំ និងដឹងពីរបៀបប្រែប្រួលនៃការយំ របស់ទារកដើម្បីបន្ថយការស្រែកយំ និងការម្ចាស់ ។

តើការធ្វើអ្វីខុស នៅពេលទារកស្រែកយំ ឬម្ចាស់ ?

- ពិនិត្យមើលថាតើ កន្លែងគ្រាប់តូចស្នាមឬទេ ឬថាមានការឃ្លាន ស្រែកទឹក ឬពាក់អាវត្រើង ជាដំណេក ឬទេ ?
- លើកទារកចេញពី ជួរដេកទៅ និងឱ្យវាស្តាប់ស្ទែងរំលឹក ។ កុំយោងខ្លួនទារកចុះ ឡើង ។ ឱ្យវាស្តាប់ស្ទែងរំលឹក ។ កុំយោងខ្លួនទារកចុះ ឡើង ។ ឱ្យវាស្តាប់ស្ទែងរំលឹក ។ កុំយោងខ្លួនទារកចុះ ឡើង ។
- ប្រសិនបើ ការស្រែកយំ ឬការម្ចាស់បណ្តាលមកពីការបៅដោះខ្លាំង គេគួរបំបៅទារកឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងមួយថ្ងៃហើយបំបៅម្តង គឺជាមួយម្តង ។
- បើការស្រែកយំ ឬការម្ចាស់នៅតែបន្ត សូមទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជម្ងឺកុមារ ។

八、溢奶與吐奶

寶寶喝奶不久，由胃倒流到口，如量不多的話，一般稱為「溢奶」。如量多或速度快，甚至噴射而出這就是吐奶。應注意以下各項：

- 適量餵食，切勿過多。
- 少量多餐，以減少胃內所承受的壓力。
- 每次餵奶中及餵奶後需適當排氣（排氣方法見 P.33）。
- 餵奶時勿讓寶寶吸食太急，中間應暫停片刻，讓寶寶呼吸順暢。
- 奶瓶鼻孔適中。
  - 太小→吸吮費力，空氣易由鼻孔吸入。
  - 太大→奶水易淹住咽喉，阻礙呼吸。
- 餵食完畢後，勿馬上平躺。若躺下時，應將寶寶上半身放高，或右側臥。
- 餵食後，勿使寶寶情緒激動或任意搖晃。

8. ការប្រែប្រួល និង ក្រែ ទឹកដោះដោ

ការក្រែទឹកដោះ រស់នៅដល់ការប្រែប្រួលច្រើនពីពេលកំណើតទៅដល់ មួយខែមុន ពីក្រពះមកតាម មាត់ក្រពះក្រោយពីការបំបៅដោះ ។ ប្រសិនបើខ្លួនទឹកដោះដែលក្រែច្រើន មិនបណ្តាលមកពីការបំបៅដោះ គេហៅថា "ការក្រែទឹកដោះ" ។ គេគួរកត់សំគាល់ខ្លួនបណ្តាខ្លួនខាងក្រោម ៖

- កុំបំបៅទារកច្រើនពេក
- បំបៅទារកឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយប្រើប្រាស់ទំនុកចិត្ត ដើម្បីបន្ថយសម្ពាធក្នុងក្រពះ ។
- ជាញឹកញយបំបៅដោះ ឬក្រោយពេលបំបៅដោះត្រូវធ្វើការដកវា រកើប បញ្ចេញខ្យល់ ។ (វិធីកើបបញ្ចេញខ្យល់ដូចម្តេចមើលផ្នែកជម្ងឺកុមារ)
- កុំបំបៅទារក ពេលវាដេក ។ អ្នកគួរឱ្យទារកសំរាកក្នុងពេលដេក ដោយឱ្យវាដកវាដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ ។
- ឱ្យវាស្តាប់ស្ទែងរំលឹក ក្នុងពេលដេក ក្នុងពេលដេក ។ បើវាដេក ទារកពិបាកជំពាក់ ហើយខ្យល់មិនចូលក្នុងក្រពះរបស់ទារក ។ បើវាដេក ទារកអាចមានមិនច្រើនទឹកដោះ ។
- កុំដាក់ឱ្យទារកដេកចុះក្រោម ឬខ្ទប់ពីបំបៅហើយ ។ នៅពេលដាក់ឱ្យទារកដេកចុះ ដងខ្លួនត្រូវ ខាងលើរបស់ទារក គួរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្ពស់ជាង ឬដាក់ឱ្យទារកដេកឡើងមកខាងស្តាំ ។
- បន្ទាប់ពីដេកហើយកុំចាក់ ឬភ្លេចទារក ។

### 九、新生兒黃疸該怎麼辦？

新生兒正常出生後第一天開始有黃疸出現，4至5天達高峰，大約7-10天便漸漸消退，這是正常現象，稱為生理性黃疸。

- 若黃疸指數不高，給予充足的奶水餵食，可增加代謝速度，由大小便幫助排出。
- 出院後仍須觀察寶寶膚色、活動力及食量。

以手指輕壓額頭、鼻及臉頰後，觀察皮膚顏色，若膚色越來越黃或出生十天仍未消退，應儘速就醫。

### 9. ការចេញទ្រូងលើទារកទើបមិនកើតត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

ការចេញទ្រូង បែបសិរវិទ្យា សំដៅដល់រោគសញ្ញាទ្រូងដែលចេញលើទារកទើបមិនកើត ទៅ តែដំបូងក្រោយកើតមក ។ វាចេញខ្លាំងដល់កំរិតក្នុងរយៈពេល ៤ ទៅ ៥ ថ្ងៃ ក្រោយកើត និងថយចុះ បង្អួចម្តងៗពី ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃក្រោយសំរាល ។

- បើកំរិតចេញទ្រូងមិនខ្លាំងហើយបំបៅទឹកដោះដល់ទារកអោយគ្រប់គ្រាន់ រោគរាមបង្កើនទ្រូងមកបូមមិនហើយចេញមករួមជាមួយនិងរោមនិងទារក ។
- បង្កាចជាមនស្សនាមិនពណ៌សំបូរស្បែកនិងកំរិតទារកចេញទ្រូងការប្រឆាំងរបស់ទារក បង្កាច់ពីចេញ ពីមធ្យមទេ ។ សង្កត់លើទាស ត្រចុះ និងផ្តាច់ជាមួយនិងក្រាមដៃដោយផ្លូវមិនមែនជាផ្លូវចេញទ្រូងចាំបាច់សំបូរស្បែកកាន់តែលឿន ឬ ទេ ។ បើពណ៌សំបូរស្បែកកាន់តែលឿន ឬ មិនចាត់ទៅក្រោយទារកកំរិតរស់រយៈពេល១០ថ្ងៃ អ្នកគួរនាំទារកទៅមធ្យមទេជាបន្ទាន់ ។

### 十、新生兒的皮膚出現小紅疹，該怎麼辦？

痱子又稱為汗疹，天熱時，幾乎所有的嬰兒都會在其頸、胸、臉、皮膚皺褶處長出一些紅色小疙瘩就是汗疹。預防痱子唯一的方法是避免流汗，建議穿寬鬆吸汗的棉質衣服，勿穿過多的衣物，並保持周遭環境空氣流通。

### 10. ការចេញកង្កួលក្រហមលើស្បែក ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

ចែងថ្ងៃម្យ៉ាង ឬហៅថា កង្កួលឡើងដោយធារកំដៅ គឺជាស្នាមលើស្បែកពណ៌ក្រហមដែលចេញ លើ ក ទ្រូង មុខ និងជាស្នាមជ្រួញ ទៅពេលទារកក្តៅ ។ មធ្យមចាញ់តែមួយគត់ ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យវាចេញ មក គឺត្រូវត្រូវសំរាលការបែកញើស ។ គេស្រែងឱ្យស្បែកពាក់សម្បែកពាក់ដែលមានផ្កាស្ករភាព ធ្វើពី ជាតិកញ្ឆាស មិនធ្វើឱ្យបែកញើស ចៀសវាងពាក់សម្បែកពាក់គ្រឿង និងត្រូវរក្សាឱ្យមានបរិយាកាស ដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ ។

### 十一、新生兒臀部皮膚起紅斑或發紅現象，該怎麼辦？

臀部因為大小便多次的刺激及尿片包著不透氣，或者有些嬰兒皮膚敏感，就容易有紅臀現象，其注意事項如下：

- 勤換尿片，大小便後以溫水洗淨及毛巾擦拭，並局部保持皮膚乾燥，避免過度使用沐浴乳或香皂。
- 若使用布尿布時，洗滌應用肥皂並且需經日晒消毒、乾燥。
- 儘量保持患部乾燥，避免於患處塗抹痱子粉，造成患部的刺激。當症狀未見改善時，需請醫師診治。

### 11. ទៅលើស្បែកទូទាត់ទើបមិនកើតចេញស្ករកកក្នុងក្រហមត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

ដោយសារតែការបញ្ចេញកាកសំណល់ និងកង្កួលទ្រូងដែលកើតឡើងជាប់ ទារកដែលមានស្បែកឆាប់ មានប្រព័ន្ធរាងាយនឹងចេញស្ករកកក្នុងក្រហមលើទូទាត់របស់គេ ។ គេគួរកត់សំគាល់លើបណ្តាចំណុចខាងក្រោមនេះ ៖

- ផ្លាស់កង្កួលទ្រូងជាញឹកញយ ។ ឆាប់កង្កួលរបស់ទារកជាមួយទឹកក្តៅខ្ពស់ៗ ហើយដូចកង្កួលរបស់ទារក ដោយប្រើកន្លែងពោះគោ បន្ទាប់ពីទារកបន្តរបស់ ។ រក្សារោមស្បែកស្អុត ចៀសវាងប្រើសារីដុសខ្នង គ្រឿងស្រពក្រហម ។
- ប្រសិនបើប្រើក្រណាត់ជាកង្កួលទ្រូង គួរជុំសំបោងវាជាមួយនិងសារីច្រើន រួមមានសំបុត និងសំណាប់ មោរោគទេវក្រោមកំដៅ ។
- រក្សាកន្លែងដែលឆ្លងមេរោគអោយស្អុតច្រើនវាងប្រើច្រវាក់លាបដែលមិនរោគកន្លែងឆ្លងមេរោគ ។ បេសញ្ជាមេរោគទៅតែមានដៃស្អុតទៅពីគ្រោះជាមួយដៃដូចគ្នារបស់អ្នក ។

十二、小孩出現發燒現象，該怎麼辦？

(一) 正常體溫範圍：

- 1. 口溫：36.4-37.2℃ (測量2-3分鐘)
- 2. 肛溫：37-37.8℃ (測量1-3分鐘)
- 3. 腋溫：35.9-36.7℃ (測量5-10分鐘)

(二) 發燒的居家處理：

- 1. 多補充水份 (包括開水、奶水、果汁、運動飲料、水果等)。
- 2. 減少患孩衣著及被蓋，以促進體溫散熱。
- 3. 維持室溫涼爽。
- 4. 儘量保持安靜，讓患孩多休息。
- 5. 肛溫在38℃上可給冰枕 (但出生三個月內給冷水枕)。
- 6. 肛溫38.5℃以上，除給冰枕外，可按醫囑給退燒藥。
- 7. 肛溫39℃以上除給6、7項外再給予溫水泡澡，約20-30分鐘。  
(水溫約為30℃左右)。



小孩發燒不適  
មានការម្សៅមិនស្រួលខ្លួន ដោយសារគ្រុន។

12. ទារកគ្រុនក្តៅត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

(1) សីតុណ្ហភាពធម្មតាក្នុងខ្លួន ត្និតក្នុងខ្លួន ៖

- 1. សីតុណ្ហភាពវាស់ក្នុងមាត់ ៣៦.៤ ដល់ ៣៧.២ អង្សាសេ (វាស់កំដៅពី២ទៅ៣នាទី)
- 2. សីតុណ្ហភាពវាស់ ក្នុងទ្វេតូច៣៧.៥ ដល់ ៣៧.៨ អង្សាសេ (វាស់កំដៅពី១ទៅ៣នាទី)
- 3. សីតុណ្ហភាពវាស់ក្នុងក្បាល ៣៥.៥ ដល់ ៣៦.៧ អង្សាសេ (វាស់កំដៅពី៥ទៅ១០នាទី)

(2) ការគ្រប់គ្រងគ្រុនក្តៅក្នុងផ្ទះ ៖

- 1. បន្ថែមបង្កប់ជាមីទឹកទៅក្នុងខ្លួន ដូចជាមីកពុះ មីកដោះ មីកផ្លែឈើ រោងចុះកីឡា និងផ្លែឈើ ។
- 2. កុំពាក់សំបៀកបំពាក់មិនដណ្តប់ក្នុងគ្រែឈាស់វេទិទារកដើម្បីជួយវិញយកកំដៅក្នុងខ្លួន ។
- 3. រក្សាបរិយាកាសក្នុងផ្ទះអោយបានត្រជាក់ ។
- 4. រក្សាបរិយាកាសអោយសប្បុរស និងទុកអោយទារកសំរាក
- 5. ប្រើថ្នើរមីកកក ទៅលេចណាដែលសីតុណ្ហភាពវាស់ត្រង់តូច លើសពី ៣៨ អង្សាសេ (តំបន់ទារក អាចក្រោម ៣៩ ត្រូវប្រើថ្នើរមីកត្រជាក់) ។
- 6. ក្រៅពីថ្នើរមីកកក ត្រូវផ្តល់ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅដល់ទារក យោងទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាបង់វេជ្ជបណ្ឌិត ទៅលេច ដែលសីតុណ្ហភាពវាស់ត្រង់តូចលើសពី ៣៨.៥ អង្សាសេ ។
- 7. បន្ថែមពីលើការវិវាទដល់ទារកដើម្បីបង្កើនទឹកឱ្យទារកជាមួយទឹកក្រៅស្បៀងក្រីក ក្នុងរយៈពេល២០នាទី ទៅលេចដែលសីតុណ្ហភាពវាស់ត្រង់តូចលើសពី ៣៨ អង្សាសេ (សីតុណ្ហភាពមីក ប្រហែល ៣០ អង្សាសេ) ។

第二章 II

關心寶寶的成長

យកចិត្តទុកដាក់ការលូតលាស់របស់ទារក

每一個寶寶都有一定的成長進度，留意這些成長進度，可以了解嬰幼兒發育是不是正常。觀察寶寶身心成長發育情形，不僅是為人父母生活上一種樂趣，也可藉以了解寶寶的健康情形。

ទារកលូតលាស់តាមកំរិតរបស់វា ។

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យការលូតលាស់នៃទារករបស់អ្នក ដើម្បីធានាថា ទារករបស់អ្នកកំពុងលូតលាស់ជាធម្មតា ។

ការសង្កេតមើលការលូតលាស់ខាងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត គឺជាការរីករាយមួយរបស់ឪពុកម្តាយ និងផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកយល់ពីសុខភាពនៃទារករបស់អ្នក ។



假如您的寶寶在以下月齡有此現象，請帶至大醫院或發展遲緩兒童聯合評估中心請教專家：

ពិបាកជាមួយមធ្យមលូតលាស់វដ្តសាស្ត្រ ឬមធ្យមលូតលាស់វាយតម្លៃ ដើម្បីធ្វើការវត្តមានតម្លៃទាមទារ ឬបំណិនបើកររបស់អ្នកមានភាពស្មុគស្មាញខាងក្រោមទៅតាមអាយុ ៖



四個月— 頭仍搖晃不穩  
៤ ខែកន្លះ —  
ស្ថានភាពក្បាលនៅមិនមឺង



九個月— 不會自己坐穩  
មិនចេះ —  
អង្គុយហ្នឹងដោយខ្លួនឯង



一歲兩個半月— 不會走或  
不會叫爸爸媽媽  
១៤ ខែកន្លះ —  
មិនអាចដើរ ឬមិនអាចមិយាយ  
“ប៉ា ម៉ាក់”



一歲十個月— 不會自己走上樓梯  
២២ ខែកន្លះ —  
មិនអាចឡើងជណ្តើរបានដោយខ្លួនឯង

第三章  
III

# 預防接種

## ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ

預防重於治療，請攜帶兒童健康手冊，按時至各地衛生所（室）或預防接種合約醫院診所接受各項預防接種。

ការបង្ការប្រសើរជាងការព្យាបាល ។ យក សៀវភៅពិនិត្យសុខភាពកុមារ ទៅមណ្ឌលសុខភាព ឬ មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្សេងៗ ។



### 一、寶寶兩地跑，預防接種該如何接續？

若攜子女居住或往來於兩國之間，應先瞭解該國之預防接種項目與時程，依續完成各項預防接種；回國後可攜帶預防接種紀錄至各地衛生所（室）及縣市預防接種合約醫院診所完成補接種。

### 二、預防接種後的反應及處理方法

接種疫苗後可能發生的局部紅腫、疼痛，通常2-3天內會消失，部分醫師建議冷敷可以降低不適，至於發燒如係在該項疫苗所列可能時間發生，可使用醫師給的退燒藥，但如高燒不退或有其他特殊症狀，則可能染患其他疾病，應儘速就醫。

#### 1. ពិច្រាវច្រាញការចាក់ថ្នាំបង្ការ ដូចម្តេចប្រសិនបើទារកត្រូវធ្វើដំណើរឡើងវិញ

ប្រសិនបើទារកត្រូវធ្វើដំណើរឡើងវិញជាច្រើនប្រទេស អ្នកត្រូវយល់ពីកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការ និងការវិភាគរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាមុន ដើម្បីចាក់បន្តវ៉ាក់សាំងនីមួយៗ ។ ក្រោយពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ប្រទេសនីមួយៗ អ្នកអាចយកសៀវភៅកំណត់ថ្នាំបង្ការទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ឬមន្ទីរពេទ្យតុលាការដើម្បីទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការដែលមិនទាន់គ្រប់ ។

#### 2. ប្រតិកម្មក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបង្ការ និងរបៀបគ្រប់គ្រង ឬព្យាបាល

ការឆ្អឹងក្រហម យើង និង ឈាមរតកកើតមានឡើងនៅគ្រប់កំឡុងចាក់ថ្នាំបង្ការ ហើយជាធម្មតា វាបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង ។ វេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះណែនាំអោយប្រើទឹកកកស្ងប់បំបាត់ការឈាម ។ ប្រសិនបើមានគ្រុនក្នុងអំឡុងពេលរៀបរយនៃការប្រោស ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗ ត្រូវត្រួតពិនិត្យទាក់ទងនឹង ធានាវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ។ ប្រសិនបើមានគ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬ មានរោគសញ្ញាដទៃទៀត នោះអោយទៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយ សារជំងឺ- មួយទៀត ។ នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ អ្នកត្រូវទំនាក់ទំនង ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតភ្លាមជាបន្ទាន់ ។

接種疫苗種類	反應及處理方法
卡介苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>注射後接種部位大多有紅色小結節，不需特別處理，若變成輕微的膿泡或潰瘍，不需要擠壓或包紮，只要保持局部清潔，約經2-3月潰瘍就會自然癒合。</li> <li>如果接種部位出現多量的膿液或發生同側腋窩淋巴腺腫大情形，可請醫師診治。</li> </ul>
B型肝炎疫苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常沒有特別反應</li> </ul>
白喉、破傷風及百日咳混合疫苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>局部紅腫、疼痛、硬塊的現象，兩天內可能會有輕度至中度之發燒、全身不適、哭鬧不安等反應，通常2-3天會恢復。</li> <li>如接種部位紅腫、硬塊不退、發生膿瘍或接種後持續高燒，則必須請醫師處理</li> </ul>
小兒麻痺口服疫苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常沒有特別反應。</li> <li>口服疫苗前後半小時不要飲水或進食，以免疫苗稀釋而影響疫苗效力。</li> </ul>
麻疹疫苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>約有5~10%於接種後5~12天，會有輕微發燒，偶而會出現紅疹、鼻炎、輕微的咳嗽或柯氏斑點，可能持續2~5天。</li> </ul>

ការចាក់វ៉ាក់សាំង	ប្រតិកម្ម និង ការគ្រប់គ្រងព្យាបាល
វ៉ាក់សាំង បេ សេ ហ្សូ	<ul style="list-style-type: none"> <li>តាមធម្មតា ស្នាមក្រហមចេញត្រង់កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ។ មិនចាំបាច់មានការព្យាបាលពិសេសទេ ។ ប្រសិនបើវាឡើងកម្ពស់ ឬជំរៅ គេត្រូវវាត្រែងខ្លួនរោគនោះរោគយស្ងាត ។ មិនចាំបាច់គ្របចង់ ឬបិទបង់ជំងឺទេ ។ វាគឺជាសំនេរដោយឯកសេពិទៅទៅទី ក្រោយមក ។</li> <li>បើមានរាបសេ ឬមានឡើងក្នុងកន្លោះ ទៅត្រង់ក្បែក ហើម ស្កមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតភ្លាមជាបន្ទាន់ ។</li> </ul>
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំនួញឡើងប្រភេទ បេ	<ul style="list-style-type: none"> <li>តាមធម្មតា មិនមានប្រតិកម្មពិសេសទេ ។</li> </ul>
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំនួញឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់	<ul style="list-style-type: none"> <li>មានស្នាមក្រហម ហើម ឈឺចាប់ និង ឡើងពក ដែលចេញត្រង់ កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ។ ទារកអាចមានក្តៅខ្លួនតិចៗ មាន ប្រតិកម្ម និងជំងឺទូក្នុងរយៈពេល២៤ ។ រោគសញ្ញាទាំង នេះ និងចង់ទៅវិញ ពិបាកទៅថែក្រោយមក ។</li> <li>បើស្នាមក្រហម ហើម ឈឺចាប់ និង ឡើងពក ត្រង់កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង នៅតែមាន ឬមានរាបសេ ឬគ្រុនក្តៅខ្លាំង ស្កមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតភ្លាមជាបន្ទាន់ ។</li> </ul>
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំនួញឡើងដៃជើង	<ul style="list-style-type: none"> <li>តាមធម្មតា មិនមានប្រតិកម្មពិសេសទេ ។</li> <li>កុំដឹក ឬហូបអាហារ ក្នុងរយៈពេល ៣០ នាទីមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីបង្ការកុំរោគរាវវ៉ាក់សាំងរោគ ឬឈឺប្រសិទ្ធភាពរបស់វា ។</li> </ul>
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំនួញឡើង	<ul style="list-style-type: none"> <li>ក្នុងរយៈពេល១២២៤ ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង មានទារក ៥ ទៅ ១០ % ដែលមានក្តៅខ្លួនតិចៗ ហើមជួរក្នុងរយៈពេល ១២ ម៉ោង ឬមិនមានស្នាមក្រហម រោគក្នុងក្រុម ឬក្តៅ ។ រោគសញ្ញាទាំងនេះ និងចង់ទៅវិញ ពី ២ ទៅ ៨ ថ្ងៃក្រោយមក ។</li> </ul>

接種疫苗種類	反應及處理方法
水痘疫苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 與自然感染水痘病毒一樣，疫苗的病毒可能潛伏在體內，在免疫功能低下時，病毒再活化而表現成帶狀疱疹，但其發生率與症狀都低於自然感染。</li> </ul>
麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 與麻疹疫苗一樣，在接種後5~12天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀。</li> </ul>
日本腦炎疫苗	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通常沒有特別反應。</li> </ul>

ការចាក់វ៉ាក់សាំង	ប្រតិកម្ម និង ការគ្រប់គ្រងព្យាបាល
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអុតស្វាយ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ វិទូរដែលមាននៅក្នុងវ៉ាក់សាំង អាចរស់នៅក្នុងខួរទារក អាចរោយ-មាន រោគសញ្ញាដូចអុតស្វាយ ។ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធ ភាពស៊ាំមុខរបៀប វិទូរឡើងមានសកម្មភាពជាថ្មី ហើយបណ្តាល រោគសញ្ញាជាអុតស្វាយ ។ ប្តីវិទូរត្រូវទាំងនេះមានកំរិតខ្ពស់ ជាងការខ្លួនរោគពីមុនជាង ។</li> </ul>
វ៉ាក់សាំង អិម អិម អា	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ដូចគ្នាទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់វ៉ាក់សាំងកម្រិតដែរ ដូចជា ស្លាកក្នុង ក្នុងរោគក្នុងក្រុម ឬ គ្រុឌក្រៅ ដែលអាចលេចឡើង ក្នុងរយៈពេលពី១២ថ្ងៃ ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង ។</li> </ul>
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរលាកខួរក្បាល ជប៉ុន	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ តាមធម្មតា មិនមានប្រតិកម្មពិសេសទេ ។</li> </ul>

三、預防接種紀錄保存與補發

3. ការរក្សា និង ការចេញរោគជាថ្មី ទូរវិទូរចាក់ថ្នាំបង្ការ

寶寶接種紀錄丟了，可向原接種單位或戶籍所在地衛生所洽詢辦理補發。請妥善永久保存，於日後入學時，必須繳交該紀錄影本，以提供校方及衛生單位相關健康查詢之需。另外出國就學、工作或移民等，各國亦多要求檢查該接種證明。

ប្រសិនបើបង្គោលចាក់ថ្នាំបង្ការ ខ្លួនអ្នកដាក់ពាក្យបញ្ជូនថ្មី ពីវិទ្យាស្ថានមធ្យមបុគ្គលិកចាក់ថ្នាំបង្ការ ឬមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពខែកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក ។ សូមរក្សាទុកប័ណ្ណនេះ ដោយចាត់ចែង ព្រោះតម្រូវការការចាក់ថ្នាំបង្ការប្រគល់អោយសាលារៀន នៅពេលមានមុន ឯរាប់អោយសាលារៀន ឬអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនោះ ធ្វើការត្រួត ពិនិត្យផ្សេងៗ ក្នុងករណីទៅសិក្សារបស់ខ្លួន នៅធ្វើការងារ ក្រៅប្រទេស ឬធ្វើអន្តរជាតិ រដ្ឋាភិបាលខែ ប្រទេសក្រៅ និងស្នើសុំពិនិត្យប័ណ្ណចាក់ថ្នាំបង្ការនេះដែរ ។

- 預防接種時程及紀錄表
- វិទ្យា សុខាភិបាលចាក់ថ្នាំបង្ការ



第四章  
IV

寶寶的飲食

របបអាហាររបស់ទារក

一、母乳

(一) 哺餵母乳對寶寶的好處

1. 最營養也最合乎嬰兒的需要：  
母乳好消化、不過敏，是最理想的嬰兒食品，母乳中所含的營養，無論在質或量方面都比配方奶更適合嬰兒的需要。
2. 最安全、最衛生經濟：  
餵母乳可免沖泡消毒的麻煩，嬰兒容易消化吸收，又可避免腸胃不適。
3. 增強抵抗力：  
母親於產後最早分泌的量少微黃的乳汁稱為初乳，含有豐富營養和抗體，增強嬰兒對疾病的抵抗力。
4. 增進母子感情：  
寶寶在母親懷抱中，得到溫暖與滿足的感覺，感受到母愛的溫暖，有利於嬰兒情緒的穩定和心理健全的發展。
5. 幫助發育：  
寶寶吸吮母乳可增加口腔運動，使寶寶對語言發育有很好的影響，同時可防止口腔變形或齒列不正的機會。

1. ទឹកដោះម្តាយ

(1) សារប្រយោជន៍នៃការចាំថែទាំដល់ទារក

1. ជាអាហារល្អបំផុតដែលមានគ្រប់ជីវជាតិ ធ្វើឲ្យឧបតាមតម្រូវការរបស់ទារក：  
ទឹកដោះម្តាយ គឺជា អាហារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក វាមានស្រូវស្រស់ជាង និងមិនបណ្តាលអោយមានប្រតិកម្ម ផ្សេងៗឡើយ ។ សារជាតិអាហារនៅក្នុងទឹកដោះម្តាយ គឺសម្របបំផុតសម្រាប់តម្រូវការរបស់ទារក និងល្អជាងទឹកដោះអាហារណាមួយ ។
2. មានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អមិនចំណាយថវិកា：  
គេមិនត្រូវការសំអាតសំលាប់មេរោគ នៅ ពេលចាំថែទាំដោះម្តាយឡើយ ។ ទឹកដោះម្តាយមានស្រូវស្រស់ក្នុង ករណី និងមិន បណ្តាលអោយមានបញ្ហា ឬ លើក្រពះឡើយ ។
3. បង្កើតភាពស្អាត：  
ទឹកដោះម្តាយពេញលេញ គឺមានសារជាតិអាហារ និងគ្រឿងការពារ គ្រប់គ្រងមិនមេរោគខ្ពស់ ដែលជាការសំខាន់ក្នុងការបង្កើតភាពស្អាតរបស់ទារកចំពោះជំងឺ ។
4. បង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងម្តាយនិងទារក：  
ទារកមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅ និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុង ដៃរបស់ម្តាយ ។ ការភ្ជាក់ភ្ជួរស្រឡាញ់របស់ម្តាយ និងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវចិត្ត និងសុខភាព ផ្លូវអារម្មណ៍របស់ទារក ។
5. ជួយដល់ការលូតលាស់：  
ការដែលទារកពញ្ជក់ទឹកដោះម្តាយ វាជួយបង្កើនលេខទាត់ដែលជះឥទ្ធិពល វិជ្ជមានដល់ការលូតលាស់របស់ទារក មានសុខភាពលាមា ។ វាក៏អាចជួយផងដែរ ក្នុងការបង្ការការ ទូចរង ឬការស្លាប់មិនច្បាស់នៃផ្នែកទាត់ ។



(二) 哺喂母乳對媽媽的好處

- 1. 促進產婦產後身體的復原：  
寶寶的吸吮過程反射性地促進媽媽催產素的分泌，促進媽媽產後子宮收縮，能使產後子宮早日恢復，從而減少產後併發症。
- 2. 媽媽更健康：  
哺喂母乳可減少母親罹患乳癌及卵巢癌的機會。
- 3. 快速恢復產前體重：  
有利消耗懷孕時體內堆積的脂肪，使媽媽更快地恢復產前體重。
- 4. 自然避孕：  
哺喂母乳可延緩排卵和月經的到來，延長產後無月經的期間，達到產後避孕的目的。

(三) 促進乳汁分泌的方法

- 1. 生產後儘早哺喂母乳：  
在產後兩小時之內就開始餵奶，寶寶吸吮乳頭，可刺激乳汁分泌。
- 2. 只喂母乳：  
避免給寶寶配方奶及其他飲料，否則寶寶可能不易有餓的感覺而減少吃奶的頻率，奶量自然會減少。
- 3. 勤於餵奶：  
寶寶餓了就可餵奶。餵得愈多，奶量會愈豐沛。一般產後剛開始餵母乳時可能1.5到2小時就得餵一次奶。
- 4. 運用正確的吸吮方式及餵奶姿勢，餵奶前按摩乳房。
- 5. 多喝牛奶、湯水或多吃發奶食物：如豬腳花生、麻油牡蠣，或各種魚湯等。
- 6. 多攝取水份：開水、湯類皆可。
- 7. 足夠的休息：疲倦和壓力會減少乳汁的分泌。

(2) ការប្រយោជន៍នៃការបំបៅដោះសំរាប់ម្តាយ

- 1. ជួយដល់ការត្រឡប់មករកភាពងើមវិញក្រោយសំរាល៖  
ការជញ្ជាក់របស់ទារក ភ្លោមដល់ការបញ្ចេញ អុកស៊ីតូស៊ីន ដែលជាការជួយដល់រូងដល់ការកម្រិតស្បូន ហើយជួយដល់ការត្រឡប់មករកភាពងើមវិញ របស់ស្បូន និងកាត់បន្ថយផលវិបាកផ្សេងៗ ។
- 2. ធ្វើរកាយម្តាយមានសុខភាពល្អឡើង៖  
ការបំបៅដោះកូន អាចបន្ថយជំនួញភាពកើតមានជំងឺ មហារីកដោះ និងក្រពេញផ្លូវវែរ ។
- 3. មិនមែន៖  
បំបៅដោះកូនអាចជួយបញ្ជាក់ជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួន ដែលជួយម្តាយរកាយមានរូបរាងស្អាតដូច ងើមវិញ ។
- 4. ការបង្កាក់កំណើតវិបបទម្នាក់៖  
ការបំបៅដោះកូន អាចបង្ការការវិវត្តន៍នៃចងបង្កាក់កំណើត និង ធានាការមានផ្លូវ ជួនផ្លូវមានសុខភាពក្នុងមិនមែនជាការបង្កាក់កំណើត ក្រោយពេលសំរាល ។

(3) របៀបភ្លោមការបញ្ចេញទឹកដោះម្តាយ

- 1. ត្រូវទាប់ធ្វើមបំបៅដោះកូន រកាយបានជាប់រហ័ស៖  
គេត្រូវទាប់ធ្វើមបំបៅដោះកូនក្នុងអំឡុងពីរម៉ោង ក្រោយសំរាល ។ ការជញ្ជាក់ក្រោយដោះម្តាយរបស់ទារក អាចភ្លោមដល់ការបញ្ចេញទឹកដោះ ។
- 2. បំបៅតែទឹកដោះម្តាយមួយមុខតត់៖  
ផ្សេងវាងបំបៅទឹកដោះគោ និងគោសព្វៈដទៃទៀត រក្សាវាងធ្វើ ធ្វើរកាយទារកជាប់ខ្ពស់ និងបន្ថយចំនួនដងនៃការបំបៅដោះ ដែលជាហេតុធ្វើរកាយការបញ្ចេញ ទឹកដោះកាន់តែតិច ។
- 3. បំបៅដោះរកាយបានត្រឹមដង៖  
បំបៅដោះទារកនៅពេលវាឃ្លាន ។ កាលណាម្តាយបំបៅកាន់តែឆ្លើកញាប់ នោះម្តាយនឹងបញ្ចេញទឹកដោះកាន់តែត្រឹម ។ ជាទូទៅ ម្តាយត្រូវបំបៅដោះកូនរាល់ ១.៥ ទៅ ២ ម៉ោង ម្តង ក្រោយសំរាល ។
- 4. ដាក់ទារកក្នុងស្ថានភាពបំបៅរកាយបានត្រឹមត្រូវ៖ ត្រូវឆ្លើត្រូវចាប់ដោះមុខពេលបំបៅដោះ ។
- 5. ត្រូវទឹកដោះគោបន្ថែម មីកស៊ីប ឬប្រភេទម្សៅដែលជួយរក្សាទារកបញ្ចេញទឹកដោះ ដូចជា pig brothers លាយជាមួយនឹងគ្រាប់សណ្តែក ឱ្យជាមួយប្រេងល ឬ ប្រភេទស៊ុបត្រីណាមួយ ។
- 6. ទឹកជាតិទឹក លាយបានត្រឹម ដូចជាស៊ុប ។
- 7. សំរាករកាយបានត្រឹម៖  
ការរស់កំចាត់ និងការគោរពតាមក្នុងការម្សៅ នឹងបន្ថយការបញ្ចេញទឹកដោះ ។

(四) 哺喂母乳的注意事項

- 餵食前應先洗淨雙手。
- 體位舒適：可採取不同姿勢，重要的是媽媽須要心情愉快、體位舒適和全身肌肉鬆弛，有益於乳汁排出。
- 母親與寶寶必須緊密相貼，而抱寶寶的姿勢，無論嬰兒抱在哪一邊，嬰兒的腹部與母親腹部應相貼，頭與雙肩朝向乳房，嘴處於乳頭相同水平位置，嬰兒頭部不被扭轉或彎曲，頭與身體成一直線。
- 檢查寶寶已正確含住乳房：寶寶口中含入乳暈，嘴張得很大，下嘴唇外翻，下巴有接觸到乳房，慢而深地吸吮，可以看見寶寶有吞嚥的動作。



(4) ការវិលទៅមិនទាន់រស់រវើករបំបៅដោះកូន

- លាងសំអាតដៃរបស់អ្នកមុនពេលបំបៅដោះកូន
- ស្ថិតក្នុងលិចរបស់មាតាត្រូវលាង៖ អ្នកអាចស្ថិតក្នុងលិចរបស់ផ្សេងៗ ។ សំខាន់បំផុតនោះ គឺអ្នកត្រូវមាន អារម្មណ៍ល្អ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានជាសុខភាព និងបន្ទូរ ឬសំរាក ដើម្បីរកយ៉ាងម៉េច អាចល្អជាង ត្រូវលាង ។
- អ្នកត្រូវលាងកូនរកយ៉ាងជាប់ជុំ ។ ពេលពេលកូន ទោះជាលាងនៅខាងខ្នងណាក៏ដោយ ត្រូវរកយ៉ាងខ្លួន របស់ទារកនៅជិតក្រោយបំផុត ។ ដោយក្បាលនិងស្បែករបស់កូនសំបូរដោះ ។ មាត់ទារកត្រូវស្ថិតនៅឆ្នើ និងក្បាលដោះ ដើម្បីរកយ៉ាងក្បាលទារកនៅត្រង់តាមដងខ្នង ហើយច្បាស់បំផុត ឬរកយ៉ាងឆ្នើ ។
- ពិនិត្យមើលថាទើទារកជញ្ជក់ដោះបានត្រឹមត្រូវឬទេ ។ ទារកប្រើមក្បាលដោះដោយបើកមាត់រកយ៉ាង និងបន្ទាត់ក្រោមបត់មកខាងក្រៅហើយនិងផ្ទុយរបស់ទារកជិតនឹងដោះហើយជញ្ជក់ដោះយឺតៗនិងជ្រៅៗ អ្នកអាចមើលឃើញវាលបិទដោះចូល ។

常見的舒適哺喂姿勢：  
ស្ថានភាពបំបៅដោះដែលសមស្រប៖



1 坐姿〈橄欖球式〉  
● អង្គុយពេនពួន



2 坐姿〈搖籃式〉  
● អង្គុយ



3 側躺  
● ដេកផ្អែមទៅចំហៀង  
ដោយដាក់ខ្នើយនៅ  
ក្រោមទារក



4 側躺  
● ដេកផ្អែមទៅចំហៀង  
ដោយដាក់ខ្នើយនៅ  
ក្រោមទារក



5 斜倚  
● ចំរេតចុះ



(三) 排氣三大基本法

(3) ពេលពេលណាដែលគាត់ជាមួយដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយការកើត

តែងតែឱ្យកូនក្រីក្រនៅលើក្បាលរបស់ម្តាយ ដើម្បីបង្ការការកើតឱ្យមានការបំបាក់ដំបូក ។ រួចផុតពីការកើតឱ្យមានការបំបាក់ដំបូក ដោយដាក់ក្បាលលើកូនក្រីក្រ ។ ប្រើដៃម្ខាងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការបំបាក់ដំបូក និងដៃម្ខាងទៀត ទទឹងលើខ្នងទារកជាមួយធាតុដៃក្រោម ។ មុនរបស់ទារកត្រូវចែកទៅម្ខាង ដើម្បីបង្ការការបំបាក់ដំបូក ។

1



2

ដោយដាក់ទារកបញ្ជាក់ ប្រើដៃម្ខាងទៀត និងដៃម្ខាងទៀត ហើយដៃម្ខាងទៀត ទទឹងលើខ្នងទារកជាមួយធាតុដៃក្រោម ។

តែងតែឱ្យកូនក្រីក្រនៅលើក្បាលរបស់ម្តាយ ដើម្បីបង្ការការកើតឱ្យមានការបំបាក់ដំបូក ។ រួចផុតពីការកើតឱ្យមានការបំបាក់ដំបូក ដោយដាក់ក្បាលលើកូនក្រីក្រ ។ ប្រើដៃម្ខាងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការបំបាក់ដំបូក និងដៃម្ខាងទៀត ទទឹងលើខ្នងទារកជាមួយធាតុដៃក្រោម ។

3



三、添加奶類以外的食物—副食品



(一) 寶寶需要吃副食品嗎?

副食品可補充母乳或配方奶營養的不足，並且可訓練咀嚼和吞嚥能力作為斷奶的準備。

(二) 這麼小會吞嗎?

小孩三個月大就漸會吞嚥軟質食物，所以四~六個月之間可以開始練習吃副食品，餵食時將食物輕置於舌頭中間。(有家族過敏性疾疾病或餵食母乳的寶寶，可以等到六個月後再開始)

(三) 添加副食品之原則

添加副食品應注意：

- 注意大便及皮膚的狀況
- 食物新鮮、盒具清潔
- 少量開始、逐漸增加
- 每次只添加一種新的食物
- 勿強迫餵食

3. អាហាររៀន

(1) តើមានការបំបាក់ដំបូក ឬទេ?

អាហាររៀន អាចបង្កប់កង្វះខាតជាតិអាហារដែលបានពិភាក្សាដោយម្តាយ ឬមិត្តភក្តិ និងដូចជាការបំបាក់ដំបូក ។

(2) តើមានការបំបាក់ដំបូក ឬទេ?

អាហាររៀនអាចបង្កប់កង្វះខាតជាតិអាហារដែលបានពិភាក្សាដោយម្តាយ ឬមិត្តភក្តិ និងដូចជាការបំបាក់ដំបូក ។

(3) ពេលពេលណាដែលគាត់ជាមួយដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយការកើត

សូមកត់សំគាល់៖

- កត់សំគាល់លើការបំបាក់ដំបូក និងលក្ខណៈផ្សេងៗ
- ប្រើដៃម្ខាងទៀត និងដៃម្ខាងទៀត ហើយដៃម្ខាងទៀត ទទឹងលើខ្នងទារកជាមួយធាតុដៃក្រោម ។
- តែងតែឱ្យកូនក្រីក្រនៅលើក្បាលរបស់ម្តាយ ដើម្បីបង្ការការកើតឱ្យមានការបំបាក់ដំបូក ។
- កុំបង្ខំទារកឱ្យបញ្ចប់

(四) 添加哪一類副食品?

(4) តើអារម្មណ៍បង្កឱ្យកូនប្រកាសឱ្យ ដៃគេចាំបាច់សំរាប់ទារក?

四-六個月 4-6 ខែ

- ▶ 果汁、菜水：如柳丁汁、西瓜汁、蔬菜湯
- 洗淨水果將果汁擠出，對等量開水。
- 將菜葉洗淨切碎，置入等量沸水中煮熟冷卻倒出。
- 每天一茶匙逐漸增加。



▶ មីកផ្លែឈើ និងមីកបន្លែ ដូចជាមីកក្រូចក្រូចបាច់ មីកឥណ្ឌូក និងមីកក្រូចបន្លែ។

- លាងផ្លែឈើ រួចក៏ត្រូវបាច់យកមីក។ បន្ថែមមីកចំនួនស្មើគ្នា។
- លាងសំអាតបន្លែ និងកាត់ជាដុំតូចៗ។ បន្ថែមមីកចំនួនស្មើគ្នារួចដាំរោយពុះ។ ទុករោយវាត្រជាក់ រួចចាក់វាចូលទៅក្នុងតាមមួយស្រោត។
- ចាប់ផ្តើមបញ្ចុះមួយស្លាបត្រាចាយ រួចបង្កើនបន្តិចម្តងៗ។

四-六個月 4-6 ខែ

- ▶ 果泥類：例如蘋果泥、木瓜泥、香蕉泥
- 洗淨水果切開以湯匙輕輕刮取成泥狀。
- 開始時給予一茶匙，以後慢慢增加。



▶ មីកក្រអូកផ្លែឈើ：មីកក្រអូកផ្លែឈើ មីកក្រអូកឈូង និងមីកក្រអូកផ្លែទេក

- បន្ទាប់ពីលាង និងកាត់ផ្លែឈើ ត្រូវប្រើស្លាបត្រា កាយយកសាច់ ផ្លែឈើ។
- បញ្ចុះមួយស្លាបត្រាចាយ រួចបង្កើនបន្តិចម្តងៗ។

四-六個月 4-6 ខែ

- ▶ 蔬菜泥類：例如胡蘿菔泥、馬鈴薯泥、莧菜泥。
- 洗淨去皮切塊狀入鍋蒸或煮。趁熱壓成泥。
- 開始時給予一茶匙，以後慢慢增加。



▶ មីកបន្លែបាច់：មីកក្រូច ដំឡូងបាច់ និងរោយបាច់

- បកសំបក និងកាត់ជាដុំតូចៗក្រោយពីលាងរួច ហើយដាំ ឬចំហុយវា។ ទៅលេងវាទៅក្រៅ ត្រូវក៏ត្រូវបាច់រោយទៅជាអាងដូចមីកក្រូចបាច់។
- បញ្ចុះមួយស្លាបត្រាចាយ រួចបង្កើនបន្តិចម្តងៗ។

四-六個月 4-6 ខែ

- ▶ 穀類食物：如米糊、麥糊。
- 稀飯煮爛或麥粉與牛奶混合餵食（由罐內量匙 1/4 開始加起）。
- 可直接與溫開水調成糊狀餵食（由一茶匙加起）
- 開始時給予一茶匙，以後慢慢增加。
- 可先餵米糊（較易消化），適應後再餵麥糊。



▶ ចេញជាពិភិទម្ងៈ រដូវក៏ទម្ងៈ និងរដូវសារីកិទម្ងៈ

- ជាបឋម ឬជាការផ្សំពីម្សៅអន្តរ និងមីកដាវេតា (ចាប់ផ្តើមពី ១/៤ ស្លាបត្រា រដូវ)
- ថែមមីកក្រអូកផ្លែឈើ ដើម្បីធ្វើជារដូវសារីកិទម្ងៈ (ចាប់ផ្តើមពី ១ ស្លាបត្រាចាយ)
- បញ្ចុះមួយស្លាបត្រាចាយ រួចបង្កើនបន្តិចម្តងៗ។
- គេណែនាំរោយចាប់ផ្តើមពីរដូវកិទម្ងៈ ត្រូវរវាងរយៈពេលស្រដៀងគ្នា។ បន្ទាប់ពីទារកចាប់ផ្តើមហើយ គេជំនួសវាដោយរដូវសារីកិទម្ងៈ។

七-九個月 ៧ ខែ ៤ ថ្ងៃ

▶ 蛋黃泥

- 雞蛋用水煮至全熟，取出蛋黃加入少量開水調成糊狀。
- 每天餵一次。開始由1/8個逐量增加。



▶ ស៊ុតស្រោចទាបៗ

- លោស៊ុតស្រោចឆ្អឹង ៧ដាក់ស៊ុតស្រោចទៅក្នុងមីកថាពុះដើម្បីធ្វើជាមីកទាបៗស៊ុតស្រោច ។
- បញ្ចុកមួយថ្ងៃម្តង ។ ចាប់ផ្តើមពី ១/៨ ដុំ រួចបង្កើតបង្កើតម្តង ។

七-九個月 ៧ ខែ ៤ ថ្ងៃ

▶ 粥類、麵類 (可摻入瘦肉湯、魚、蔬菜、豆腐等配料)。

- 將細麵或粥煮爛，依實需加入上項任一配料即可。
- 粥或麵要煮爛 (呈半固體)，且勿太稠。
- 煮熟魚肉要弄碎，並將魚刺剷除乾淨。
- 蔬菜梗應去除，葉要剷碎，以免噎到。
- 摻入之配料勿太多、太雜。



▶ បបរ និង មី (អាចប្រើមីកស៊ុតស្រោចត្រី បរិខ្លួម និងទាបៗ)

- ប្រុសមីសរសៃតូច ឬបបរ រួចបរិខ្លួមអាហារណាមួយ ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ។
- មី ឬបបរ ត្រូវដាំសោយ ឆ្អឹងល្អ ឬចាក់កណ្តាលវិង ។ កុំធ្វើសោយវាស្លិតពេក ។
- ត្រីត្រូវកិនសោយឆ្អឹង ហើយដកយកឆ្អឹងចេញ ។
- ត្រូវបេះបាងបរិខ្លួម និងមីកស៊ុតស្រោចជាដុំតូចៗ ដើម្បីបង្ការការឆ្លាក់ ។
- អាហារបរិខ្លួមមិនត្រូវធ្វើឲ្យពេក ឬលាក់ក្នុងពេកទេ ។

十-十二個月 ១០ ខែ ១២ ថ្ងៃ

▶ 除參照7至9個月食物另可摻入碎肉、吻仔魚等柔軟細碎之固體食物。亦可用排骨湯煮麵、粥。例如吻仔魚粥、排骨湯麵、餛飩湯、蘿蔔糕、蛋糕、雞蓉玉米湯。



- 碎肉要弄得細碎。
- 吻仔魚如欲炒香，須揉碎再餵食。
- 排骨湯之浮油要去除 (可先冷藏，再刮除浮油)。
- 蔬菜洗淨，梗應去除，葉要剷碎，以免噎到，煮熟後撈出。

▶ ក្រៅពីអាហាររស់រាប់ទារកអាចពិព័រណ៍នៃដួងចុះរៀបរាប់ខាងលើតាមបរិមាណអាហារជាតិសាច់ដូចជាសាច់ត្រី និងកូនត្រី ។ មិនមែនដួងជាអាហារក្នុងស៊ុតឆ្អឹងជំនីក៏ជាជំនីស្នូលដែរដូចជាបបរត្រីស៊ុតឆ្អឹងជំនីស៊ុតមីត្រូវខំកូរឆ្អឹងទាបៗ និង ស៊ុតពោតសាច់ទាបៗ ។

- មីក្រូរ៉ោសរសៃតូច
- ជីវិតសាច់ត្រី ហាត់តូចៗមុននឹងបញ្ចាក់ ។
- គេត្រូវយកគ្នាញ់អណ្តើតក្នុងស៊ុតឆ្អឹងជំនីចេញគេត្រូវដាក់ស៊ុតក្នុងទូមីកកកសិនដើម្បីទាញប្រុសចេញពីក្នុងស៊ុតចេញ
- ត្រូវបេះបាងបរិខ្លួមមីកស៊ុតស្រោចជាដុំតូចៗដើម្បីបង្ការការឆ្លាក់ ។ យកបរិខ្លួមចេញទៅលេងវាឆ្អឹង ។

十-十二個月 ១០ ខែ ១២ ថ្ងៃ

▶ 蒸全蛋

○ 將全蛋在碗中打勻，加水八分滿及少許鹽拌勻，置鍋中小火蒸約20-25分鐘。



▶ ចំហុយស៊ុតសោ

○ ស៊ុតក្នុងទាបៗអាហារណាមួយរួចបរិខ្លួមមីក១០០%កាតយនៃទាប និងលាយអំបិលបង្កើតឱ្យយកក្នុងឆ្នាំងដោយប្រើកំដៅភ្លើងតិចៗក្នុងរយៈពេលពី ២០ដល់២៥នាទី ។

一至二歲以上

មួយទារកម្នាក់ឡើង



▶ 每天每日飲食參考表

- 牛奶2杯 (每杯240 c.c.) 稀飯2碗
- 肉或魚類 1兩 蛋1個
- 蔬菜1碟 (約2兩) 水果1份

▶ 可均衡調配攝取各類較柔軟的固體食物。

例如蛋包飯、什錦炒麵、排骨糙米粥、三色燴飯、肉燥河粉、三色卷等。

- 餵食時應與孩子面對面，讓孩子坐椅子上，不要跑來跑去。
- 每次進食適當時間為三十分鐘，沒吃完應收起。
- 兩餐之間勿給零食，用餐前不給飲料，以免影響食慾。
- 應培養孩子獨立進食的習慣。

▶ របបអាហារប្រចាំថ្ងៃ ជាទំនាក់

ទឹកដោះដោ ២ កែវ (២៤០ លេស ក្នុង១កែវ)	ចបរ ២ ចាន
សាច់ ឬ ត្រី ៤០ ក្រាម	ផ្លែ ១
បន្លែ ១ចាន (ប្រហែល ៨០ ក្រាម)	វ៉ែនធី ១ វ៉ែន

▶ ទារកនឹងអាចរំលាយអាហារទំនាក់គ្រប់យ៉ាង ដូចជាឈាម មីនា ចបរឈាម ផ្លែឈើ ចបរ ឬ ឈាមឈាម ត្រៀមណាស់ មីឬ គុយទាវ ពោលជាមួយសាច់ចំណី និងដុំឈាម ។

- ទារកត្រូវអង្គុយចង់មុខម្តាយ ។ ដាក់ទារករកយកអង្គុយលើកៅស៊ូ កុំអោយ វាដំលេចចុះ ឡើង ។
- ផលប៉ះពាល់ពួកអាហារសម្រប គឺប្រហែល៣០ខាតិ ។ អាហារដែលទាំងសង្ខេបសាង សំអាតចេញ ។
- កុំអោយទារកប្តូរអាហារប្រក្រាវពេល ទៅខ្លះខាតពេលវេលា ។ កុំអោយទារកទឹកទឹកក្រួត មុនពេល បញ្ជូកអាហារ ដើម្បីកុំអោយវាសាច់វិធាន ។
- ត្រូវប្រៀបធៀបសាច់ទារកអោយនេះប្តូរដោយខ្លួនឯង ។

四、斷奶 4. magtòché

如果您已經開始為寶寶添加副食品，便是準備斷奶了。(但哺餵母乳者則可持續哺餵到寶寶兩歲或兩歲以上)

ប្រសិនបើអ្នកបានចាប់ផ្តើមបន្ថែមអាហារបន្ថែមទៅលើរបបអាហាររបស់ទារកហើយ នោះមានន័យថា ទារកអាចផ្លាស់ដោះដោយបានហើយ ។ (សំរាប់ទារកដែល ដោះដោយម្តាយ អាចចាំបន្តបូកដល់របបអាហារដាច់ពីទារក ។)

(一) 若是喝牛奶的寶寶，六個月以後開始訓練寶寶用杯子，為日後戒斷奶瓶做準備。

- (1) ទារកដែលចេញទឹកដោះដោយតាមរបបបច្ចុប្បន្ន អាចត្រូវបានបន្លាត់ អោយច្នាំទឹកដោះដោយពីពេលដែលត្រូវបាន ពេទ្យប្រចាំសំរាប់ធ្វើអោយ ទារកផ្លាស់ទឹកដោះដោយដែលវាចេញតាមរបបទឹកដោះដោយ ក្នុងពេលអនាគត ។



(二) 一般可在一歲左右完成，可添加菜肉泥稀飯由1湯匙逐漸增加為一碗，一天兩次，以母乳或牛奶當點心便完成斷奶了。

- (2) ផ្លាស់ដោះទារកដែលចេញទឹកដោះដោយពីរបបទឹកដោះដោយ ត្រឹមត្រូវ ១២ ខែ ។ យករបបឈាមជាមួយទឹកដោះដោយ និងសាច់ចំណីជាអាហារសំខាន់ ដោយបន្តិចបន្តួច ពីមួយស្លាបត្រូវទៅមួយចាន ដោយអោយទឹកដោះដោយ ឬទឹកដោះដោយជាអាហារប្រក្រាវពេល ។ ធ្វើដូចនេះ អោយស្រួលផ្លាស់ដោះទារកជាង ។


第五章

V

事故傷害預防

ការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ

一、6個月以下 1. ទារកអាយុក្រោម ៦ ខែ



- 注意環境安全
- យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ



- 注意欄杆安全
- យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ របងព្រួញរបស់ក្មេង



- 預防被幼兒所傷
- បង្ការគ្រោះថ្នាក់ចំពោះ កុមារដទៃទៀត

二、6-12個月 2. ទារកអាយុក្រោម ៦ ខែ និង ១២ ខែ



- 預防跌落
- បង្ការពីការធ្លាក់ពីទីខ្ពស់



- 注意危險物品放置
- យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទុកដាក់ របស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់



- 禁止進入廚房
- កុំបណ្តោយអោយកូនចូលចេញ របស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់



- 預防燙傷
- បង្ការពីការលាក់ផ្សេងៗ



- 選擇安全玩具
- ជ្រើសរើសប្រដាប់ប្រដារលេង ដែលមានសុវត្ថិភាព

三、1-2歲 3. ពី១ឆ្នាំទៅដល់២ឆ្នាំ

1-2 ឆ្នាំ លើកលែងតែការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដទៃទៀត គួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទារកអាយុក្រោម ១ ឆ្នាំ និង ២ ឆ្នាំ



- 勿讓小孩獨處
- កុំបណ្តោយអោយទារកអាយុ ដៅច្រាក់ដៃ



- 預防車輛傷害
- បង្ការពីគ្រោះថ្នាក់របស់យាន យន្ត



第七章  
VII

大小便訓練

ការបណ្តុះបណ្តាលអោយទេវប្រើបង្គំ

一、開始訓練的時間 1. ពេលវេលាដែលត្រូវចាប់ផ្តើមបណ្តុះបណ្តាល

1 歲以後，且

- 1. 可以站立
- 2. 大便時間有規律，且能發出聲音或特殊表情。

ទារកអាចឡើងដើរ ដែល :

- 1. អាចឆេវជាប់
- 2. មានលក្ខណៈឡើងទាត់ និងអាចធ្វើសំឡេង និងបង្ហាញការយឺត ទៅពេលចង្កោរបង ។

二、訓練的方法 2. វិធីសាស្ត្រ ៃការបណ្តុះបណ្តាល

(一) 讓小孩盡量在輕鬆的心情下完成，如有失誤勿予責罵。

(二) 訓練時勿給予食物或玩具，以免分散注意力。

- (1) ទុកអោយទារកបញ្ចប់តាមស្វ័យ ។ បើទារកធ្វើខុសមួយខ្លះ កុំជេរវាយដំ ។
- (2) ទៅពេលបង្គាប់ច្រៀង កុំអោយទារក ឬប្តូរទីកន្លែងដើរទៅទារក ត្រូវដាក់អោយទារកបែក ការម្នាក់ពីការរៀនសូត្រ ។



固定地點及合適便盆  
ជ្រើសរើសទីកន្លែងកំណត់  
និងបង្គំស្រួលប្រើ



成功時予以稱讚、鼓勵  
មានការសរសើរ និងលើកទឹកចិត្ត

三、完成訓練的時間 3. ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ការបង្គាប់ច្រៀង

(一) 大便訓練在1至2歲左右可完成。

(二) 小便訓練在2-3歲時，可完成。

- (1) បង្គាប់ច្រៀងដំបូងគ្រប់ដំណើរការដល់សព្វគ្រប់នៅអាយុ ១ឆ្នាំដល់២ឆ្នាំ
- (2) បង្គាប់ច្រៀងដំបូងគ្រប់ដំណើរការដល់សព្វគ្រប់នៅអាយុ២ទៅ៣ឆ្នាំ ។

第八章 VIII

兒童預防保健服務

ការពិនិត្យសុខភាពសំរាប់កុមារ

兒童預防保健服務，是全民健康保險專為未滿七歲以下兒童設計，共九次的免費健康檢查服務。

ការពិនិត្យសុខភាពសំរាប់កុមារ គឺជាសេវាបង្កើតឡើងសំរាប់កុមារអាយុក្រោម៧ឆ្នាំ ដែលក្នុងនេះមាន ការពិនិត្យដោយឥតបង់ថ្លៃចំនួន ៩ដង ។ សេវាទាំងនេះផ្តល់អោយដោយផ្នែកធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ ។

一、檢查時程

出生未滿一歲給付四次，每次間隔二至三個月；一歲以上至未滿兩歲給付兩次、兩歲以上至未滿三歲給付乙次；三歲以上至未滿四歲給付乙次、四歲以上至未滿七歲給付乙次。

二、提供之健康檢查項目

身體檢查：病史查詢、身高、體重、聽力、視力、口腔檢查、生長發育評估等。  
健康諮詢：預防接種史查詢、營養、事故傷害預防及口腔保健。

1. ការពិនិត្យ

មានការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតបង់ថ្លៃចំនួន ៤ដង សំរាប់ទារកអាយុក្រោម១ឆ្នាំ ចន្លោះពេលពី ៧ខែទៅ ១២ខែ ។  
មានការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតបង់ថ្លៃចំនួន ២ដង សំរាប់ទារកអាយុចន្លោះ ១ ឆ្នាំ និង ២ ឆ្នាំ ។  
មានការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតបង់ថ្លៃចំនួន ១ដង សំរាប់ទារកអាយុចន្លោះ ២ ឆ្នាំ និង ៣ ឆ្នាំ ។ មានការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតបង់ថ្លៃចំនួន ១ដង សំរាប់ទារកអាយុចន្លោះ ៣ ឆ្នាំ និង ៤ ឆ្នាំ ។ មានការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតបង់ថ្លៃចំនួន ១ដង សំរាប់ទារកអាយុចន្លោះ ៤ ឆ្នាំ និង ៧ ឆ្នាំ ។

2. សេវាពិនិត្យសុខភាពដែលផ្តល់អោយ

ពិនិត្យរាងកាយ ៖ ប្រវត្តិជំងឺ កំពស់ ទម្ងន់ សោតវិញ្ញាណ ឥក្ខវិញ្ញាណ ការពិនិត្យមាត់ធ្មេញ និងការវាយ តំលៃលើការលូតលាស់ ។  
ការពិគ្រោះសុខភាព ៖ ការពិនិត្យប័ណ្ណមាត់ថ្នាំបង្ការ អាហាររូបត្ថម្ភ ការបង្ការពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ និងការថែទាំធ្មេញ ។

三、那些特約醫療院所，可以受理兒童預防保健服務？

如果您要帶家中的寶寶接受兒童預防保健服務，可前往聘有家醫科或小兒科專科醫師的健保特約醫院、診所及衛生所，即可受理本項服務。

3. តើមន្ទីរពេទ្យ ឬវិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាល ដែលផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាព សំរាប់កុមារ ។


ប្រសិនបើអ្នកមិនបំប្រុងទុកជាមុន ទូរស័ព្ទពិនិត្យសុខភាព ឬការត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលមានមន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាលវេជ្ជកម្មវិទ្យាស្ថាន វេជ្ជកម្មវិទ្យាស្ថាន វេជ្ជកម្មវិទ្យាស្ថាន និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋាន ។

四、寶寶檢查前要準備什麼？

- (一) 請持寶寶之「兒童健康手冊」及健保IC卡前往辦理本服務的健保特約院所接受檢查，接受本服務時不用繳交部分負擔。
- (二) 接受免費兒童健康檢查前，請家長事先填好「兒童健康手冊」中「生長紀錄表」及「家長紀錄欄」的各項問答，以建立寶寶的健康紀錄與生長發育資料，供醫護人員參考。

4. ការត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសំរាប់ការពិនិត្យសុខភាពកុមារ

- (1) សូមយកទៅជាមួយ ៖ សៀវភៅសុខភាពកុមារ និង ប័ណ្ណ ៥ បាទាវាច់សុខភាពជាតិ ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលផ្តល់សេវានេះ ។ សេវានេះឥតមានបង់ថ្លៃទេ ។ មានតែការចុះឈ្មោះ ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវគិតថ្លៃ ។
- (2) មុននឹងពិនិត្យសុខភាពត្រូវបំពេញ ៖ សៀវភៅសុខភាពកុមារ កំណត់ត្រាការលូតលាស់ និងបំពេញកំណត់ត្រាសុខភាពរបស់មេត្រូសាវ ។ បើស្ត្រីបង្កើតកំណត់ត្រាសុខភាពរបស់ទារកនិង មិនដឹងសំរាប់ជាបាទាវាច់សុខភាពរបស់បុគ្គលិកពេទ្យ ។



● 兒童健康手冊  
● ប្របសៀវភៅ សុខភាពកុមារ



● 健保IC卡  
● ប័ណ្ណ IC បាទាវាច់សុខភាពជាតិ

第九章 IX 篩 檢  
ការពិនិត្យសំរាំង

一、新生兒先天性代謝異常疾病篩檢

(一) 目的

許多先天性代謝異常疾病，在嬰兒期症狀表現不明顯，因此必須藉助新生兒先天性代謝異常疾病篩檢（簡稱新生兒篩檢）來作早期發現早期治療，以免造成兒童生長發育遲滯或終身智能及身體障礙。

(二) 檢驗時間

新生兒出生後二至三天或進食廿四小時之後，由醫療人員採取少量足跟血，檢驗是否有「先天代謝異常疾病」。

(三) 目前政府補助新生兒先天性代謝異常篩檢五種疾病

1. 先天性甲狀腺低功能症
2. 半乳糖血症
3. 苯酮尿症
4. 高胱氨酸尿症
5. 葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶缺乏症 G-6-P-D (俗稱蠶豆症)

(四) 檢驗結果

您可詢問原接生院所有關寶寶的篩檢結果，或利用新生兒篩檢中心之網路、電話語音查詢。

若寶寶篩檢結果為疑似異常，新生兒篩檢中心會轉知接生院所，儘速以電話通知家長，帶您的寶寶接受進一步檢查。

1. ការពិនិត្យរោគសំរាំងទារកដែលរកមើលការខូចមេតាបូលីសពីកំណើត

- (1) វត្តចំណេះ  
រោគសញ្ញាជាច្រើននៃការខូចមេតាបូលីសពីកំណើត មិនសូវស្តែងច្បាស់ទេ ទៅក្នុងវិធានកុមារភាព ។ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសំរាំងពិនិត្យលើទារកទើបមិនកើត ដើម្បីរកជំងឺផ្សេងៗ និងរក្សាចលនា ទាំងនោះពីដើមដំបូង ក្រុមទាំងដើម្បីបង្ការរោគមិនសូវរីកលូតលាស់ខាងបញ្ចេញ ជាមេទីត្រូយី និងពិការភាពខាងផ្លូវកាយ ឬការមិនសូវរីកលូតលាស់ ទៅក្នុងរាងកាយដែលកុមាររោគខូចមេតាបូលីសពីកំណើត ។
- (2) កាលវិភាគនៃការពិនិត្យសំរាំង  
បុគ្គលិកពេទ្យ ឬមនុស្សមួយចំនួនខ្លះ ពិសេសទើបមិនកើតបាន ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃក្រោយ សំរាំង ឬ ២៤ ម៉ោងក្រោយទៅ ដើម្បីពិនិត្យរោគខូចមេតាបូលីសពីកំណើត ។
- (3) គោលការណ៍បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលជួយការពិនិត្យរោគខូចមេតាបូលីសពីកំណើតដែលរកមើលការ ខូចមេតាបូលីសពីកំណើត ។
  1. ជំងឺកង្វះក្រូម៉ូសូមីត
  2. ពេញនិយមក្នុងកុមារ
  3. អូម៉ូស៊ីស ក្នុងទឹកនោម
  4. ពេញនិយមក្នុងទឹកនោម
  5. ជំងឺអ៊ីដូស៊ីយ៉ា dehydrogenase សំរាំងបំបែកជាតិក្នុងកូស-៦-ផូស្វាត (G-6-P-D)
- (4) លទ្ធផលនៃការពិនិត្យសំរាំង  
អ្នកអាចទទួលបានលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសំរាំងពីមន្ទីរពេទ្យដែលទារកកើត ពីអ៊ីនធឺណិត ឬពីប្រព័ន្ធសំរាំងពិនិត្យ ផ្ញើរដោយសំបុត្រវិទ្យុនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសំរាំងកុមារដែលទើបកើត ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលរកឃើញថាអត្រាក្រៅពី មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសំរាំងកុមារដែលទើបកើត មិនដូចដំណឹងដល់មន្ទីរពេទ្យ ដែលទារកកើត ដើម្បីជំរាបឱ្យកុមាររបស់ទារក ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកផ្សេង អ្នកត្រូវទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក មកទទួលការពិនិត្យ ។

### 二、膽汁滯流症篩檢

透過「嬰兒大便顏色識別卡」，仔細比對觀察嬰兒大便，可以早期發現膽道閉鎖症儘早就醫。膽道閉鎖宜在出生50天內完成診斷，60天以內（愈早愈好）完成手術，否則膽汁滯留在肝內，很容易造成肝硬化，不及時治療，多在2歲內會死亡。

- (一) 嬰兒好發膽汁滯流症及新生兒黃疸，若黃疸延遲至第3-4週之後，有部份嬰兒可能患有膽汁滯流症。
- (二) 膽汁滯流症症狀：皮膚會呈現黃疸、眼白變黃及大便常會變成淡黃色或灰白色（表示膽汁排泄減少或完全消失）。

### 2. ការពិនិត្យសំរាំងដើម្បីការបញ្ជប់ការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់

សង្កេតមើលនិងច្របូបឡើងវិញដើម្បីការពិនិត្យទារកដោយធ្វើ ប័ណ្ណសំរាំងពណ៌នាមាត់ ដើម្បីរកឃើញ ជំងឺធ្លាក់ចំពោះទឹកប្រមាត់ទាំងពេលវេលាហើយព្យាបាលទាំងពេលវេលា។ ជំងឺធ្លាក់ចំពោះទឹកប្រមាត់ ត្រូវពិនិត្យបើចេញក្នុងកំឡុងពេល៧០ថ្ងៃក្រោយពីកើតនិងធ្វើការវាស់វែងក្នុងកំឡុងពេល៦០ថ្ងៃ (ដាច់ចូរ) បើទឹកប្រមាត់នៅក្នុងក្លើរ ដោយបង្កើតឡើងហើយនិងព្យាបាលបិទទាំងពេលវេលា ទារកត្រូវនឹង ស្លាប់មិនរហូសអាជ្ញាធុ។

- (1) ទារកទើបកើត រយៈពេល១ខែដល់១០ខែការបញ្ជប់ការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ និងការចេញឡើងដើម្បីការពិនិត្យ។ បើសិនជាការចេញឡើងដើម្បីការពិនិត្យ គួតទៅក្នុងរយៈពេល ៣ ទៅ ៤ សប្តាហ៍ ដោយការរកទាញចេញ ខែការបញ្ជប់ការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់។
- (2) រោគសញ្ញាខែការបញ្ជប់ការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ : ពណ៌សំបុកស្បែក ឡើងឡើង ។ ផ្នែកសរសៃឱក ឡើងឡើង ហើយនាមកក់ប្រែទៅជាឡើងថ្មី ឬសប្រផេះ (នេះមានន័យថា ការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ត្រូវ ថយចុះ ឬត្រូវបាត់បង់) ។

仔細觀察嬰兒大便顏色，可早期診斷膽汁滯流症  
ពេលវេលាធ្វើនេះគួរតែធ្វើឡើងឆាប់ ចំពោះការបញ្ជប់ការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ ដោយសង្កេតមើលពណ៌នាមាត់ទារក។

### 三、何種方式可早期協助膽汁滯流症篩檢？

- 若膽汁順利排出，大便呈現黃色或綠色，亦即編號4到6號顏色（如圖），此為正常狀況。
- 若膽汁遭到阻塞或滯留，則大便顏色呈現淡黃或灰白色表示膽汁排泄減少或完全消失，亦即編號1到3號顏色（如圖），此為不正常狀況，必須儘早就醫治療，請教專業兒科醫師或轉診至兒科消化專科醫師。

### 3. តើគេត្រូវធ្វើការពិនិត្យសំរាំងពណ៌នាមាត់របស់ការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ យ៉ាងដូចម្តេច ?


- បើសិនជា មានការបញ្ចេញទឹកប្រមាត់ដោយស្រួល វាមិនមែនជាមួយនាមក ធ្វើអោយនាមក មកមានពណ៌ឡើង ឬ បែកចំពោះចេញនៅក្នុង រូបភាព ៤ ទៅ ៦ ខាងលើ ។ នេះជាការល្អមួយ ។
- បើសិនជាទឹកប្រមាត់ត្រូវស្ទុះនៅក្នុងខួរ នាមកមិនដូរពណ៌ ទៅជា ឡើងថ្មី ឬសប្រផេះ មានថា ទឹកប្រមាត់ថយ ឬ អត់មានទាំងស្រុងដូចរកឃើញនៅក្នុងរូបភាព ១ ទៅ ៣ ខាងលើ ។ នេះជាការល្អមិនមួយ ។ គួរតែពិនិត្យពិនិត្យនេះ ព្រោះវាមានបញ្ហាមកពីជំងឺធ្លាក់ចំពោះទឹកប្រមាត់ ហើយត្រូវទៅពិបាកជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាម្ចាស់ ។

嬰兒大便顏色識別卡  
ការស្ករសំរាំងពណ៌នាមាត់

#### ● មិនមួយ



#### ● មួយ



- 若您的選項是1-3，請24小時之內立即將此頁表格影印傳真給大便卡諮詢中心，我們會給您幫忙與協助。

傳真：02-2388-1798 電話：02-2382-0886

寶寶的異常大便顏色與編號 \_\_\_\_\_ 的大便最相似

發現此種顏色的大便是在 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

寶寶的姓名 \_\_\_\_\_ 生日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

母親的姓名 \_\_\_\_\_ 電話 \_\_\_\_\_

住址 \_\_\_\_\_

寶寶在 \_\_\_\_\_ 醫院/診所出生

- បើសិនជា ចំណីរបស់អ្នក គឺ លេខ ១ ទៅ លេខ ៣ ស្មុគស្មាញដល់ដំបូង ហើយធ្វើជាមួយទូរស័ព្ទ ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះជំនួយសំភារៈពណ៌សមាម ។ យើងនឹងជួយអ្នក ។

ទូរស័ព្ទលេខ : ០២-២៣៨៨-១៧៩៨ ទូរសារ : ០២-២៣៨២-០៨៨៦

ពណ៌សមាមរបស់ទារក ដូចរូបលេខ \_\_\_\_\_

ភាពមិនស្មុគស្មាញរបស់សមាមលេចឡើងនៅ ថ្ងៃ \_\_\_\_\_ ខែ \_\_\_\_\_ ឆ្នាំ \_\_\_\_\_

ឈ្មោះរបស់ទារក : \_\_\_\_\_ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : \_\_\_\_\_

ឈ្មោះរបស់ម្តាយ : \_\_\_\_\_ ទូរស័ព្ទ : \_\_\_\_\_

អាសយដ្ឋាន : \_\_\_\_\_

មីក្រូមកំណើត : \_\_\_\_\_

第十章  
XI

服務處所

កន្លែងផ្តល់សេវា

- 婦產科醫療院所：可提供產前檢查、生產、產後檢查、家庭計畫、產前遺傳診斷、新生兒先天代謝疾病篩檢、優生健康檢查及遺傳諮詢等服務。
- 小兒科醫療院所：可提供兒童預防保健檢查、生長發育、預防接種及諮詢服務。

以上服務處所，可向各地區衛生局、衛生所洽詢，請善加利用。

- វិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រ ផ្នែកសំរាម និងរោគស្រ្តី : ផ្តល់សេវាពិនិត្យមុនសំរាម សំរាមក្នុង ការពិនិត្យក្រោយសំរាម ផែនការគ្រួសារ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមបែបប្រទេសនៅមុនសំរាម ការពិនិត្យសំរាមសម្រាប់កម្រិត និងកើត ការពិនិត្យសុខភាពនៅពេលកើត និងការពិគ្រោះផ្នែកប្រទេសទឹក នៅមុនសំរាម ។
- វិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកជំងឺកុមារ : ផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពកុមារ ការពិគ្រោះអំពីការស្តុកសំរាមរបស់កុមារ ការចាក់ថ្នាំបង្ការ និងការពិគ្រោះផ្សេងៗទៀត ។

សំរាប់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងបណ្តាសេវាទាំងនេះ សូមទាក់ទងមួយនឹងកមិយាជ័យសុខាភិបាល ឬមណ្ឌលសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ។

各縣市衛生局專線服務電話，如下：

單位	聯絡電話	傳真電話
台北市政府衛生局	(02) 27287079	(02) 27205260
高雄市政府衛生局	(07) 7128939	(07) 7243588
基隆市衛生局	(02) 24261133	(02) 24282255
新竹市衛生局	(03) 5256504	(03) 5222572
台中市衛生局	(04) 23801180	(04) 23801124
嘉義市衛生局	(05) 2338252	(05) 2341185
台南市衛生局	(06) 2673880	(06) 2698029
宜蘭縣政府衛生局	(03) 9367855	(03) 9367855
台北縣政府衛生局	(02) 22577155	(02) 22585006
桃園縣衛生局	(03) 3378854	(03) 3321073
新竹縣衛生局	(03) 5518164	(03) 5512743
苗栗縣衛生局	(037) 336735	(037) 360649
台中縣衛生局	(04) 25261814	(04) 25263401
彰化縣衛生局	(04) 7119095	(04) 7121309
南投縣政府衛生局	(049) 2231624	(049) 2202628
嘉義縣衛生局	(05) 3620602	(05) 3621188
雲林縣衛生局	(05) 5325220	(05) 5345633
台南縣衛生局	(06) 6352633	(06) 6321251
高雄縣政府衛生局	(07) 7334881	(07) 7334863
屏東縣衛生局	(08) 7372507	(08) 7382389
台東縣衛生局	(089) 329171	(089) 310334
花蓮縣衛生局	(03) 8230791	(03) 8230169
澎湖縣衛生局	(06) 9272162	(06) 9261557
金門縣衛生局	(082) 330697轉123	(082) 336021
連江縣衛生局	(0836) 22095	(0836) 25024

លេខវ៉ាន់កំចំខណ្ឌទូរស័ព្ទរបស់ការិយាល័យសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ពីមាត់ទូរស័ព្ទខាងក្រោម ៖

មីក្រូកំរង	លេខទូរស័ព្ទ	លេខទូរសារ
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ	(02) 27287079	(02) 27205260
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងព្រះកែវសៀម	(07) 7128939	(07) 7243588
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងព្រៃនប់	(02) 24261133	(02) 24282255
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែង	(03) 5256504	(03) 5222572
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងតែជូន	(04) 23801180	(04) 23801124
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុង Chai-I	(05) 2338252	(05) 2341185
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងតែឃោន	(06) 2673880	(06) 2698029
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកអ៊ូឡាន	(03) 9367855	(03) 9367855
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកតែជូន	(02) 22577155	(02) 22585006
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកសាវជ័យ	(03) 3378854	(03) 3321073
ការិយាល័យសុខាភិបាលស្ទឹងត្រែង	(03) 5518164	(03) 5512743
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកមាសិ	(037) 336735	(037) 360649
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកតែជូន	(04) 25261814	(04) 25263401
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកចាងហ្វូ	(04) 7119095	(04) 7121309
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកឃោនតូ	(049) 2231624	(049) 2202628
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុក Chai-I	(05) 3620602	(05) 3621188
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកចូឡិន	(05) 5325220	(05) 5345633
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងតែឃោន	(06) 6352633	(06) 6321251
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងព្រះកែវសៀម	(07) 7334881	(07) 7334863
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងព្រៃនប់	(08) 7372507	(08) 7382389
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងតែជូន	(089) 329171	(089) 310334
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកឃោន	(03) 8230791	(03) 8230169
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកស្ទឹងត្រែង	(06) 9272162	(06) 9261557
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកគីមម៉ុន	(082) 330697 ចុះលេខប្រទេស 123	(082) 336021
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងស្រុកឃោនជ័យ	(0836) 22095	(0836) 25024

## 國家圖書館出版品預行編目資料

外籍配偶育兒保健手冊：照顧寶寶有一套

= Proficient in Taking Care of Baby

行政院衛生署國民健康局編著，第一版

臺中市：行政院衛生署國民健康局，民93

面： 公分

中英對照

ISBN 957-01-8638-0 〈平裝〉

1. 優生保健 - 手冊，便覽等

412.58026 92018942

題 名：外籍配偶育兒保健手冊

編 著 者：行政院衛生署國民健康局

規劃小組：〈蘇淑貞、李美慧、陳麗娟、劉瓊瑛、王春美〉

審稿委員：張瑞幸、朱斯鴻

出版機關：行政院衛生署國民健康局

電 話：(04) 2259-1999

地 址：台中市黎明路二段503號

網 址：<http://www.bhp.doh.gov.tw/>

企劃設計：傲圖國際股份有限公司 電話：(02) 2391-8223

出版年月：中華民國九十三年十月

版 次：第一版

刷 次：第一刷

工 本 費：新台幣八元整

GPN: 1009303077

ISBN: 957-01-8638-0 平裝